Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►**B**

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 418/2001

2001 m. kovo 1 d.

dėl leidimo naudoti naujus pašarų priedus arba naujai paskirčiai senuosius

(tekstas svarbus EEE)

(OL L 62, 2001 3 2, p. 3)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1519/2007 2007 m. gruodžio 19 d.	L 335	15	2007 12 20
►**M2**	Komisijos reglamentas (EB) Nr. 976/2008 2008 m. spalio 6 d.	L 266	3	2008 10 7

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 418/2001

2001 m. kovo 1 d.

dėl leidimo naudoti naujus pašarų priedus arba naujai paskirčiai senuosius

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2697/2000 ([2]), ypač į jos 4 straipsnį,

kadangi:

(1) Direktyvoje 70/524/EEB yra numatyta, kad persvarsčius paraišką, pateiktą remiantis tos direktyvos 4 straipsnio nuostatomis, gali būti leidžiama naudoti naujus priedus ar nauja paskirtimi senuosius.

(2) Direktyvos 70/524/EEB 9e straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad gali būti laikinai leidžiama naudoti naujus priedus arba naujai paskirčiai senuosius, jei laikomasi Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnio b–e punktų reikalavimų ir jeigu, atsižvelgiant į turimus rezultatus, galima pagrįstai daryti prielaidą, kad, naudojami pašaruose, jie turi vieną iš 2 straipsnio a punkte nurodytų poveikių. Minėtos direktyvos C priedo II dalyje nurodytiems priedams šis laikinas leidimas suteikiamas ne ilgesniam kaip ketverių metų laikotarpiui.

(3) Įvertinus pateiktus dokumentus, paaiškėjo, kad šio reglamento I ir II prieduose aprašyti nauji mikroorganizmų bei fermentų preparatai ir jų nauja paskirtis atitinka anksčiau minėtus reikalavimus, ir todėl laikinai, ne ilgiau kaip ketverius metus, juos galima leisti naudoti.

(4) Direktyvos 70/524/EEB 2 straipsnio aaa punkte reikalaujama, kad leidimai naudoti kokcidiostatus būtų siejami su asmeniu, atsakingu už jų išleidimą į apyvartą.

(5) Direktyvos 70/524/EEB 9b straipsnyje yra numatyta, kad leidimas naudoti šias medžiagas būtų suteikiamas dešimčiai metų, skaičiuojant nuo galutinio leidimo įsigaliojimo datos, jei laikomasi visų Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnyje nustatytų reikalavimų.

(6) Įvertinus pateiktus dokumentus paaiškėjo, kad šio reglamento III priede aprašytas kokcidiostatas atitinka visus 3a straipsnio reikalavimus, kai jie yra naudojami tame priede nurodytos kategorijos gyvūnams tame priede nurodytomis sąlygomis.

(7) Įvertinus dokumentus paaiškėjo, kad norint apsaugoti darbuotojus nuo priedų poveikio gali būti reikalaujama laikytis tam tikros tvarkos. Tačiau minėtą apsaugą turėtų užtikrinti 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo ([3]) ir su ja susijusių direktyvų taikymas.

(8) Gyvūnų mitybos mokslinis komitetas pateikė nuomonę, kad, laikantis minėtuose prieduose aprašytų sąlygų, fermentų bei

([1]) OL L 270, 1970 12 14, p. 1.
([2]) OL L 319, 2000 12 16, p. 1.
([3]) OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

▼B

mikroorganizmų preparatai ir kokcidiostatas yra nekenksmingi ir kad pastarojo poveikis gyvūnų produktyvumui yra teigiamas.

(9) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento I priede išvardytus „mikroorganizmų“ grupei priskiriamus preparatus leidžiama naudoti kaip pašarų priedus laikantis tame priede nustatytų reikalavimų.

2 straipsnis

Šio reglamento II priede išvardytus „fermentų“ grupei priskiriamus preparatus leidžiama naudoti kaip pašarų priedus laikantis tame priede nustatytų reikalavimų.

3 straipsnis

Šio reglamento III priede nurodytą „kokcidiostatų ir kitų vaistinių medžiagų“ grupei priskiriamą preparatą leidžiama naudoti kaip pašarų priedą laikantis tame priede nustatytų reikalavimų.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2001 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

I PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					KSV/kg visaverčių pašarų	KSV/kg visaverčių pašarų		
20	*Bacillus licheniformis* DSM 5749 *Bacillus subtilis* DSM 5750 (Santykiu 1/1)	*Bacillus licheniformis* ir *Bacillus subtilis* mišinys, kuriame yra ne mažiau kaip $3,2x10^9$ KSV/g priedo (1,6xKSV/g kiekvienos bakterijos)	Veršeliai	6 mėn.	$1,28x10^9$	$1,6x10^9$	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.	2005 2 28
21	*Enterococcus faecium* DSM 3530	*Enterococcus faecium* preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip $2,5x10^9$ KSV/g	Veršeliai	6 mėn.	$1x10^9$	$1x10^9$	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.	2005 2 28

II PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų	Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų		
23	Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8	Endo-1,4-beta-ksilanazės preparatas, gautas iš *Trichoderma longibrachitum*(CNCM MA 6–10 W), kurio minimalus aktyvumas: Kieto pavidalo: 70 000 IFP ([1])/g Skysto pavidalo: 7 000 IFP/ml	Mėsiniai kalakutai	–	700 IFP	–	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma: 1 400 IFP kilogramui visaverčių pašarų. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kviečių.	2005 2 28
			Dedeklės vištos	–	840 IFP	–	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma: 840 IFP kilogramui visaverčių pašarų. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kviečių.	2005 2 28

▼B

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų	Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų		
27	Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EB 3.2.1.6	Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma reesei*(CBS 529.94), ir endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma reesei*(CBS 526.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Kieto pavidalo: 2 200 000 BXU ([2])/g 200 000 BU ([3])/g Skysto pavidalo: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Paršeliai	2 mėn.	7 00 BXU 7 500 BU	– –	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma: 7 500–15 000 BXU 7 500–15 000 BU kilogramui visaverčių pašarų. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % kviečių.	2005 2 28
28	3-fitazė EB 3.1.3.8	3-fitazės preparatas, gautas iš *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), kurio minimalus aktyvumas: kieto pavidalo: 5 000 PPU ([4])/g skysto pavidalo: 1 000 PPU/g	Mėsiniai viščiukai	–	500 PPU	–	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma: 500–750 PPU kilogramui visaverčių pašarų. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,22 % fitino, jungiančio fosforą.	2005 2 28

▼B

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų	Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų		
30	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EB 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės preparatas, gautas iš *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101), kurio mažiausias aktyvumas: Miltelių pavidalo: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 2 000 U ([5])/g Endo-1,4-beta-ksilanazės: 1 400 U ([6])/g Skysto pavidalo:	Mėsiniai kalakutai	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U	– – –	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanazės: 70 U kilogramui visaverčių pašarų. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % kviečių.	2005 2 28
			Dedeklės vištos	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U	– – –	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanazės: 70 U kilogramui visaverčių pašarų.	2005 2 28

▼B

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų	Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų		
							3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 60 % miežių arba 30 % kviečių.	
			Mėsinės kiaulės	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanazė: 70 U	– –	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma: Endo-1,4-beta-ksilanazės: 300 U Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 150 U kilogramui visaverčių pašarų. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % miežių arba 60 % kviečių.	2005 2 28
59	Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EB 3.2.1.6 Subtilizinas	Endo-1,4-beta- ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta gliukanazės ir alfa amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens*	Mėsiniai viščiukai	–	Endo-1,4-beta-ksilanazė: 300 U	–	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.	2005 2 28

▼B

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų	Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų		
	EB 3.4.21.62 Alfa-amilazė EB 3.2.1.1 Poligalakturonazė EB 3.2.1.15	(DSM 9553), subtilizino, gauto iš *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), poligalakturonazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,4-beta-ksilanazės: 300 U ([7])/g Endo-1,3(4)-beta-: gliukanazės: 150 U ([8])/g Subtilizino: 4 000 U ([9])/g			Endo-1,3(4)-beta-: gliukanazė 150 U Subtilizinas: 4 000 U Alfa-amilazė: 400 U Poligalakturonazė: 25 U	– – – –	2. Rekomenduojama norma: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 100 U Endo-1,4-beta-ksilanazės: 70 U Subtilizino: 4 000 U Alfa-amilazės: 400 U Poligalakturonazės: 25 U kilogramui visaverčių pašarų. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų ir betagliukanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kukurūzų.	

▼B

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų	Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų		
60	Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EB 3.2.1.6	Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) ir endo-1,3(4)-beta gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,4-beta-ksilanazės: 5 000 U (7)/g	Mėsiniai viščiukai	–	Endo-1,4-beta-ksilanazė: 500 U Endo-1,3(4)-beta-: gliukanazė 5 U	– – 	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma: Endo-1,4-beta-ksilanazės: 500–2 500 U Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 5–25 U kilogramui visaverčių pašarų. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % miežių ir 40 % kviečių.	2005 2 28

▼B

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų	Aktyvumo vienetai 1 kg visaverčių pašarų		
61	Endo-1,4-beta-ksilanazė EB 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EB 3.2.1.6	Endo-1,4-beta- ksilanazės preparatas, gautas iš *Trichoderma reesei* (CBS 526.94), kurio mažiausias aktyvumas: Miltelių pavidalo: Endo-1,4-beta-ksilanazės: 17 000 BXU ([10])/g Endo-1,3(4)- beta-gliukanazės: 11 000 BU ([11])/g Skysto pavidalo: Endo-1,4-beta-ksilanazės: 22 000 U/ml	Mėsiniai viščiukai	–	Endo-1,4-beta-ksilanazės: 17 000 BXU Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 11 000 BU	– –	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama norma: Endo-1,4-beta-ksilanazės: 17 000 BXU Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 11 000 BU kilogramui visaverčių pašarų. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % miežių ir 55 % kviečių.	2005 2 28

([1]) Vienas IFP – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis viena mikromoli redukuojancio cukraus (ksilozes ekvivalentu) per minute iš aviu ksilano, esant 4,8 pH ir 50° C temperaturai.
([2]) Vienas BXU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,06 mikromolio redukuojancio cukraus (ksilozes ekvivalentu) per minute iš beru medienos ksilano, esant 5,3 pH ir 50° C temperaturai
([3]) Vienas BU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,06 mikromolio redukuojancio cukraus (gliukozes ekvivalentu) per minute iš mieiu gliukano, esant 4,8 pH ir 50° C temperaturai
([4]) Vienas PPU - tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato per minutę iš natrio fitato, esant 5,0 pH ir 37° C.
([5]) Vienas U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 5,5 mikromolio redukuojancio cukraus (maltozes ekvivalentu) per minute iš mieiu beta-gliukano, esant 5, 0 pH ir 50° C temperaturai.
([6]) Vienas U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 4 mikromolius redukuojancio cukraus (maltozes ekvivalentu) per minute iš bero medienos ksilano, esant 5,5 pH ir 50° C temperaturai.
([7]) Vienas U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis viena mikromoli redukuojancio cukraus (ksilozes ekvivalentu) per minute iš aviu speltos ksilano, esant 5,3 pH ir 50° C temperaturai.
([8]) Vienas U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis viena mikromoli redukuojancio cukraus (gliukozes ekvivalentu) per minute iš mieiu beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30° C temperaturai.
([9]) Vienas U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis viena mikrograma fenolio junginio (tirozino ekvivalentu) per minute iš kazeino substrato, esant 7,5 pH ir 40° C temperaturai.
([10]) Vienas U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis viena mikromoli gliukozidu junginiu per minute iš vandenyje netirpaus krakmolo polimeru substrato, esant 6,5 pH ir 37° C temperaturai.
([11]) Vienas U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis viena mikromoli redukuojancios mediagos (galakturono rugšties ekvivalentu) per minute iš poli-D-galakturono substrato, esant 5,0 pH ir 40° C temperaturai.

III PRIEDAS

Priedo registracijos numeris	Asmens, atsakingo už priedo išleidimą į apyvartą, pavardė ir registracijos numeris	Priedas (prekinis pavadinimas)	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ilgiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas	Didžiausias likučių kiekis (DLK) tam tikruose gyvūninės kilmės maisto produktuose
						Veikliosios medžiagos kiekis mg viename visaverčio pašaro kg				
Kokcidiostatai ir kitos vaistinės medžiagos										
E 771	Janssen Pharmaceutica nv	Diklazurilis 0,5 g/100 g (*Clinacox* 0,5 % premikso) Diklazurilis 0,2 g/100 g (*Clinacox* 0,2 % premikso)	*Priedo sudėtis:* Diklazurilio 0,5 g/100 g Sojos pupelių: 99,25 g/100 g Polividono K 30: 0,2 g/100 g Natrio hidroksido: 0,0538 g/100 g Diklazurilio 0,2 g/100 g Sojos pupelių: 39,7 g/100 g Polividono K 30: 0,08 g/100 g Natrio hidroksido: 0,0215 g/100 g Smulkintų kviečių: 60 g/100 g *Veiklioji medžiaga:* Diklazurilis $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$ (±)-4-chlorfenil[2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahidro-3,5-diokso-1,2,4-triazin-2-il)fenil]acetonitrilas CAS numeris: 101831-37-2 *Susijusios priemaišos:* Irimo produktas (R064318) ≤ 0,2 % Kitos susijusios priemaišos (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5 % kiekviena Viso priemaišų: ≤ 1,5 %	Mėsiniai kalakutai	12 savaičių	1	1	—	2011.2.28	1 500 µg diklazurilio/kg šviežių kepenų 1 000 µg diklazurilio/kg šviežių inkstų 500 µg diklazurilio/kg šviežių raumenų 500 µg diklazurilio/kg šviežios odos/riebalų