РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 156/2008 НА КОМИСИЯТА

от 21 февруари 2008 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 109/2007 по отношение на минималното съдържание на фуражната добавка монензин натрий (Coxidin)

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните [1], и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1) Добавката монензин натрий (Coxidin) беше разрешена при определени условия в съответствие с Регламент (ЕО) № 1831/2003. С Регламент (ЕО) № 109/2007 на Комисията [2] беше разрешена употребата на тази добавка за период от десет години при угояването на пилета и при пуйки, като разрешението беше свързано с титуляря на разрешението за пускане в обращение на тази добавка.

(2) Регламент (ЕО) № 1831/2003 предоставя възможността да се измени разрешението за дадена добавка по искане на титуляря на разрешението и след консултация с Европейския орган за безопасност на храните („органа“).

(3) Титулярят на разрешението за фуражната добавка монензин натрий (Coxidin) представи заявление, което съдържа предложение за промяна на условията на разрешението чрез намаляване на минималното съдържание на тази добавка при храненето на пуйки.

(4) В своето становище, прието на 18 септември 2007 г., органът предложи да се намали минималното съдържание на добавката за пуйки от 90 mg на 60 mg на килограм готова храна за животни, тъй като добавката може да се счита за ефикасна при борбата с коксидиозата [3].

(5) Регламент (ЕО) № 109/2007 следва да бъде съответно изменен.

(6) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕО) № 109/2007 се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 февруари 2008 година.

За Комисията

Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

---

[1] ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 378/2005 на Комисията (ОВ L 59, 5.3.2005 г., стр. 8).

[2] ОВ L 31, 6.2.2007 г., стр. 6.

[3] Становище на Научната група по добавките и продуктите или веществата, използвани в храните за животни относно ефикасността на Coxidin 25 % (монензин натрий) като фуражна добавка за пуйки. Прието на 18 септември 2007 г. *The EFSA Journal* (2007 г.) 545, стр. 1—13.

ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Име на титуляря на разрешителното	Добавка (търговско име)	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Край на срока на разрешение	Временни максимално допустими граници на остатъчни вещества (МДГОВ) в съответните хранителни продукти от животински произход
						mg активно вещество/kg готова храна за животни, съдържание на влага 12 %				
Кокидиостатици и хистомоностатици										
5 1 701	Huvepharma NV Belgium	Монензин натрий (Coxidin)	Активно вещество: $C_{36}H_{61}O_{11}Na$ Натриева сол на полиетерната монокарбоксилна киселина, получена от *Streptomyces cinnamonensis*, 28682, LMG S-19095 под формата на прах. Състав: Монензин A: не по-малко от 90 %, Монензин A + B: не по-малко от 95 % Монензин C: 0,2—0,3 %. Състав на добавката: Техническо вещество, наречено монензин натрий, чието действие е равно на това на монензина: 25 % Перлит: 15—20 % Пшенични трици: 55—60 % Метод за анализ ([1]) Метод за определяне на активното вещество: високоефективна течна хроматография (HPLC) със следколонна дериватизация и UV детекция (λ = 520 nm).	Пилета за угояване	—	100	125	1. Употребата е забранена поне през последните три дни преди клането. 2. Добавката се смесва с комбинираните фуражи под формата на премикс. 3. Максимална разрешена доза монензин натрий в допълващите фуражи: — 625 mg/kg за пилета за угояване; — 500 mg/kg за пуйки. 4. Монензин натрият не трябва да се комбинира с други коксидиостатици. 5. В указанията за употреба да се посочи: „Опасен за еднокопитни животни. Този фураж съдържа йонофор: да се избягва едновременното му прилагане с тиамулин и да се следи за възможна поява на странични ефекти в случай на едновременна употреба с други лекарствени препарати“. 6. Да се използват предпазни облекла, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. При недостатъчна вентилация в помещението да се носят подходящи средства за дихателна защита.	6.2.2017 г.	25 микрограма монензин натрий на килограм за кожа и мазнина (пресни). 8 микрограма монензин натрий на килограм за черен дроб, бъбреци и мускулна тъкан (пресни).
				Пуйки	16 седмици	60	100			

([1]) Методите за анализ са описани подробно на страницата на референтната лаборатория на Общността на следния адрес: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“.