KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 156/2008

2008 m. vasario 21 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 109/2007 nuostatas, susijusias su mažiausiu pašarų priedo natrio monenzino (*Coxidin*) kiekiu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 13 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Priedą natrio monenziną (*Coxidin*) buvo leista naudoti laikantis tam tikrų sąlygų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1831/2003. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 109/2007 ([2]) suteiktas leidimas naudoti priedą dešimt metų mėsiniams viščiukams ir kalakutams, leidimą susiejant su leidimo išleisti priedą į apyvartą turėtoju.

(2) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatyta galimybė leidimo turėtojui pateikus prašymą ir Europos maisto saugos tarnybai pateikus nuomonę keisti leidimą naudoti priedą.

(3) Leidimo naudoti pašarų priedą natrio monenziną (*Coxidin*) turėtojas pateikė prašymą, kuriame siūlo pakeisti leidimo sąlygas sumažinant mažiausią priedo kiekį kalakutams.

(4) 2007 m. rugsėjo 18 d. priimtoje nuomonėje Europos maisto saugos tarnyba pasiūlė sumažinti mažiausią priedo kiekį kalakutams nuo 90 mg iki 60 mg vienam kilogramui visaverčio pašaro, kadangi jis gali būti laikomas veiksmingu užkertant kelią koksidiozei ([3]).

(5) Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 109/2007.

(6) Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 109/2007 priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 21 d.

Komisijos vardu
Markos KYPRIANOU
Komisijos narys

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 378/2005 (OL L 59, 2005 3 5, p. 8).

([2]) OL L 31, 2007 2 6, p. 6.

([3]) Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės nuomonė dėl 25 % *Coxidin* (natrio monenzino) kaip pašarų priedo kalakutams veiksmingumo. Priimta 2007 m. rugsėjo 18 d. *EFSA leidinys* (2007) 545, 1–13.

PRIEDAS

„PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas (Prekinis pavadinimas)	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas	Laikini didžiausi likučių kiekiai (DLK) tam tikruose gyvūninės kilmės maisto produktuose
						mg veikliosios medžiagos vienam kilogramui visaverčio pašaro, kurio drėgnis 12 %				
Kokcidiostatai ir histomonostatai										
5 1 701	*Huvepharma NV Belgium*	Natrio monenzinas (*Coxidin*)	Veiklioji medžiaga: $C_{36}H_{61}O_{11}Na$ Natrio druska iš polieterinės monokarboksilinės rūgšties, gauta iš *Streptomyces cinnamonnensis* (28682, LMG S–19095), miltelių pavidalo Sudėtis: Monenzinas A: ne mažiau kaip 90 % Monenzino A + B: ne mažiau kaip 95 % Monenzinas: C 0,2–0,3 % Priedo sudėtis: Natrio monenzino, kaip techninės medžiagos, ekvivalentas monenzino aktyvumui: 25 % Perlitas: 15–20 % Kviečių sėlenos: 55–60 % Analizės metodas (1) Veikliosios medžiagos nustatymo metodas: didelio slėgio skysčių chromatografija su po kolonėlės naudojamu darinių sintetinimu ir UV detektoriumi (λ=520 nm).	Mėsiniai viščiukai	—	100	125	1. Draudžiama naudoti mažiausiai tris paras prieš skerdimą. 2. Priedas maišomas su kombinuotaisiais pašarais kaip premiksas. 3. Didžiausia leistina natrio monenzino dozė pašarų papilduose: — 625 mg/kg mėsiniams viščiukams; — 500 mg/kg kalakutams 4. Natrio monenzinas nemaišomas su kitais kokcidiostatais. 5. Naudojimo instrukcijose nurodyti: „Pavojingas arklinių šeimos gyvūnams. Šiame pašare yra jonoforo: vengti naudoti kartu su tiamulinu ir stebėti, ar neatsiranda galimų nepageidaujamų reakcijų, kai naudojamas kartu su kitomis vaistinėmis medžiagomis.“ 6. Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones, jei patalpos vėdinamos nepakankamai.	2017 2 6	25 µg natrio monenzino 1 kilogramui šviežios odos + riebalų. 8 µg natrio monenzino 1 kilogramui šviežių kepenų, inkstų ir raumenų.
				Kalakutai	16 savaičių	60	100			

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti šiuo Bendrijos etaloninės laboratorijos adresu: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“