Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►**B**

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1206/2005

ze dne 27. července 2005

o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 197, 28.7.2005, s. 12)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►**M1**	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 403/2013 ze dne 2. května 2013	L 121	26	3.5.2013
►**M2**	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 290/2014 ze dne 21. března 2014	L 87	84	22.3.2014
►**M3**	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/211 ze dne 7. února 2017	L 33	23	8.2.2017

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1206/2005

ze dne 27. července 2005

o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech

(Text s významem pro EHP)

Článek 1

Přípravky náležící do skupiny „enzymů“ uvedené v příloze se povolují k používání bez časového omezení jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedené příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼B

PŘÍLOHA

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
Enzymy								
▼M1 ———								
▼B E 1604	►M2 ——— ◄	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z *Penicillium funiculosum* (IMI SD101) s minimem aktivity pro: práškovou formu: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 000 U ([4])/g endo-1,4-beta-xylanáza: 1 400 U ([5])/g kapalnou formu: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 U/ml endo-1,4-beta-xylanáza: 350 U/ml	Prasata na výkrm	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U	— —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování 2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 70 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (zejména beta-glukany a arabinoxylany), např. obsahujících více než 40 % ječmene nebo 20 % pšenice	Časově neomezené
▼M3 ———								

▼B

Číslo ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Maximální stáří	Minimální obsah	Maximální obsah	Jiná ustanovení	Konec platnosti povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
E 1633	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy z *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta- xylanázy z *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) a subtilisin z *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) s minimem aktivity pro: pevnou formu: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 100 U ([7])/g endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U ([8])/g subtilisin: 800 U ([9])/g	Kuřata na výkrm	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 30 U Endo-1,4-beta-xylanáza: 90 U Subtilisin: 240 U	— — —	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování 2. Doporučená dávka na 1 kg kompletního krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 30–100 U endo-1,4-beta-xylanáza: 90–300 U subtilisin: 240–800 U 3. Pro použití do krmné směsi obsahující např. více než 60 % ječmene	Časově neomezené

►M1 ——— ◄

([4]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 5,55 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a 50 °C.
([5]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 4,00 mikromolu redukujících cukrů (ekvivalenty maltózy) za 1 minutu z xylanu březového dřeva při pH 5,5 a teplotě 50 °C.
([6]) 1 IU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu březového dřeva při pH 4,5 a 30 °C.
([7]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a 30 °C.
([8]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty xylózy) za minutu z xylanu ovesných slupek při pH 5,3 a teplotě 50 °C.
([9]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol fenolové sloučeniny (ekvivalenty tyrozinu) za minutu z kaseinového substrátu při pH 7,5 a teplotě 40 °C.