Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1206/2005

av den 27 juli 2005

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 197, 28.7.2005, s. 12)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 403/2013 av den 2 maj 2013	L 121	26	3.5.2013
►M2	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 290/2014 av den 21 mars 2014	L 87	84	22.3.2014
►M3	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/211 av den 7 februari 2017	L 33	23	8.2.2017

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1206/2005

av den 27 juli 2005

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

De preparat av typen enzymer som avses i bilagan skall godkännas som fodertillsatser utan tidsbegränsning enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					Aktivitet/kg helfoder			
Enzymer								
▼M1 ———								
▼B E 1604	►M2 ——— ◄	Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas och endo-1,4-beta-xylanas från *Penicillium funiculosum* (IMI SD101). Minsta aktivitet: Pulverform: endo-1,3(4)-beta-glukanas: 2 000 U ([4])/g endo-1,4-beta-glukanas: 1 400 U ([5])/g Flytande form: endo-1,3(4)-beta-glukanas: 500 U/ml endo-1,4-beta-xylanas: 350 U/ml	Slaktsvin	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 100 U Endo-1,4-beta-xylanas: 70 U	— —	1. I bruksanvisningen för tillsatser och förblandningar skall lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering anges 2. Rekommenderad dos/kg helfoder: endo-1,3(4)-beta-glukanas: 100 U endo-1,4-beta-xylanas: 70 U 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelsepolysackarider (huvudsakligen betaglukaner och arabinoxylaner), t.ex. sådana som innehåller mer än 40 % korn eller 20 % vete	Utan tidsbegränsning
▼M3 ———								

▼B

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					Aktivitet/kg helfoder			
E 1633	Endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Preparat av endo-1,3(4)-beta-glukanas från *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanas från *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) och subtilisin från Bacillus subtilis (ATCC 2107). Minsta aktivitet: Fast form: endo-1,3(4)-beta-glukanas: 100 U ([7])/g endo-1,4-beta-xylanas: 300 U ([8])/g subtilisin: 800 U ([9])/g	Slaktkycklingar	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 30 U Endo-1,4-beta-xylanas: 90 U Subtilisin: 240 U	— — —	1. I bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen skall lagringstemperatur, lagringstid samt stabilitet vid pelletering anges 2. Rekommenderad dos/kg helfoder endo-1,3(4)-beta-glukanas: 30–100 U endo-1,4-beta-xylanas: 90–300 U subtilisin: 240–800 U 3. För användning i foderblandningar som innehåller mer än 60 % korn	Utan tidsbegränsning

►M1 ——— ◄

([4]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 5,55 mikromol reducerande sockerarter (maltosekvivalenter) från betaglukan från korn per minut vid pH 5,0 och 50 °C.
([5]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 4,00 mikromol reducerande sockerarter (maltosekvivalenter) från xylan från björk per minut vid pH 5,0 och 50 °C.
([6]) 1 IU motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från xylan från björk per minut vid pH 4,5 och 30 °C.
([7]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) från betaglukan från korn per minut vid pH 5,0 och 30 °C.
([8]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) från xylan från havrespelt per minut vid pH 5,3 och 50 °C.
([9]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikrogram fenolförening (tyrosinekvivalenter) från kaseinsubstrat per minut vid pH 7,5 och 40 °C.