Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1206/2005,

27. juuli 2005,

teatavate söödalisandite alalise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 197, 28.7.2005, lk 12)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 403/2013, 2. mai 2013	L 121	26	3.5.2013
►M2	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 290/2014, 21. märts 2014	L 87	84	22.3.2014
►M3	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/211, 7. veebruar 2017	L 33	23	8.2.2017

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1206/2005,

27. juuli 2005,

teatavate söödalisandite alalise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas täpsustatud ensüümide rühma kuuluvaid preparaate on tähtajatult lubatud kasutada loomasöötades söödalisanditena määruse lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimu-m-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täis-sööda kg kohta			
Ensüümid								
▼M1 ———								
▼B E 1604	►M2 ——— ◄	*Penicillium funiculosum*'ist (IMI SD101) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja endo-1,4-beeta-ksülanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: pulbrina: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 2 000 U ([4])/g endo-1,4-beeta-ksülanaas: 1 400 U ([5])/g vedelal kujul: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 500 U/ml endo-1,4-beeta-ksülanaas: 350 U/ml	Nuumsead	—	endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U	— —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 70 U 3. Kasutamiseks mitte-tärklise päritolu polüsahhariididerikkas (peamiselt beeta-glükaanid ja arabiinoksülaanid) segajõusöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % otra või 20 % nisu	Tähtajatu
▼M3 ———								

▼B

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või-kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimum-sisaldus	Maksimum-sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kg kohta			
E 1633	Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Subtilisiin EC 3.4.21.62	*Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2106) toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi, *Trichoderma longibrachiatum*'ist (ATCC 2105) toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja *Bacillus subtilis*'est (ATCC 2107) toodetud preparaat minimaalse aktiivsusega: tahkel kujul: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 100 U ([7])/g endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U ([8])/g subtilisiin: 800 U ([9])/g	Broilerkanad	—	endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 30 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 90 U subtilisiin: 240 U	— — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 30–100 U endo-1,4-beeta-ksülanaas: 90–300 U subtilisiin: 240–800 U 3. Kasutamiseks segajõusöödas, näiteks sellises, mis sisaldab üle 60 % otra	Tähtajatu

►M1 ——— ◄

([4]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab odra beeta-glükaanist 5,55 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalente) minutis.
([5]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,5 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab kasepuidu ksülaanist 4,00 mikromooli redutseerivaid suhkruid (maltoosi ekvivalente) minutis.
([6]) Üks IU on ensüümi hulk, mis pH taseme 4,5 ja temperatuuri 30 °C juures vabastab kasepuidu ksülaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.
([7]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 30 °C juures vabastab odra beeta-glükaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalente) minutis.
([8]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 5,3 ja temperatuuri 50 °C juures vabastab kaera/speltnisu ksülaanist ühe mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) minutis.
([9]) Üks U on ensüümi hulk, mis pH taseme 7,5 ja temperatuuri 40 °C juures vabastab kaseiini substraadist ühe mikrogrammi fenoolühendeid (türosiini ekvivalente) minutis.