# KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1375,

## 1. oktoober 2020,

## milles käsitletakse sidrunhappe, sorbiinhappe, tümooli ja vanilliini preparaadi lubamist piimapõrsaste, broilerkalkunite ja aretuskalkunite söödalisandina (loa hoidja Vetagro SpA)

**(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubade taotlemise nõue ning selliste lubade andmise alused ja kord.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlused loa saamiseks sidrunhappe, sorbiinhappe, tümooli ja vanilliini preparaadile. Taotlustele olid lisatud kõnealuse määruse artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3) Taotlustes käsitletakse sidrunhappe, sorbiinhappe, tümooli ja vanilliini preparaadi lubamist piimapõrsaste, broilerkalkunite ja aretuskalkunite söödalisandina ning selle liigitamist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid“.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 4. juuli 2019. aasta arvamuses ([2]) järeldusele, et kavandatud kasutustingimuste juures ei avalda sidrunhappe, sorbiinhappe, tümooli ja vanilliini preparaat kahjulikku mõju loomade ega inimeste tervisele ega keskkonnale. Toiduohutusamet jõudis ka järeldusele, et kõnealust söödalisandit peetakse potentsiaalselt nahka ja silmi ärritavaks ning nahka sensibiliseerivaks. Seetõttu leiab komisjon, et tuleks võtta asjakohased kaitsemeetmed, mis võimaldavad ennetada kahjulikku mõju inimeste tervisele, eelkõige söödalisandi kasutajate puhul. Toiduohutusamet jõudis järeldusele, et kõnealune söödalisand võib tõhusalt parandada broilerite zootehnilisi näitajaid ning seda järeldust võib laiendada noorkanadele ja vähemlevinud kodulinnuliikide munalindudele ([3]). Sellele tuginedes on toiduohutusamet oma 2019. aasta arvamuses laiendanud broilerkanade kohta tehtud järeldusi broilerkalkunitele ja aretuskalkunitele. Samuti jõuti võõrutatud põrsaste puhul tehtud järeldust laiendades järeldusele, et kõnealune söödalisand võib olla soovitatava annuse puhul tõhus piimapõrsaste zootehniliste näitajate parandamisel ([4]). Toiduohutusameti hinnangul ei ole vaja kehtestada turustamisjärgse järelevalve erinõudeid. Ühtlasi kinnitas toiduohutusamet määruse (EÜ) nr 1831/2003 kohaselt asutatud referentlabori esitatud aruande söödas sisalduva söödalisandi analüüsimeetodi kohta.

(5) Sidrunhappe, sorbiinhappe, tümooli ja vanilliini preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6) Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
([2]) *EFSA Journal* 2019; 17(7):5795.
([3]) *EFSA Journal* 2012; 10(5):2670.
([4]) *EFSA Journal* 2012; 10(5):2670.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

*Artikkel 1*

Lisas kirjeldatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised söödalisandid“ ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised söödalisandid“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades vastavalt lisas esitatud tingimustele.

*Artikkel 2*

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 1. oktoober 2020

*Komisjoni nimel*
*eesistuja*
Ursula VON DER LEYEN

*LISA*

| Söödalisandi identifitseerimisnumber | Loa hoidja | Lisand | Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod | Loomaliik või -kategooria | Vanuse ülempiir | Miinimumsisaldus | Maksimumsisaldus | Muud sätted | Loa kehtivusaja lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Söödalisandi sisaldus 12 % niiskusesisaldusega täissöödas (mg/kg) | | | |
| **Kategooria: zootehnilised söödalisandid. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised söödalisandid (jõudlusnäitajate paranemine)** | | | | | | | | | |
| 4d3 | Vetagro SpA | Kaitstud sidrunhappe, sorbiinhappe, tümooli ja vanilliini preparaat | *Söödalisandi koostis*<br>Kaitstud mikrokuulidest preparaat, mis sisaldab sidrunhapet, sorbiinhapet, tümooli ja vanilliini vähemalt järgmistes kogustes:<br>sidrunhape: 25 g/100 g<br>tümool: 1,7 g/100 g<br>sorbiinhape: 16,7 g/100 g<br>vanilliin: 1 g/100 g<br><br>*Toimeaine kirjeldus*<br>Sidrunhape $C_6H_8O_7$ (puhtus ≥ 99,5 %)<br>2-hüdroksü-1,2,3-propaantrikarboksüülhape, CASi number 77–92-9, veevaba<br>Sorbiinhape $C_6H_8O_2$ (puhtus ≥ 99,5 %)<br>2,4-heksadieenhape, CASi number 110–44-1<br>Tümool (puhtus ≥ 98 %)<br>5-metüül-2-(1-metüületüül)fenool, CASi number 89–83-8)<br>Vanilliin (puhtus ≥ 99,5 %)<br>4-hüdroksü-3-metoksübensaldehüüd, CASi number 121–33-5)<br><br>Analüüsimeetod ([1])<br>Sorbiinhappe ja tümooli määramine söödalisandis, eelsegudes ja söödas:<br>— kõrgefektiivne pööratud faasi vedelikkromatograafia koos ultraviolett- või dioodireadetektsiooniga (RP-HPLC-UV/DAD) | Piimapõrsad<br><br>Nuumkalkunid<br>Aretuskalkunid | – | 1 000<br><br>200 | –<br><br>– | 1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel.<br>2. Kasutusjuhendis märgitakse: „Eri allikatest pärineva sidrunhappe ja sorbiinhappe kogusisaldust täissöödas ei tohi ületada.“<br>3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse nende kasutamisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silmade- ja hingamiskaitsevahendeid. | 22.10.2030 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sidrunhappe määramine söödalisandis ja eelsegudes:<br>— kõrgefektiivne pööratud faasi vedelikkromatograafia koos ultraviolett- või dioodireadetektsiooniga (RP-HPLC-UV/DAD)<br>Sidrunhappe määramine söödas:<br>— sidrunhappe sisalduse ensümaatiline määramine – NADH (nikotiinamiidadeniindinukleotiidi taandatud vorm) spektromeetriline meetod | | | | | | |

([1]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.