REGOLAMENTO (CEE) N. 1979/79 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1979

che modifica, per quanto riguarda la loro applicazione per varietà di tabacco della produzione comunitaria, i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 638/74 e (CEE) n. 410/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/79 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 10, e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1697/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo al finanziamento delle spese d'intervento nel settore del tabacco greggio (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 330/74 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1581/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che fissa per il raccolto 1979 i prezzi d'obiettivo, i prezzi d'intervento e i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia nonché i prezzi d'intervento derivati del tabacco in colli (5), ha modificato l'elenco delle varietà di tabacco della produzione comunitaria e la definizione delle loro qualità di riferimento applicate dopo l'entrata in vigore dell'organizzazione comune dei mercati del tabacco greggio, per renderle più conformi all'attuale realtà del mercato ; che è quindi opportuno adattare in tal senso i regolamenti le cui disposizioni si riferiscono alle diverse varietà e qualità di riferimento dei tabacchi, e precisamente :

— regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità di intervento nel settore del tabacco greggio (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1556/78 (7) ;

— regolamento (CEE) n. 1728/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 784/77 (9) ;

— regolamento (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/79 (11) ;

— regolamento (CEE) n. 638/74 della Commissione, del 20 marzo 1974, che fissa il limite di tolleranza per le perdite di quantità dovute alla conservazione del tabacco greggio all'intervento (12) ;

— regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco (13) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco greggio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 1727/70 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I, II e III del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1728/70 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati IV e V del presente regolamento.

Articolo 3

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/71 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 8.
(4) GU n. L 37 del 9. 2. 1974, pag. 5.
(5) GU n. L 189 del 27. 7. 1979, pag. 6.
(6) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 5.
(7) GU n. L 184 del 6. 7. 1978, pag. 11.
(8) GU n. L 191 del 27. 8. 1970, pag. 18.
(9) GU n. L 95 del 19. 4. 1977, pag. 16.
(10) GU n. L 269 dell'8. 12. 1971, pag. 11.
(11) GU n. L 127 del 25. 5. 1979, pag. 11.
(12) GU n. L 77 del 22. 3. 1974, pag. 30.
(13) GU n. L 50 del 26. 2. 1976, pag. 11.

Articolo 4

L'allegato del regolamento (CEE) n. 638/74 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 5

L'allegato del regolamento (CEE) n. 410/76 è sostituito dall'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile per la prima volta al tabacco greggio del raccolto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

TABACCO IN FOGLIA

Classificazione delle varietà per qualità prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1727/70

1. a) BADISCHER GEUDERTHEIMER, b) FORCHHEIMER HAVANNA II c

« **Grumpen** » (Primings)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal rosso bruno al giallastro-verdognolo

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo. Ai margini le foglie possono essere ultramature e di colore bruno

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« **Sandblatt** » (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo, di lunghezza uniforme

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno chiaro al giallastro-verdognolo

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« **Hauptgut** » (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, a tonalità scura, di lunghezza uniforme (1)

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« **Obergut** » (Tips)

Foglie sane e mature, di colore dal bruno scuro al giallastro-verdognolo, che presentano i requisiti minimi per l'intervento

2. BADISCHER BURLEY E

« **Grumpen** » (Primings)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro al bruno rossastro

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo. Ai margini le foglie possono essere ultramature

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« **Sandblatt** » (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno chiaro al bruno rossastro, di lunghezza uniforme

Classe II Foglie sane, mature, non friabili al taglio, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo

Classe III Foglie che non appartengono alla categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

« **Hauptgut** » (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore dal bruno rossastro al bruno chiaro, di lunghezza uniforme (1)

Classe II Foglie sane e mature, di colore dal bruno al giallastro-verdognolo

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

(1) Qualità di riferimento.

« **Obergut** » (Tips)

Foglie sane e mature, di colore bruno scuro e che presentano i requisiti minimi per l'intervento

3. VIRGIN D

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallo al giallo-rosso ; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo-verdognolo, con una tolleranza di un terzo della superficie della foglia (1)

Classe II Foglie sane e mature, aventi il giallo come colore di base ; sono ammesse differenze di colorazione, come il brunastro o il giallo-verdognolo, con una tolleranza di due terzi della superficie della foglia

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, ma presentano i requisiti minimi per l'intervento

4. a) PARAGUAY e ibridi derivati, b) DRAGON VERT e ibridi derivati, PHILIPPIN, PETIT GRAMMONT (Flobecq), SEMOIS, APPELTERRE

Foglie basilari (Lugs)

Foglie mediane (Leaves)

Foglie apicali (Tips)

Per ogni corona si distinguono le classi seguenti :

Classe 1 Foglie mature, di buona combustibilità, di colorazione vivace, di tessuto sufficientemente integro, anche con leggeri difetti

Classe 2 Foglie con leggeri difetti di combustibilità, di colore, di tessuto, di maturità (eccessiva o insufficiente) (1)

Classe 3 Foglie con gravi difetti di colorazione (tendente al livido o verdastro), di combustibilità, di integrità e di tessuto, di maturazione (eccessiva o insufficiente), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

Classe supplementare relativa ai tabacchi raccolti foglia a foglia e solamente le foglie basilari

Classe 1S :

Foglie mature, di buona combustibilità, con tessuto integro, leggero e colorazione uniformemente vivace

5. NIJKERK

Foglie basilari (Leaves)

Classe 1 Foglie mature, con tessuto lievemente gommoso, sostanzioso e integro, ancora resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona colorazione marrone più o meno scuro, vivace

Classe 2 Foglie poco gommose, con tessuto, nervatura e colorazione con qualche difetto di integrità

Classe 3 Foglie con tessuto cipollino, non gommoso, con difetti di cura e con danni parziali e non gravi da grandine e malattie, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

Foglie apicali (Tips)

Classe 1 Foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm) con tessuto gommoso sostanzioso, integro, resistente ed elastico, con nervature poco accentuate, di buona maturazione, di colorazione dal marrone al marrone scuro, di tonalità vivace

Classe 2 Sia foglie di seconda lunghezza (inferiore o uguale a 45 cm) con le stesse caratteristiche della classe 1, sia foglie di prima lunghezza (di oltre 45 cm) con tessuto ancora gommoso, sostanzioso, ancora integro, resistente, con nervature più o meno accentuate, di varia colorazione, ad esclusione del verde bottiglia (1)

Classe 3 Foglie di varia lunghezza con accentuati difetti di maturazione, di colorazione (verde bottiglia), del tessuto (poco resistente, poco gommoso, malattie con difetti di cura), ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

(1) Foglie mediane superiori (Leaves) : qualità di riferimento.

6. a) MISIONERO e ibridi derivati, b) RIO GRANDE e ibridi derivati

Prima qualità Foglie di oltre 45 cm di lunghezza, con tessuto non grossolano, giustamente essiccate, sufficientemente integre, di colorazione marrone-rossa, a tonalità vivace o abbastanza vivace, di combustibilità soddisfacente

Seconda qualità Foglie di oltre 45 cm di lunghezza, con tessuto non grossolano, di colorazione chiara e leggermente giallastra, di tonalità vivace o abbastanza vivace, sufficientemente resistente e abbastanza integro, di discreta combustibilità (1)

Terza qualità Foglie di oltre 35 cm di lunghezza, sane, con tessuto più o meno grossolano, di colorazione marrone a fondo rossastro o giallastro ma poco vivace, di combustibilità mediocre

Quarta qualità Foglie di oltre 30 cm di lunghezza, con difetti accentuati relativi all'integrità e alla consistenza del tessuto, colorazione che può essere scura, marrone più o meno verdastra, opaca, spessore eccessivo e tessuto grossolano. Combustibilità mediocre o non buona, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

7. BRIGHT

Grado A Foglie di sufficiente maturazione, senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1)

Grado B Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano; sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore, che può andare dal giallo macchiato od abbronzato fino al giallo tendente al verde, ed anche con difetti di integrità

Grado C Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura, di colore giallo molto macchiato, o tendente al grigio o al marrone e con gravi difetti di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

8. BURLEY I

Grado A Foglie di sufficiente maturazione senza difetti di cura, di tessuto a grana aperta, anche sostanziosi, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1)

Grado B Foglie di varia sostanza, sane, con qualche difetto di cura e di integrità o di colore disforme

Grado C Foglie grossolane, a grana chiusa con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

9. MARYLAND

Grado A Foglie di sufficiente maturazione con lievi difetti di cura, con pochissime sfumature abbronzate, di tessuto a grana media, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone-rossastro di tonalità piuttosto vivace

Grado B Foglie di varia sostanza, prevalentemente leggera, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore marrone-rossastro anche disforme

Grado C Foglie grossolane, anche con qualche difetto di cura, di integrità e di colore, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

10. KENTUCKY e ibridi derivati, b) MORO DI CORI, c) SALENTO

Grado A Foglie integre, di ampia e media paginatura, di giusta maturità, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso, con costole e nervature poco accentuate, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone uniforme

Grado B Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, senza difetti di cura e di conservazione, di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1)

Grado C Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

(1) Qualità di riferimento.

11. a) NOSTRANO DEL BRENTA, b) RESISTENTE 142, c) GOJANO

Grado A Foglie di tessuto gentile, sufficientemente sostanzioso, a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, senza difetti di cura o trattate secondo il sistema tradizionale, colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità

Grado B Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, senza difetti di cura o trattato secondo il sistema tradizionale, di colore marrone, anche scuro e con non vistosi difetti di integrità (1)

Grado C Foglie poco mature, di colore disforme anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura o del trattamento tradizionale e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

12. a) BENEVENTANO, b) BRASILE SELVAGGIO e varietà analoghe

Grado A Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, senza difetti di cura e fermentate, di colore marrone anche scuro purché uniforme e con qualche difetto di integrità

Grado B Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso od anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1)

Grado C Foglie di tessuto grossolano, scure, con accentuati difetti di maturazione, di cura, di conservazione e di integrità, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

13. XANTI-YAKÀ

14. PERUSTITZA

15. ERZEGOVINA e varietà analoghe

Grado A Foglie mature, sane, senza difetti di cura, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillante, di tessuto gentile o medianamente sostanzioso, a grana aperta, prevalentemente di paginatura piccola o media, provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà n. 13 e n. 14) e dalle corone apicali o foglie mediane (varietà n. 15)

Grado B Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari (1)

Grado C Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, di colore disforme e con difetti di integrità, provenienti da tutte le corone, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

16. a) ROUND TIP, b) SCAFATI, c) SUMATRA I (2)

Grado A Foglie basilari suddivise mediamente secondo le proporzioni seguenti :

1ª lunghezza : 15 % ;
2ª lunghezza : 55 % ;
3ª lunghezza : 30 %.

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici idonei per fascia di sigari ; si può tollerare una percentuale di circa il 20 % di foglie non integre

Grado B Foglie di prima mediana suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti :

1ª lunghezza : 60 % ;
2ª lunghezza : 35 % ;
3ª lunghezza : 5 %.

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari ; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre (1)

(1) Qualità di riferimento.
(2) Definizione delle lunghezze :
1ª lunghezza : superiore o uguale a 38 cm ;
2ª lunghezza : da 32 a meno di 38 cm ;
3ª lunghezza : da 25 a meno di 32 cm.

Grado C Foglie di seconda mediana, suddivise mediamente per lunghezza secondo le proporzioni seguenti :

1ª lunghezza : 10 % ;
2ª lunghezza : 40 % ;
3ª lunghezza : 50 %.

Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonei per fascia di sigari inferiori ; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre, ma che presentano i requisiti minimi per l'intervento

ALLEGATO II

TABACCO IN COLLI

Classificazione delle varietà per qualità prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1727/70

1. a) BADISCHER GEUDERTHEIMER, b) FORCHHEIMER HAVANNA II c

« **Grumpen** » (Primings)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al marrone scuro, normalmente fermentate

Classe II Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base ; sono ammesse differenze di colorazione ; ai margini le forglie possono essere ultramature ; normalmente fermentate

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II ; normalmente fermentate

« **Sandblatt** » (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al marrone scuro, di lunghezza uniforme ; normalmente fermentate

Classe II Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base ; sono ammesse differenze di colorazione ; normalmente fermentate

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II ; normalmente fermentate

« **Hauptgut** » (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al marrone scuro ; di lunghezza uniforme, normalmente fermentate (1)

Classe II Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base ; sono ammesse differenze di colorazione ; normalmente fermentate

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II, normalmente fermentate

« **Obergut** » (Tip)

Foglie mature, sane, di colore diverso ; normalmente fermentate

2. BADISCHER BURLEY E

« **Grumpen** » (Primings)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore bruno chiaro e dal bruno-rossastro al marrone ; normalmente fermentate

Classe II Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base ; sono ammesse differenze di colorazione ; ai margini le foglie possono essere ultramature ; normalmente fermentate

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II ; normalmente fermentate

« **Sandblatt** » (Lugs)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore bruno chiaro e dal bruno-rossastro al marrone ; di lunghezza uniforme ; normalmente fermentate

Classe II Foglie sane, mature, non friabili al taglio, aventi il brunastro come colore di base ; sono ammesse differenze di colorazione ; normalmente fermentate

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II ; normalmente fermentate

« **Hauptgut** » (Leaves)

Classe I Foglie mature, sane, intatte, non friabili al taglio, di colore bruno chiaro, e dal bruno-rossastro al marrone scuro ; di lunghezza uniforme ; normalmente fermentate (1)

Classe II Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base ; sono ammesse differenze di colorazione ; normalmente fermentate

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II ; normalmente fermentate

(1) Qualità di riferimento.

« **Obergut** » (Tips)

Foglie mature, sane, di colore diverso ; normalmente fermentate

3. VIRGIN D

Classe I Foglie mature, sane, intatte, di colore giallo e dal giallo-rosso al giallo-brunastro ; normalmente fermentate (1)

Classe II Foglie sane e mature, aventi il giallo come colore di base ; sono ammesse differenze di colorazione ; normalmente fermentate

Classe III Foglie che non appartengono alle categorie I e II ; normalmente fermentate

7. BRIGHT

Grado A Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivament accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1)

Grado B Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano ; sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore (giallo macchiato bronzeo) ed anche con difetti di integrità

Grado C Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura, purché conservabili, di colore giallo molto macchiato o tendente al grigio e al marrone e con gravi difetti di integrità

8. BURLEY I

Grado A Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tesuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1)

Grado B Foglie di varia sostanza, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore disforme

Grado C Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purché conservabili

9. MARYLAND

Grado A Foglie di sufficiente maturazione, con lievi difetti di cura e pochissime tinte bronzee, ben curate, con tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore bruno rossastro piuttosto vivace

Grado B Foglio di varia sostanza, prevalentemente leggera, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore bruno rossastro anche disforme

Grado C Foglie grossolane, con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purché conservabili

10. a) KENTUCKY e ibridi derivati, b) MORO DI CORI, c) SALENTO

Grado A Foglie integre, di ampia e media paginatura, di giusta maturazione, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso, con costole e nervature poco accentuate, ben curate e conservate, di colore marrone uniforme

Grado B Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1)

Grado C Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione

11. a) NOSTRANO DEL BRENTA, b) RESISTENTE 142, c) GOJANO

Grado A Foglie di tessuto gentile, sufficientemente sostanzioso, a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità

Grado B Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con vistosi difetti di integrità (1)

Grado C Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura, di fermentazione e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti

(1) Qualità di riferimento.

12. a) BENEVENTANO, b) BRASILE SELVAGGIO e varietà analoghe

Grado A Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro purché uniforme e con qualche difetto di integrità

Grado B Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso o anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1)

Grado C Foglie di tessuto grossolano, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità

13. XANTI-YAKÀ

14. PERUSTITZA

15. ERZEGOVINA e varietà analoghe

Grado A Foglie mature, sane, ben curate, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta, prevalentemente di paginatura piccola o media provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà n. 13 e n. 14) e dalle corone apicali o foglie mediane (varietà n. 15)

Grado B Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari (1)

Grado C Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, ma serbevoli, di colore disforme e con accentuati difetti di integrità, provenienti da tutte le corone

16. a) ROUND TIP, b) SCAFATI, c) SUMATRA I (2)

Grado A Foglie basilari suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti :

1ª lunghezza : 15 % ;
2ª lunghezza : 55 % ;
3ª lunghezza : 30 %.

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari ; si può tollerare una percentaule di circa il 20 % di foglie non integre

Grado B Foglie di prima mediana suddivisa mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti :

1ª lunghezza : 60 % ;
2ª lunghezza : 35 % ;
3ª lunghezza : 5 %.

Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari ; comprende una percentuale di circa il 25 % di foglie non integre (1)

Grado C Foglie di seconda mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti :

1ª lunghezza : 10 % ;
2ª lunghezza : 40 % ;
3ª lunghezza : 50 %.

Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonee per fascia di sigari inferiori ; si può tollerare una percentuale di circa il 30 % di foglie non integre

(1) Qualità di riferimento.
(2) Definizione delle lunghezze :
1ª lunghezza : superiore o uguale a 38 cm ;
2ª lunghezza : da 32 a meno di 38 cm ;
3ª lunghezza : da 25 a meno di 32 cm.

ALLEGATO III

Umidità da prendere in considerazione per la determinazione del peso netto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1727/70

Numero progressivo	Varietà	Umidità	
		Tabacco in foglia	Tabacco in colli
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	26 %	16 %
2	Badischer Burley E	25 %	15 %
3	Virgin D	19 %	13 %
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	27 %	19 %
5	Nijkerk	27 %	19 %
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	27 %	19 %
7	Bright	16 %	13 %
8	Burley I	19 %	13 %
9	Maryland	19 %	13 %
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	23 %	16 %
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	22 %	18 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà anologhe	24 %	16 %
13	Xanti-Yakà	17 %	13 %
14	Perustitza	17 %	13 %
15	Erzegovina e varietà analoghe	17 %	13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	22 %	16 %

ALLEGATO IV

Tabella degli abbuoni e delle riduzioni per il tabacco in foglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1728/70

Numero progressivo	Varietà	Corona fogliare	Classi, qualità o categorie e numero indice rispetto alle qualità di riferimento			
			Classe I	Classe II	Classe III	
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Grumper (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	90 109 100 (1) 67	73 88 82	58 71 70	
			Classe I	Classe II	Classe III	
2	Badischer Burley E	Grumper (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	114 122 100 (1) 50	89 98 77	56 76 59	
			Classe I	Classe II	Classe III	
3	Virgin D		100 (1)	57	22	
			Classe 1 S	Classe 1	Classe 2	Classe 3
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Foglie basse (Lugs) Foglie mediane (Leaves) Foglie apicali (Tips)	130 — —	110 120 100	90 100 (1) 80	70 80 60
			Classe 1	Classe 2	Classe 3	
5	Nijkerk	Foglie basse (Leaves) Foglie apicali (Tips)	100 120	80 100 (1)	60 60	
			1ª qualità	2ª qualità	3ª qualità	4ª qualità
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati		120	100 (1)	80	60
			Categoria A	Categoria B	Categoria C	
7	Bright		100 (1)	65	50	
8	Burley I		100 (1)	65	48	
9	Maryland		100 (1)	65	48	
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60	
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano		129	100 (1)	76	
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà analoghe		128	100 (1)	71	
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74	
14	Perustitza		109	100 (1)	73	
15	Erzegovina e varietà analoghe		109	100 (1)	71	
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I		86	100 (1)	36	

(1) Qualità di riferimento.

ALLEGATO V

Tabella degli abbuoni e delle riduzioni per il tabacco in colli di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1728/70

Abbuoni e riduzioni riferiti alle categorie della classificazione

Numero progressivo	Varietà	Corona fogliare	Classi e numero d'indice rispetto alle qualità di riferimento		
			Classe I	Classe II	Classe III
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	90 109 100 (1) 67	73 88 82	58 71 70
2	Badischer Burley E	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	114 122 100 (1) 50	89 98 77	56 76 59
3	Virgin D		100 (1)	57	22
			Categoria A	Categoria B	Categoria C
7	Bright		100 (1)	65	50
8	Burley I		100 (1)	65	48
9	Maryland		100 (1)	65	48
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano		129	100 (1)	76
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà analoghe		128	100 (1)	71
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74
14	Perustitza		109	100 (1)	73
15	Erzegovina e varietà analoghe		109	100 (1)	71
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I		86	100 (1)	36

(1) Qualità di riferimento.

ALLEGATO VI

Importo di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 327/71

Numero progressivo	Varietà	Importo in ECU/kg di tabacco in foglia
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	0,580
2	Badischer Burley E	0,598
3	Virgin D	0,603
4	a) Paraguay e ibridi derivati b) Dragon vert e ibridi derivati Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	0,422
5	Nijkerk	0,372
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	0,468
7	Bright	0,642
8	Burley I	0,594
9	Maryland	0,594
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	0,490
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	0,589
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà analoghe	0,445
13	Xanti-Yakà	0,957
14	Perustitza	0,663
15	Erzegovina e varietà analoghe	0,608
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	3,598

ALLEGATO VII

Regolamento (CEE) n. 638/74

Limite di tolleranza in % di peso netto

Varietà	Durante l'anno di acquisto	Durante gli anni successivi
Dark air cured (1, 4, 5, 6, 11, 12) Fire cured (10) Tabacs spéciaux (16)	1,5 %	0,7 %
Light air cured (2, 8, 9) Flue cured (3, 7) Sun cured (13, 14, 15)	1,0 %	0,6 %

ALLEGATO VIII

Tasso massimo delle perdite di peso di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 410/76

Numero progressivo	Varietà	Perdite di peso massime (in percentuale del peso netto del tabacco in foglia) (1)
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	22
2	Badischer Burley E	19
3	Virgin D	13
4	a) Paraguay b) Dragon vert e ibridi derivati Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	19
5	Nijkerk	19
6	a) Misionero e ibridi derivati b) Rio Grande e ibridi derivati	17
7	Bright	14
8	Burley I	15
9	Maryland	15
10	a) Kentucky e ibridi derivati b) Moro di Cori c) Salento	15
11	a) Nostrano e ibridi derivati b) Resistente 142 c) Gojano	15
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio e varietà analoghe	15
13	Xanti-Yakà	17
14	Perustitza	17
15	Erzegovina e varietà analoghe	17
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra 1	16

(1) Questi tassi sono maggiorati di 4 punti per i tabacchi che hanno subito operazioni di battitura.