379R1979

8.9.79 'Επίσημη 'Εφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων 'Αριθ. N 228/23

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1979/79 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τῆς 5ης Σεπτεμβρίου 1979

περί τροποποιήσεως τῶν κανονισμῶν (ΕΟΚ) ἀριθ. 1727/70, (ΕΟΚ) ἀριθ. 1728/70, (ΕΟΚ) ἀριθ. 2603/71, (ΕΟΚ) ἀριθ. 638/74 καί (ΕΟΚ) ἀριθ. 410/76, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἐφαρμογή τους κατά ποικιλίες καπνοῦ κοινοτικῆς παραγωγῆς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 727/70 τοῦ Συμβουλίου τῆς 21ης 'Απριλίου 1970 περί κοινῆς ὀργανώσεως ἀγορᾶς στόν τομέα τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ[1], ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1579/79[2], καί ἰδίως τό ἄρθρο 3 παράγραφος 3 πρῶτο ἐδάφιο, τό ἄρθρο 5 παράγραφος 6, τό ἄρθρο 6 παράγραφος 10 καί τό ἄρθρο 7 παράγραφος 4,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1697/71 τοῦ Συμβουλίου τῆς 26ης 'Ιουλίου 1971 περί τῆς χρηματοδοτήσεως τῶν δαπανῶν παρεμβάσεως στόν τομέα τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ[3], ὅπως τροποποιήθηκε ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 330/77[4] καί ἰδίως τό ἄρθρο 6 παράγραφος 2,

'Εκτιμώντας:

ὅτι ὁ κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1581/79 τοῦ Συμβουλίου τῆς 24ης 'Ιουλίου 1979 περί καθορισμοῦ, γιά τήν ἐσοδεία τοῦ 1979, τῶν τιμῶν στόχου, τῶν τιμῶν παρεμβάσεως καί τῶν πριμοδοτήσεων πού παρέχονται στούς ἀγοραστές καπνοῦ σέ φύλλα καθώς καί τῶν παραγώγων τιμῶν παρεμβάσεως τοῦ δεματοποιημένου καπνοῦ[5], τροποποίησε τόν κατάλογο τῶν ποικιλιῶν καπνοῦ τῆς κοινοτικῆς παραγωγῆς καθώς καί τόν καθορισμό τῶν ποιοτήτων ἀναφορᾶς τους πού ἐφαρμόζονται ἀπό τότε πού ἄρχισε ἡ ἰσχύς τῆς κοινῆς ὀργανώσεως ἀγορᾶς τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ, γιά νά τίς εὐθυγραμμίσει περισσότερο μέ τή σημερινή πραγματικότητα τῆς ἀγορᾶς· ὅτι ἐνδείκνυται λοιπόν νά προσαρμοσθοῦν μέ τό πνεῦμα αὐτό, οἱ κανονισμοί τῶν ὁποίων οἱ διατάξεις ἀναφέρονται στίς διάφορες ποικιλίες καί ποιότητες ἀναφορᾶς καπνῶν, καί ἰδίως οἱ κανονισμοί:

— (ΕΟΚ) ἀριθ. 1727/70 τῆς 'Επιτροπῆς τῆς 25ης Αὐγούστου 1970 περί τῶν λεπτομερειῶν παρεμβάσεως στόν τομέα τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ[6], ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1556/78[7],

— (ΕΟΚ) ἀριθ. 1728/70 τῆς 'Επιτροπῆς τῆς 25ης Αὐγούστου 1970 περί καθορισμοῦ κλιμάκων προσαυξήσεων καί μειώσεων στόν τομέα τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ[8], ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 784/77[9],

— (ΕΟΚ) ἀριθ. 2603/71 τῆς 'Επιτροπῆς τῆς 6ης Δεκεμβρίου 1971 περί τῶν λεπτομερειῶν συνάψεως συμβάσεων ἐμπορικῆς ἐπεξεργασίας καί συσκευασίας τῶν κατεχομένων ἀπό τούς ὀργανισμούς παρεμβάσεως καπνῶν[10], ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1018/79[11],

— (ΕΟΚ) ἀριθ. 638/74 τῆς 'Επιτροπῆς τῆς 20ῆς Μαρτίου 1974 περί τοῦ καθορισμοῦ τοῦ ὁρίου ἀνοχῆς γιά τίς ἀπώλειες τῶν ποσοτήτων οἱ ὁποῖες προκύπτουν ἀπό τή συντήρηση τοῦ ἀκατέργαστου καπνοῦ στήν παρέμβαση[12],

— (ΕΟΚ) ἀριθ. 410/76 τῆς 'Επιτροπῆς τῆς 23ης Φεβρουαρίου 1976 περί καθορισμοῦ τῶν μεγίστων ἐπιτρεπτῶν ποσοστῶν ἀπωλειῶν βάρους, κατά τόν ἔλεγχο τῶν ἐργασιῶν τῆς ἐμπορικῆς ἐπεξεργασίας καί συσκευασίας τοῦ καπνοῦ[13]·

ὅτι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό εἶναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τῆς 'Επιτροπῆς Διαχειρίσεως 'Ακατέργαστου Καπνοῦ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1

Τά παραρτήματα I, II καί IV τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1727/70 ἀντικαθίστανται ἀντίστοιχα ἀπό τά παραρτήματα I, II καί III τοῦ παρόντος κανονισμοῦ.

(1) ΕΕ ἀριθ. N 94 τῆς 28.4.1970, σ. 1.
(2) ΕΕ ἀριθ. N 189 τῆς 27.7.1979, σ. 1.
(3) ΕΕ ἀριθ. N 175 τῆς 4.8.1971, σ. 8.
(4) ΕΕ ἀριθ. N 37 τῆς 9.2.1974, σ. 5.
(5) ΕΕ ἀριθ. N 189 τῆς 27.7.1979, σ. 6.
(6) ΕΕ ἀριθ. N 191 τῆς 27.8.1970, σ. 5.
(7) ΕΕ ἀριθ. N 184 τῆς 6.7.1978, σ. 11.
(8) ΕΕ ἀριθ. N 191 τῆς 27.8.1970, σ. 18.
(9) ΕΕ ἀριθ. N 95 τῆς 19.4.1977, σ. 16.
(10) ΕΕ ἀριθ. N 269 τῆς 8.12.1971, σ. 11.
(11) ΕΕ ἀριθ. N 127 τῆς 24.5.1979, σ. 11.
(12) ΕΕ ἀριθ. N 77 τῆς 22.3.1974, σ. 30.
(13) ΕΕ ἀριθ. N 50 τῆς 26.2.1976, σ. 11.

Ἄρθρο 2

Τά παραρτήματα I καί II τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1728/70 ἀντικαθίστανται ἀντίστοιχα ἀπό τά παραρτήματα IV καί V τοῦ παρόντος κανονισμοῦ.

Ἄρθρο 3

Τό παράρτημα τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 2603/71 ἀντικαθίσταται ἀπό τό παράρτημα VI τοῦ παρόντος κανονισμοῦ.

Ἄρθρο 4

Τό παράρτημα τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 638/74 ἀντικαθίσταται ἀπό τό παράρτημα VII τοῦ παρόντος κανονισμοῦ.

Ἄρθρο 5

Τό παράρτημα τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 410/76 ἀντικαθίσταται ἀπό τό παράρτημα VIII τοῦ παρόντος κανονισμοῦ.

Ἄρθρο 6

Ὁ παρών κανονισμός ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τή δημοσίευσή του στήν *Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων*.

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι δεσμευτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 5 Σεπτεμβρίου 1979.

Γιά τήν Ἐπιτροπή

Finn GUNDELACH

Ἀντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΣΕ ΦΥΛΛΑ

1. α) BADISCHER GEUDERTHEIMER· b) FORCHHEIMER HAVANNA II c)

«Grumpen» (Primings)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος καστανοῦ-ἐρυθροῦ μέχρι ἐλαφρῶς ποικίλου

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ποικίλου χρωματισμοῦ. Τό περίγραμμα τῶν φύλλων δύναται νά εἶναι πολύ ὥριμο καί χρώματος καστανοῦ

Κλάση III Φύλλα τά ὁποῖα δέν ἀνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

«Sandblatt» (Lugs)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος καστανοῦ μέχρι ἐλαφρῶς ποικίλου, ὁμοιομόρφου μήκους

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ καί ποικίλου χρωματισμοῦ

Κλάση III Φύλλα πού δέν ἀνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

«Hauptgut» (Leaves)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος βαθέος καστανοῦ μέχρι ποικίλου, ὁμοιομόρφου μήκους (1)

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ καί ποικίλου χρωματισμοῦ

Κλάση III Φύλλα πού δέν ἀνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

«Obergut» (Tips)

Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, χρώματος βαθέος καστανοῦ μέχρι ποικίλου, πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

2. BADISCHER BURLEY E

«Grumpen» (Primings)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, μέ ὕλη, χρώματος ἀνοικτοῦ καστανοῦ μέχρι καστανοῦ ἐρυθρωποῦ

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, χρώματος καστανοῦ μέχρι ποικίλου. Τό περίγραμμα τῶν φύλλων δύναται νά εἶναι ὑπερώριμο

Κλάση III Φύλλα πού δέν ἀνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

«Sandblatt» (Lugs)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, μέ ὕλη, χρώματος ἀνοικτοῦ καστανοῦ μέχρι καστανοῦ ἐρυθρωποῦ, ὁμοιομόρφου μήκους

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, συμπαγῆ, χρώματος καστανοῦ μέχρι ποικίλου

Κλάση III Φύλλα τά ὁποῖα δέν ἀνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

«Hauptgut» (Leaves)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, μέ ὕλη, χρώματος καστανοῦ ἐρυθρωποῦ μέχρι καστανοῦ ἀνοικτοῦ, ὁμοιομόρφου μήκους(1)

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, χρώματος καστανοῦ μέχρι ποικίλου

Κλάση III Φύλλα τά ὁποῖα δέν ἀνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

(1) Ποιότητα ἀναφορᾶς.

«Obergut» (Tips)

Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, χρώματος θαθέος καστανοῦ πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρισματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

3. VIRGIN D

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἄθικτα, χρώματος κιτρίνου μέχρι ἐρυθροκιτρίνου, ἀποκλίσεις τέτοιου εἴδους ὅπως οἱ ἀποχρώσεις τοῦ φαιοῦ πρός τό κιτρινο-πρασινωπό γίνονται δεκτές ἐφ' ὅσον καλύπτουν μέχρι τό ἕνα τρίτο τῆς ἐπιφανείας τοῦ φύλλου(1)

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, μέ θασικό τόνο τό κίτρινο. Ἀποκλίσεις τέτοιου εἴδους ὅπως οἱ ἀποχρώσεις τοῦ φαιοῦ πρός τό κιτρινο-πρασινωπό γίνονται δεκτές ἐφ' ὅσον καλύπτουν μέχρι τά δύο τρίτα τῆς ἐπιφανείας τοῦ φύλλου

Κλάση III Φύλλα, τά ὁποῖα δέν ἀνταποκρίνονται στίς κλάσεις I καί II, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

4. α) PARAGUAY καί τά ὑβρίδιά της, θ) DRAGON VERT καί τά ὑβρίδιά της, PHILIPPIN, PETIT GRAMMONT (Flobecq), SEMOIS, APPELTERRE

Feuilles basses (Lugs)

Feuilles médianes (Leaves)

Feuilles de tête (Tips)

Κλάση 1 Φύλλα ὥριμα, καλῆς καυσιμότητος, ζωηροῦ χρωματισμοῦ μέ ἱστό ἐπαρκῶς ἀκέραιο. Ἐλαφρά ἐλαττώματα γίνονται ἀνεκτά

Κλάση 2 Φύλλα μέ ἐλαττώματα, ὄχι πολύ ἔντονα, εἴτε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν καυσιμότητα, εἴτε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν χρωματισμό, εἴτε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τόν ἱστό, εἴτε σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ὡριμότητα (ὑπερβολική ἤ ἀνεπαρκής)(1)

Κλάση 3 Φύλλα μέ ἔντονα ἐλαττώματα, σέ ὅ,τι ἀφορᾶ εἴτε τόν χρωματισμό (θαμπός ἤ ἐντόνως πρασινωπός) εἴτε τήν καυσιμότητα, εἴτε τήν ἀκεραιότητα καί τήν ὑφή τοῦ ἱστοῦ, εἴτε τήν ὡριμότητα (ὑπερβολική ἤ ἐντόνως ἀνεπαρκής), ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

Κλάση συμπληρωματική ἀφορῶσα τόν καπνό τόν συλλεγέντα φύλλο πρός φύλλο καί μόνο τά φύλλα θάσεως:

Κλάση 1 S:

Φύλλα ὥριμα, καλῆς καυσιμότητος, μέ ἱστό ἀκέραιο, ἀραιᾶς συστάσεως, ὁμοιομόρφου ζωηροῦ χρωματισμοῦ

5. NIJKERK

Feuilles basses (Leaves)

Κλάση 1 Φύλλα ὥριμα, μέ ἱστό εἰσέτι κολλώδη, μέ ὕλη καί ἀκέραια ἀκόμη ἀνθεκτικά καί ἐλαστικά, μέ νευρώσεις ὄχι ἔντονες, καλοῦ καστανοῦ χρωματισμοῦ κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον θαθέος ζωηροῦ

Κλάση 2 Φύλλα λίγο κολλώδη, μέ ἐλαττώματα ὄχι ἔντονα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀκεραιότητα τοῦ ἱστοῦ, τίς νευρώσεις ἤ τόν χρωματισμό

Κλάση 3 Φύλλα μέ ἱστό θεβλαμμένο, μή κολλώδη, ἤ «ὑπερβολικῆς ζυμώσεως» (ζημία τοῦ ἱστοῦ καί τοῦ χρωματισμοῦ λόγω θλάθης κατά τήν ἀποξήρανση) ἤ πληγέντα ἀπό χαλάζι ἤ προσθεθλημένα μερικῶς ἀπό ἀσθένειες, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

Feuilles de tête (Tips)

Κλάση 1 Φύλλα 1ου μήκους (μεγαλύτερα τῶν 45 ἑκατοστῶν) μέ ἱστό πολύ κολλώδη, μέ ὕλη, ἀκέραια, ἀνθεκτικά καί ἐλαστικά χωρίς ἔντονες νευρώσεις, καλῆς ὡριμότητος, ἐκφραζομένης δι' ἑνός χρωματισμοῦ καστανοῦ μέχρι θαθέος καστανοῦ, ζωηρᾶς ἀποχρώσεως

Κλάση 2 Εἴτε φύλλα 2ου μήκους (κατώτερα ἤ ἴσα πρός 45 ἑκατοστά) πού παρουσιάζουν τά ἀναφερόμενα ἀνωτέρω χαρακτηριστικά. Εἴτε φύλλα 1ου μήκους (μεγαλύτερα τῶν 45 ἑκατοστῶν) μέ ἱστό ἐπίσης κολλώδη, μέ ὕλη, ἐπίσης ἀκέραια, ἀνθεκτικά, μέ νευρώσεις κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον ἔντονες, παντός χρωματισμοῦ, ἐξαιρέσει τοῦ πρασίνου «πράσου»(1)

Κλάση 3 Φύλλα παντός μήκους μέ ἔντονα ἐλαττώματα, εἴτε ὡς πρός τήν ὡριμότητα, εἴτε ὡς πρός τόν χρωματισμό (πράσινο «πράσου») εἴτε ὡς πρός τόν ἱστό (ἔλλειψη ἀνθεκτικότητος, μή κολλώδης, προσθεθλημένος ἀπό ἀσθένειες, ἐντόνου ζυμώσεως), ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

(1) Μεσαῖα φύλλα: ποιότητα ἀναφορᾶς.

6. α) MISIONERO καί τά ὑβρίδιά της, RIO GRANDE καί τά ὑβρίδιά της

1η ποιότητα Φύλλα ἀνεπτυγμένα, μεγαλύτερα τῶν 45 ἑκατοστῶν, μέ ἱστό ὄχι χονδροειδῆ, ἐπαρκῶς ἀπεξηραμμένα, ἐπαρκῶς ἀκέραια, χρωματισμοῦ ζωηροῦ ἤ ἀρκετά ζωηροῦ, καστανοερυθροῦ, ἱκανοποιητικῆς καυσιμότητος

2η ποιότητα Φύλλα ἀνεπτυγμένα, μεγαλύτερα τῶν 45 ἑκατοστῶν, μέ ἱστό ὄχι χονδροειδῆ, ἀνοικτοῦ χρωματισμοῦ, λίγο κιτρινωποῦ, ζωηρῆς ἤ ἀρκετά ζωηρῆς ἀποχρώσεως, ἐπαρκοῦς ἀνθεκτικότητος καί ἀρκετά ἀκέραια, ἀνεκτῆς καυσιμότητος(1)

3η ποιότητα Φύλλα μεγαλύτερα τῶν 35 ἑκατοστῶν, ὑγιῆ μέ ἱστό κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον χονδροειδῆ, χρωματισμοῦ καστανοῦ ἐρυθρωποῦ, ἤ ψυχροῦ κιτρίνου, μετρίας καυσιμότητος

4η ποιότητα Φύλλα μεγαλύτερα τῶν 30 ἑκατοστῶν, μέ ἔντονα μειονεκτήματα σέ ὅ,τι ἀφορᾶ εἴτε τήν ἀκεραιότητα καί τήν ὑφή τοῦ ἱστοῦ, εἴτε τόν χρωματισμό ὁ ὁποῖος δύναται νά εἶναι θαθύς, φαιός κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον πρασινωπός, θαμπός, εἴτε κατά τό ὑπερβολικό πάχος καί τή χονδροειδῆ ὑφή τοῦ ἱστοῦ. Μετρίας ἤ κακῆς καυσιμότητος ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

7. BRIGHT

Κατηγορία Α Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, πορώδους ὑφῆς, χωρίς ἔντονες νευρώσεις καί μίσχους, ὑγιῆ, χρώματος κιτρίνου διαφόρων ἀποχρώσεων(1)

Κατηγορία Β Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος, ἀκόμη καί φύλλα ἀδύνατα ἤ χονδροειδῆ, ἐπαρκῶς ὥριμα, ἀλλά μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί χρώματος δυναμένου νά φθάσει ἀπό τό κατάστικτο κίτρινο ἤ τό χαλκόχροουν μέχρι τό κιτρινοπράσινο. Ἀκόμη καί μέ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος

Κατηγορία Γ Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος μή πορώδους ὑφῆς, μέ ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, χρώματος κιτρίνου, πολύ διάστικτου, ἤ ἀποκλίνοντος εἴτε πρός τό γκρί εἴτε πρός τό καστανό, μέ σοβαρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

8. BURLEY I

Κατηγορία Α Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, πορώδους ἀκόμη καί συνεκτικῆς ὑφῆς μέ μίσχους καί νευρώσεις ὄχι πολύ ἔντονες, ὑγιῆ, χρώματος φουντουκιοῦ, κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον, ζωηροῦ(1)

Κατηγορία Β Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος, ὑγιῆ, μέ μερικά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί ἀκεραιότητος, ἀνομοιομόρφου χρώματος

Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδῆ μή πορώδους ὑφῆς, μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ἀκεραιότητος καί χρώματος, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

9. MARYLAND

Κατηγορία Α Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος πού παρουσιάζουν ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, μέ λίγες χαλκόχροες ἀποχρώσεις, ὑφή ἱστοῦ μέτρια, μέ ὄχι πολύ ἔντονες νευρώσεις καί μίσχους, ὑγιῆ, μέ χρῶμα καστανό ἐρυθρωπό μᾶλλον ἔντονο

Κατηγορία Β Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος ἀλλά μᾶλλον ἐλαφρᾶς, ὑγιῆ, πού παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί ἀκεραιότητος, μέ χρῶμα καστανό ἐρυθρωπό, ἔστω καί ὄχι ὁμοιόμορφο

Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδῆ πού παρουσιάζουν ἔστω καί ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ἀκεραιότητος καί χρωματισμοῦ, ἀλλά πού συγκεντρώνουν τίς ἐλάχιστες ἰδιότητες πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

10. α) KENTUCKY καί τά ὑβρίδιά της· β) MORO DI CORI· γ) SALENTO

Κατηγορία Α Φύλλα ἄθικτα, μεγάλων ἤ μέσων διαστάσεων, κανονικῶς ὥριμα μέ λεπτό ἱστό ἐπαρκῶς ἐλαστικό καί συνεκτικό, μέ μίσχους καί νευρώσεις λίγο ἔντονες, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί συντηρήσεως, χρώματος καστανοῦ ὁμοιομόρφου.

Κατηγορία Β Φύλλα κανονικῶς ὥριμα, συνεκτικοῦ ἱστοῦ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί συντηρήσεως, χρώματος καστανοῦ, μέ μερικά μειονεκτήματα ἀκεραιότητος(1)

Κατηγορία Γ Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, μέ ἱστό ἔστω καί ἐλαφρᾶς ὑφῆς, χρώματος ἀνομοιομόρφου μέ ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί ἀκεραιότητος καί μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα συντηρήσεως, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

(1) Ποιότητα ἀναφορᾶς.

11. (α) NOSTRANO DEL BRENTA· β) RESISTENTE 142· γ) GOJANO

Κατηγορία Α Φύλλα λεπτοτάτου ἱστοῦ, ἐπαρκῶς συνεκτικά, ὑφῆς πορώδους, ὥριμα, μέ μίσχους καί νευρώσεις ὄχι ἔντονες, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως ἤ ἐπαρκοῦς ζυμώσεως κατά τό παραδοσιακό σύστημα, χρώματος καστανοῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον ὁμοιομόρφου, ἔστω καί μέ ἐλαφρά μειονεκτήματα ἀκεραιότητος

Κατηγορία Β Φύλλα συνεκτικοῦ καί ἐλαφροῦ ἱστοῦ, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως ἤ ἐπαρκοῦς ζυμώσεως κατά τό παραδοσιακό σύστημα, χρώματος καστανοῦ ἤ ἔστω καί θαθέος καστανοῦ, μέ ὄχι πολύ ἔντονα ἐλαττώματα ἀκεραιότητος

Κατηγορία Γ Φύλλα λίγο ὥριμα, ἀνομοιομόρφου χρώματος, ἔστω καί σκούρου καστανοῦ, χονδροειδῆ, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως ζυμώσεως καί συντηρήσεως, καθώς καί φύλλα σχισμένα μή δυνάμενα νά ἐνταχθοῦν στίς προηγούμενες κατηγορίες, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

12. α) BENEVENTANO· β) BRASILE SELVAGGIO καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες

Κατηγορία Α Φύλλα καλῆς ὡριμότητος, ὑγιῆ, μέ ἱστό λεπτό καί ἀνθεκτικό, μέ νευρώσεις ὄχι ἔντονες, πορώδους ὑφῆς χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί μέ κατάλληλη ζύμωση, χρώματος καστανοῦ ἤ ἔστω θαθέος καστανοῦ, ἀλλά ὁμοιομόρφου, μέ μερικά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος

Κατηγορία Β Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος μέ συνεκτικό ἱστό ἤ ἀκόμη καί χονδροειδῆ ἤ ἰσχνό μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ζυμώσεως καί ἀκεραιότητος(1)

Κατηγορία Γ Φύλλα μέ ἱστό χονδροειδῆ χρώματος σκούρου, μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ὡριμάνσεως, ἀποξηράνσεως, συντηρήσεως καί ἀκεραιότητος, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

13. XANTI-YAKÀ

14. PERUSTITZA

15. ERZEGOVINA καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες

Κατηγορία Α Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, χρώματος ἀνοικτοῦ καστανοῦ ἤ κιτρίνου, μᾶλλον στιλπνά μέ λεπτό ἱστό ἤ σχετικῶς συνεκτικό, πορώδους ὑφῆς μεγέθους κυρίως μικροῦ ἤ μεσαίου, προερχόμενα κανονικῶς ἀπό τά κορυφόφυλλα ἤ τά ἀνώτερα μεσαῖα φύλλα (ποικιλίες 13 καί 14) καί τά κορυφόφυλλα ἤ τά μεσαῖα φύλλα (ποικιλία 15)

Κατηγορία Β Φύλλα ἐπαρκῶς ὑγιῆ καί ὥριμα μέ μερικά ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, μέ ἱστό συνήθως ἐλαφροῦ χρώματος κιτρίνου μέχρι καστανοῦ, μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος ἀλλά καλῶς συντηρημένα ἔστω καί ἄν προέρχονται ἀπό τά φύλλα θάσεως(1)

Κατηγορία Γ Φύλλα ἐλαφρά καί χονδροειδῆ, μέ ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ἀνομοιομόρφου χρώματος, μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, προερχόμενα ἀπό ὅλα τά ἐπίπεδα φυλλώματος ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

16. α) ROUND TIP· β) SCAFATI· γ) SUMATRA I(2)

Κατηγορία Α Φύλλα θάσεως ταξινομημένα ὡς πρός τό μῆκος κατά τίς ἀκόλουθες ἀναλογίες:

1ου μήκους: 15%,

2ου μήκους: 55%,

3ου μήκους: 30%.

Φύλλα κανονικοῦ μεγέθους, καλῆς ὡριμότητος, χρώματος ἐπαρκῶς ὁμοιομόρφου, ὑγιῆ, μέ ἱστό λεπτό, πορώδη ὑφή, μέ μίσχους καί νευρώσεις ὄχι ἔντονες, καλῶς συντηρημένα, καλῆς καυσιμότητος, χαρακτηριστικῆς γεύσεως καί ἀρώματος, κατάλληλα γιά περιτυλίγματα πούρων. Εἶναι δυνατή ἡ ἀνοχή ἑνός ποσοστοῦ μή ἀκεραίων φύλλων περίπου 20%

Κατηγορία Β Φύλλα μεσαῖα κατώτερα, ταξινομημένα ὡς πρός τό μῆκος κατά τίς ἀκόλουθες ἀναλογίες:

1ου μήκους: 60%,

2ου μήκους: 35%,

3ου μήκους: 5%.

Φύλλα κανονικοῦ μεγέθους, κανονικῆς ὡριμότητος καί ὁμοιομόρφου χρώματος, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, μέ λεπτό ἱστό, ἐλαστικά καί ἀνθεκτικά, μέ μίσχους καί νευρώσεις ὄχι ἔντονες, κανονικῆς ζυμώσεως καί καλῶς συντηρημένα, καλῆς καυσιμότητος, χαρακτηριστικῆς γεύσεως καί ἀρώματος, κατάλληλα γιά περιτυλίγματα πούρων, μέ ἀνοχή φύλλων μή ἀκεραίων περίπου 25%(1)

(1) Ποιότητα ἀναφορᾶς.

(2) Τά μήκη ἔχουν ὡς ἑξῆς:
1ο μῆκος: ἀνώτερο ἤ ἴσο πρός 38 ἑκατ.
2ο μῆκος: ἀπό 32 μέχρι κάτω τῶν 38 ἑκατ.
3ο μῆκος: ἀπό 25 μέχρι κάτω τῶν 32 ἑκατ.

Κατηγορία Γ Φύλλα μεσαῖα ἀνώτερα, ταξινομημένα ὡς πρός τό μῆκος κατά τίς ἀκόλουθες ἀναλογίες:

1ου μήκους: 10%,
2ου μήκους: 40%,
3ου μήκους: 50%.

Φύλλα μετρίου μεγέθους, ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, χρώματος ἐπαρκῶς ὁμοιομόρφου, ὑφῆς μᾶλλον συνεκτικῆς, καλῶς συντηρημένα, μετρίας καυσιμότητος, χαρακτηριστικῆς γεύσεως καί ἀρώματος, ἐν μέρει κατάλληλα γιά περιτυλίγματα πούρων κατωτέρας ποιότητος. Εἶναι δυνατή ἡ ἀνοχή ἑνός ποσοστοῦ μή ἀκεραίων φύλλων περίπου 30 %, ἀλλά πού παρουσιάζουν τά ἐλάχιστα ποιοτικά γνωρίσματα πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν παρέμβαση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

πού προβλέπεται στό ἄρθρο 7 παράγραφος 2 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1727/70

1. α) BADISCHER GEUDERTHEIMER· β) FORCHHEIMER HAVANNA II c

«Grumpen» (Primings)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἀκέραια, χρώματος ἐλαφρῶς ποικιλοχρώμου πρός τό βαθύ καστανό, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ τῶν ὁποίων ὁ βασικός χρωματικός τόνος εἶναι φαιόχρους. Γίνονται δεκτές ἀποκλίσεις χρωματισμοῦ. Τά ἄκρα τῶν φύλλων μπορεῖ νά εἶναι πολύ ωρίμα, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση III Φύλλα πού δέν ἀντιστοιχοῦν στίς κλάσεις I καί II, κανονικά ζυμωθέντα

«Sandblatt» (Lugs)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἀκέραια, χρώματος ἐλαφρῶς ποικιλοχρώμου πρός τό βαθύ καστανό, ὁμοιομόρφου μήκους, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, τῶν ὁποίων ὁ βασικός χρωματικός τόνος εἶναι φαιόχρους. Γίνονται δεκτές ἀποκλίσεις χρωματισμοῦ, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση III Φύλλα πού δέν ἀντιστοιχοῦν στίς κλάσεις I καί II, κανονικά ζυμωθέντα

«Hauptgut» (Leaves)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἀκέραια, χρώματος ἐλαφρῶς ποικιλοχρώμου πρός τό βαθύ καστανό, ὁμοιομόρφου μήκους, κανονικά ζυμωθέντα(1)

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ τῶν ὁποίων ὁ βασικός τόνος εἶναι ὁ φαιόχρους. Γίνονται δεκτές ἀποκλίσεις χρωματισμοῦ, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση III Φύλλα πού δέν ἀντιστοιχοῦν στίς κλάσεις I καί II, κανονικά ζυμωθέντα,

«Obergut» (Tips)

Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, διαφορετικοῦ χρώματος, κανονικά ζυμωθέντα

2. BADISCHER BURLEY E

«Grumpen» (Primings)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἀκέραια, μέ ὕλη χρώματος ἐντόνου καστανοῦ, ἐρυθρωποῦ καστανοῦ πρός τό καστανό, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, τῶν ὁποίων ὁ βασικός τόνος εἶναι φαιόχρους. Γίνονται δεκτές ἀποκλίσεις χρωματισμοῦ. Τά ἄκρα τῶν φύλλων μπορεῖ νά εἶναι πολύ ὥριμα, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση III Φύλλα πού δέν ἀντιστοιχοῦν στίς κλάσεις I καί II, κανονικά ζυμωθέντα

«Sandblatt» (Lugs)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἀκέραια, μέ ὕλη χρώματος ἐντόνου καστανοῦ, καστανοῦ ἐρυθρωποῦ πρός τό καστανό, ὁμοιομόρφου μήκους, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, συνεκτικά, τῶν ὁποίων ὁ βασικός τόνος εἶναι φαιόχρους. Γίνονται δεκτές ἀποκλείσεις χρωματισμοῦ, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση III Φύλλα τά ὁποῖα δέν ἀντιστοιχοῦν στίς κλάσεις I καί II, κανονικά ζυμωθέντα

«Hauptgut» (Leaves)

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἀκέραια, μέ ὕλη, χρώματος ἐντόνου καστανοῦ, ἐρυθρωποῦ καστανοῦ μέχρι βαθέος καστανοῦ, ὁμοιομόρφου μήκους, κανονικά ζυμωθέντα(1)

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, τῶν ὁποίων ὁ βασικός τόνος εἶναι τό φαιόχρουν. Γίνονται δεκτές ἀποκλίσεις χρωματισμοῦ κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση III Φύλλα τά ὁποῖα δέν ἀντιστοιχοῦν στίς κλάσεις I καί II κανονικά ζυμωθέντα

(1) Ποιότητα ἀναφορᾶς.

«Obergut» (Tips)

Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, διαφόρων χρωμάτων, κανονικά ζυμωθέντα

3. VIRGIN D

Κλάση I Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, ἀκέραια, μέ χρῶμα κίτρινο, ἐρυθροκίτρινο ὡς φαιοκίτρινο, κανονικά ζυμωθέντα(1)

Κλάση II Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, τῶν ὁποίων ὁ θασικός τόνος εἶναι τό κίτρινο. Γίνονται δεκτές ἀποκλίσεις χρωματισμοῦ, κανονικά ζυμωθέντα

Κλάση III Φύλλα τά ὁποῖα δέν ἀντιστοιχοῦν στίς κλάσεις I καί II, κανονικά ζυμωθέντα

7. BRICHT

Κατηγορία A Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, καλῶς περιποιημένα, πορώδους ὑφῆς, χωρίς ἔντονες νευρώσεις καί μίσχους, ὑγιῆ, χρώματος κιτρίνου διαφόρων ἀποχρώσεων(1)

Κατηγορία B Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος, ἀκόμη καί φύλλα ἰσχνά ἤ χονδροειδῆ, ἐπαρκῶς ὥριμα, ἀλλά μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα περιποιήσεως καί χρώματος (καταστίκτου κιτρίνου ἤ χαλκοχρόου) ἀκόμη καί μέ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος

Κατηγορία Γ Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος, μή πορώδους ὑφῆς, μέ ἐλαττώματα περιποιήσεως, ἀλλά κατάλληλα πρός συντήρηση χρώματος κιτρίνου λίαν καταστίκτου, ἤ ἀποκλίνοντος εἴτε πρός τό γκρί, εἴτε πρός τό καστανό, μέ σοβαρά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος

8. BURLEY I

Κατηγορία A Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, καλῶς περιποιημένα, πορώδους ὑφῆς, ἀκόμη καί συνεκτικῆς, μέ μίσχους καί νευρώσεις ὄχι πολύ ἐμφανεῖς, ὑγιῆ, χρώματος φουντουκιοῦ, κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον ζωηροῦ(1)

Κατηγορία B Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος, ὑγιῆ, μέ μερικά ἐλαττώματα περιποιήσεως καί ἀκεραιότητος, χρώματος ἀνομοιομόρφου

Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδῆ, μή πορώδους ὑφῆς, μέ ἔντονα ἐλαττώματα περιποιήσεως, ἀκεραιότητος καί χρώματος, ἀλλά κατάλληλα γιά συντήρηση

9. MARYLAND

Κατηγορία A Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος πού παρουσιάζουν ἐλαφρά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως μέ πολύ λίγες μπρούτζινες ἀποχρώσεις, ὅμως καλά περιποιημένα, μέ ἱστό μετρίας ὑφῆς, χωρίς ἔντονες νευρώσεις καί μίσχους, ὑγιῆ, καί μέ χρῶμα καστανό ἐρυθρωπό, μᾶλλον ἔντονο

Κατηγορία B Φύλλα ποικίλης συνεκτικότητος ἀλλά μᾶλλον ἐλαφρά, ὑγιῆ, πού παρουσιάζουν μερικά ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως καί ἀκεραιότητος, μέ χρῶμα καστανό ἐρυθρωπό μή ὁμοιόμορφο

Κατηγορία Γ Φύλλα χονδροειδῆ, μέ ἔντονα ἐλαττώματα ἀποξηράνσεως, ἀκεραιότητος καί χρώματος, ἀλλά κατάλληλα γιά συντήρηση

10. α) KENTUCKY καί τά ὑβρίδιά της· β) MORO DI CORI· γ) SALENTO

Κατηγορία A Φύλλα ἄθικτα, μεγάλου ἤ μετρίου μεγέθους, κανονικῶς ὥριμα μέ λεπτό ἱστό καί ἐπαρκῶς ἐλαστικό καί συνεκτικό, μέ λίγο ἔντονες νευρώσεις καί μίσχους, καλῶς περιποιημένα καί συντηρημένα, χρώματος καστανοῦ ὁμοιόμορφου

Κατηγορία B Φύλλα κανονικῶς ὥριμα, μέ ἱστό συνεκτικό, καλῶς περιποιημένα καί συντηρημένα, χρώματος καστανοῦ, μέ μερικά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος(1)

Κατηγορία Γ Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, ἐλαφροῦ ἱστοῦ, ἀνομοιομόρφου χρώματος, μέ ἐλαττώματα περιποιήσεως καί ἀκεραιότητος καί ἐλαφρά ἐλαττώματα συντηρήσεως

11. α) NOSTRANO DEL BRENTA· β) RESISTENTE 142· γ) GOJANO

Κατηγορία A Φύλλα μέ λεπτό ἱστό, ἐπαρκῶς συνεκτικά, πορώδη, ὥριμα, μέ ὄχι ἐντόνους μίσχους καί νευρώσεις, ὑγιῆ, καλῆς συντηρήσεως καί ζυμώσεως, χρώματος καστανοῦ ἤ ἀνοικτοῦ καστανοῦ κατά τό μᾶλλον ἤ ἧττον ὁμοιομόρφου, ἔστω καί μέ ἐλαφρά μειονεκτήματα ἀκεραιότητος

Κατηγορία B Φύλλα μέ ἱστό συνεκτικό ἤ ἐλαφρό, ὑγιῆ, καλῆς περιποιήσεως καί ζυμώσεως, χρώματος καστανοῦ ἤ θαθέος καστανοῦ, μέ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος ὄχι πολύ ἔντονα(1)

Κατηγορία Γ Φύλλα ἀνεπαρκῶς ὥριμα, ἀνομοιομόρφου χρώματος, ἔστω καί σκούρου καστανοῦ, χονδροειδῆ, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα περιποιήσεως, ζυμώσεως καί συντηρήσεως καθώς καί φύλλα πολύ σχισμένα μή δυνάμενα νά ἐνταχθοῦν στίς προηγούμενες κατηγορίες

(1) Ποιότητα ἀναφορᾶς.

12. α) BENEVENTANO· β) BRASILE SELVAGGIO καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες

Κατηγορία Α Φύλλα καλῆς ὡριμότητος, ὑγιῆ μέ ἱστό λεπτό καί ἀνθεκτικό, μέ ὄχι ἐντόνους μίσχους καί νευρώσεις, πορώδη, καλῆς περιποιήσεως καί ζυμώσεως, χρώματος καστανοῦ ἤ ἔστω θαθέος καστανοῦ ἀλλ' ὁμοιομόρφου, μέ μερικά ἐλαττώματα ἀκεραιότητος

Κατηγορία Β Φύλλα ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, μέ ἱστό συνεκτικό ἤ ἔστω χονδροειδῆ ἤ ἰσχνό, χωρίς ἔντονα ἐλαττώματα περιποιήσεως, ζυμώσεως καί ἀκεραιότητος(1)

Κατηγορία Γ Φύλλα μέ ἱστό χονδροειδῆ μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ὡριμότητος, περιποιήσεως, συντηρήσεως καί ἀκεραιότητος

13. XANTI-YAKÀ

14. PERUSTITZA

15. ERZEGOVINA καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες

Κατηγορία Α Φύλλα ὥριμα, ὑγιῆ, καλῆς περιποιήσεως, χρώματος ἀνοικτοῦ καστανοῦ ἤ κιτρίνου, μᾶλλον στιλπνά, μέ λεπτό ἱστό σχετικῶς συνεκτικό, πορώδη ὑφή, μεγέθους κυρίως μικροῦ ἤ μεσαίου, τά ὁποῖα προέρχονται κανονικά ἀπό τά κορυφόφυλλα ἤ τά ἀνώτερα μεσαῖα φύλλα (ποικιλίες 13 καί 14) καί ἀπό τά κορυφόφυλλα ἤ τά μεσαῖα φύλλα (ποικιλία 15)

Κατηγορία Β Φύλλα ἐπαρκῶς ὑγιῆ καί ὥριμα, μέ ἐλαφρά ἐλαττώματα περιποιήσεως, μέ ἱστό συνήθως ἐλαφρό, χρώματος ἀπό κιτρίνου μέχρι καστανοῦ, μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, ἀλλά καλῶς συντηρημένα, ἔστω καί ἄν προέρχονται ἀπό τά φύλλα θάσεως(1)

Κατηγορία Γ Φύλλα ἐλαφρά καί χονδροειδῆ, μέ ἐλαττώματα περιποιήσεως, ἀλλά συντηρήσιμα, ἀνομοιομόρφου χρώματος, μέ ἐμφανῆ ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, τά ὁποῖα προέρχονται ἀπό ὅλα τά ἐπίπεδα φυλλώματος

16. α) ROUND TIP· β) SCAFATI· γ) SUMATRA 1(1)

Κατηγορία Α Φύλλα θάσεως ταξινομημένα ὡς πρός τό μῆκος κατά τίς ἀκόλουθες ἀναλογίες:
1ου μήκους: 15%,
2ου μήκους: 55%,
3ου μήκους: 30%.
Φύλλα κανονικῶν διαστάσεων, καλῆς ὡριμότητος, χρώματος ἐπαρκῶς ὁμοιομόρφου, ὑγιῆ, μέ ἱστό κανονικό, πορώδη, μέ ὄχι ἐντόνους μίσχους καί νευρώσεις, καλῶς συντηρημένα, καλῆς καυσιμότητος, χαρακτηριστικῆς γεύσεως καί ἀρώματος, κατάλληλα γιά περιτυλίγματα πούρων. Εἶναι δυνατή ἡ ἀνοχή ἑνός ποσοστοῦ μή ἀκεραίων φύλλων περίπου 20%

Κατηγορία Β Φύλλα μεσαῖα κατώτερα ταξινομημένα ὡς πρός τό μῆκος κατά τίς ἀκόλουθες ἀναλογίες:
1ου μήκους: 60%,
2ου μήκους: 35%,
3ου μήκους: 5%,
Φύλλα κανονικῶν διαστάσεων, κανονικῶς ὥριμα καί ὁμοιομόρφου χρώματος, ὑγιῆ, χωρίς ἐλαττώματα ἀκεραιότητος, μέ λεπτό ἱστό, ἐλαστικά καί ἀνθεκτικά, μέ ὄχι ἐντόνους μίσχους καί νευρώσεις κανονικῆς ζυμώσεως καί καλῶς συντηρημένα, καλῆς καυσιμότητος, χαρακτηριστικῆς γεύσεως καί ἀρώματος, κατάλληλα γιά περιτυλίγματα πούρων, μέ ἀνοχή μή ἀκεραίων φύλλων περίπου 25%(1)

Κατηγορία Γ Φύλλα μεσαῖα ἀνώτερα ταξινομημένα ὡς πρός τό μῆκος κατά τίς ἀκόλουθες ἀναλογίες:
1ου μήκους: 10%,
2ου μήκους: 40%,
3ου μήκους: 50%.
Φύλλα μετρίων διαστάσεων, ἐπαρκοῦς ὡριμότητος, χρώματος ἐπαρκῶς ὁμοιομόρφου, ὑφῆς μᾶλλον συνεκτικῆς, καλῶς συντηρημένα, μετρίας καυσιμότητος, χαρακτηριστικῆς γεύσεως καί ἀρώματος, ἐν μέρει κατάλληλα γιά περιτυλίγματα πούρων κατωτέρας ποιότητος. Εἶναι δυνατή ἡ ἀνοχή ἑνός ποσοστοῦ μή ἀκεραίων φύλλων, περίπου 30%

(1) Ποιότητα ἀναφορᾶς.
(2) Τά μήκη ἔχουν ὡς ἑξῆς:
1ο μῆκος: ἀνώτερα ἤ ἴσα πρός 38 ἑκατ.
2ο μῆκος: ἀπό 32 μέχρι μικρότερα τῶν 38 ἑκατ.
3ο μῆκος: ἀπό 25 μέχρι μικρότερα τῶν 32 ἑκατ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ὑγρασία πού λαμβάνεται ὑπόψη γιά τόν προσδιορισμό τοῦ καθαροῦ βάρους πού προβλέπεται στό ἄρθρο 6 παράγραφος 1 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1727/70

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλίες	Ὑγρασία	
		Καπνός σέ φύλλα	Καπνός δεματοποιημένος
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	26%	16%
2	Badischer Burley E	25%	15%
3	Virgin D	19%	13%
4	a) Paraguay καί τά ὑβρίδιά της b) Dragon vert καί τά ὑβρίδιά της Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	27%	19%
5	Nijkerk	27%	19%
6	a) Misionero καί τά ὑβρίδιά της b) Rio Grande καί τά ὑβρίδιά της	27%	19%
7	Bright	16%	13%
8	Burley I	19%	13%
9	Maryland	19%	13%
10	a) Kentucky καί τά ὑβρίδιά της b) Moro di Cori c) Salento	23%	16%
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	22%	18%
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες	24%	16%
13	Xanti-Yakà	17%	13%
14	Perustitza	17%	13%
15	Erzegovina καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες	17%	13%
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	22%	16%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κλίμακα προσαυξήσεων καί μειώσεων γιά τά καπνά σέ φύλλα πού προβλέπεται στό ἄρθρο 1 παράγραφος 1 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1728/70.

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλίες	Ἐπίπεδο φυλλώματος	Κλάσεις, ποιότητες καί ἀριθμοί σέ σχέση μέ τήν ποιότητα ἀναφορᾶς			
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	Κλάση I 90 109 100 (1) 67	Κλάση II 73 88 82	Κλάση III 58 71 70	
2	Badischer Burley E	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	Κλάση I 114 122 100 (1) 50	Κλάση II 89 98 77	Κλάση III 56 76 59	
3	Virgin D		Κλάση I 100 (1)	Κλάση II 57	Κλάση III 22	
4	a) Paraguay καί τά ὑβρίδιά της b) Dragon vert καί τά ὑβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Φύλλα βάσεως (Lugs) Μεσαῖα φύλλα (Leaves) Κορυφόφυλλα (Tips)	Κλάση IS 130 — —	Κλάση 1 110 120 100	Κλάση 2 90 100 (1) 80	Κλάση 3 70 80 60
5	Nijkerk	Φύλλα βάσεως (Leaves) Κορυφόφυλλα (Tips)	Κλάση 1 100 120	Κλάση 2 80 100 (1)	Κλάση 3 60 60	
6	a) Misionero καί τά ὑβρίδιά της b) Rio Grande καί τά ὑβρίδιά της		1η ποιότητα 120	2α ποιότητα 100 (1)	3η ποιότητα 80	4η ποιότητα 60
7	Bright		Κατηγορία Α 100 (1)	Κατηγορία Β 65	Κατηγορία Γ 50	
8	Burley I		100 (1)	65	48	
9	Maryland		100 (1)	65	48	
10	a) Kentucky καί τά ὑβρίδιά της b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60	
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano		129	100 (1)	76	
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες		128	100 (1)	71	
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74	
14	Perustitza		109	100 (1)	73	
15	Erzegovina καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες		109	100 (1)	71	
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I		86	100 (1)	36	

(1) Ποιότητα ἀναφορᾶς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κλίμακα προσαυξήσεων καί μειώσεων γιά δεματοποιημένο καπνό πού προβλέπεται στό ἄρθρο 1 παράγραφος 2 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1728/70

Προσαυξήσεις καί μειώσεις σέ σχέση πρός τήν κατάταξη κατά κατηγορίες

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλίες	Ἐπίπεδα φυλλώματος	Κλάσεις καί ἀριθμοί σέ σχέση μέ τήν ποιότητα ἀναφορᾶς		
			Κλάση I	Κλάση II	Κλάση III
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	90 109 100 (1) 67	73 88 82	58 71 70
2	Badischer Burley E	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	114 122 100 (1) 50	89 98 77	56 76 59
3	Virgin D		100 (1)	57	22
			Κατηγορία A	Κατηγορία B	Κατηγορία Γ
7	Bright		100 (1)	65	50
8	Burley I		100 (1)	65	48
9	Maryland		100 (1)	65	48
10	a) Kentucky καί τά ὑβρίδιά της b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano		129	100 (1)	76
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες		128	100 (1)	71
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74
14	Perustitza		109	100 (1)	73
15	Erzegovina καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες		109	100 (1)	71
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I		86	100 (1)	36

(1) Ποιότητα ἀναφορᾶς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ποσό προβλεπόμενο στό ἄρθρο 1 παράγραφος 6 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 327/71

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλίες	Ποσό ΕΝΜ/χγρ. καπνοῦ σέ φύλλα
1	(a) Badischer Geudertheimer (b) Forchheimer Havanna II c	0,580
2	Badischer Burley E	0,598
3	Virgin D	0,603
4	(a) Paraguay καί τά ὑβρίδιά της (b) Dragon vert καί τά ὑβρίδιά της Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	0,422
5	Nijkerk	0,372
6	(a) Misionero καί τά ὑβρίδιά της (b) Rio Grande καί τά ὑβρίδιά της	0,468
7	Bright	0,642
8	Burley I	0,594
9	Maryland	0,594
10	(a) Kentucky καί τά ὑβρίδιά της (b) Moro di Cori (c) Salento	0,490
11	(a) Nostrano del Brenta (b) Resistente 142 (c) Gojano	0,589
12	(a) Beneventano (b) Brasile Selvaggio καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες	0,445
13	Xanti-Yakà	0,957
14	Perustitza	0,663
15	Erzegovina καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες	0,608
16	(a) Round Tip (b) Scafati (c) Sumatra I	3,598

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 638/74

Ὅρια ἀνοχῆς ἐπί τοῖς (%) τοῦ καθαροῦ βάρους

Ποικιλίες	Κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους ἀγορᾶς	Κατά τή διάρκεια τῶν ἑπομένων ἐτῶν
Dark air cured (1, 4, 5, 6, 11, 12) Fire cured (10) Special tobaccos (16)	1,5 %	0,7 %
Light air cured (2, 8, 9) Flue cured (3, 7) Sun cured (13, 14, 15)	1,0 %	0,6 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Μέγιστο ποσοστό ἀπωλειῶν βάρους πού προβλέπονται στό ἄρθρο 1 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 410/76

Αὔξων ἀριθμός	Ποικιλίες	Μέγιστο ὅριο ἀπωλειῶν βάρους (σέ ποσοστό τοῦ καθαροῦ βάρους καπνοῦ σέ φύλλα)(1)
1	(a) Badischer Geudertheimer (b) Forchheimer Havanna II c	22
2	Badischer Burley E	19
3	Virgin D	13
4	(a) Paraguay καί τά ὑβρίδιά της (b) Dragon vert καί τά ὑβρίδιά της Philippin Semois Appelterre	19
5	Nijkerk	19
6	(a) Misionero καί τά ὑβρίδιά της (b) Rio Grande καί τά ὑβρίδιά της	17
7	Bright	14
8	Burley I	15
9	Maryland	15
10	(a) Kentucky καί τά ὑβρίδιά της (b) Moro di Cori (c) Salento	15
11	(a) Nostrano καί τά ὑβρίδιά της (b) Resistente 142 (c) Gojano	15
12	(a) Beneventano (b) Brasile Selvaggio καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες	15
13	Xanti-Yakà	17
14	Perustitza	17
15	Erzegovina καί ὁμοειδεῖς ποικιλίες	17
16	(a) Round Tip (b) Scafati (c) Sumatra I	16

(1) Τά ποσοστά αὐτά προσαυξάνονται κατά 4 μονάδες γιά τά καπνά πού ἔχουν ὑποστεῖ κατεργασία.