I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2697/2000

af 27. november 2000

om de foreløbige tilladelser for tilsætningsstoffer i foderstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer [1], senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1887/2000 [2], (»direktivet«), særlig artikel 3, 9e og 9i, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter artikel 9e, stk. 1, og artikel 9i, stk. 1, i direktivet kan der gives en foreløbig tilladelse til anvendelse af et nyt tilsætningsstof eller til en ny anvendelse af et tilsætningsstof for en bestemt periode.

(2) Artikel 4 i direktivet fastsætter proceduren for en sådan tilladelse.

(3) I henhold til artikel 9e, stk. 2 og 3, og artikel 9i, stk. 1, i direktivet kan gyldighedsperioden for de foreløbige tilladelser ikke være over fire eller fem år, afhængigt af datoen for den første foreløbige tilladelse. Hvis denne blev givet inden den 1. april 1998, kan gyldighedsperioden for den foreløbige tilladelse ikke være over fem år. For tilsætningsstoffer, der første gang blev foreløbigt tilladt efter den 1. april 1998, kan gyldighedsperioden for den foreløbige tilladelse ikke være over fire år.

(4) Den første foreløbige tilladelse gives indtil den 30. september i det løbende år eller næste år og kan derefter forlænges hvert år med et år. Det sidste år kan den foreløbige tilladelse kun forlænges indtil henholdsvis den femte eller den fjerde årsdag for den oprindelige foreløbige tilladelse.

(5) De foreløbige tilladelser af mange tilsætningsstoffer udløber den 30. september, og gyldighedsperioden for disse tilladelser bør forlænges med et år eller indtil henholdsvis den femte eller den fjerde årsdag for den oprindelige foreløbige tilladelse, så at de data, der er nødvendige for at give en tilladelse for ti år eller en tidsubegrænset tilladelse (afhængigt af arten af det pågældende tilsætningsstof), kan fremskaffes.

(6) Forlængelsen af gyldighedsperioden for de foreløbige tilladelser må betragtes som en rent administrativ foranstaltning, der ikke indebærer en ny evaluering af de pågældende tilsætningsstoffer.

(7) Foreløbige tilladelser efter denne forordning gives for en bestemt periode, uden at dette anfægter muligheden af, at de når som helst kan trækkes tilbage, jf. direktivets artikel 9m og 11. Således er tilladelserne til at anvende antibiotika som tilsætningsstoffer til foderstoffer for øjeblikket ved at blive revurderet, på baggrund af, at Kongeriget Sverige med hjemmel i direktivets artikel 11 har forbudt anvendelse af alle former for antibiotika som tilsætningsstoffer til foderstoffer på sit territorium, og på baggrund af Den Videnskabelige Styringskomités udtalelse om antimikrobiel resistens den 28. maj 1999. Desuden er Kommissionen ved at undersøge det mere generelle spørgsmål om anvendelsen af antibiotika som tilsætningsstoffer til foderstoffer.

(8) I lyset af de fremlagte data, der er blevet undersøgt af medlemsstaterne, er betingelserne opfyldt med henblik på foreløbig tilladelse af den nye anvendelse af tilsætningsstofferne »Tartrazin« (E 102), »Sunset Yellow FCF« (E 110), »Patent Blue V« (E 131), og »Chlorophyllin-kobber-kompleks« (E 141), der tilhører gruppen »Farvestoffer, herunder pigmenter«, på de betingelser, der er beskrevet i bilaget.

(9) I lyset af de fremlagte data, der er blevet undersøgt af medlemsstaterne, er betingelserne opfyldt med henblik på en ændring af de fysiske former af de tidligere foreløbigt tilladte enzympræparater nr. 7 og 8 på de betingelser, der er beskrevet i bilaget.

---

[1] EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1.
[2] EFT L 227 af 7.9.2000, s. 13.

(10) De foreløbige tilladelser, der udløber den 30. september 2000 for præparater af mikroorganismer nr. 1 Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112) og nr. 4 Bacillus cereus (ATCC 14893), bør forlænges foreløbigt indtil den 20. februar 2001 for at give tilstrækkelig tid til at fremskaffe supplerende data og for en nyvurdering af sikkerheden for disse stammer med hensyn til produktion af toksiner, således som det blev krævet i *Opinion of the Scientific Committee for Animal Nutrition on the safety of use of Bacillus species in Animal Nutrition*, afgivet den 17. februar 2000.

(11) Kommissionen har hørt Den Videnskabelige Komité for Foder om sikkerheden i forbindelse med de enzympræparater, der er opført i bilaget til denne forordning; komitéen har afgivet en positiv udtalelse i *Report of the Scientific Committee for Animal Nutrition on the use of certain enzymes in animal feedingstuffs*, der blev vedtaget den 4. juni 1998 og opdateret den 3. december 1999.

(12) Kommissionen har hørt Den Videnskabelige Komité for Foder om sikkerheden i forbindelse med de præparater af mikroorganismer, der er opført i bilaget til denne forordning; komitéen har afgivet en positiv udtalelse i *Report on the use of certain micro-organisms as additives in feedingstuffs*, der blev vedtaget den 26. september 1997 og opdateret den 27. april 1999.

(13) Med henblik på at fremlægge et læsevenligt og komplet dokument bør alle foreløbige tilladelser for tilsætningsstoffer i foderstoffer præsenteres samlet i denne forordning.

(14) De foreløbige tilladelser for de fleste tilsætningsstoffer udløber den 30. september 2000; det er derfor nødvendigt, at denne forordning anvendes fra den 1. oktober 2000.

(15) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Foderstofkomité —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De tilsætningsstoffer, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, tillades foreløbigt efter direktiv 70/524/EØF på betingelserne i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Den anvendes fra den 1. oktober 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2000.

På Kommissionens vegne
David BYRNE
Medlem af Kommissionen

BILAG

Fortegnelse over tilsætningsstoffer, der er knyttet til en ansvarlig for markedsføringen, og for hvilke der er givet en foreløbig tilladelse for højst fem år

Tilsætningsstoffets registreringsnummer	Navn på og registreringsnummer for den ansvarlige for tilsætningsstoffets markedsføring	Tilsætningsstof (handelsnavn)	Sammensætning, kemisk betegnelse og beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
						mg aktivt stof/kg fuldfoder			
Antibiotika									
33	Eli Lilly and Company Ltd	Avilamycin, 200 g/kg (Maxus G200, Maxus 200) Avilamycin, 100 g/kg (Maxus G100, Maxus 100)	Tilsætningsstoffets sammensætning: Avilamycin: 200 g aktivt stof/kg Sojaolie eller mineralolie: 5-30 g/kg Sojabønneskaller q.s. 1 kg Avilamycin: 100 g aktivt stof/kg Sojaolie eller mineralolie: 5-30 g/kg Sojabønneskaller q.s. 1 kg Aktivt stof: Avilamycin, $C_{57-62}H_{82-90}Cl_{1-2}O_{31-32}$, Avilamycin A's CAS-nummer: 69787-79-7, Avilamycin B's CAS-nummer: 73240-30-9, blanding af oligosaccharider af orthosomycingruppen produceret af *Streptomyces viridochromogenes* (NRRL 2860), granulat. Forholdsmæssig sammensætning: Avilamycin A: ≥ 60 %. Avilamycin B: ≤ 18 %. Avilamycin A + B: ≥ 70 %. Andre enkeltavilamyciner: ≤ 6 %.	Kalkuner	—	5	10	—	30.9.2001 [a]

Tilsætningsstoffets registreringsnummer	Navn på og registreringsnummer for den ansvarlige for tilsætningsstoffets markedsføring	Tilsætningsstof (handelsnavn)	Sammensætning, kemisk betegnelse og beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
						mg aktivt stof/kg fuldfoder			
			Coccidiostatika og andre lægemidler						
26	Intervet International bv	Salinomycinnatrium 120 g/kg (Sacox 120)	Tilsætningsstoffets sammensætning: Salinomycinnatrium ≥ 120 g/kg Siliciumdioxid: 10-100 g/kg Calciumcarbonat: 350-700 g/kg Aktivt stof: Salinomycinnatrium, $C_{42}H_{69}O_{11}Na$, CAS-nummer: 53003-10-4, natriumsalt af en polyethermonocarboxylsyre produceret ved gæring af *Streptomyces albus* (DSM 12217) Beslægtede urenheder: < 42 mg elaiophylin pr. kg salinomycinnatrium < 40 g 17-epi-20-desoxy-salinomycin pr. kg salinomycinnatrium	Slagtekaniner	—	20	25	Må højst anvendes indtil fem dage før slagtning I brugsvejledningen angives: »Farligt for heste« »Dette foderstof indeholder en inophor: bør ikke anvendes sammen med visse lægemidler (fx tiamulin)«	20.3.2001 [b]
				Hønniker	12 uger	30	50	I brugsvejledningen angives: »Farligt for heste« »Dette foderstof indeholder en ionophor: bør ikke anvendes sammen med visse lægemidler (fx tiamulin)«	30.9.2001 [c]

Tilsætningsstoffets registreringsnummer	Navn på og registreringsnummer for den ansvarlige for tilsætningsstoffets markedsføring	Tilsætningsstof (handelsnavn)	Sammensætning, kemisk betegnelse og beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
						mg aktivt stof/kg fuldfoder			
27	Janssen Animal Health B.V.B.A	Diclazuril, 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5% Premix)	Tilsætningsstoffets sammensætning: Diclazuril: 0,5 g/100 g Sojaskrå: 99,25 g/100 g Polyvidon K 30: 0,2 g/100 g Natriumhydroxid: 0,0538 g/100 g	Kalkuner	12 uger	1	1	Må højst anvendes indtil fem dage før slagtning	20.3.2001 [b]
		Diclazuril, 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2% Premix)	Diclazuril: 0,2 g/100 g Sojaskrå: 39,7 g/100 g Polyvidon K 30: 0,08 g/100 g Natriumhydroxid: 0,0215 g/100 g Hvedestrømel: 60 g/100 g Aktivt stof: Diclazuril, $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-chlorophenyl[2,6-dichloro-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]acetonitril, CAS-nummer: 101831-37-2, Beslægtede urenheder: Nedbrydningsprodukt (R064318): ≤ 0,2% Andre beslægtede urenheder (R066891, R066896, R068610, R070156, R068584, R070016): ≤ 0,5% pr. urenhed Urenheder i alt: ≤ 1,5%	Hønniker	16 uger	1	1	—	30.9.2001 [a]

Tilsætningsstoffets registreringsnummer	Navn på og registreringsnummer for den ansvarlige for tilsætningsstoffets markedsføring	Tilsætningsstof (handelsnavn)	Sammensætning, kemisk betegnelse og beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
						mg aktivt stof/kg fuldfoder			
28	Alpharma AS	Alfa-maduramicinammonium: 1 g/100 g (Cygro 1 %)	Tilsætningsstoffets sammensætning: Alfa-maduramicinammonium 1 g/100 g Benzylalkohol: 5 g/100 g Majsgrits q.s. 100 g Aktivt stof: Alfa-maduramicinammonium $C_{47}H_{83}O_{17}N$, CAS-nummer: 84878-61-5, ammoniumsalt af en polyethermonocarboxylsyre produceret af *Actinomadura yumaensis* (ATCC 31585) (NRRL 12515) Beslægtede urenheder: Beta-maduramicinammonium: < 10 %	Kalkuner	16 uger	5	5	Må højst anvendes indtil fem dage før slagtning I brugsvejledningen angives: »Farligt for heste« »Dette foderstof indeholder en inophor: bør ikke anvendes sammen med visse lægemidler (fx tiamulin)«	30.9.2001 [c]

Fortegnelse over andre tilsætningsstoffer, for hvilke der er givet foreløbig tilladelse før højst fire år, eller fem år for så vidt angår tilsætningsstoffer, for hvilke der blev givet foreløbig tilladelse inden den 1. april 1998

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
Farvestoffer, herunder pigmenter								
1. *Karotenoider og xanthofyler*								
E 160a	Beta-caroten	$C_{40}H_{56}$	Kanariefugle	—	—	—	—	30.9.2001 [d]
E 161g	Canthaxanthin	$C_{40}H_{52}O_2$	Selskabs- og prydfugle	—	—	—	—	30.9.2001 [d]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
12	Astaxanthin-rig *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219)	Koncentreret biomasse af gæren *Phaffia rhodozyma* (ATCC 74219), dræbt, indeholdende mindst 4,0 g astaxanthin pr. kg tilsætningsstof og med et ethoxyquin-indhold på maksimum 2 000 mg/kg.	Laks	—	—	100	Maksimumsindhold udtrykt som astaxanthin Må først anvendes fra seksmånedersalderen Blanding af tilsætningsstoffet med canthaxanthin er tilladt, hvis det totale indhold af astaxanthin og canthaxanthin ikke overstiger 100 mg/kg i fuldfoderet Indholdet af ethoxyquin skal anføres	30.9.2001 [d]
			Ørreder	—	—	100	Maksimumsindhold udtrykt som astaxanthin Må først anvendes fra seksmånedersalderen Blanding af tilsætningsstoffet med canthaxanthin er tilladt, hvis det totale indhold af astaxanthin og canthaxanthin ikke overstiger 100 mg/kg i fuldfoderet Indholdet af ethoxyquin skal anføres	30.9.2001 [d]
2. *Andre farvestoffer*								
E 102	Tartrazin	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Kornædende prydfugle	—	—	150	—	30.9.2001
			Små gnavere	—	—	150	—	30.9.2001
E 110	Sunset Yellow FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Kornædende prydfugle	—	—	150	—	30.9.2001
			Små gnavere	—	—	150	—	30.9.2001

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
E 131	Patent Blue V	Calciumsalt af m-hydroxy-tetra-ethyl-diaminotriphenylcarbinol anhydrid disulfonsyre	Kornædende prydfugle	—	—	150	—	30.9.2001
			Små gnavere	—	—	150	—	30.9.2001
E 141	Chlorophyllin-kobber-kom-pleks	—	Kornædende prydfugle	—	—	150	—	30.9.2001
			Små gnavere	—	—	150	—	30.9.2001

Nr. (eller EF-nr.)	Element	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse	Maksimumsindhold af stoffet i mg/kg fuldfoder	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
			Sporstoffer			
E 4	Kobber — Cu	Kobberlysinsulfat	$Cu(C_6H_{13}N_2O_2)_2{\cdot}SO_4$	Fedesvin: — i medlemsstater, hvis gennemsnitlige svinebelægningstæthed er 175 svin eller derover pr. 100 ha udnyttet landbrugsareal: — indtil 16 uger: 175 (i alt) — i medlemsstater, hvis gennemsnitlige svinebelægningstæthed er under 175 svin pr. 100 ha udnyttet landbrugsareal: — indtil 16 uger: 175 (i alt)	Højst 50 mg/kg kobber i fuldfoderet må stamme fra kobberlysinsulfat	30.9.2001 (e)
				Fedesvin: — i medlemsstater, hvis gennemsnitlige svinebelægningstæthed er 175 svin eller derover pr. 100 ha udnyttet landbrugsareal: — fra 17. uge indtil slagtning: 35 (i alt) — i medlemsstater, hvis gennemsnitlige svinebelægningstæthed er under 175 svin pr. 100 ha udnyttet landbrugsareal: — fra 17. uge til 6 måneder: 100 (i alt) — fra 6 måneder indtil slagtning: 35 (i alt) Avlssvin: 35 (i alt) Andre dyrearter eller -kategorier, undtagen kalve inden drøvtygningens begyndelse og får: 35 (i alt)	Højst 25 mg/kg kobber i fuldfoderet må stamme fra kobberlysinsulfat	30.9.2001 (e)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
Bindemidler, antiklumpningsmidler og koaguleringsmidler								
3	Clinoptilolit af vulkansk oprindelse	Calciumhydroaluminiumsilikat af vulkansk oprindelse, der indeholder mindst 85% clinoptilolit og højst 15% feldspat, glimmer og ler, fri for fibre og kvarts Maksimalt blyindhold: 80 mg/kg	Svin	—	—	20 000	Alle foderstoffer	30.9.2001 (f)
			Kaniner	—	—	20 000	Alle foderstoffer	30.9.2001 (f)
			Fjerkræ	—	—	20 000	Alle foderstoffer	30.9.2001 (f)
4	Clinoptilolit af sedimentær oprindelse	Calciumhydroaluminiumsilikat af sedimentær oprindelse, der indeholder mindst 80% clinoptilolit og højst 20% lermineraler, fri for fibre og kvarts Maksimalt dioxinindhold (1):	Fedesvin	—	—	20 000	Alle foderstoffer	30.9.2001 (o)
			Slagtekyllinger	—	—	20 000	Alle foderstoffer	30.9.2001 (o)
			Slagtekalkuner	—	—	20 000	Alle foderstoffer	30.9.2001 (o)
			Kvæg	—	—	20 000	Alle foderstoffer	30.9.2001 (o)
			Laks	—	—	20 000	Alle foderstoffer	30.9.2001 (o)
Enzymer								
1	3-fytase EC 3.1.3.8	Præparat af 3-fytase produceret af *Aspergillus niger* (CBS 114.94) med en fytaseaktivitet på mindst 5 000 FTU (2)/g for faste og flydende præparater	Kalkuner	—	125 FTU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 200-800 FTU 3. Anvendes i foderblandinger med et fytatindhold på mindst 0,3%, fx 20% hvede	30.9.2001 (d)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
2	3-fytase EC 3.1.3.8	Præparat af 3-fytase produceret af *Aspergillus oryzae* (ATCC 10 289), med en aktivitet på mindst: Coated: 2 500 FYT ([3])/g Flydende: 5 000 FYT/g	Smågrise	4 måneder	250 FYT	1 000 FYT	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500 FYT 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af fytater, fx med indhold af mere end 40 % korn (majs, byg, havre, hvede, rug, triticale), oliefrø og bælgfrugter	30.9.2001 ([g])
			Fedesvin	—	400 FYT	1 000 FYT	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500 FYT 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af fytater, fx med indhold af mere end 40 % korn (majs, byg, havre, hvede, rug, triticale), oliefrø og bælgfrugter	30.9.2001 ([g])
			Slagtekyllinger	—	200 FYT	1 000 FYT	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500 FYT 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af fytater, fx med indhold af mere end 40 % korn (majs, byg, havre, hvede, rug, triticale), oliefrø og bælgfrugter	30.9.2001 ([g])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Æglæggende høner	—	500 FYT	1 000 FYT	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 750 FYT 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af fytater, fx med indhold af mere end 40 % korn (majs, byg, havre, hvede, rug, triticale), oliefrø og bælgfrugter	30.9.2001 (h)
3	Alfa-galactosidase EC 3.2.1.22	Præparat af alfa-galactosidase produceret af *Aspergillus oryzae* (DSM 10 286) med en aktivitet på mindst: Flydende: 1 000 GALU (4)/g	Slagtekyllinger	—	300 GALU	1 000 GALU	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 450 GALU 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af oligosaccharider, fx med indhold af sojamel, bomuldsfrøkager og ærter på over 25 %	30.9.2001 (g)
4	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) med en aktivitet på mindst: Coated: 50 FBG (5)/g Flydende: 120 FBG/g	Smågrise	4 måneder	25 FBG	40 FBG	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 25 FBG 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 50 % majs eller byg	30.9.2001 (g)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Slagtekyllinger	—	10 FBG	100 FBG	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 20 FBG 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af majs på over 60 %	30.9.2001 ([m])
5	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) med en aktivitet på mindst: Coated: 1 000 FXU ([6])/g Flydende: 650 FXU/ml	Slagtekyllinger	—	80 FXU	200 FXU	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 150 FXU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 50 %	30.9.2001 ([g])
			Slagtekalkuner	—	225 FXU	600 FXU	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 225-600 FXU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 50 %	30.9.2001 ([g])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Smågrise	4 måneder	200 FXU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 200 FXU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 50 %	30.9.2001 (g)
6	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase produceret af *Humicola insolens* (DSM 10442) med en aktivitet på mindst: Coated: 800 FXU (7)/g 75 FBG (8)/g Mikrogranulat: 800 FXU/g 75 FBG/g Flydende: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Slagtekyllinger	—	200 FXU 19 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 400 FXU 38 FBG 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg og/eller havre, hvede, på over 30 %	30.9.2001 (g)
			Smågrise	4 måneder	240 FXU 22 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 400 FXU 38 FBG 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg og/eller havre, hvede, på over 30 %	30.9.2001 (g)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Fedesvin	—	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 400 FXU 38 FBG 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg og/eller havre, hvede, på over 30 %	30.9.2001 (i)
7	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase produceret af *Aspergillus niger* (CBS 600.94), med en aktivitet på mindst: Coated: 36 000 FXU (9)/g 15 000 BGU (10)/g Flydende og fast form: 36 000 FXU/g 15 000 BGU/g	Slagtekyllinger	—	3 600 FXU 1 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 3 600-6 000 FXU 1 500-2 500 BGU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 35 % og af hvede på over 20 %	30.9.2001 (g*)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Smågrise	4 måneder	6 000 FXU 2 500 BGU	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 6 000 FXU 2 500 BGU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og betaglucaner), fx med indhold af hvede på over 30 % og af byg på over 30 %	30.9.2001 [m]
			Slagtekalkuner	—	6 000 FXU 2 500 BGU	12 000 FXU 5 000 BGU	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 6 000-12 000 FXU 2 500-5 000 BGU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og betaglucaner), fx med indhold af hvede på over 40 %	30.9.2001 [m]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Æglæggende høner	—	12 000 FXU 5 000 BGU	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 12 000 FXU 5 000 BGU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 20 %, af byg på over 10 % og af solsikke på over 20 %	30.9.2001 ([m])
8	Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Aspergillus niger* (CBS 600.94) med en aktivitet på mindst: Coated: 10 000 BGU ([10])/g 4 000 FXU ([9])/g Flydende og fast form: 20 000 BGU/g 8 000 FXU/g	Slagtekyllinger	—	3 000 BGU 1 200 FXU	10 000 BGU 4 000 FXU	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 3 000-10 000 BGU 1 200-4 000 FXU 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), dvs. med indhold af mere end 60 % byg	30.9.2001 ([g*])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Smågrise	4 måneder	3 000 BGU 1 200 FXU	5 000 BGU 2 000 FXU	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 3 000-5 000 BGU 1 200-2 000 FXU 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), fx med indhold af mere end 30 % byg	30.9.2001 (h*)
			Æglæggende høner	—	5 000 BGU 2 000 FXU	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 5 000 BGU 2 000 FXU 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), dvs. med indhold af mere end 60 % byg	30.9.2001 (m)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
9	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Aspergillus niger* (CBS 270.95) med en aktivitet på mindst: Fast: 28 000 EXU ([11])/g Flydende: 14 000 EXU/ml	Slagtekyllinger	—	1 400 EXU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 400 EXU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 50 %	30.9.2001 ([g])
			Æglæggende høner	—	2 400 EXU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 2 400-7 400 EXU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 30 % og af rug på over 30 %	30.9.2001 ([m])
			Slagtekalkuner	—	2 400 EXU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 2 400-5 600 EXU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 30 % og rug på over 30 %	30.9.2001 ([m])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
10	Alfa-amylase EC 3.2.1.1	Præparat af alfa-amylase produceret af *Bacillus amyloliquefaciens* (CBS 360.94) med en aktivitet på mindst: Fast: 45 000 RAU ([12])/g Flydende: 20 000 RAU/ml	Smågrise	4 måneder	1 800 RAU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 800 RAU 3. Anvendes udelukkende i foderblandinger, der er beregnet til flydende fodring, og som indeholder stivelsesrigt fodermateriale (fx over 35 % hvede)	30.9.2001 ([g])
			Fedesvin	—	1 800 RAU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 800 RAU 3. Anvendes udelukkende i foderblandinger, der er beregnet til flydende fodring, og som indeholder stivelsesrigt fodermateriale (fx over 35 % hvede)	30.9.2001 ([g])
			Søer	—	1 800 RAU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 800 RAU 3. Anvendes udelukkende i foderblandinger, der er beregnet til flydende fodring, og som indeholder stivelsesrigt fodermateriale (fx over 35 % hvede)	30.9.2001 ([g])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
11	Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252), med en aktivitet på mindst: Endo-1,4-beta-glucanase: 8 000 U ([13])/ml Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 18 000 U ([14])/ml Endo-1,4-beta-xylanase: 26 000 U ([15])/ml	Slagtekyllinger	—	Endo-1,4-beta-glucanase: 400 U Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 900 U Endo-1,4-beta-xylanase: 1 300 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-glucanase: 400-1 600 U endo-1,3(4)-beta-glucanase: 900-3 600 U endo-1,4-beta-xylanase: 1 300-5 200 U. 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af hvede eller byg på over 30 % og rug på over 10 %	30.9.2001 ([g])
12	Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-glucanase, endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma viride* (FERM BP-4447), med en aktivitet på mindst: Endo-1,4-beta-glucanase: 8 000 U ([13])/g Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 18 000 U ([14])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 26 000 U ([15])/g	Slagtekyllinger	—	Endo-1,4-beta-glucanase: 200 U Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 450 U Endo-1,4-beta-xylanase: 650 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-glucanase: 800-1 200 U endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 800-2 700 U endo-1,4-beta-xylanase: 2 600-3 900 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 20 % og byg på over 20 % og/eller af rug på over 25 %	30.9.2001 ([g])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Æglæggende høner	—	Endo-1,4-beta-glucanase: 640 U Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 440 U Endo-1,4-beta-xylanase: 2 080 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-glucanase: 640-1 280 U endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 440-2 880 U endo-1,4-beta-xylanase: 2 080-4 160 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 20 %, af byg på over 20 % og/eller af rug på over 25 %	30.9.2001 (g)
			Slagtekalkuner	—	Endo-1,4-beta-glucanase: 800 U Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 800 U Endo-1,4-beta-xylanase: 2 600 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-glucanase: 800-1 200 U endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 800-2 700 U endo-1,4-beta-xylanase: 2 600-3 900 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 20 % og af byg på over 20 %	30.9.2001 (g**)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
13	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) med en aktivitet på mindst: Pulver: 8 000 BGU ([16])/g 11 000 EXU ([17])/g Granuleret form: 6 000 BGU/g 8 250 EXU/g Flydende: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Slagtekyllinger	—	100 BGU 130 EXU	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 100 BGU 130 EXU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 30 % og byg på over 30 % eller af rug på over 20 %	30.9.2001 ([g])
			Æglæggende høner	—	600 BGU 800 EXU	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 600 BGU 800 EXU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 40 % og af byg på over 30 %	30.9.2001 ([m])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Slagtekalkuner	—	600 BGU 800 EXU	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 600 BGU 800 EXU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 30 % eller af rug på over 30 %	30.9.2001 (m)
14	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Aspergillus niger* (CBS 520.94), med en aktivitet på mindst: Fast form: endo-1,4-beta-xylanase: 600 U ([18])/g Flydende: endo-1,4-beta-xylanase: 300 U/ml	Slagtekyllinger	—	Endo-1,4-beta-xylanase: 300 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 300-600 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 50 %	30.9.2001 (g)
15	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma viride* (CBS 517.94), med en aktivitet på mindst: Fast form: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 650 U ([19])/g Flydende: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 325 U/ml	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 325 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 325-650 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 50 %	30.9.2001 (g)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
16	Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4	Præparat af endo-1,4-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 142), med en aktivitet på mindst: Fast: 2 000 CU ([20])/g Flydende: 2 000 CU/ml	Slagtekyllinger	—	250 CU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 CU 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 40 % byg	30.9.2001 ([g**])
			Ægglæggende høner	—	250 CU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 CU 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 40 % byg	30.9.2001 ([g**])
			Smågrise	4 måneder	250 CU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 CU 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 40 % byg	30.9.2001 ([g**])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Fedesvin	—	250 CU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 CU 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 40 % byg	30.9.2001 (g**)
17	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) med en aktivitet på mindst: Fast: 6 000 EPU ([21])/g Flydende: 6 000 EPU/ml	Slagtekyllinger	—	750 EPU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 500-3 000 EPU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede eller majs på over 40 %	30.9.2001 (g**)
			Æglæggende høner	—	750 EPU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 500-3 000 EPU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede eller majs på over 40 %	30.9.2001 (g**)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Smågrise	4 måneder	750 EPU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 500-3 000 EPU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede eller majs på over 40 %	30.9.2001 (g**)
			Fedesvin	—	750 EPU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 500-3 000 EPU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede eller majs på over 40 %	30.9.2001 (g**)
			Slagtekalkuner	—	750 EPU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 500-3 000 EPU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede eller majs på over 35 %	30.9.2001 (n)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
18	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Aspergillus niger* (MUCL 39199), med en aktivitet på mindst: Fast form: 2 000 AGL ([22])/g Flydende: 500 AGL/ml	Slagtekyllinger	—	100 AGL	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 100 AGL 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 40 % og af hvede på over 20 %	30.9.2001 ([g])
19	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Aspergillus niger* (MUCL 39199), med en aktivitet på mindst: Fast form: 1 500 AGL ([22])/g Flydende: 200 AGL/g	Slagtekyllinger	—	25 AGL	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 25-100 AGL. 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 50 % byg	30.9.2001 ([g])
20	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203), med en aktivitet på mindst: Fast: 2 000 AXC ([23])/g Flydende: 500 AXC/ml	Slagtekyllinger	—	100 AXC	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 100 AXC 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede eller rug på over 40 %	30.9.2001 ([g])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
21	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (MUCL 39203), med en aktivitet på mindst: Fast: 1 500 AXC ([23])/g Flydende: 200 AXC/g	Slagtekyllinger	—	25 AXC	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 25-100 AXC 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 50 %	30.9.2001 ([g])
22	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), med en aktivitet på mindst: Fast: 70 000 BGN ([24])/g Flydende: 14 000 BGN/ml	Slagtekyllinger	—	1 050 BGN	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 2 800 BGN 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 50 % byg	30.9.2001 ([g])
23	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W), med en aktivitet på mindst: Fast: 70 000 IFP ([25])/g Flydende: 7 000 IFP/ml	Slagtekyllinger	—	1 050 IFP	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 1 400 IFP 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 56 %	30.9.2001 ([g])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
24	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Aspergillus niger* (CNCM I-1517), med en aktivitet på mindst: 28 000 QXU ([26])/g 140 000 QGU ([27])/g	Slagtekyllinger	—	420 QXU 2 100 QGU	1 120 QXU 5 600 QGU	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 560 QXU 2 800 QGU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især betaglucaner), fx med indhold af hvede på over 30 % og af byg på over 30 %	30.9.2001 ([g])
25	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Aspergillus niger* (NRRL 25541), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 100 U ([28])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 1 600 U ([29])/g	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 138 U Endo-1,4-beta-xylanase: 200 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 138 U endo-1,4-beta-xylanase: 200 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), fx med indhold af byg på over 50 % eller af hvede på over 30 % og majs på over 30 %	30.9.2001 ([g])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Æglæggende høner	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 138 U Endo-1,4-beta-xylanase: 200 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 138 U endo-1,4-beta-xylanase: 200 U. 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 50 % eller af hvede på over 30 % og majs på over 30 %	30.9.2001 (g)
26	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma reesei* (CBS 526.94), med en aktivitet på mindst: Fast: 350 000 BU ([30])/g Flydende: 50 000 BU/g	Slagtekyllinger	—	23 000 BU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 23 000-50 000 BU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især glucaner), fx med indhold af byg på over 20 % eller rug på over 30 %	30.9.2001 (i)
			Smågrise	4 måneder	26 000 BU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 26 000—35 000 BU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især glucaner), fx med indhold af byg eller hvede på over 60 %	30.9.2001 (i)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
27	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma reesei* (CBS 529.94) og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma reesei* (CBS 526.94), med en aktivitet på mindst: Fast form: 200 000 BXU ([31])/g 200 000 BU ([30])/g Flydende: 30 000 BXU/g 30 000 BU/g	Slagtekyllinger	—	2 500 BXU 2 500 BU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 10 000 BXU 10 000 BU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og glucaner), fx med indhold af hvede på over 40 % eller af rug på over 30 %	30.9.2001 (i)
28	3-fytase EC 3.1.3.8	Præparat af 3-fytase produceret af *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), med en aktivitet på mindst: Fast: 5 000 PPU ([32])/g Flydende: 1 000 PPU/g	Smågrise	4 måneder	250 PPU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-750 PPU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af fytater, fx med indhold af korn (majs, byg, hvede), tapioka, oliefrø og bælgfrugter på over 50 %	30.9.2001 (i)
			Fedesvin	—	500 PPU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-750 PPU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af fytater, fx med indhold af korn (majs, byg, hvede), tapioka, oliefrø og bælgfrugter på over 50 %	30.9.2001 (i)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
29	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Geosmithia emersonii* (IMI SD 133), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 5 500 U ([33])/g	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 50 %	30.9.2001 ([h])
30	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101), med en aktivitet på mindst: Pulver: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 2 000 U ([34])/g endo-1,4-beta-xylanase: 1 400 U ([35])/g Flydende: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 500 U/ml endo-1,4-beta-xylanase: 350 U/ml	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U Endo-1,4-beta-xylanase: 70 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U endo-1,4-beta-xylanase: 70 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), fx med indhold af byg på over 50 % eller af hvede på over 60 %	30.9.2001 ([h])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
31	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 614.94) med en aktivitet på mindst: Fast form: 300 EU ([36])/g Flydende: 1 000 EU/g	Slagtekyllinger	—	600 EU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 600 EU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 60 %	30.9.2001 ([h])
			Æglæggende høner	—	300 EU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 600 EU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 60 %	30.9.2001 ([h])
32	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 200 U ([19])/ml	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 30 % byg	30.9.2001 ([i])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
		Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 200 U/ml	Smågrise	4 måneder	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 55 % byg	30.9.2001 (i)
			Fedesvin	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 500 U	—	1. I retningslinjerne for brugs af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 500 U 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af mere end 70 % byg	30.9.2001 (i)
33	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), med en aktivitet på mindst: Pulver: endo-1,4-beta-xylanase: 2 000 U ([37])/g Flydende: endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U/ml	Slagtekyllinger	—	Endo-1,4-beta-xylanase: 500 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 500-2 500 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 55 % eller af rug på over 60 %	30.9.2001 (i)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Æglæggende høner	—	Endo-1,4-beta-xylanase: 2 000 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 2 000 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 35 %	30.9.2001 (i)
		Pulver: endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U/g Flydende: endo-1,4-beta-xylanase: 10 000 U/ml	Smågrise	4 måneder	Endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 45 %	30.9.2001 (i)
		Pulver: endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U/g Flydende: endo-1,4-beta-xylanase: 8 000 U/ml	Fedesvin	—	Endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 35 %	30.9.2001 (i)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
34	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Alfa-amylase EC 3.2.1.1	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Aspergillus niger* (NRRL 25541) og alfa-amylase produceret af *Aspergillus oryzae* (ATCC 66222), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 275 U ([28])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U ([38])/g Alfa-amylase: 3 100 U ([39])/g	Smågrise	4 måneder	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 165 U Endo-1,4-beta-xylanase: 240 U Alfa-amylase: 1 860 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 165 U endo-1,4-beta-xylanase: 240 U alfa-amylase: 1 860 U 3. Anvendes i foderblandinger med korn med højt indhold af stivelse og andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 45 % og hvede på over 10 % eller majs på over 10 %	30.9.2001 ([k])
35	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 80 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 180 U ([37])/g	Æglæggende høner	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 80 U Endo-1,4-beta-xylanase: 180 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 80 U endo-1,4-beta-xylanase: 180 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), fx med indhold af byg på over 60 %	30.9.2001 ([k])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
36	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 300 U ([37])/g	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U Endo-1,4-beta-xylanase: 300 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U endo-1,4-beta-xylanase: 300 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), fx med indhold af byg på over 40 %	30.9.2001 ([k])
			Æglæggende høner	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U Endo-1,4-beta-xylanase: 300 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 300 U endo-1,4-beta-xylanase: 300 U 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), dvs med indhold af mere end 35 % byg	30.9.2001 ([k])
37	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) og Subtilisin produceret af *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), med en aktivitet på mindst: Endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U ([37])/g Subtilisin: 800 U ([40])/g	Slagtekyllinger	—	Endo-1,4-beta-xylanase: 500 U Subtilisin: 160 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 500-2 500 U subtilisin: 160-800 U 3. Til brug i foderblandinger, fx med indhold af mere end 65 % hvede	30.9.2001 ([k])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Kalkuner	—	Endo-1,4-beta-xylanase: 825 U Subtilisin: 265 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 825-2 500 U Subtilisin: 265-800 U 3. Til brug i foderblandinger, fx med indhold af mere end 45 % hvede	30.9.2001 ([k])
38	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) og subtilisin produceret af *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), med en aktivitet på mindst: Endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U ([37])/g Subtilisin: 500 U ([40])/g	Smågrise	4 måneder	Endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U Subtilisin: 500 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 5 000 U subtilisin: 500 U 3. Anvendes i foderblandinger, fx med indhold af hvede på over 40 %	30.9.2001 ([k])
39	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) og endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U ([37])/g	Fedesvin	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U	— —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U endo-1,4-beta-xylanase: 400 U 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner og arabinoxylaner), dvs. med indhold af mere end 65 % byg	30.9.2001 ([k])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
40	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) og subtilisin produceret af *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 300 U ([37])/g Subtilisin: 800 U ([40])/g	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 30 U Endo-1,4-beta-xylanase: 90 U Subtilisin: 240 U	— — 	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 30-100 U endo-1,4-beta-xylanase: 90-300 U subtilisin: 240-800 U 3. Til brug i foderblandinger, fx med indhold af mere end 60 % byg	30.9.2001 ([k])
41	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) og subtilisin produceret af *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U ([37])/g Subtilisin: 800 U ([40])/g	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 25 U Endo-1,4-beta-xylanase: 625 U Subtilisin: 200 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 25-100 U endo-1,4-beta-xylanase: 625-2 500 U subtilisin: 200-800 U 3. Til brug i foderblandinger, fx med indhold af mere end 30 % hvede og 10 % byg	30.9.2001 ([k])
			Æglæggende høner	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U Endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U Subtilisin: 800 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U endo-1,4-beta-xylanase: 2 500 U subtilisin: 800 U 3. Til brug i foderblandinger, fx med indhold af mere end 50 % hvede og 25 % byg	30.9.2001 ([k])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
42	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) med en aktivitet på mindst: Fast form: endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U ([37])/g Det tilladte præparats karakteristika: Endo-1,4-beta-xylanase: 1,99 % Hvede: 97,7 % Calciumpropionat: 0,3 % Lecithin: 0,01 %	Smågrise	4 måneder	Endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U 3. Til brug i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 60 %	30.9.2001 ([k])
			Fedesvin	—	Endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 60 %	30.9.2001 ([m])
43	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Alfa-amylase EC 3.2.1.1	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) og alfa-amylase produceret af *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), med en aktivitet på mindst: Endo-1,4-beta-xylanase: 3 975 U ([37])/g Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 125 U ([19])/g Alfa-amylase: 1 000 U ([41])/g	Smågrise	4 måneder	Endo-1,4-beta-xylanase: 3 975 U Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 125 U Alfa-amylase: 1 000 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,4-beta-xylanase: 3 975 U endo-1,3(4)-beta-glucanase: 125 U alfa-amylase: 1 000 U 3. Anvendes i foderblandinger med korn med højt indhold af stivelse og andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 30 % og byg på over 20 % og rug på over 20 %	30.9.2001 ([l])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
44	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Alfa-amylase EC 3.2.1.1	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) og alfa-amylase produceret af *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U ([37])/g Alfa-amylase: 1 000 U ([41])/g	Smågrise	4 måneder	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U Alfa-amylase: 1 000 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U endo-1,4-beta-xylanase: 400 U alfa-amylase: 1 000 U 3. Anvendes i foderblandinger, der indeholder korn med højt indhold af stivelse og andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 50 %	30.9.2001 ([1])
45	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Alfa-amylase EC 3.2.1.1	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) og alfa-amylase produceret af *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U ([37])/g Alfa-amylase: 1 000 U ([41])/g	Smågrise	4 måneder	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U Alfa-amylase: 1 000 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 250 U endo-1,4-beta-xylanase: 400 U alfa-amylase: 1 000 U 3. Anvendes i foderblandinger, der indeholder korn med højt indhold af stivelse og andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 35 %	30.9.2001 ([1])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
46	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Polygalacturonase EC 3.2.1.15	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135) og polygalacturonase produceret af *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U ([37])/g Polygalacturonase: 50 U ([41])/g	Fedesvin	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U Endo-1,4-beta-xylanase: 400 U Polygalacturonase: 50 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 400 U endo-1,4-beta-xylanase: 400 U polygalacturonase: 50 U 3. Anvendes i foderblandinger, der indeholder korn med højt indhold af stivelse og andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 40 %	30.9.2001 ([l])
47	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Alfa-amylase EC 3.2.1.1 Polygalacturonase EC 3.2.1.15	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), alfa-amylase produceret af *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) og polygalacturonase produceret af *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 140 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U ([37])/g Alfa-amylase: 1 000 U ([41])/g Polygalacturonase: 25 U ([42])/g	Smågrise	4 måneder	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 150 U Endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U Alfa-amylase: 1 000 U Polygalacturonase: 25 U	— — — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 150 U endo-1,4-beta-xylanase: 4 000 U alfa-amylase: 1 000 U polygalacturonase: 25 U 3. Til brug i foderblandinger med korn med højt indhold af stivelse og andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 20 % og af hvede på over 35 %	30.9.2001 ([l])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
48	Alfa-amylase EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6	Præparat af alfa-amylase og endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), med en aktivitet på mindst: Coated: alfa-amylase: 200 KNU ([43])/g endo-1,3(4)-beta-glucanase: 350 FBG ([44])/g Flydende: alfa-amylase: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-glucanase: 225 FBG/ml	Slagtekyllinger	—	10 KNU 17 FBG	40 KNU 70 FBG	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 20 KNU 35 FBG 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 40 %	30.9.2001 ([m])
			Slagtekalkuner	—	40 KNU 70 FBG	80 KNU 140 FBG	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 40 KNU 70 FBG 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af byg på over 40 %	30.9.2001 ([m])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
49	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Alfa-amylase: EC 3.2.1.1 Bacillolysin EC 3.4.24.28 Polygalacturonase EC 3.2.1.15	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (IMI SD 135), alfa-amylase produceret af *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacillolysin produceret af *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) og polygalacturonase produceret af *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), med en aktivitet på mindst: Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 150 U ([19])/g Endo-1,4-beta-xylanase: 1 500 U ([37])/g Alfa-amylase: 500 U ([41])/g Subtilisin: 800 U ([40])/g Polygalacturonase: 50 U ([42])/g	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 150 U Endo-1,4-beta-xylanase: 1 500 U Alfa-amylase: 500 U Bacillolysin: 800 U Polygalacturonase: 50 U	— — — — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 150 U endo-1,4-beta-xylanase: 1 500 U alfa-amylase: 500 U bacillolysin: 800 U polygalacturonase: 50 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 30 %	30.9.2001 ([n])
			Æglæggende høner	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 150 U Endo-1,4-beta-xylanase: 1 500 U Alfa-amylase: 500 U Bacillolysin: 800 U Polygalacturonase: 50 U	— — — — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 150 U endo-1,4-beta-xylanase: 1 500 U alfa-amylase: 500 U bacillolysin: 800 U polygalacturonase: 50 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 30 %.	30.9.2001 ([n])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
50	6-fytase EC 3.1.3.26	Præparat af 6-fytase produceret af *Aspergillus oryzae* (ATCC 11857), med en aktivitet på mindst: Coated: 2 500 FYT ([3])/g Flydende: 5 000 FYT/g	Slagtekyllinger	—	250 FYT	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 FYT 3. Til brug i foderblandinger med indhold af fytinbundet fosfat på over 0,25 %	30.9.2001 ([n])
			Æglæggende høner	—	250 FYT	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 FYT 3. Til brug i foderblandinger med indhold i fytinbundet fosfat på over 0,25 %	30.9.2001 ([n])
			Slagtekalkuner	—	250 FYT	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 FYT 3. Til brug i foderblandinger med indhold af fytinbundet fosfat på over 0,25 %	30.9.2001 ([n])
			Smågrise	2 måneder	500 FYT	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 FYT 3. Til brug i foderblandinger med indhold i fytinbundet fosfat på over 0,25 %	30.9.2001 ([n])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Fedesvin	—	500 FYT	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 500-1 000 FYT 3. Til brug i foderblandinger med indhold af fytinbundet fosfat på over 0,25 %	30.9.2001 (n)
51	Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8	Præparat af endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136), med en aktivitet på mindst: 100 IU (45)/g	Slagtekyllinger	—	10 IU	—	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: 10 IU 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner), fx med indhold af hvede på over 40 %	30.9.2001 (n)
52	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glucanase EC 3.2.1.4 Alfa-amylase: EC 3.2.1.1	Præparat af endo-1,3(4)-beta-glucanase produceret af *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-xylanase produceret af *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) og alfa-amylase produceret af *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), med en aktivitet på mindst: Flydende: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 10 000 U (46)/ml endo-1,4-beta-glucanase: 120 000 U (47)/ml alfa-amylase: 400 U (48)/ml	Slagtekyllinger	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 000 U Endo-1,4-beta-glucanase: 12 000 U Alfa-amylase: 40 U	— — —	1. I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet 2. Anbefalet dosis pr. kg fuldfoder: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 1 000-2 000 U endo-1,4-beta-glucanase: 12 000-24 000 U alfa-amylase: 40-80 U 3. Anvendes i foderblandinger med højt indhold af andre polysaccharider end stivelse (især arabinoxylaner og beta-glucaner), fx med indhold af hvede på over 20 % og sorghum på over 15 % og majs på over 5 %	30.9.2001 (n)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
Mikroorganismer								
1	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012	Præparat af *Bacillus cereus* var. *toyoe*, der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof	Slagtekyllinger	—	$0{,}2 \times 10^9$	1×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: monensinnatrium, lasalocidnatrium, salinomycinnatrium, amproliumethopabat, meticlorpindol/methylbenzoquat, decoquinat, robenidin, narasin og halofuginon	20.2.2001 [i]
			Æglæggende høner	—	$0{,}2 \times 10^9$	1×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	20.2.2001 [i]
			Kalve	6 måneder	$0{,}5 \times 10^9$	1×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	20.2.2001 [i]
			Slagtekvæg	—	$0{,}2 \times 10^9$	$0{,}2 \times 10^9$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Mængden af *Bacillus cereus* var. *toyoi* i dagsrationen må ikke overstige $1{,}0 \times 10^9$ CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes $0{,}2 \times 10^9$ CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt	20.2.2001 [i]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
			Avlsdåer	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder det tilladte coccidiostatikum: robenidin	20.2.2001 [i]
			Slagtekaniner	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: meticlorpindol, robenidin, salinomycinnatrium	20.2.2001 [i]
3	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	Præparat af *Saccharomyces cerevisiae*, der indeholder mindst 5×10^9 CFU/g tilsætningsstof	Slagtekvæg	—	4×10^9	8×10^9	I brugsvejledningen angives: »Mængden af *Saccharomyces cerevisiae* i dagsrationen må ikke overstige $2,5 \times 10^{10}$ CFU for 100 kg kropsvægt og $0,5 \times 10^{10}$ CFU for hver yderligere 100 kg kropsvægt«	20.2.2001 [b]
			Slagtekaniner	—	$2,5 \times 10^9$	5×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan bruges i foderblandinger, der indeholder det tilladte coccidiostatikum: meticlorpindol	30.9.2001 [g]
			Søer	—	5×10^9	$2,5 \times 10^{10}$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [g]
			Smågrise	4 måneder	5×10^9	1×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [g]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
4	*Bacillus cereus* ATCC 14893	Præparat af *Bacillus cereus*, der indeholder mindst 10^{10} CFU/g tilsætningsstof	Slagtekaniner	—	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	—	20.2.2001 [b]
			Avlskaniner	—	$0,5 \times 10^9$	2×10^9	—	20.2.2001 [b]
			Smågrise	4 måneder	5×10^8	1×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	20.2.2001 [g]
			Fedesvin	—	2×10^8	1×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	20.2.2001 [g]
			Søer	15 dage før faringen og under laktationen	$8,5 \times 10^8$	$1,2 \times 10^9$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	20.2.2001 [g]
			Kalve	16 uger	1×10^9	$1,2 \times 10^9$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	20.2.2001 [g]
			Slagtekyllinger	—	2×10^8	1×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan bruges i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: amprolium, halofuginon, lasalocidnatrium, maduramicinammonium, monensinnatrium, narasin, salinomycinnatrium, meticlorpindol, diclazuril	20.2.2001 [g]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
			Slagtekalkuner	26 uger	2×10^8	1×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan bruges i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: amprolium, halofuginon, meticlorpindol/methylbenzoquat, diclazuril, nifursol	20.2.2001 (g)
5	*Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94	Præparat af *Saccharomyces cerevisiae*, der indeholder mindst: 1×10^8 CFU/g tilsætningsstof	Kalve	6 måneder	2×10^8	2×10^9	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 (g)
			Slagtekvæg	—	$1{,}7 \times 10^8$	$1{,}7 \times 10^8$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Mængden af *Saccharomyces cerevisiae* i dagsrationen må ikke overstige $7{,}5 \times 10^8$ CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes 1×10^8 CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt	30.9.2001 (h)
6	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	Præparat af *Saccharomyces cerevisiae*, der indeholder mindst: 2×10^{10} CFU/g tilsætningsstof	Søer	—	2×10^9	1×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 (g)
			Smågrise	4 måneder	6×10^9	3×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 (g)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
7	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077	Præparat af *Saccharomyces cerevisiae*, der indeholder mindst: 2×10^{10} CFU/g tilsætningsstof	Malkekøer	—	$5,5 \times 10^{8}$	$2,1 \times 10^{9}$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Mængden af *Saccharomyces cerevisiae* i dagsrationen må ikke overstige $8,4 \times 10^{9}$ CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes $1,8 \times 10^{9}$ CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt	30.9.2001 (g)
			Slagtekvæg	—	1×10^{9}	$1,5 \times 10^{9}$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Mængden af *Saccharomyces cerevisiae* i dagsrationen må ikke overstige $4,6 \times 10^{9}$ CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes 2×10^{9} for hver ekstra 100 kg kropsvægt	30.9.2001 (g)
8	*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 [i forholdet 1/1]	Blanding af: indkapslet *Enterococcus faecium* ATCC 53519 og indkapslet *Enterococcus faecium* ATCC 55593, der indeholder mindst 2×10^{8} CFU/g af tilsætningsstoffet (dvs. mindst 1×10^{8} CFU/g af hver bakterie)	Slagtekyllinger	—	1×10^{8}	1×10^{8}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan bruges i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: amprolium, decoquinat, halofuginon, lasalocidnatrium, maduramicinammonium, monensinnatrium, narasin, nicarbazin, narasin/nicarbazin, salinomycinnatrium	30.9.2001 (g)

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
9	*Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M	Præparat af *Pediococcus acidilactici*, der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof	Slagtekyllinger	—	1×10^{9}	1×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: amprolium, meticlorpindol, decoquinat, halofuginon, narasin, salinomycinnatrium, nicarbazin, maduramicinammonium, diclazuril	30.9.2001 [h]
			Smågrise	4 måneder	1×10^{9}	1×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [h]
			Fedesvin	—	1×10^{9}	1×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [h]
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Præparat af *Enterococcus faecium*, der indeholder mindst: Mikroindkapslet: $1{,}0 \times 10^{10}$ CFU/g tilsætningsstof $1{,}75 \times 10^{10}$ CFU/g tilsætningsstof	Slagtekyllinger	—	$0{,}3 \times 10^{9}$	$2{,}8 \times 10^{9}$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan bruges i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: amprolium, amprolium/ethopabat, diclazuril, halofuginon, maduramicinammonium, meticlorpindol, meticlorpindol/methylbenzoquat, monensinnatrium, robenidin, salinomycinnatrium	30.9.2001 [h]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
			Fedesvin	—	$0,35 \times 10^9$	$1,5 \times 10^9$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [h]
			Søer	—	$0,2 \times 10^9$	$1,25 \times 10^9$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [h]
			Slagtekvæg	—	$0,25 \times 10^9$	$0,6 \times 10^9$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Mængden af *Enterococcus faecium* i dagsrationen må ikke overstige 1×10^9 CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes 1×10^9 CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt	30.9.2001 [h]
		Præparat af *Enterococcus faecium*, der indeholder mindst: Mikroindkapslet: $1,0 \times 10^{10}$ CFU/g tilsætningsstof $1,75 \times 10^{10}$ CFU/g tilsætningsstof samt Granuleret form: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g tilsætningsstof	Smågrise	4 måneder	$0,3 \times 10^9$	$1,4 \times 10^9$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Må som granulat kun bruges i mælkeerstatninger	30.9.2001 [h]
			Kalve	6 måneder	$0,35 \times 10^9$	$6,6 \times 10^9$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Må som granulat kan bruges i mælkeerstatninger	30.9.2001 [h]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
11	*Enterococcus faecium* DSM 5464	Præparat af *Enterococcus faecium*, der indeholder mindst: 5×10^{10} CFU/g tilsætningsstof	Smågrise	4 måneder	$0{,}5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [h]
			Slagtekyllinger	—	$0{,}5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder følgende godkendte coccidiostatika: amprolium, diclazuril, halofuginon, monensinnatrium, meticlorpindol, methylbenzoquat, nicarbazin	30.9.2001 [m]
			Kalve	4 måneder	$0{,}5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [m]
12	*Lactobacillus farciminis* CNCM MA 67/4R	Præparat af *Lactobacillus farciminis*, der indeholder mindst: 1×10^{9} CFU/g tilsætningsstof	Smågrise	4 måneder	1×10^{9}	1×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [i]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
13	*Enterococcus faecium* DSM 10663/ NCIMB 10415	Præparat af *Enterococcus faecium*, der indeholder mindst: Pulver og granulat: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g tilsætningsstof Coated: $2,0 \times 10^{10}$ CFU/g tilsætningsstof Flydende: 1×10^{10} CFU/ml tilsætningsstof	Smågrise	4 måneder	1×10^{9}	1×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [i]
			Kalve	6 måneder	1×10^{9}	1×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [k]
			Slagtekyllinger	—	1×10^{9}	1×10^{10}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: amprolium, amprolium/ethopabat, decoquinat, diclazuril, halofuginon, lasalocidnatrium, maduramicinammonium, meticlorpindol/ methylbenzoquat, monensinnatrium, narasin, nicarbazin, robenidin, salinomycinnatrium	30.9.2001 [k]
14	*Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885	Præparat af *Saccharomyces cerevisiae*, der indeholder mindst: Pulver og kugleformet og ovalt granulat: 1×10^{9} CFU/g tilsætningsstof	Smågrise	4 måneder	3×10^{9}	3×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [i]
			Slagtekvæg	—	9×10^{9}	9×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet Mængden af *Saccharomyces cerevisiae* i dagsrationen må ikke overstige $1,6 \times 10^{10}$ CFU for 100 kg kropsvægt. Der tilsættes $3,2 \times 10^{9}$ CFU for hver ekstra 100 kg kropsvægt	30.9.2001 [i]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimumsalder	Minimumsindhold	Maksimumsindhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
15	*Enterococcus faecium* NCIMB 11181	Præparat af *Enterococcus faecium*, der indeholder mindst: Pulver: 4×10^{11} CFU/g tilsætningsstof Coated: 5×10^{10} CFU/g tilsætningsstof	Kalve	6 måneder	5×10^{8}	2×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [l]
			Smågrise	4 måneder	5×10^{8}	2×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [l]
16	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Blanding af: *Enterococcus faecium*, der indholder mindst: 7×10^{9} CFU/g og *Lactobacillus rhamnosus*, der indeholder mindst: 3×10^{9} CFU/g	Kalve	6 måneder	1×10^{9}	6×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [l]
			Smågrise	4 måneder	1×10^{9}	5×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [l]
17	*Lactobacillus casei* NCIMB 30096 *Enterococcus faecium* NCIMB 30098	Blanding af *Lactobacillus casei* og *Enterococcus faecium*, der indeholder mindst: *Lactobacillus casei* 2×10^{9} CFU/g samt *Enterococcus faecium* 6×10^{9} CFU/g	Kalve	6 måneder	*Lactobacillus casei* $0{,}5 \times 10^{9}$ *Enterococcus faecium* $1{,}5 \times 10^{9}$	*Lactobacillus casei* 1×10^{9} *Enterococcus faecium* 3×10^{9}	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [m]
18	*Enterococcus faecium* CECT 4515	Præparat af *Bacillus cereus*, der indeholder mindst 1×10^{10} CFU/g tilsætningsstof	Smågrise	4 måneder	1×10^{9}	1×10^{9}	I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [m]
			Kalve	6 måneder	1×10^{9}	1×10^{9}	I retningslinjerne for brug af tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 [m]

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					CFU/kg fuldfoder			
19	*Streptococcus infantarius* CNCM I-841 *Lactobacillus plantarum* CNCM I-840	Blanding af: *Streptococcus infantarius* og *Lactobacillus plantarum*, der indeholder mindst: *Streptococcus infantarius* $0,5 \times 10^9$ CFU/g tilsætningsstof samt *Lactobacillus plantarum* 2×10^9 CFU/g	Kalve	6 måneder	*Streptococcus infantarius* 1×10^9 *Lactobacillus plantarum* $0,5 \times 10^9$	*Streptococcus infantarius* 1×10^9 *Lactobacillus plantarum* $0,5 \times 10^9$	I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet	30.9.2001 ([n])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
Radionukleidbindere								
1. Bindere af radioaktivt cæsium (^{137}Cs og ^{134}Cs)								
1.1	Jern(III)ammoniumhexacyanoferrat(II)	$NH_4Fe(III)[Fe(II)(CN)_6)]$	Drøvtyggere (tamme og vildtlevende)	—	50	500	I brugsvejledningen angives: »Mængden af jern(III)ammoniumhexacyanoferrat(II) i dagsrationen skal ligge på mellem 10 mg og 150 mg for 10 kg kropsvægt«	13.10.2001 ([c])
			Kalve inden drøvtygningens begyndelse	—	50	500	I brugsvejledningen angives: »Mængden af jern(III)ammoniumhexacyanoferrat(II) i dagsrationen skal ligge på mellem 10 mg og 150 mg for 10 kg kropsvægt«	13.10.2001 ([c])

Nr. (eller EF-nr.)	Tilsætningsstof	Kemisk betegnelse, beskrivelse	Dyreart eller -kategori	Maksimums-alder	Minimums-indhold	Maksimums-indhold	Bestemmelser i øvrigt	Tilladelsens varighed
					mg/kg fuldfoder			
			Lam inden drøvtygningens begyndelse	—	50	500	I brugsvejledningen angives: »Mængden af jern(III)ammoniumhexacyanoferrat(II) i dagsrationen skal ligge på mellem 10 mg og 150 mg for 10 kg kropsvægt«	13.10.2001 (c)
			Gedekid inden drøvtygningens begyndelse	—	50	500	I brugsvejledningen angives: »Mængden af jern(III)ammoniumhexacyanoferrat(II) i dagsrationen skal ligge på mellem 10 mg og 150 mg for 10 kg kropsvægt«	13.10.2001 (c)
			Svin (tamme og vildtlevende)	—	50	500	I brugsvejledningen angives: »Mængden af jern(III)ammoniumhexacyanoferrat(II) i dagsrationen skal ligge på mellem 10 mg og 150 mg for 10 kg kropsvægt«	13.10.2001 (c)

(a) Første tilladelse: Kommissionens direktiv 97/72/EF (EFT L 351 af 23.12.1997, s. 55).
(b) Første tilladelse: Kommissionens direktiv 96/7/EF (EFT L 51 af 1.3.1996, s. 45).
(c) Første tilladelse: Kommissionens direktiv 96/66/EF (EFT L 272 af 25.10.1996, s. 32).
(d) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 2316/98 (EFT L 289 af 28.10.1998, s. 4).
(e) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 639/1999 (EFT L 82 af 26.3.1999, s. 6).
(f) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 1245/1999 (EFT L 150 af 17.6.1999, s. 15).
(g) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 (EFT L 191 af 7.7.1998, s. 15).
(g*) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 (EFT L 191 af 7.7.1998, s. 15) med ændring af form/koncentration i Kommissionens forordning (EF) nr. 654/2000 (EFT L 79 af 30.3.2000, s. 26).
(g**) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 1436/98 (EFT L 191 af 7.7.1998, s. 15) med ændring af vilkårene for brug i Kommissionens forordning (EF) nr. 1353/2000 (EFT L 155 af 28.6.2000, s. 15).
(h) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 866/1999 (EFT L 108 af 27.4.1999, s. 21).
(h*) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 866/1999 (EFT L 108 af 27.4.1999, s. 21) med ændring af koncentration i Kommissionens forordning (EF) nr. 654/2000 (EFT L 79 af 30.3.2000, s. 26).
(i) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 1411/1999 (EFT L 164 af 30.6.1999, s. 56).
(j) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 2374/98 (EFT L 295 af 4.11.1998, s. 3).
(k) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 1636/1999 (EFT L 194 af 27.7.1999, s. 17).
(l) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 2690/1999 (EFT L 326 af 18.12.1999, s. 33).
(m) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 654/2000 (EFT L 79 af 30.3.2000, s. 26).
(n) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 1353/2000 (EFT L 155 af 28.6.2000, s. 15).
(o) Første tilladelse: Kommissionens forordning (EF) nr. 1887/2000 (EFT L 227 af 7.9.2000, s. 13).
(1) Hvis et eventuelt krav om fastsættelse af et maksimalt dioxinindhold baseret på tilstrækkelige data ikke er opfyldt, gælder indholdet på 500 pg WHO-PCDD/F-TEQ/kg som maksimum fra den 15. oktober 2000.
(2) 1 FTU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra natriumfytat ved pH 5,5 og 37 °C .
(3) 1 FYT er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat pr. minut fra natriumfytat ved pH 5,5 og 37 °C.
(4) 1 GALU er den mængde enzym, der hydrolyserer 1 mikromol p-nitrophenyl-alfa-galactopyranosid pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(5) 1 FBG er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
(6) 1 FXU er den mængde enzym, der frigiver 7,8 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra azo-hvede-arabinoxylan pr. minut ved pH 6,0 og 50 °C.
(7) 1 FXU er den mængde enzym, der frigiver 3,1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra azo-hvede-arabinoxylan pr. minut ved pH 6,0 og 50 °C.
(8) 1 FBG er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 6,0 og 50 °C.
(9) 1 FXU er den mængde enzym, der frigiver 0,15 mikromol xylose fra azurin-tværbundet xylan pr. minut ved pH 5,0 og 40 °C.

([10]) 1 BGU er den mængde enzym, der frigiver 0,15 mikromol glucose fra azurin-tværbundet beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 40 °C.
([11]) 1 EXU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra arabinoxylan pr. minut ved pH 3,5 og 55 °C.
([12]) 1 RAU er den mængde enzym, der omdanner 1 mg opløselig stivelse til et produkt, der har samme absorption som en referencefarveprøve ved 620 nm efter reaktion med jod, pr. minut ved pH 6,6 og 30 °C.
([13]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,1 mikromol glucose fra carboxymethylcellulose pr. minut ved pH 5,0 og 40 °C.
([14]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,1 mikromol glucose fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 40 °C.
([15]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,1 mikromol glucose fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 5,0 og 40 °C.
([16]) 1 BGU er den mængde enzym, der frigiver 0,278 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 3,5 og 40 °C.
([17]) 1 EXU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra hvede-arabinoxylan pr. minut ved pH 3,5 og 55 °C.
([18]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol glucose fra birke-xylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
([19]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
([20]) 1 CU er den mængde enzym, der frigiver 0,128 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 4,5 og 30 °C.
([21]) 1 EPU er den mængde enzym, der frigiver 0,0083 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 4,7 og 30 °C.
([22]) 1 AGL er den mængde enzym, der frigiver 5,55 mikromol reducerende sukker (maltoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 4,6 og 30 °C.
([23]) 1 AXC er den mængde enzym, der frigiver 17,2 mikromol reducerende sukker (maltoseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 4,7 og 30 °C.
([24]) 1 BGN er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.
([25]) 1 IFP er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.
([26]) 1 QXU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 5,1 og 50 °C.
([27]) 1 QGU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.
([28]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra havre-beta-glucan pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
([29]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
([30]) 1 BU er den mængde enzym, der frigiver 0,06 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.
([31]) 1 BXU er den mængde enzym, der frigiver 0,06 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra birke-xylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
([32]) 1 PPU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol uorganisk fosfat fra natriumfytat pr. minut ved pH 5 og 37 °C.
([33]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 2,78 mikromol reducerende sukker (maltoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 50 °C.
([34]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 5,55 mikromol reducerende sukker (maltoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 50 °C.
([35]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 4,00 mikromol reducerende sukker (maltoseækvivalenter) fra birke-xylan pr. minut ved pH 5,5 og 50 °C.
([36]) 1 EU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 4,5 og40 °C.
([37]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 5,3 og 50 °C.
([38]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra havreavne-xylan pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
([39]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra hvedestivelse pr. minut ved pH 4,0 og 30 °C.
([40]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikrogram phenolforbindelser (tyrosinækvivalenter) fra et kaseinsubstrat pr. minut ved pH 7,5 og 40 °C.
([41]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol glucosidbindinger fra et vanduopløseligt, tværbundet stivelsespolymersubstrat pr. minut ved pH 6,5 og 37 °C.
([42]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende materiale (galacturonsyreækvivalenter) fra et poly-D-galacturonsyresubstrat pr. minut ved pH 5,0 og 40 °C.
([43]) 1 KNU er den mængde enzym, der frigiver 672 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra opløselig stivelse pr. minut ved pH 5,6 og 37 °C.
([44]) 1 FBG er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 5,0 og 30 °C.
([45]) 1 IU er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol reducerende sukker (xyloseækvivalenter) fra birke-xylan pr. minut ved pH 4,5 og 30 °C.
([46]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,0056 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra byg-beta-glucan pr. minut ved pH 7,5 og 30 °C.
([47]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 0,0056 mikromol reducerende sukker (glucoseækvivalenter) fra carboxymethylcellulose pr. minut ved pH 4,8 og 50 °C.
([48]) 1 U er den mængde enzym, der frigiver 1 mikromol glucose fra tværbundet stivelsespolymer pr. minut ved pH 7,5 og 37 °C.