**Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument**

# ►B REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2470

## tal-20 ta' Diċembru 2017

## li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid

**(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

(ĠU L 351, 30.12.2017, p. 72)

Emendat minn:

| | | Ġurnal Uffiċjali | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nru | Paġna | Data |
| ►M1 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/460 tal-20 ta' Marzu 2018 | L 78 | 2 | 21.3.2018 |
| ►M2 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/461 tal-20 ta' Marzu 2018 | L 78 | 7 | 21.3.2018 |
| ►M3 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/462 tal-20 ta' Marzu 2018 | L 78 | 11 | 21.3.2018 |
| ►M4 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/469 tal-21 ta' Marzu 2018 | L 79 | 11 | 22.3.2018 |
| ►M5 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/991 tat-12 ta' Lulju 2018 | L 177 | 9 | 13.7.2018 |
| ►M6 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1011 tas-17 ta' Lulju 2018 | L 181 | 4 | 18.7.2018 |
| ►M7 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1018 tat-18 ta' Lulju 2018 | L 183 | 9 | 19.7.2018 |
| ►M8 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1032 tal-20 ta' Lulju 2018 | L 185 | 9 | 23.7.2018 |
| ►M9 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1023 tat-23 ta' Lulju 2018 | L 187 | 1 | 24.7.2018 |
| ►M10 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1122 tal-10 ta' Awwissu 2018 | L 204 | 36 | 13.8.2018 |
| ►M11 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1123 tal-10 ta' Awwissu 2018 | L 204 | 41 | 13.8.2018 |
| ►M12 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1132 tat-13 ta' Awwissu 2018 | L 205 | 15 | 14.8.2018 |
| ►M13 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1133 tat-13 ta' Awwissu 2018 | L 205 | 18 | 14.8.2018 |
| ►M14 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1293 tas-26 ta' Settembru 2018 | L 243 | 2 | 27.9.2018 |
| ►M15 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1631 tat-30 ta' Ottubru 2018 | L 272 | 17 | 31.10.2018 |
| ►M16 | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1632 tat-30 ta' Ottubru 2018 | L 272 | 23 | 31.10.2018 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ►**M17** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1633 tat-30 ta' Ottubru 2018 | L 272 | 29 | 31.10.2018 |
| ►**M18** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1647 tal-31 ta' Ottubru 2018 | L 274 | 51 | 5.11.2018 |
| ►**M19** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1648 tad-29 ta' Ottubru 2018 | L 275 | 1 | 6.11.2018 |
| ►**M20** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1991 tat-13 ta' Diċembru 2018 | L 320 | 22 | 17.12.2018 |
| ►**M21** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2016 tat-18 ta' Diċembru 2018 | L 323 | 1 | 19.12.2018 |
| ►**M22** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/2017 tat-18 ta' Diċembru 2018 | L 323 | 4 | 19.12.2018 |
| ►**M23** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/108 tal-24 ta' Jannar 2019 | L 23 | 4 | 25.1.2019 |
| ►**M24** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/109 tal-24 ta' Jannar 2019 | L 23 | 7 | 25.1.2019 |
| ►**M25** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/110 tal-24 ta' Jannar 2019 | L 23 | 11 | 25.1.2019 |
| ►**M26** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/387 tal-11 ta' Marzu 2019 | L 70 | 17 | 12.3.2019 |
| ►**M27** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/388 tal-11 ta' Marzu 2019 | L 70 | 21 | 12.3.2019 |
| ►**M28** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/456 tal-20 ta' Marzu 2019 | L 79 | 13 | 21.3.2019 |
| ►**M29** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/506 tas-26 ta' Marzu 2019 | L 85 | 11 | 27.3.2019 |
| ►**M30** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/760 tat-13 ta' Mejju 2019 | L 125 | 13 | 14.5.2019 |
| ►**M31** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1272 tad-29 ta' Lulju 2019 | L 201 | 3 | 30.7.2019 |
| ►**M32** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1294 tal-1 ta' Awwissu 2019 | L 204 | 16 | 2.8.2019 |
| ►**M33** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1314 tat-2 ta' Awwissu 2019 | L 205 | 4 | 5.8.2019 |
| ►**M34** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1686 tat-8 ta' Ottubru 2019 | L 258 | 13 | 9.10.2019 |
| ►**M35** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1976 tal-25 ta' Novembru 2019 | L 308 | 40 | 29.11.2019 |
| ►**M36** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1979 tas-26 ta' Novembru 2019 | L 308 | 62 | 29.11.2019 |
| ►**M37** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/2165 tas-17 ta' Diċembru 2019 | L 328 | 81 | 18.12.2019 |
| ►**M38** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/16 tal-10 ta' Jannar 2020 | L 7 | 6 | 13.1.2020 |
| ►**M39** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/24 tat-13 ta' Jannar 2020 | L 8 | 12 | 14.1.2020 |
| ►**M40** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/206 tal-14 ta' Frar 2020 | L 43 | 66 | 17.2.2020 |
| ►**M41** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/443 tal-25 ta' Marzu 2020 | L 92 | 7 | 26.3.2020 |
| ►**M42** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/478 tal-1 ta' April 2020 | L 102 | 1 | 2.4.2020 |
| ►**M43** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/484 tat-2 ta' April 2020 | L 103 | 3 | 3.4.2020 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ►**M44** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/500 tas-6 ta' April 2020 | L 109 | 2 | 7.4.2020 |
| ►**M45** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/916 tal-1 ta' Lulju 2020 | L 209 | 6 | 2.7.2020 |
| ►**M46** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/917 tal-1 ta' Lulju 2020 | L 209 | 10 | 2.7.2020 |
| ►**M47** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/973 tas-6 ta' Lulju 2020 | L 215 | 7 | 7.7.2020 |
| ►**M48** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1163 tas-6 ta' Awwissu 2020 | L 258 | 1 | 7.8.2020 |
| ►**M49** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1559 tas-26 ta' Ottubru 2020 | L 357 | 7 | 27.10.2020 |
| ►**M50** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1634 tal-4 ta' Novembru 2020 | L 367 | 39 | 5.11.2020 |
| ►**M51** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1820 tat-2 ta' Diċembru 2020 | L 406 | 29 | 3.12.2020 |
| ►**M52** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1821 tat-2 ta' Diċembru 2020 | L 406 | 34 | 3.12.2020 |
| ►**M53** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1822 tat-2 ta' Diċembru 2020 | L 406 | 39 | 3.12.2020 |
| ►**M54** | Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1993 tal-4 ta' Diċembru 2020 | L 410 | 62 | 7.12.2020 |
| ►**M55** | Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/50 tat-22 ta' Jannar 2021 | L 23 | 7 | 25.1.2021 |
| ►**M56** | Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/51 tat-22 ta' Jannar 2021 | L 23 | 10 | 25.1.2021 |
| ►**M57** | Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/82 tas-27 ta' Jannar 2021 | L 29 | 16 | 28.1.2021 |
| ►**M58** | Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/96 tat-28 ta' Jannar 2021 | L 31 | 201 | 29.1.2021 |
| ►**M59** | Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/120 tat-2 ta' Frar 2021 | L 37 | 1 | 3.2.2021 |
| ►**M60** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/668 tat-23 ta' April 2021 | L 141 | 3 | 26.4.2021 |
| ►**M61** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/670 tat-23 ta' April 2021 | L 141 | 14 | 26.4.2021 |
| ►**M62** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/882 tal-1 ta' Ġunju 2021 | L 194 | 16 | 2.6.2021 |
| ►**M63** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/900 tat-3 ta' Ġunju 2021 | L 197 | 71 | 4.6.2021 |
| ►**M64** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/912 tal-4 ta' Ġunju 2021 | L 199 | 10 | 7.6.2021 |
| ►**M65** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/912 tal-4 ta' Ġunju 2021 | L 199 | 10 | 7.6.2021 |
| ►**M66** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1318 tad-9 ta' Awwissu 2021 | L 286 | 5 | 10.8.2021 |
| ►**M67** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1319 tad-9 ta' Awwissu 2021 | L 286 | 12 | 10.8.2021 |
| ►**M68** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1326 tal-10 ta' Awwissu 2021 | L 288 | 24 | 11.8.2021 |
| ►**M69** | Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1377 tad-19 ta' Awwissu 2021 | L 297 | 20 | 20.8.2021 |

▼B

# REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2017/2470

**tal-20 ta' Diċembru 2017**

**li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid skont ir-Regolament (UE) 2015/2283 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ikel ġdid**

**(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)**

*Artikolu 1*

**Il-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid awtorizzat**

Il-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid awtorizzat biex jiġi introdott fis-suq fl-Unjoni kif imsemmi fl-Artikolu 6(1) tar-Regolament (UE) 2015/2283 hija b'dan stabbilita u mniżżla fl-Anness ta' dan ir-Regolament.

*Artikolu 2*

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼M9

*ANNESS*

## LISTA TAL-UNJONI TAL-IKEL ĠDID

**Kontenut tal-lista**

1. Il-lista tal-Unjoni għandha tikkonsisti fit-Tabelli 1 u 2.

2. It-Tabella 1 fiha l-ikel ġdid awtorizzat u l-informazzjoni li ġejja:

   Kolonna 1: Ikel ġdid awtorizzat

   Kolonna 2: Il-kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid. Din il-kolonna hija wkoll maqsuma f'żewġ taqsimiet: Kategorija tal-ikel speċifikat u Livelli Massimi

   Kolonna 3: Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn

   Kolonna 4: Rekwiżiti oħrajn

3. It-Tabella 2 tinkludi l-ispeċifikazzjonijiet dwar l-ikel ġdid u l-informazzjoni li ġejja:

   Kolonna 1: Ikel ġdid awtorizzat

   Kolonna 2: Speċifikazzjonijiet

▼M9

**Tabella 1: Ikel ġdid awtorizzat**

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Aċidu *N*-Aċetil-D-newramminiku** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun "Aċidu *N*-aċetil-D-newramminiku"<br>Is-supplimenti tal-ikel li fihom l-aċidu *N*-aċetil-D-newramminiku għandhom iġorru dikjarazzjoni li dan is-suppliment tal-ikel ma għandux jingħata lit-trabi, lit-tfal żgħar u lit-tfal ta' taħt l-10 snin meta dawn ikunu qed jieħdu l-ħalib tal-omm jew ikel ieħor li fih l-aċidu *N*-aċetil-D-newramminiku miżjud fl-istess perjodu ta' 24 siegħa. | | |
| | Formuli tat-trabi u formuli tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 (1) | 0,05 g/L ta' formula rikostitwita | | | |
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,05 g/kg għall-ikel solidu | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont il-bżonnijiet nutrittivi tat-trabi u tat-tfal żgħar li għalihom huma maħsubin il-prodotti, iżda fi kwalunkwe każ mhux iżjed mil-livelli massimi speċifikati għall-kategorija msemmija fit-tabella li tikkorrispondi mal-prodotti. | | | |
| | Sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,2 g/L (xarbiet)<br>1,7 g/kg (bars) | | | |
| | Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 (2) | 1,25 g/kg | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib ippasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT) bla togħmiet miżjuda | 0,05 g/L | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat mingħajr togħma miżjuda, ittrattat bis-sħana wara l-fermentazzjoni, prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat bit-togħma miżjuda, fosthom prodotti ttrattati bis-sħana | 0,05 g/L (xarbiet)<br>0,4 g/kg (solidi) | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inklużi s-sostituti tal-ħalib li jitħalltu max-xarbiet biex ibajduhom | 0,05 g/L (xarbiet)<br>0,25 g/kg (solidi) | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 0,5 g/kg | | | |
| | Sostituti taz-zokkor għal mat-te u l-kafè | 8,3 g/kg | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-frott u mill-ħaxix | 0,05 g/L | | | |
| | Xarbiet aromatizzati | 0,05 g/L | | | |
| | Kafè, te, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, ċikwejra, speċjalizzati; tè, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, u estratti taċ-ċikwejra; preparazzjonijiet tat-te, tal-pjanti u taċ-ċereali għall-infużjonijiet | 0,2 g/kg | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE ([3]) | 300 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali ta' fuq l-10 snin<br>55 mg/kuljum għat-trabi<br>130 mg kuljum għat-tfal żgħar<br>250 mg/kuljum għat-tfal ta' età bejn tlieta u 10 snin | | | |
| ***Adansonia digitata* (Baobab) polpa tal-frott imnixxef** | Mhux speċifikat | | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Polpa tal-frott tal-Baobab" | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli ta' *Ajuga reptans*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili tal-partijiet tal-pjanta maqtugħin mill-art li jwarrdu ta' *Ajuga reptans* | | | |
| **L-Alanil-L-Glutammina** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, minbarra l-ikel maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar | | | | |
| | Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi | | | | |
| **Żejt tal-alga miksub mill-mikroalgi *Ulkenia* sp.** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt tal-mikroalgi *Ulkenia sp.*" | | |
| | Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin) | 200 mg/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 500 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi xarbiet magħmulin mill-ħalib) | 60 mg/100 ml | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M25 | | | | | |
| **Żejt taż-żerriegħa tal- *Allanblackia*** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | L-isem tal-ikel il-ġdid fuq it-tikketti tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandu jkun "żejt taż-żerriegħa tal-*Allanblackia*" | | |
| | Dlik isfar tax-xaħam u dlik b'baži ta' krema | 30 g/100 g | | | |
| | It-taħlitiet ta' żjut veġetali (*) u ħalib (li jidħlu fil-kategorija tal-ikel: Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inklużi s-sostituti tal-ħalib li jitħalltu max-xarbiet biex ibajduhom) | 30 g/100 g | | | |
| | (*) Minbarra ż-żjut taż-żebbuġ u ż-żjut mir-residwi taż-żebbuġ kif iddefiniti fil-Parti VIII tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013. | | | | |
| ▼M9 | | | | | |
| **Estratt tal-werqa tal-*Aloe macroclada* Baker** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali fis-supplimenti tal-ikel tal-ġel simili li jsir *mill-Aloe vera* (L.) Burm. | | | |
| **Żejt tal-Krill tal-Antartiku miksub mill-*Euphasia superba*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku u ta' aċidu ejkosapentenojku flimkien* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt ta' lipidi mill-krustaċju Krill tal-Antartiku (*Euphausia superba*)" | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib ħlief xarbiet magħmulin mill-ħalib | 200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet | 200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Xorb mhux alkoħoliku<br>Xarbiet magħmulin mill-ħalib<br>Xarbiet analogi għal dawk magħmulin mill-ħalib | 80 mg/100 ml | | | |
| | Xaħam li jiddellek u taħwir tal-ikel | 600 mg/100 g | | | |
| | Xaħam għat-tisjir | 360 mg/100 ml | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 500 mg/100 g | | | |
| | Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin) | 200 mg/100 g | | | |
| | Bars nutrittivi/bars taċ-ċereali | 500 mg/100 g | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 3 000 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali<br>450 mg kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Sostituti tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 250 mg/ikla | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 200 mg/100 ml | | | |
| | Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi | | | | |
| | Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | | | | |
| **Żejt tal-Krill tal-Antartiku li fih ħafna fosfolipidi miksub mill-*Euphasia superba*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku u ta' aċidu ejkosapentenojku flimkien* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt ta' lipidi mill-krustaċju Krill tal-Antartiku (*Euphausia superba*)" | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib ħlief xarbiet magħmulin mill-ħalib | 200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet | 200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Xorb mhux alkoħoliku<br>Xarbiet magħmulin mill-ħalib<br>Xarbiet analogi għal dawk magħmulin mill-ħalib | 80 mg/100 ml | | | |
| | Xaħam li jiddellek u taħwir tal-ikel | 600 mg/100 g | | | |
| | Xaħam għat-tisjir | 360 mg/100 ml | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 500 mg/100 g | | | |
| | Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin) | 200 mg/100 g | | | |
| | Bars nutrittivi/bars taċ-ċereali | 500 mg/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 3 000 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali<br>450 mg kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Sostituti tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 250 mg/ikla | | | |
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 200 mg/100 ml | | | |
| | Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi | | | | |
| | Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | | | | |

▼M66

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt li fih ħafna aċidu arakidoniku miksub mill-fungus *Mortierella alpina*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt mill-*Mortierella alpini*" *jew "Żejt tal-Mortierella alpina*" | | |
| | Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali għat-trabi kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt tal-Argan mill-*Argania spinosa*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt tal-Argan" u jekk jintuża bħala taħwir tal-ikel fuq it-tikketta jrid ikun hemm miktub "Żejt veġetali għall-użu bħala taħwir tal-ikel biss" | | |
| | Bħala taħwir tal-ikel | Mhux speċifikat | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali taż-żjut veġetali bħala ikel | | | |

▼M69

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Oleorežina li fiha ħafna astaksantina mill-algi *Haematococcus pluvialis*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun "Oleorežina li fiha ħafna astaksantina mill-algi *Haematococcus pluvialis*"<br>It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom l-oleorežina li fiha ħafna astaksantina mill-algi *Haematococcus pluvialis* għandu jġorr dikjarazzjoni li dawn jenħtieġ li ma jiġux ikkonsmati mit-trabi, mit-tfal, u mill-adoloxxenti iżgħar minn 14-il sena. | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE, jeskludu t-trabi, it-tfal żgħar, it-tfal u l-adoloxxenti li għandhom inqas minn 14-il sena | 40-80 mg kuljum ta' oleorežina li tagħti ≤ 8 mg ta' astaksantina kuljum | | | |

▼M9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żerriegħa tal-ħabaq (*Ocimum basilicum*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew minn taħlita ta' frott u ħaxix | 3 g/200 ml għaż-żieda ta' żerriegħa tal-ħabaq sħiħa (*Ocimum basilicum*) | | | |

▼M32

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Betaina** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* ([7]) | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dak l-ikel għandha tkun "betaina".<br>It-tikkettar tal-ikel li jkun fih il-betaina għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li l-ikel jenħtieġ li ma jintużax jekk fl-istess jum ikunu ġew ikkunsmati supplimenti tal-ikel li fihom il-betaina. | | Awtorizzat fit-22 ta' Awwissu 2019. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika proprjetarja u *data* xjentifika protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: DuPont Nutrition Biosciences ApS, Langebrogade 1 Copenhagen K, DK-1411, id-Danimarka. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid, betaina, huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni biss |
| | Trab tax-xorb, xarbiet isotoniċi u energy drinks maħsuba għall-isportivi | 60 mg/100 g | | | |
| | Bċejjeċ tal-proteini u taċ-ċereali maħsuba għall-isportivi | 500 mg/100 g | | | |
| | Sostituti tal-ikliet maħsuba għall-isportivi | 20 mg/100 g | | | |
| | Sostitut tad-dieta totali għall-kontroll tal-piż kif definit skont ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 500 mg/100 g (biċċa)<br>136 mg/100 g (soppa)<br>188 mg/100 g (tagħsida)<br>60 mg/100 g (xarbiet) | | | |
| | Ikel għal Skopijiet Mediċi Speċjali kif definit skont ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 għall-adulti | 400 mg kuljum | | | |

▼M32

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mid-DuPont Nutrition Biosciences ApS, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr riferiment għall-evidenza xjentifika proprjetarja jew għad-*data* xjentifika protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bi ftehim mad-DuPont Nutrition Biosciences ApS,<br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: it-22 ta' Awwissu 2024. |

▼M9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt iffermentat tal-fażola sewda** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt iffermentat tal-fażola sewda (Sojja)" jew "Estratt iffermentat tas-Sojja" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 4,5 g kuljum | | | |
| **Lattoferrina bovina** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Lattoferrina mill-ħalib tal-baqar" | | |
| | Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 (lesta biex tinxtorob) | 100 mg/100 ml | | | |
| | Ikel fuq bażi tal-ħalib maħsub għal tfal żgħar (lest biex jiġi kkunsmat) | 200 mg/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ikel taċ-ċereali pproċessati (solidu) | 670 mg/100 g | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont il-bżonnijiet tal-individwu sa 3 g kuljum | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib | 200 mg/100 g | | | |
| | Taħlitiet ta' xorb f'forma ta' trab magħmulin mill-ħalib (lesti għax-xorb) | 330 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib iffermentat (inklużi xarbiet tal-jogurt) | 50 mg/100 g | | | |
| | Xorb mhux alkoħoliku | 120 mg/100 g | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-jogurt | 80 mg/100 g | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ġobon | 2 000 mg/100 g | | | |
| | Ġelat | 130 mg/100 g | | | |
| | Kejkijiet u ikel tal-għaġina | 1 000 mg/100 g | | | |
| | Ħelu | 750 mg/100 g | | | |
| | Ċuwingamm | 3 000 mg/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M34 | | | | | |
| **Iżolat tal-proteini bażiċi tax-xorrox tal-ħalib bovin** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dak l-ikel għandha tkun "Iżolat tal-proteini tax-xorrox tal-ħalib".<br>Is-supplimenti tal-ikel li jkun fihom l-iżolat tal-proteini bażiċi tax-xorrox tal-ħalib bovin għandu jkollhom id-dikjarazzjoni li ġejja:<br>"Dan is-suppliment tal-ikel ma għandux jiġi kkunsmat mit-trabi/mit-tfal/mill-adolexxenti ta' taħt l-età ta' sena/tliet snin/tmintax-il sena (*)"<br>(*) Skont il-grupp tal-età li jkun maħsub għalih is-suppliment tal-ikel. | | Awtorizzat fl-20 ta' Novembru 2018. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika proprjetarja u *data* xjentifika protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283. Applikant: Armor Protéines S.A.S., 19 bis, rue de la Libération 35460 Saint-Brice-en-Coglès, France. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid, iżolat tal-proteini bażiċi tax-xorrox tal-ħalib bovin, huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni biss mill-Armor Protéines S.A.S., sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr riferiment għall-evidenza xjentifika proprjetarja jew għad-*data* xjentifika protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bi ftehim mal-Armor Protéines S.A.S.. Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: l-20 ta' Novembru 2023. |
| | Formuli tat-trabi kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013<br>Formuli ta' prosegwiment kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013<br>Ikel bħala sostituti tad-dieta totali għall-kontroll tal-piż kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013<br>Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013<br>Supplimenti tal-Ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE | 30 mg/100 g (trab)<br>3,9 mg/100 ml (rikostitwit)<br>30 mg/100 g (trab)<br>4,2 mg/100 ml (rikostitwit)<br>300 mg kuljum<br>30 mg/100 g (formula tat-trab għat-trabi matul l-ewwel xhur ta' ħajjithom sa ma jibdew jingħataw ikel komplementari xieraq)<br>3,9 mg/100 g (formula rikostitwita għat-trabi matul l-ewwel xhur ta' ħajjithom sa ma jibdew jingħataw ikel komplementari xieraq)<br>30 mg/100 g (formula tat-trab għat-trabi meta jibdew jingħataw ikel komplementari xieraq)<br>4,2 mg/100 g (formula rikostitwita għat-trabi meta jibdew jingħataw ikel komplementari xieraq)<br>58 mg kuljum għat-tfal żgħar<br>380 mg kuljum għat-tfal u għall-adolexxenti mill-età ta' tliet snin sa 18-il sena<br>610 mg kuljum għall-adulti<br>25 mg kuljum għat-trabi<br>58 mg kuljum għat-tfal żgħar<br>250 mg kuljum għat-tfal u għall-adolexxenti mill-età ta' tliet snin sa 18-il sena<br>610 mg kuljum għall-adulti | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt taż-żerriegħa tal-*Buglossoides arvensis*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu stearidoniku (STA)* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt irfinut tal-*Buglossoides*" | | |
| | Prodotti tal-ħalib u analogi tagħhom | 250 mg/100 g | | | |
| | | 75 mg/100 g għax-xarbiet | | | |
| | Ġobon u prodotti tal-ġobon | 750 mg/100 g | | | |
| | Butir u emulsjonijiet oħra tax-xaħam u taż-żejt inkluż id-dlik (mhux għat-tisjir jew għall-qali) | 750 mg/100 g | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 625 mg/100 g | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefinit fid-Direttiva 2002/46/KE, minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar | 500 mg kuljum | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, minbarra l-ikel bi skopijiet mediċi speċjali maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Sostituti tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 250 mg/ikla | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt tal-*Calanus finmarchicus*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt mill-*Calanus finmarchicus* (krustaċju)" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 2,3 g kuljum | | | |

▼M66

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **L-Metilfolat tal-Kalċju** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi (espressi bħala aċidu foliku)* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun "L-Metilfolat tal-Kalċju" | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |
| | Formuli tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar | F'konformità mad-Direttiva 2002/46/KE | | | |
| | Ikel iffortifikat f'konformità mar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 | F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1925/2006 | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bażi taċ-ċuwingamm (glikol tal-monometossipolietilen)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Bażi tal-gomma (li fiha l-1,3-butadiena, 2-metil-omopolimeru, maleat, esteri bil-polietilenglikol monometiletere)" inkella "Bażi tal-gomma (bin-Nru tal-CAS: 1246080-53-4)" | | |
| | Ċuwingamm | 8 % | | | |
| **Bażi taċ-ċuwingamm (Kopolimeru tal-etere metilviniliku u tal-anidride malejka)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Bażi tal-gomma (li fiha l-kopolimeru tal-etere metilviniliku u tal-anidride malejku)" jew "Bażi tal-gomma (bin-Nru tal-CAS 9011-16-9)" | | |
| | Ċuwingamm | 2 % | | | |
| **Żejt taċ-chia mis-*Salvia hispanica*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt taċ-Chia (*Salvia hispanica*)" | | |
| | Xaħmijiet u żjut | 10 % | | | |
| | Żejt taċ-chia pur | 2 g kuljum | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 2 g kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M60 | | | | | |
| **Żrieragħ taċ-chia (*Salvia hispanica*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun "Żrieragħ taċ-Chia (*Salvia hispanica*)" | | |
| | Prodotti mill-ħobż | 5 % (żrieragħ taċ-chia sħaħ jew miṫħuna) | | | |
| | Prodotti moħmija | 10 % żrieragħ taċ-chia sħaħ | | | |
| | Ċereali tal-kolazzjon | 10 % żrieragħ taċ-chia sħaħ | | | |
| | Ikliet sterilizzati lesti biex jittieklu magħmulin mill-ħbub taċ-ċereali, mill-ħbub psewdoċereali u/jew mill-bus u mill-ħemes | 5 % żrieragħ taċ-chia sħaħ | | | |
| | Taħlitiet tal-frott, tal-ġewż u taż-żrieragħ | | | | |
| | Żrieragħ taċ-Chia kif inhi | | | | |
| | Prodotti tal-ħelu (inklużi ċikkulata u prodotti taċ-ċikkulata), esklużi chewing gums | | | | |
| | Prodotti tal-ħalib (inkluż il-jogurt) u analogi | | | | |
| | Silġ li jittiekel | | | | |
| | Prodotti tal-frott u tal-ħaxix (inklużi pejsts tal-frott, compotes biċ-ċereali jew mingħajr, preparazzjonijiet tal-frott li jservu ta' bażi jew biex jiṫħalltu ma' prodotti tal-ħalib, dežerti tal-frott, frott imħallat mal-ħalib tal-ġewż tal-Indi għal kontenitur b'żewġ kompartimenti) | | | | |
| | Xarbiet mhux alkoħoliċi (inkluż meraq tal-frott u xorb b'taħlita ta' frott/ħaxix) | | | | |
| | Pudini li ma jeħtiġux trattament bis-sħana ta' 120 °C jew aktar fil-manifattura, fl-ipproċessar jew fil-preparazzjoni tagħhom | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kitina-glukan mill-*Aspergillus niger*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Kitina-glukan mill-*Aspergillus niger*" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 5 g kuljum | | | |
| **Kompost ta' kitina-glukan mill-*Fomes fomentarius*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Kitina-glukan mill-*Fomes fomentarius*" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 5 g kuljum | | | |
| **Estratt ta' kitosan mill-faqqiegħ (*Agaricus bisporus*; *Aspergillus niger*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt ta' kitosan mill-*Agaricus bisporus*" jew "Estratt ta' kitosan mill-*Aspergillus niger*" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali tal-kitosan mill-krustaċji fis-supplimenti tal-ikel | | | |
| **Sulfat tal-kondrojtina** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Sulfat tal-Kondrojtina miksub mill-fermentazzjoni u s-sulfazzjoni mikrobjali" | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u n-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu | 1 200 mg kuljum | | | |
| **Pikolinat tal-Kromju** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi tal-kromju totali* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Pikolinat tal-Kromju" | | |
| | Ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 250 µg kuljum | | | |
| | Ikel imqawwi skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 ([4]) | | | | |
| ▼M53 **Bijomassa tal-ħmira li fiha l-kromu (*Yarrowia lipolytica*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "bijomassa tal-ħmira li fiha l-kromu (*Yarrowia lipolytica*)"<br>It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom il-bijomassa tal-ħmira li fiha l-kromu (*Yarrowia lipolytica*) għandu jkollu dikjarazzjoni li s-supplimenti tal-ikel ma għandhomx jiġu kkunsmati minn trabi u tfal żgħar (tfal taħt it-tliet (3) snin)/tfal minn tliet (3) snin sa disa' (9) snin ([12]). | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefinit fid-Direttiva 2002/46/KE, minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar | 2 g kuljum għal tfal minn tlieta (3) sa (9) snin, li jirriżulta f'46 µg ta' kromu kuljum<br>4 g kuljum għal tfal minn età ta' 10 snin, għall-adolexxenti u għall-adulti, li jirriżulta f'92 µg ta' kromu kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ħaxixa aromatika *Cistus incanus* L. Pandalis** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "ħaxixa aromatika *Cistus incanus* L. Pandalis" | | |
| | Infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi | Konsum ta' kuljum maħsub: 3 g ta' ħaxix aromatiku kuljum (żewġ kikkri kuljum) | | | |
| **Ċitikolina** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Ċitikolina"<br>2. It-tikkettar tal-ikel li jkun fih iċ-ċitikolina għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li l-prodott mhuwiex maħsub biex jiġi kkunsmat mit-tfal | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 500 mg kuljum | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 250 mg f'kull doża, u livell massimu ta' konsum ta' 1 000 mg kuljum | | | |
| ***Clostridium butyricum*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "*Clostridium butyricum* MIYAIRI 588 (CBM 588)" jew "*Clostridium butyricum* (CBM 588)" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | $1{,}35 \times 10^8$ CFU kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M29 | | | | | |
| **D-ribożju** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "D-Ribożju".<br>It-tikkettar tal-ikel li fih id-D-ribożju għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li dan l-ikel ma għandux jiġi kkunsmat jekk fl-istess jum jkunu qed jiġu kkunsmati supplimenti tal-ikel li fihom d-D-ribożju. | | Awtorizzat fis-16 ta' April 2019. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika proprjetarja u *data* xjentifika riżervata protetta skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: Bioenergy Life Science, Inc., 13840 Johnson St. NE, Minneapolis, Minnesota, 55304, USA. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid, id-D-ribożju, huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni biss mill-Bioenergy Life Science, Inc., sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika propretarja protetta skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Bioenergy Life Science, Inc.<br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: is-16 ta' April 2024 (ħames snin). |
| | Bars taċ-ċereali | 0,20 g/100 g | | | |
| | Prodotti fini tal-forn | 0,31 g/100 g | | | |
| | Ħelu biċ-ċikkulata (eskluži bars taċ-ċikkulata) | 0,17 g/100 g | | | |
| | Xarbiet abbaži tal-ħalib (eskluži l-malts u s-shakes) | 0,08 g/100 g | | | |
| | Xarbiet maħsuba biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi, xarbiet isotoniċi jew enerġetiċi | 0,80 g/100 g | | | |
| | Bars maħsuba biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi | 3,3 g/100 g | | | |
| | Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet) | 0,13 g/100 g | | | |
| | Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet) | 3,30 g/100 g | | | |
| | Ħlewwiet | 0,20 g/100 g | | | |
| | Te u infużjonijiet (f'għamla ta' trab li għandu jiġi rikostitwit) | 0,23 g/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt tat-trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Il-konsumaturi għandhom jiġu avżati biex ma jikkunsmawx aktar minn 600 mg polifenoli li jikkorrispondu għal 1,1 g kuljum ta' trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi | | |
| | Bars nutrittivi | 1 g kuljum u 300 mg ta' polifenoli li jikkorrispondu għal mhux aktar minn 550 mg ta' estratt tat-trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi f'kull porzjon tal-ikel (jew supplement tal-ikel) | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib | | | | |
| | Kull tip ta' ikel ieħor (fost dawn is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE) li saru stabbiliti li jintużaw bħala mezzi għall-ingredjenti funzjonali u li tipikament jitqiegħdu biex jittieħdu minn adulti li jieħdu ħsieb saħħithom | | | | |
| **Estratt tal-kawkaw b'livell baxx ta' xaħam** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Il-konsumaturi għandhom jiġu avżati biex ma jikkunsmawx aktar minn 600 mg flavanoli tal-kawkaw kuljum | | |
| | Ikel u supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 730 mg kull doża u madwar 1,2 g kuljum | | | |
| **Żejt taż-żerriegħa tal-kosbor mill-*Coriandrum sativum*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt taż-żerriegħa tal-kosbor" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 600 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M15 | | | | | |
| **Trab tal-estratt tal-cranberries** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "trab tal-estratt tal-cranberries" | | Awtorizzat fl-20 ta' Novembru 2018. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarji protetti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: Ocean Spray Cranberries Inc. One Ocean Spray Drive Lakeville-Middleboro, MA, 02349, USA.<br>Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid, trab tal-estratt tal-cranberries, huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni biss minn Ocean Spray Cranberries Inc., sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika jew għad-data xjentifika propretarja protetta skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Ocean Spray Cranberries Inc.<br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: l-20 ta' Novembru 2023. |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta | 350 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Frott niexef *Crataegus pinnatifida*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Frott imnixxef tal-*Crataegus pinnatifida*" | | |
| | Infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi | Skont l-użu normali tal-*Crataegus laevigata* | | | |
| | Ġammijiet u ġelatini skont id-Direttiva 2001/113/KE ([5]) | | | | |
| | Frott ippriżervat fil-ġulepp | | | | |
| **α-ċiklodestrina** | Mhux speċifikat | | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Alfa-ċiklodestrina" jew "α-ċiklodestrina" | | |
| **γ-ċiklodestrina** | Mhux speċifikat | | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Gamma-Ċiklodestrina" jew "γ-Ċiklodestrina" | | |
| ▼M21 **Iż-żerriegħa mqaxxra tad-*Digitaria exilis* (Kippist) Stapf (Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | Mhux speċifikat | | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "żerriegħa mqaxxra tal-fonio (*Digitaria exilis*)" | | |
| ▼M9 **Preparazzjoni tad-destran prodotta mil-*Leuconostoc mesenteroides*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Destran" | | |
| | Prodotti tal-furnara | 5 % | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt diaċiglicerol li joriġina mill-pjanti** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt diaċiglicerol li joriġina mill-pjanti (mill-inqas 80 % diaċigliceroli)" | | |
| | Żejt tat-tisjir | | | | |
| | Dlik xaħmi | | | | |
| | Taħwir għall-insalati | | | | |
| | Majoneż | | | | |
| | Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet) | | | | |
| | Prodotti tal-furnara | | | | |
| | Prodotti tat-tip tal-jogurt | | | | |
| **Diidrokapsjat (DHC)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Diidrokapsjat"<br>2. Is-supplimenti tal-ikel li fihom id-diidrokapsjat ikollhom fuq it-tikketta li "mhumiex maħsubin għat-tfal ta' taħt l-erba' snin u sitt xhur" | | |
| | Bars taċ-ċereali | 9 mg/100 g | | | |
| | Gallettini, cookies u krekers | 9 mg/100 g | | | |
| | Snacks magħmulin bir-ross | 12 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet bil-gass, xarbiet li jitħalltu mal-ilma, xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott | 1,5 mg/100 ml | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħaxix | 2 mg/100 ml | | | |
| | Xarbiet b'bażi ta' kafè, xarbiet b'bażi ta' te | 1,5 mg/100 ml | | | |
| | Ilma bit-togħma – bla gass | 1 mg/100 ml | | | |
| | Ċereali tad-dqiq tal-ħafur imsajjar minn qabel | 2,5 mg/100 g | | | |
| | Ċereali oħrajn | 4,5 mg/100 g | | | |
| | Ġelat, deżerti magħmula minn prodotti tal-ħalib | 4 mg/100 g | | | |
| | Taħlitiet tal-pudini (lesti għall-ikel) | 2 mg/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Prodotti magħmulin mill-jogurt | 2 mg/100 g | | | |
| | Ħlewwiet biċ-ċikkulata | 7,5 mg/100 g | | | |
| | Ħelu iebes | 27 mg/100 g | | | |
| | Ċuwingamm mingħajr zokkor | 115 mg/100 g | | | |
| | Sostitut tal-ħalib/kolorant tal-kafè | 40 mg/100 g | | | |
| | Sustanzi li jagħtu l-ħlewwa | 200 mg/100 g | | | |
| | Soppa (lesta biex tittiekel) | 1,1 mg/100 g | | | |
| | Taħwir għall-insalati | 16 mg/100 g | | | |
| | Proteina tal-ħaxix | 5 mg/100 g | | | |
| | Ikliet lesti biex jittieklu | 3 mg/ikla | | | |
| | Sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 3 mg/ikla | | | |
| | Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet) | 1 mg/100 ml | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | doża waħda ta' 3 mg<br>9 mg kuljum | | | |
| | Trab li jitħallat mal-ilma biex isiru xarbiet mhux alkoħoliċi | 14,5 mg/kg ekwivalenti għal 1,5 mg/100 ml | | | |

▼M51

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Euglena gracilis* imnixxfa** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikketti tal-prodotti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun "bijomassa mnixxfa tal-alka tal-*Euglena gracilis*".<br>It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom l-*Euglena gracilis* imnixxfa għandu jkollu dikjarazzjoni li dawk is-supplimenti tal-ikel ma għandhomx jiġu kkunsmati minn trabi/tfal taħt it-tliet (3) snin/tfal taħt l-età ta' 10 snin/tfal u adolexxenti taħt l-età ta' 18-il sena ([12]). | | Awtorizzat fit-23 ta' Diċembru 2020. Din l-inklużjoni tissejjes fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika riżervata u protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: Kemin Foods L.C., 2100 Maury Street Des Moines, IA 50317, USA. |
| | Bars taċ-ċereali tal-kolazzjon, bars tal-granola u bars tal-proteini | 630 mg/100 g | | | |
| | Jogurt | 150 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet tal-Jogurt | 95 mg/100 g | | | |
| | Meraq tal-frott u tal-ħaxix, nectars, xarbiet ta' taħlitiet ta' frott/ħxejjex | 120 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet bit-Togħma tal-Frott | 40 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet li jissostitwixxu l-ikel | 75 mg/100 g | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE, ħlief is-supplimenti tal-ikel għat-trabi | 100 mg kuljum għat-tfal żgħar<br>150 mg/kuljum għat-tfal ta' età bejn tlieta (3) u disa' (9) snin<br>225 mg kuljum għal tfal minn 10 snin u adolexxenti (sa 17-il sena)<br>375 mg kuljum għall-adulti | | | |

▼M51

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sostituti tad-dieta totali għall-kontroll tal-piż kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 190 mg/ikla | | | Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni minn Kemin Foods L.C. biss, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għal dak l-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika proprjetarja jew għad-*data* xjentifika proprjetarja protetti f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Kemin Foods L.C.<br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: it-23 ta' Diċembru 2025. |

▼M13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Il-partijiet esposti mnixxfin tal-*Hoodia parviflora*** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikketti tal-prodotti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun "il-partijiet esposti mnixxfin tal-*Hoodia parviflora*" | | Awtorizzat fit-3 ta' Settembru 2018. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika proprjetarja u *data* xjentifika riżervata protetti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>L-applikant: Desert Labs, Ltd. Kibbutz Yotvata, 88820, l-Iżrael. |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta | 9,4 mg kuljum | | | |

▼M13

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data,* l-ikel ġdid "Il-partijiet esposti mnixxfin tal-*Hoodia parviflora*" huwa awtorizzat li jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni biss mid-Desert Labs, Ltd sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr ma jagħmel referenza għall-evidenza xjentifika propretarja jew għad-*data* xjentifika riżervata protetti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bi ftehim mad-Desert Labs, Ltd.<br>Id-data ta' tmiem tal-protezzjoni tad-*data*: it-3 ta' Settembru 2023. |

▼M9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt imnixxef mil-*Lippia citriodora* magħmul mill-kolturi taċ-ċelloli** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "*Lippia citriodora* mill-kolturi taċ-ċelloli HTN®Vb" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili mill-weraq tal-*Lippia citriodora* | | | |
| **Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli tal-*Echinacea angustifolia*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili mill-għeruq tal-*Echinacea angustifolia* | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M31 | | | | | |
| **Estratt tal- *Echinacea purpurea* mill-kolturi taċ-ċelloli** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt imnixxef tal-*Echinacea purpurea* mill-kolturi taċ-ċelloli EchiPure-PC™" | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt simili mill-fjuretti fil-fjuri tal-*Echinacea purpurea* | | | |
| ▼M9 | | | | | |
| ***Żejt tal-Echium plantagineum*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu stearidoniku (STA)* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt irfinut tal-echium" | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib u prodotti tal-jogurt għax-xorb li jinbiegħu f'doża waħda | 250 mg/100 g; 75 mg/100 g għax-xarbiet | | | |
| | Preparazzjonijiet tal-ġobon | 750 mg/100 g | | | |
| | Xaħam li jiddellek u taħwir tal-ikel | 750 mg/100 g | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 625 mg/100 g | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 500 mg kuljum | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Sostituti tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 250 mg/ikla | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M49 | | | | | |
| **Florotannini tal-*Ecklonia cava*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "Florotannini tal-*Ecklonia cava*". | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsuba għall-popolazzjoni ġenerali, ħlief it-tfal taħt l-età ta' 12-il sena | 163 mg kuljum għall-adoloxxenti ta' bejn it-12 u l-14-il sena<br><br>230 mg kuljum għall-adoloxxenti ta' aktar minn 14-il sena<br><br>263 mg kuljum għall-adulti | Is-supplimenti tal-ikel li jkun fihom il-Florotannini tal-*Ecklonia cava* għandu jkollhom id-dikjarazzjoni li ġejja:<br><br>(a) Dan is-suppliment tal-ikel ma għandux jiġi kkunsmat mit-tfal/mill-adolexxenti ta' taħt it-tnax/l-erbatax/it-tmintax(*)-il sena.<br><br>(b) Dan is-suppliment tal-ikel ma għandux jiġi kkunsmat minn persuni li jbatu bil-marda tat-tirojde jew minn persuni li huma konxji jew li ġew identifikati li huma fir-riskju li jiżviluppaw il-marda tat-tirojde.<br><br>(c) Dan is-suppliment tal-ikel ma għandux jiġi kkunsmat jekk jiġu kkunsmati wkoll supplimenti tal-ikel oħrajn li fihom il-jodju.<br><br>(*) Skont il-grupp tal-età li jkun maħsub għalih is-suppliment tal-ikel. | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M18<br>**Idroliżat tal-membrana tal-bajd** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "idroliżat tal-membrana tal-bajd". | | Awtorizzat fil-25 ta' Novembru 2018. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarji protetti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br><br>Applikant: Biova, LLC., 5800 Merle Hay Rd, Suite 14 PO Box 394 Johnston 50131, Iowa USA. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data,* l-ikel ġdid "idroliżat tal-membrana tal-bajd" huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni biss minn Biova, LLC., sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika propretarja protetta skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Biova, LLC.<br><br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: il-25 ta' Novembru 2023 |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsuba għall-popolazzjoni adulta | 450 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gallat tal-epigallokatekina fl-għamla ta' estratt ippurifikat mill-weraq tat-tè aħdar (*Camellia sinensis*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Fuq it-tikkettar għandu jkun hemm dikjarazzjoni li l-konsumaturi ma għandhomx jieħdu aktar minn 300 mg tal-estratt kuljum | | |
| | Ikel u supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 150 mg tal-estratt f'porzjon ta' ikel wieħed jew f'porzjon ta' suppliment tal-ikel wieħed | | | |

▼M49

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **L-ergotijoneina** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "L-ergotijoneina" | | |
| | Xarbiet mhux alkoħoliċi | 0,025 g/kg | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib | 0,025 g/kg | | | |
| | "Prodotti tal-ħalib friski(*) | 0,040 g/kg | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 0,2 g/kg | | | |
| | Ħelu biċ-ċikkulata | 0,25 g/kg | | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE | 30 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali (ħlief in-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu)<br><br>20 mg kuljum għat-tfal li għandhom aktar minn 3 snin | | | |
| | (*) Meta tintuża fil-prodotti tal-ħalib, l-L-ergotijoneina ma tista' tissostitwixxi l-ebda kostitwent tal-ħalib, kompletament jew parzjalment | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M49 | | | | | |
| **Estratt tat-tliet għeruq erbali (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. u *Angelica gigas* Nakai)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "estratt tat-tliet għeruq erbali (*Cynanchum wilfordii* Hemsley, *Phlomis umbrosa* Turcz. u *Angelica gigas* Nakai)".<br><br>It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom l-estratt tat-taħlita tat-tliet għeruq erbali għandu jkollu dikjarazzjoni qrib il-lista tal-ingredjenti li tindika li ma għandhomx jiġu kkunsmati minn individwi li jafu li huma allerġiċi għall-karfus. | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta | 175 mg kuljum | | | |
| ▼M9 | | | | | |
| **EDTA tas-sodju ferriku** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi (espressi bħala EDTA anidru)* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "EDTA tas-sodju ferriku" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 18 mg kuljum għat-tfal<br><br>75 mg kuljum għall-adulti | | | |
| | Ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 12 mg/100 g | | | |
| | Ikel imqawwi skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 | | | | |
| **Fosfat ferruż tal-ammonju** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Fosfat ferruż tal-ammonju" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Irid jintuża bi qbil mad-Direttiva 2002/46/KE, mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 u/jew mar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 | | | |
| | Ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | | |
| | Ikel imqawwi skont ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Peptidi tal-ħut mis-*Sardinops sagax*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi tal-prodott tal-peptidi tal-ħut* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Peptidi tal-ħut (*Sardinops sagax*)" | | |
| | Ikel magħmul mill-jogurt, xarbiet magħmulin mill-jogurt, prodotti tal-ħalib iffermentat, u ħalib tat-trab | 0,48 g/100 g (lesti għall-ikel/għax-xorb) | | | |
| | Ilma bit-togħma, u xorb b'bażi veġetali | 0,3 g/100 g (lesti għax-xorb) | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 2 g/100 g | | | |
| | Sopop, stuffati u trabijiet tas-sopop | 0,3 g/100 g (lesti biex jittieklu) | | | |
| **Flavonojdi mill-*Glycyrrhiza glabra*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | Livelli massimi tal-flavonojdi mill-*Glycyrrhiza glabra* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Flavonojdi mill-*Glycyrrhiza glabra L.*"<br>2. It-tikkettar tal-ikel li jinżied il-prodott miegħu bħala ingredjent tal-ikel ġdid għandu jiddikjara li:<br>(a) il-prodott ma jridx jittieħed min-nisa tqal u li qed ireddgħu, mit-tfal u mill-adoloxxenti żgħar; kif ukoll<br>(b) min ikun qed jieħu xi mediċina bir-riċetta jrid jikkonsma l-prodott biss taħt superviżjoni medika;<br>(c) ma jridx jittieħed aktar minn 120 mg ta' flavonojdi kuljum.<br>3. L-ammont ta' flavonojdi fil-prodott tal-ikel finali jrid ikun indikat fuq it-tikkettar tal-ikel li jkun qiegħed fih. | Ix-xarbiet li fihom il-flavonojdi għandhom jaslu għand il-konsumatur aħħari f'porzjonijiet individwali. | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib | 120 mg kuljum | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-jogurt | | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-frott jew mill-ħaxix | | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 120 mg kuljum | | | |
| | Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 120 mg kuljum | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 120 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M40 **Polpa tal-frott, meraq tal-polpa u meraq ikkonċentrat tal-polpa tat-*Theobroma cacao* L. (Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | Mhux speċifikat | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.)", "meraq tal-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.)" jew "meraq ikkonċentrat tal-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.)", skont il-forma użata. | | | |
| ▼M9 **Estratt tal-fukojdan mill-alga *Fucus vesiculosus*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt tal-fukojdan mill-alga *Fucus vesiculosus*". | | |
| | Ikel u supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni ġenerali | 250 mg kuljum | | | |
| **Estratt tal-fukojdan mill-alga *Undaria pinnatifida*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt tal-fukojdan mill-alga Undaria pinnatifida" | | |
| | Ikel u supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni ġenerali | 250 mg kuljum | | | |
| **2′-Fukosillattożju** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "2′-fukosillattożju".<br>2. It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom it-2′-fukosillattożju għandu jkun fih dikjarazzjoni li dawn is-supplimenti ma jridux jintużaw jekk dak li jkun jiekol ikel ieħor miżjud bit-2′-fukosillattożju fl-istess ġurnata. | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib ippasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT) bla togħmiet miżjuda | 1,2 g/l | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat bla togħmiet miżjuda | 1,2 g/l għax-xarbiet | | | |
| | | 19,2 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat b'togħmiet miżjuda, inklużi prodotti ttrattati bis-sħana | 1,2 g/l għax-xarbiet | | | |
| | | 19,2 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inklużi s-sostituti tal-ħalib li jitħalltu max-xarbiet biex ibajduhom | 1,2 g/l għax-xarbiet | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 12 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | 3. It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fih it-2′-fukosillattożju maħsub għat-tfal żgħar irid iġorr dikjarazzjoni li dawn is-supplimenti ma jridux jintużaw jekk fl-istess ġurnata jittieħed il-ħalib tal-omm jew xi ikel ieħor miżjud bit-2′-fukosillattożju. | | |
| | | 400 g/kg għal sostitut tal-ħalib | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 12 g/kg | | | |
| | Sostituti taz-zokkor għal mat-tè u l-kafè | 200 g/kg | | | |
| | Formula tat-trabi kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 1,2 g/l waħedha jew f'taħlita ma' 0,6 g/l ta' latto-*N*-neotetraożju fi proporzjon ta' 2:1 fil-prodott finali, lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur | | | |
| | Formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 1,2 g/l waħedha jew f'taħlita ma' 0,6 g/l ta' latto-*N*-neotetraożju fi proporzjon ta' 2:1 fil-prodott finali, lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur | | | |
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar, kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 12 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |
| | | 1,2 g/l għal ikel likwidu lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar | 1,2 g/l għax-xarbiet magħmulin mill-ħalib u prodotti simili miżjuda waħedhom jew f'taħlita ma' 0,6 g/l ta' latto-*N*-neotetraożju, fi proporzjon ta' 2:1 fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 4,8 g/l għax-xarbiet | | | |
| | | 40 g/kg għall-bars | | | |
| | Prodotti tal-ħobż u tal-għaġin li fuqhom ikunu ddikjarati n-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | 60 g/kg | | | |
| | Xarbiet aromatizzati | 1,2 g/l | | | |
| | Kafè, tè (ħlief it-tè iswed), infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, ċikwejra; tè, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, u estratti taċ-ċikwejra; tè, preparazzjonijiet ta' pjanti, frott u ċereali għall-infużjonijiet kif ukoll taħlitiet u taħlitiet istantanji ta' dawn il-prodotti | 9,6 g/l - il-livell massimu jirreferi għall-prodotti lesti għall-użu | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE ħlief is-supplimenti tal-ikel għat-trabi | 3,0 g kuljum għall-popolazzjoni ġenerali | | | |
| | | 1,2 g kuljum għat-tfal żgħar | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M36 | | | | | |
| ***Taħlita tat-2'-Fukosillattożju/Difukosillattożju ("2'-FL/DFL")***<br><br>**(sors mikrobjali)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dak l-ikel għandha tkun 'Taħlita tat-2′DFL-Fukosillattożju/Difukosillattożju".<br><br>It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom it-taħlita tat-2-Fukosillattożju/Difukosillattożju għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li jenħtieġ li ma jintużawx jekk il-ħalib tas-sider jew ikel ieħor li jkun fih it-2′-Fukosillattożju u/jew id-Difukosillattożju jiġi kkunsmat fl-istess jum. | | Awtorizzat fid-19.12.2019. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br><br>Applikant: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, id-Danimarka. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid tat-taħlita tat-2′-Fukosillattożju/Difukosillattożju huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni minn Glycom A/S biss, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika propretarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta′ Glycom A/S.<br><br>Id-data ta′ tmiem il-protezzjoni tad-*data*: 19.12.2024. |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib ippasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT) mhux aromatizzati | 2,0 g/L | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat mhux aromatizzati | 2,0 g/L (xarbiet)<br><br>20 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat aromatizzati, inklużi prodotti ttrattati bis-sħana | 2,0 g/L (xarbiet)<br><br>20 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Xarbiet (xarbiet aromatizzati) | 2,0 g/L | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 20 g/kg | | | |
| | Formula tat-trabi kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 1,6 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur | | | |
| | Formula ta prosegwiment kif definita fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 1,2 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur | | | |
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi għat-trabi u għat-tfal żgħar, kif definiti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 1,2 g/L (xarbiet) fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur<br><br>10 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |

▼M36

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ikel bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 4,0 g/L (xarbiet)<br><br>40 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | F'konformità mal-bżonnijiet nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsuba għall-popolazzjoni ġenerali ħlief għat-trabi | 4,0 g kuljum | | | |
| ▼M55 | Xarbiet magħmula bil-ħalib u prodotti simili maħsubin għat-tfal iż-żgħar | 1,2 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkonsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |
| ▼M63 **Galatto-oligosakkarid** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi (espressi bħala proporzjon f'kull kilogramma ta' galatto-oligosakkarid/kg tal-prodott tal-ikel finali)* | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 0,333 | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE, minbarra t-trabi u t-tfal żgħar | 0,450 (li jikkorrispondi għal 5,4 g galatto-oligosakkarid/porzjon; massimu ta' 3 porzjonijiet/kuljum sa massimu ta' 16,2 g/kuljum) | | | |
| | Ħalib | 0,020 | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib | 0,030 | | | |
| | Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' xarbiet) | 0,020 | | | |
| | Xarbiet analogi għal dawk magħmulin mill-ħalib | 0,020 | | | |
| | Jogurt | 0,033 | | | |
| | Dežerti magħmulin mill-ħalib | 0,043 | | | |

▼M63

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dežerti magħmulin mill-ħalib iffriżati | 0,043 | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-frott u xarbiet li jagħtu l-enerġija | 0,021 | | | |
| | Xarbiet li jissostitwixxu l-ikel għat-trabi | 0,012 | | | |
| | Meraq għat-trabi | 0,025 | | | |
| | Xarbiet tal-jogurt għat-trabi | 0,024 | | | |
| | Dežerti għat-trabi | 0,027 | | | |
| | Snacks għat-trabi | 0,143 | | | |
| | Ċereali għat-trabi | 0,027 | | | |
| | Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi | 0,013 | | | |
| | Meraq | 0,021 | | | |
| | Mili tat-torti tal-frott | 0,059 | | | |
| | Preparazzjonijiet bil-frott | 0,125 | | | |
| | Bars | 0,125 | | | |
| | Ċereali | 0,125 | | | |
| | Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,008 | | | |

▼M9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Glukożammina HCl** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali fl-ikel tal-glukożammina li tinkiseb mill-frott tal-baħar bil-qoxra | | | |
| | Ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | | |
| | | | | | |
| | Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi | | | | |
| | Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | | | | |
| **Sulfat tal-glukożammina KCl** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali fl-ikel tal-glukożammina li tinkiseb mill-frott tal-baħar bil-qoxra | | | |
| **Sulfat tal-glukożammina NaCl** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali fl-ikel tal-glukożammina li tinkiseb mill-frott tal-baħar bil-qoxra | | | |
| **Gomma tal-gwar** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Gomma tal-Gwar".<br>2. Fuq it-tikketta ta' kull oġġett tal-ikel li fih il-gomma tal-gwar irid ikun imsemmi li jeżisti r-riskju li t-tfal ta' taħt it-tmien snin jistgħu jħossu dwejjaq fl-istonku jekk jiġu esposti għal din is-sustanza.<br>Pereżempju, "Il-konsum żejjed ta' dawn il-prodotti jista' jikkawża d-dwejjaq fl-istonku, speċjalment fit-tfal ta' taħt it-tmien snin".<br>3. Fil-każ ta' prodotti li jiġu ppreżentati f'żewġ kompartimenti separati li jkun fihom rispettivament prodott tal-ħalib u prodott taċ-ċereali, fl-istruzzjonijiet tal-użu jrid ikun speċifikat b'mod | | |
| | Prodotti tal-ħalib friski bħalma huma l-jogurt, il-ħalib iffermentat, il-ġobon frisk u dežerti oħrajn magħmulin mill-ħalib. | 1,5 g/100 g | | | |
| | Oġġetti tal-ikel likwidi magħmulin mill-frott jew mill-ħaxix (tat-tip tal-"ismoothies") | 1,8 g/100 g | | | |
| | Frott jew ħaxix imsajjar fil-ġulepp | 3,25 g/100 g | | | |
| | Ċereali flimkien ma' prodott tal-ħalib ippreżentati f'pakket b'żewġ kompartimenti separati | 10 g/100 g fiċ-ċereali<br>Xejn fil-prodott tal-ħalib li jkun miegħu<br>1 g/100 g fil-prodott meta jkun lest biex jittiekel | | | |

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | ċar li l-prodott taċ-ċereali u l-prodott tal-ħalib iridu jitħalltu flimkien qabel ma jittieklu, biex ikun kopert ir-riskju potenzjali ta' ostrazzjoni gastrointestinali. | | |
| **Prodotti tal-ħalib ittrattat bis-sħana ffermentati bil-*Bacteroides xylanisolvens*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Prodotti tal-ħalib iffermentat (fl-għamliet ta' likwidu, semilikwidu u trab imnixxef bl-isprej) | | | | |
| **Idrodossitirosol** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "idrodossitirosol".<br>It-tikkettar tal-prodotti tal-ikel li fihom l-idroxxitirosol għandu jkollhom fuqhom id-dikjarazzjonijiet li ġejjin:<br>(a) Dan il-prodott tal-ikel jenħtieġ li ma jitħeidx minn tfal ta' taħt it-tliet snin, min-nisa tqal u min-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu;<br>(b) Dan il-prodott tal-ikel jenħtieġ li ma jintużax għat-tisjir, għall-ħami jew għall-qali" | | |
| | Żjut tal-ħut u tal-ħxejjex, (ħlief iż-żjut taż-żebbuġ u ż-żjut mir-residwi taż-żebbuġ kif iddefinit fil-Parti VIII tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 (6)) imqiegħda fis-suq tali kwali | 0,215 g/kg | | | |
| | Xaħmijiet li jistgħu jiddelku kif iddefinit fil-Parti VII tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, imqiegħda fis-suq tali kwali | 0,175 g/kg | | | |
| **Proteina li Tistruttura s-Silġ tat-tip III HPLC 12** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Proteina li Tistruttura s-Silġ" | | |
| | Silġ li jittiekel | 0,01 % | | | |
| **Estratti milwiema mill-weraq niexef tal-*Ilex guayusa*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratti mill-weraq niexef tal-*Ilex guayusa*" | | |
| | Infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi | Skont l-użu normali fl-infużjonijiet ta' ħxejjex aromatiċi u fis-supplimenti tal-ikel ta' estratt milwiem simili mill-weraq niexef tal-*Ilex paraguariensis* | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M46 | | | | | |
| **Infużjoni mill-weraq tal-kafe ta' *Coffea arabica* L. u/jew minn *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner (Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dak l-ikel għandha tkun Infużjoni mill- weraq tal-kafè ta' *Coffea arabica* u/jew *Coffea canephor a* | | |
| | Infużjonijiet erbali | | | | |
| ▼M9 | | | | | |
| **Isomalto-oligosakkarid** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Isomalto-oligosakkarid".<br>2. L-oġġetti tal-ikel li fihom l-ingredjent ġdid fuq it-tikketta jridu jkunu ttikkettati bħala "sors ta' glukożju". | | |
| | Soft Drinks bil-Kaloriji Mnaqqsa | 6,5 % | | | |
| | Xarbiet li jagħtu l-enerġija | 5,0 % | | | |
| | Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi (jinkludi x-xarbiet isotoniċi) | 6,5 % | | | |
| | Meraq tal-Frott | 5 % | | | |
| | Ħaxix Ipproċessat u Meraq tal-Ħaxix | 5 % | | | |
| | Soft Drinks oħrajn | 5 % | | | |
| | Bars taċ-Ċereali | 10 % | | | |
| | Cookies, Gallettini | 20 % | | | |
| | Bars taċ-Ċereali għall-Kolazzjon | 25 % | | | |
| | Ħelu Iebes | 97 % | | | |
| | Ħelu Artab/Bars taċ-Ċikkulata | 25 % | | | |
| | Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż (fl-għamla ta' bars jew magħmulin mill-ħalib) | 20 % | | | |
| **Iżomaltulożju** | Mhux speċifikat | | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Iżomaltulożju". | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar għandha jkollha magħha indikazzjoni li "L-Iżomaltulożju huwa sors ta' glukożju u ta' fruttożju". | | |
| ▼M14 **Lattitol** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Lattitol" | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE (kapsuli, pilloli jew trab) maħsuba għall-popolazzjoni adulta. | 20 g kuljum | | | |
| ▼M9 **Latto-*N*-neotetraożju** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Latto-*N*-neotetraożju".<br>2. It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fih il-latto-*N*-neotetraożju għandu jiddikjara li dawn is-supplimenti ma għandhomx jintużaw jekk dak li jkun jiekol ikel ieħor miżjud bil-latto-*N*-neotetraożju fl-istess ġurnata.<br>3. It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fih il-latto-*N*-neotetraożju maħsub għat-tfal żgħar għandu jiddikjara li dawn is-supplimenti ma jridux jintużaw jekk fl-istess ġurnata jittieħed il-ħalib tal-omm jew xi ikel ieħor miżjud bil-latto-*N*-neotetraożju. | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib ippasturizzat u sterilizzat (inkluż UHT) bla togħmiet miżjuda | 0,6 g/l | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat bla togħmiet miżjuda | 0,6 g/l għax-xarbiet<br>9,6 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat b'togħmiet miżjuda, inklużi prodotti ttrattati bis-sħana | 0,6 g/l għax-xarbiet<br>9,6 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib, inklużi s-sostituti tal-ħalib li jitħalltu max-xarbiet biex ibajduhom | 0,6 g/l għax-xarbiet<br>6 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet<br>200 g/kg għal sostitut tal-ħalib | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 6 g/kg | | | |
| | Sostituti taz-zokkor għal mat-tè u l-kafè | 100 g/kg | | | |
| | Formula tat-trabi kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,6 g/l imħallat ma' massimu ta' 1,2 g/l ta' 2′-fukosillattożju fi proporzjon ta' 1:2 fil-prodott finali, lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,6 g/l imħallat ma' massimu ta' 1,2 g/l ta' 2′-fukosillattożju fi proporzjon ta' 1:2 fil-prodott finali, lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur | | | |
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar, kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 6 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet<br>0,6 g/l għal ikel likwidu lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar | 0,6 g/l għal xarbiet magħmulin mill-ħalib u prodotti simili miżjuda waħedhom jew f'taħlita mat-2′-fukosillattożju, fi proporzjon ta' 1:2 fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonjiet tal-manifattur | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 2,4 g/l għax-xarbiet<br>20 g/kg għall-bars | | | |
| | Prodotti tal-ħobż u tal-għaġin li fuqhom ikunu ddikjarati n-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | 30 g/kg | | | |
| | Xarbiet aromatizzati | 0,6 g/l | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kafè, tè (ħlief it-tè iswed), infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, ċikwejra; tè, infużjonijiet tal-ħxejjex aromatiċi u tal-frott, u estratti taċ-ċikwejra; tè, preparazzjonijiet ta' pjanti, frott u ċereali għall-infużjonijiet kif ukoll taħlitiet u taħlitiet istantanji ta' dawn il-prodotti | 4,8 g/l - il-livell massimu jirreferi għall-prodotti lesti għall-użu | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE ħlief is-supplimenti tal-ikel għat-trabi | 1,5 g kuljum għall-popolazzjoni ġenerali<br>0,6 g kuljum għat-tfal żgħar | | | |

▼M43

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **"Latto-*N*-tetraożju ("LNT")<br>(sors mikrobjali)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dak l-ikel għandha tkun "latto-*N*-tetraożju".<br>It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom il-latto-*N*-tetraożju għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li jenħtieġ li ma jintużawx jekk fl-istess jum jiġi kkunsmat ħalib tas-sider jew ikel ieħor li jkun miżjud bil-latto-*N*-tetraożju. | | Awtorizzat fit-23.4.2020. Din l-inklużjoni tissejjes fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarja u protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, id-Danimarka. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid latto-*N*-tetraożju huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni minn Glycom A/S biss, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika proprjetarja u protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Glycom A/S. |
| | Prodotti tal-ħalib pasturizzat u sterilizzat mhux aromatizzati (inkluż l-UHT) | 1,0 g/l | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat mhux aromatizzati | 1,0 g/l (xarbiet)<br>10 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat aromatizzati, inklużi prodotti ttrattati bis-sħana | 1,0 g/l (xarbiet)<br>10 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Xarbiet (xarbiet aromatizzati) | 1,0 g/l | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 10 g/kg | | | |
| | Formula tat-trabi kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,8 g/l fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |

▼M43

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Formula ta' prosegwiment kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,6 g/l fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: 23.4.2025. |
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali, ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar, kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,6 g/l (xarbiet) fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur<br>5 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar | 0,6 g/l (xarbiet) fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkumerċjalizzat tali kwali jew biex jiġi rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur<br>5 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |
| | Ikel bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 2,0 g/l (xarbiet)<br>20 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif definit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | F'konformità mal-bżonnijiet nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif definit fid-Direttiva 2002/46/KE, għajr għat-trabi | 2,0 g/kuljum għat-tfal żgħar, għat-tfal, għall-adolexxenti u għall-adulti | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M20 **Il-frott artab tal-*Lonicera caerulea* L. (haskap) (Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | Mhux speċifikat | | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "frott artab tal-haskap (*Lonicera caerulea*)". | | |
| ▼M9 **Estratt tal-weraq tal-alfalfa mill-*Medicago sativa*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Proteina tal-alfalfa (*Medicago sativa*)" jew "Proteina tal-Alfalfa (*Medicago sativa*)". | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 10 g kuljum | | | |
| **Likopen** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Likopen" | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew tal-ħaxix (inklużi l-konċentrati) | 2,5 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi | 2,5 mg/100 g | | | |
| | Sostituti tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 8 mg/ikla | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 5 mg/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Xaħmijiet u taħwir tal-ikel | 10 mg/100 g | | | |
| | Sopop ħlief sopop tat-tadam | 1 mg/100 g | | | |
| | Ħobż (inkluż il-ħobż iqarmeċ) | 3 mg/100 g | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 15 mg kuljum | | | |
| **Likopen mill-*Blakeslea trispora*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Likopen" | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew tal-ħaxix (inklużi l-konċentrati) | 2,5 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi | 2,5 mg/100 g | | | |
| | Sostituti tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 8 mg/ikla | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 5 mg/100 g | | | |
| | Xaħmijiet u taħwir tal-ikel | 10 mg/100 g | | | |
| | Sopop ħlief sopop tat-tadam | 1 mg/100 g | | | |
| | Ħobż (inkluż il-ħobż iqarmeċ) | 3 mg/100 g | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 15 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Likopen mit-tadam** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Likopen" | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew tal-ħaxix (inklużi l-konċentrati) | 2,5 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi | 2,5 mg/100 g | | | |
| | Sostituti tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 8 mg/ikla | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 5 mg/100 g | | | |
| | Xaħmijiet u taħwir tal-ikel | 10 mg/100 g | | | |
| | Sopop ħlief sopop tat-tadam | 1 mg/100 g | | | |
| | Ħobż (inkluż il-ħobż iqarmeċ) | 3 mg/100 g | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 15 mg kuljum | | | |
| **Oleoraża tal-likopen mit-tadam** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' likopen* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Oleoraża tal-likopen mit-tadam" | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew tal-ħaxix (inklużi l-konċentrati) | 2,5 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet maħsubin biex jagħmlu tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi magħmulin b'mod speċjali għall-isportivi | 2,5 mg/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 8 mg/ikla | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 5 mg/100 g | | | |
| | Xaħmijiet u taħwir tal-ikel | 10 mg/100 g | | | |
| | Sopop ħlief sopop tat-tadam | 1 mg/100 g | | | |
| | Ħobż (inkluż il-ħobż iqarmeċ) | 3 mg/100 g | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| ▼M49 **Liżożima idrolizzata tal-abjad tal-bajd tat-tiġieġ** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "Liżożima idrolizzata tal-abjad tal-bajd tat-tiġieġ". | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsuba għall-popolazzjoni adulta | 1000 mg kuljum | | | |
| ▼M9 **Ċitrat malat tal-manjeżju** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Ċitrat malat tal-manjeżju" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | | | | |
| **Estratt mill-qoxra tas-siġra tal-manjolja** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt mill-qoxra tas-siġra tal-manjolja" | | |
| | Ħelu tal-menta (prodotti tal-ħelu) | 0,2 % biex jaħbu l-irwejjaħ tal-ħalq. Abbażi ta' livell massimu ta' inkorporazzjoni ta' 0,2 % u ta' daqs massimu ta' ċuwingamm jew menta ta' 1,5 g kull biċċa, kull porzjon ta' ċuwingamm jew menta ma jkunx fih iżjed minn 3 mg ta' estratt mill-qoxra tas-siġra tal-manjolja. | | | | |
| | Ċuwingamm | | | | |
| **Żejt tas-sufara tal-qamħirrum li fih ħafna materja insaponifikabbli** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt taż-żejt tas-sufara tal-qamħirrum" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 2 g kuljum | | | |
| | Ċuwingamm | 2 % | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Metilċelluloża** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Metilċelluloża" | Il-metilċelluloża ma tridx tintuża f'ikel li jkun ippreparat b'mod speċjali għat-tfal żgħar | |
| | Silġ li jittiekel | 2 % | | | |
| | Xarbiet aromatizzati | | | | |
| | Prodotti tal-ħalib iffermentat aromatizzati u mhux aromatizzati | | | | |
| | Dežerti kesħin (prodotti magħmulin mill-ħalib, mix-xaħam, mill-frott, miċ-ċereali, mill-bajd) | | | | |
| | Preparazzjonijiet tal-frott (polpi, purè jew frott imsajjar fil-ġulepp) | | | | |
| | Sopop u brodijiet | | | | |
| ▼M11 | | | | | |
| **Klorur tal-1-Metilnikotinammid** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "klorur tal-1-Metilnikotinammid".<br>Is-supplimenti tal-ikel li fihom il-klorur tal-1-Metilnikotinammid għandhom ikollhom d-dikjarazzjoni li ġejja:<br>Dan is-suppliment tal-ikel għandu jiġi kkonsmat minn adulti biss, minbarra n-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu | | Awtorizzat fit-2 ta' Settembru 2018. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika proprjetarja u *data* xjentifika riżervata protetta skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: Pharmena S.A., Wolczanska 178, 90 530 Lodz, il-Polonja. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid "klorur tal-1-Metilnikotinammid" huwa |
| | Is-Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu | 58 mg kuljum | | | |

▼M11

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni biss mill-Pharmena S.A., sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika propretarja jew għad-*data* xjentifika riżervata protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Pharmena S.A.<br>Id-data ta' tmiem tal-protezzjoni tad-*data*: it-2 ta' Settembru 2023 |
| ▼M9<br>**Aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku, melħ tal-glukożammina** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku, melħ tal-glukożammina" jew "5MTHF-glukożammina" | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE bħala sors ta' folat | | | | |
| **Monometilsilanetrijol (Siliċju organiku)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' siliċju* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Siliċju organiku (monometilsilanetrijol)" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta (f'għamla likwida) | 10,40 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt tal-miċelju mill-faqqiegħ Shiitake (*Lentinula edodes*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt mill-faqqiegħ *Lentinula edodes*" jew "Estratt mill-faqqiegħ Shiitake" | | |
| | Prodotti tal-ħobż | 2 ml/100 g | | | |
| | Soft drinks | 0,5 ml/100 ml | | | |
| | Ikliet ippreparati bil-lest | 2,5 ml kull ikla | | | |
| | Ikel magħmul mill-jogurt | 1,5 ml/100 ml | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Doża ta' 2,5 ml kuljum | | | |

▼M38

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Klorur tan-nikotinam-midribosid** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "klorur tan-nikotinammidribosid" | | Awtorizzat fl-20 ta' Frar 2020. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika proprjetarja u *data* xjentifika proprjetarja protetti f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: ChromaDex Inc., 10900 Wilshire Boulevard Suite 600, Los Angeles, CA 90024 USA. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni minn ChromaDex Inc. biss, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għal dak l-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika proprjetarja jew għad-*data* xjentifika proprjetarja protetti f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' ChromaDex Inc.<br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: l-20 ta' Frar 2025. |
| | Supplimenti tal-ikel kif definit fid-Direttiva 2002/46/KE | 300 mg/kuljum għall-popolazzjoni ġenerali, ħlief in-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu<br>230 mg/kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Meraq tal-frott tan-Noni (*Morinda citrifolia*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Meraq tan-noni" jew "Meraq tal-*Morinda citrifolia*" | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-frott u min-nektar tal-frott ippasturizzati | 30 ml f'kull doża (sa 100 % meraq tan-noni)<br>jew<br>20 ml darbtejn kuljum, mhux aktar minn 40 ml kuljum | | | |
| **Trab tal-meraq tal-frott tan-Noni (*Morinda citrifolia*)** | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 6,6 g kuljum (ekwivalenti għal 30 ml ta' meraq tan-noni) | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Trab tal-meraq tan-noni" jew "Trab tal-meraq tal-*Morinda citrifolia*" | | |
| **Purè u konċentrat tal-frott tan-noni (*Morinda citrifolia*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun:<br>Għall-purè tal-frott:<br>"Purè tal-frott tal-*Morinda citrifolia*" jew "Purè tal-frott tan-noni"<br>Għall-konċentrat tal-frott:<br>"Konċentrat tal-frott tal-*Morinda citrifolia*" jew "Konċentrat tal-frott tan-noni" | | |
| | | Purè tal-frott | | | |
| | Ħelu/ħlewwiet | 45 g/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 53 g/100 g | | | |
| | Taħlitiet tax-xorb nutrittiv bi trab (piż xott) | 53 g/100 g | | | |
| | Xorb bil-gass | 11 g/100 g | | | |
| | Ġelat u sorbet | 31 g/100 g | | | |
| | Jogurt | 12 g/100 g | | | |
| | Gallettini | 53 g/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Bans, kejkijiet u pasti bl-għaġina | 53 g/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali għall-kolazzjon (ċereali integrali) | 88 g/100 g | | | |
| | Ġammijiet u ġelatini skont id-Direttiva 2001/113/KE | 133 g/100 g<br>Abbażi tal-kwantità ta' qabel l-ipproċessar biex isir prodott finali ta' 100 g | | | |
| | Dlik tal-ħelu, mili u ġelu | 31 g/100 g | | | |
| | Zlazi mħawwra, pikles, grejvi u kondimenti | 88 g/100 g | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 26 g kuljum | | | |
| | | Konċentrat tal-frott | | | |
| | Ħelu/Ħlewwiet | 10 g/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 12 g/100 g | | | |
| | Taħlitiet tax-xorb nutrittiv bi trab (piż xott) | 12 g/100 g | | | |
| | Xorb bil-gass | 3 g/100 g | | | |
| | Ġelat u sorbet | 7 g/100 g | | | |
| | Jogurt | 3 g/100 g | | | |
| | Gallettini | 12 g/100 g | | | |
| | Bans, kejkijiet u pasti bl-għaġina | 12 g/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali għall-kolazzjon (ċereali integrali) | 20 g/100 g | | | |
| | Ġammijiet u ġelatini skont id-Direttiva 2001/113/KE | 30 g/100 g | | | |
| | Dlik tal-ħelu, mili u ġelu | 7 g/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Zlazi mħawwra, pikles, grejvi u kondimenti | 20 g/100 g | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 6 g kuljum | | | |
| **Weraq tan-noni (*Morinda citrifolia*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Weraq tan-noni" jew "Weraq tal-*Morinda citrifolia*".<br>2. Għandhom jingħataw istruzzjonijiet lill-konsumatur li kikkra infużjoni ma jridx ikollha iktar minn 1 g ta' weraq tal-Morinda citrifolia mnixxfa u moħmija. | | |
| | Għall-preparazzjoni tal-infużjonijiet | Kikkra infużjoni għall-konsum ma għandhiex ikollha iktar minn 1 g ta' weraq tal-*Morinda citrifolia* mnixxfa u moħmija | | | |
| **Trab tal-frott tan-Noni (*Morinda citrifolia*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Trab tal-frott tal-Morinda citrifolia" jew "Trab tal-frott tan-noni" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 2,4 g kuljum | | | |
| **Mikroalgi *Odontella aurita*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Mikroalgi *Odontella aurita*" | | |
| | Għaġin aromatizzat | 1,5 % | | | |
| | Aljotti | 1 % | | | |
| | Terrini tal-ħut | 0,5 % | | | |
| | Preparazzjonijiet għall-brodu | 1 % | | | |
| | Krekers | 1,5 % | | | |
| | Ħut bil-panura ffriżat | 1,5 % | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt bil-fitosteroli/ fitostanoli miżjudin** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' fitosteroli/ fitostanoli* | Skont l-Anness III.5 tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 | | |
| | Xaħmijiet li jistgħu jiddelku kif iddefiniti fl-Anness VII, il-Parti VII u l-Appendiċi II il-punti B u C tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, ħlief ix-xaħmijiet u d-dlik għat-tisjir u għall-qali magħmulin mill-butir jew minn xaħam ieħor tal-annimali | 1. Il-prodotti li fihom l-ikel ġdid bħala ingredjent għandhom jiġu ppreżentati b'tali mod li faċilment ikunu jistgħu jitqassmu f'porzjonijiet li jkun fihom massimu ta' fitosteroli/fitostanoli miżjuda ta' 3 g (fil-każ ta' porzjon wieħed kuljum) jew massimu ta' 1 g (fil-każ ta' tliet porzjonijiet kuljum).<br>2. L-ammont ta' fitosteroli/fitostanoli miżjud f'kontenitur tax-xorb ma għandux ikun iżjed minn 3 g.<br>3. Taħwir għall-insalati, majoneż u zlazi mħawrin għandhom jiġu ppakkjati bħala porzjonijiet ta' wieħed. | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib, bħall-prodotti magħmulin mill-ħalib xkumat u mill-ħalib semixkumat, li jista' jkollhom il-frott u/jew iċ-ċereali miżjudin, prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat, bħal jogurt u prodotti magħmulin mill-ġobon (kontenut ta' xaħam ta' ≤ 12 g għal kull 100 g) fejn jista' jkun li x-xaħam tal-ħalib ikun tnaqqas jew ix-xaħam jew il-proteini jkunu ssostitwiti kompletament jew parzjalment bix-xaħam jew bil-proteini veġetali | | | | |
| | Xarbiet tas-sojja | | | | |
| | Taħwir għall-insalati, majoneż u zlazi mħawrin | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt estratt mill-klamari** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku (DHA) u aċidu ejkosapentenojku (EPA) flimkien* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt tal-klamari". | | |
| | Prodotti magħmula mill-ħalib ħlief xarbiet magħmula mill-ħalib | 200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet | 200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Xaħam li jiddellek u taħwir tal-ikel | 600 mg/100 g | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 500 mg/100 g | | | |
| | Prodotti tal-furnara (ħobżiet u bziezen) | 200 mg/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 500 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi xarbiet magħmula mill-ħalib) | 60 mg/100 ml | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 3 000 mg kuljum għall-popolazzjoni ġenerali<br>450 mg kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom il-prodotti huma maħsuba | | | |
| | Sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 200 mg/ikla | | | |

▼M52

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt mill-*Panax notoginseng* u l-*Astragalus membranaceus*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "Estratt mill-*Panax notoginseng* u l-*Astragalus membranaceus*"<br>It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom l-estratt mill-*Panax notoginseng* u l-*Astragalus membranaceus* għandu jkollu dikjarazzjoni li dawk is-supplimenti tal-ikel ma għandhomx jiġu kkunsmati mill-popolazzjoni taħt l-età ta' 18-il sena u minn nisa tqal. | | Awtorizzat fit-23 ta' Diċembru 2020. Din l-inklużjoni tissejjes fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarja u protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283. |
| | Supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta ġenerali, minbarra s-supplimenti tal-ikel għannisa tqal | 35 mg kuljum | | | |

▼M52

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Applikant: NuLiv Science, 1050 W. Central Ave., Building C, Brea, CA 92821, USA.<br>Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni minn NuLiv Science biss, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għal dak l-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika proprjetarja jew għad-data xjentifika proprjetarja protetti f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' NuLivScience.<br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni: it-23 ta' Diċembru 2025. |

▼M44

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trabijiet taż-żerriegħa taċ-chia (*Salvia hispanica*) parzjalment sgrassati** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikketti tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Trab taż-żerriegħa taċ-chia (*Salvia hispanica*) parzjalment sgrassat" | | |
| | Trab b'kontenut għoli ta' proteini | | | | |
| | Prodotti tal-ħalib iffermentati mingħajr togħmiet miżjuda, inkluż xorrox tal-butir naturali mingħajr togħmiet miżjuda (barra x-xorrox tal-butir sterilizzat) mhux trattat bis-sħana wara l-fermentazzjoni | 0,7 % | | | |
| | Prodotti tal-ħalib iffermentat mingħajr togħmiet miżjuda, trattati bis-sħana wara l-fermentazzjoni | 0,7 % | | | |
| | Prodotti tal-ħalib iffermentat b'togħmiet miżjuda inklużi prodotti trattati bis-sħana | 0,7 % | | | |

▼M44

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ħelu | 10 % | | | |
| | Meraq tal-frott kif definit fid-Direttiva 2001/112/KE ([8]) u meraq tal-ħaxix | 2,5 % | | | |
| | Nektars tal-frott kif definit fid-Direttiva 2001/112/KE u nektars tal-ħaxix u prodotti simili | 2,5 % | | | |
| | Xarbiet aromatizzati | 3 % | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar | 7,5 g kuljum | | | |
| | Trab b'kontenut għoli ta' fibra | | | | |
| | Ħelu | 4 % | | | |
| | Meraq tal-frott kif definit fid-Direttiva 2001/112/KE u meraq tal-ħaxix | 2,5 % | | | |
| | Nektars tal-frott kif definit fid-Direttiva 2001/112/KE u nektars tal-ħaxix u prodotti simili | 4 % | | | |
| | Xarbiet aromatizzati | 4 % | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar | 12 g kuljum | | | |

▼M59

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trab taż-żerriegħa tal-lift bix-xaħam parzjalment imneħħi mill-*Brassica rapa* L. u *Brassica napus* L.** | *Il-Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikketti tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Trab taż-żerriegħa tal-lift bix-xaħam parzjalment imneħħi".<br>Kwalunkwe oġġett tal-ikel li fih "Trab taż-żerriegħa tal-lift bix-xaħam parzjalment imneħħi mill-*Brassica rapa* L. u *Brassica napus* L." għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li dan l-ingredjent jista' jikkawża reazzjoni allerġika lill-konsumaturi li huma allerġiċi għall-mustarda u għall-prodotti magħmulin biha. Din id-dikjarazzjoni għandha tidher qrib il-lista tal-ingredjenti. | | |
| | Bars taċ-ċereali mħallta | 20 g/100 g | | | |
| | Muesli u ċereali tal-kolazzjon simili | 20 g/100 g | | | |
| | Prodotti taċ-ċereali tal-kolazzjon estruži | 20 g/100 g | | | |
| | Snacks (minbarra l-crisps tal-patata) | 15 g/100 g | | | |
| | Ħobżiet u bziezen b'ingredjenti speċjali miżjuda (bħal żrieragħ, żbib, ħaxix aromatiku) | 7 g/100 g | | | |
| | Ħobżiet somor li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet dwar in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | 7 g/100 g | | | |

▼M59

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ħobż u bziezen b'diversi qmuħ | 7 g/100 g | | | |
| | Sostituti tal-laħam | 10 g/100 g | | | |
| | Pulpetti tal-laħam | 10 g/100 g | | | |
| ▼M9 **Preparazzjonijiet ta' frott ippasturizzati permezz ta' trattament bi pressjoni għolja** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Il-kliem "pasturizzat bi trattament ta' pressjoni għolja" għandu jidher ħdejn isem il-preparazzjonijiet tal-frott ippreżentati kif inhuma u f'kull prodott li jintużaw fih | | |
| | Tipi ta' frott:<br>tuffieħ, berquq, banana, tut, tuta żerqa, ċirasa, ġewż tal-Indi, tin, għeneb, grejpfrut, mandolin, mango, bettieħ, ħawħ, lanġas, ananas, pruna, lampun, rabarbru, frawli | | | | |
| ▼M35 **Fenilkapsaiċina** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun "Fenilkapsaiċina". | | Awtorizzat fid-19 ta' Diċembru 2019. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br><br>Applikant: aXichem AB, Södergatan 26, SE 211 34, Malmö l-Iżvezja. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid "Fenilkapsaiċina" huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni minn aXichem AB biss, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika propretarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' aXichem AB. |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif definit skont ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 minbarra l-ikel għat-trabi, għat-tfal żgħar u għat-tfal ta' taħt il-11-il sena | 2,5 mg kuljum | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsuba għall-popolazzjoni ġenerali, bl-esklużjoni ta' tfal taħt l-età ta' 11-il sena | 2,5 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Lamtu tal-qamħirrum iffosfatat** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Lamtu tal-qamħirrum iffosfatat" | | |
| | Prodotti tal-furnara moħmija | 15 % | | | |
| | Għaġin | | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | | | | |
| | Bars taċ-ċereali | | | | |
| **Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tal-ħut** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' fosfatidilserina* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Fosfatidilserina tal-ħut" | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-jogurt | 50 mg/100 ml | | | |
| | Trabijiet magħmulin mit-trabijiet tal-ħalib | 3 500 mg/100 g (ekwivalenti għal 40 mg/100 ml tal-prodott lest għax-xorb) | | | |
| | Ikel magħmul mill-jogurt | 80 mg/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 350 mg/100 g | | | |
| | Ħlewwiet magħmulin miċ-ċikkulata | 200 mg/100 g | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 300 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tas-sojja** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' fosfatidilserina* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Fosfatidilserina tas-sojja" | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-jogurt | 50 mg/100 ml | | | |
| | Trabijiet magħmulin mit-trab tal-ħalib | 3,5 g/100 g (ekwivalenti għal 40 mg/100 ml tal-prodott lest għax-xorb) | | | |
| | Ikel magħmul mill-jogurt | 80 mg/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 350 mg/100 g | | | |
| | Ħlewwiet magħmulin miċ-ċikkulata | 200 mg/100 g | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |
| **Prodott tal-fosfolipidi li fih ammonti ugwali ta' fosfatidilserina u aċidu fosfatidiku** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' fosfatidilserina* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Fosfatidilserina u aċidu fosfatidiku tas-sojja" | Il-prodott mhuwiex maħsub għall-bejgħ lil nisa tqal jew li jkunu jreddgħu | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 80 mg/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 350 mg/100 g | | | |
| | Ikel ibbażat fuq il-jogurt | 80 mg/100 g | | | |
| | Prodotti bħall-jogurt ibbażati fuq is-sojja | 80 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-jogurt | 50 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet magħmulin bis-sojja li jixbħu lill-jogurt | 50 mg/100 g | | | |
| | Trabijiet magħmulin mit-trab tal-ħalib | 3,5 g/100 g (ekwivalenti għal 40 mg/100 ml tal-prodott lest għax-xorb) | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 800 mg kuljum | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fosfolipidi mill-isfar tal-bajd** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Mhux speċifikat | | | | |
| **Fitoglikoġenu** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Fitoglikoġenu" | | |
| | Oġġetti tal-ikel ipproċessati | 25 % | | | |
| **Fitosteroli/ fitostanoli** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | B'konformità mal-Anness III.5 tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 | | |
| | Xarbiet magħmulin bir-ross | 1. Il-prodotti għandhom ikunu ppreżentati b'tali mod li faċilment ikunu jistgħu jitqassmu f'porzjonijiet ta' fitosteroli/fitostanoli miżjuda li jkun fihom massimu ta' 3 g (fil-każ ta' porzjon 1 kuljum) jew massimu ta' 1 g (fil-każ ta' 3 porzjonijiet kuljum).<br>L-ammont ta' fitosteroli/fitostanoli miżjud f'kontenitur tax-xorb ma għandux ikun iżjed minn 3 g.<br>Taħwir għall-insalati, majonież u zlazi mħawrin għandhom jiġu ppakkjati bħala porzjonijiet ta' wieħed | | | |
| | Ħobż tas-segala magħmul minn dqiq li fih ≥ 50 % segala (dqiq integrali tas-segala, qlub tas-segala sħaħ jew maqsuma u laqx tas-segala) u ≤ 30 % qamħ; u li fih ≤ 4 % zokkor miżjud iżda mingħajr xaħam miżjud. | | | | |
| | It-taħlitiet imħawrin għall-insalati, il-majonież u z-zlazi mħawrin. | | | | |
| | Xarbiet tas-sojja | | | | |
| | Prodotti tat-tip tal-ħalib, bħalma huma l-prodotti tat-tip tal-ħalib xkumat u semixkumat, possibbilment biż-żieda ta' frott u/jew ċereali, li fihom jista' jkun tnaqqas ix-xaħam tal-ħalib, jew li fihom ix-xaħam u/jew il-proteina tal-ħalib ġew issostitwiti parzjalment jew għalkollox b'xaħam u/jew proteina veġetali. | | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat, bħal prodotti tat-tip tal-jogurt u tal-ġobon (b'kontenut ta' xaħam ta' < 12 % f'kull 100 g), fejn jista' jkun li tnaqqas ix-xaħam tal-ħalib, jew fejn ix-xaħam u/jew il-proteina tal-ħalib ġew issostitwiti parzjalment jew għalkollox b'xaħam u/jew proteina veġetali | | | | |
| | Xaħmijiet li jistgħu jiddelku kif iddefiniti fil-punti B u C tal-Parti VII tal-Appendiċi II tal-Anness VII tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013, ħlief ix-xaħmijiet u d-dlik għat-tisjir u għall-qali magħmulin mill-butir jew minn xaħam ieħor tal-annimali. | | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 3 g kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt tal-qlub tal-għanbaqar** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Għall-qali u biex jintuża għat-taħwir tal-ikel | Skont l-użu normali taż-żjut veġetali bħala ikel | | | |
| **Proteini tal-patata (ikkoagulati) u idrolisati tagħhom** | Mhux speċifikat | | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Proteina tal-patata" | | |
| **Prolil oligopeptidaži (preparazzjoni enzimatika)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Prolil oligopeptidaži" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta ġenerali | 120 PPU kuljum (2,7 g tal-preparazzjoni enzimatika kuljum) ($2x10^6$ PPI kuljum)<br>PPU – Prolyl Peptidase Units (Unitajiet tal-Prolilpeptidaži) jew Proline Protease Units (Unitajiet tal-Proteaži Prolina)<br>PPI – Protease Picomole International | | | |
| ▼M47 **Estratt ta' proteina mill-kliewi tal-qżieqeż** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | tliet kapsuli jew tliet pilloli/kuljum; li huma ugwali għal 12,6 mg ta' estratt mill-kliewi tal-qżieqeż kuljum kontenut ta' Diamine oxidase (DAO): 0,9 mg kuljum (tliet kapsuli jew tliet pilloli b'kontenut ta' DAO ta' 0,3 mg/kapsula jew 0,3 mg/pillola) | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M10 | | | | | |
| **Melħ tad-disodju pirrokinolina kinon** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Melħ tad-disodju tal-pirrolokinolina kinon"<br>Is-supplimenti tal-ikel li fihom il-Melħ tad-disodju tal-pirrolokinolina kinon għandu jkollhom d-dikjarazzjoni li ġejja:<br>Dan is-suppliment tal-ikel jenħtieġ li jiġi kkonsmat minn adulti biss, minbarra n-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu | | Awtorizzat fit-2 ta' Settembru 2018. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika proprjetarja u *data* xjentifika riżervata protetta skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc., Mitsubishi Building 5-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Il-Ġappun. Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid il-"Melħ tad-disodju tal-pirrolokinolina kinon" huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni biss mill-Mitsubishi tal-Gass Chemical Company, Inc., sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għal evidenza xjentifika proprjetarja jew *data* xjentifika riżervata protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Mitsubishi tal-Gass Chemical Company, Inc.<br>Id-data ta' tmiem tal-protezzjoni tad-*data*: it-2 ta' Settembru 2023. |
| | Is-Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u n-nisa li qegħdin ireddgħu | 20 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt tal-kolza li fih ħafna materja insaponifikabbli** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt taż-żejt tal-kolza" | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 1,5 g f'kull porzjon irrakkomandat għall-konsum ta' kuljum | | | |
| **Proteina taż-żejt tal-kolza** | Bħala sors ta' proteina veġetali fl-ikel minbarra fil-formula tat-trabi u fil-formula tal-prosegwiment | | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Proteina tal-kolza".<br>2. Kull oġġett tal-ikel li fih il-"proteina tal-kolza" għandu jġorr dikjarazzjoni li dan l-ingredjent jista' jikkawża reazzjoni allerġika fil-konsumaturi li huma allerġiċi għall-mustarda u għall-prodotti magħmulin biha. Fejn ikun rilevanti, din id-dikjarazzjoni għandha tidher qrib il-lista tal-ingredjenti. | | |

▼M17

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Konċentrat raffinat tal-peptidi tal-gambli** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "konċentrat raffinat tal-peptidi tal-gambli". | | Awtorizzat fl-20 ta' Novembru 2018. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika proprjetarja u *data* xjentifika proprjetarji protetti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: Marealis AS, Stortorget 1, Kystens Hus, 2nd floor, N-9008 Tromsø Indirizz postali: P.O. Box 1065, 9261 Tromsø, In-Norveġja. Matul |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta | 1 200 mg kuljum | | | |

▼M17

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data,* l-ikel ġdid "konċentrat raffinat tal-peptidi tal-gambli" huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni minn Marealis AS biss, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika proprjetarja protetta skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Marealis AS.<br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: l-20 ta' Novembru 2023. |
| ▼M56<br>***Trans*-resveratrolu** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Il-livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "*Trans*-resveratrolu".<br>2. It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom it-*trans*-resveratrolu għandu jkun fih dikjarazzjoni li min ikun qed jieħu l-mediċini għandu jikkonsma dan il-prodott biss taħt superviżjoni medika. | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni adulta. | 150 mg/kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trans-resveratrolu (mill-mikrobi)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "*Trans*-resveratrolu".<br>2. It-tikkettar ta' supplimenti tal-ikel li fihom it-trans-resveratrolu għandu jkollu dikjarazzjoni li persuni li jkunu qed jużaw xi mediċini għandhom jużaw il-prodott biss taħt superviżjoni medika. | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | Skont l-użu normali fis-supplimenti tal-ikel tar-resveratrolu mill-għeruq tal-poligonju tal-Ġappun (*Fallopia japonica*) | | | |
| **Estratt mill-għalla tas-serduq** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt mill-għalla tas-serduk" jew "Estratt mill-għalla tal-kapuċċell" | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib | 40 mg/100 g jew mg/100 ml | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib iffermentat | 80 mg/100 g jew mg/100 ml | | | |
| | Prodotti tat-tip jogurt | 65 mg/100 g jew mg/100 ml | | | |
| | *Ġobon frisk* | 110 mg/100 g jew mg/100 ml | | | |
| **Żejt tas-sacha inchi mill-*Plukenetia volubilis*** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt tas-sacha inchi (Plukenetia volubilis)" | | |
| | L-istess kif jintuża ż-żejt tal-kittien | Skont l-użu normali taż-żejt tal-kittien bħala ikel | | | |
| **Salatrimi** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "xaħam b'inqas kaloriji (salatrimi)".<br>2. Għandu jkun hemm dikjarazzjoni li tgħid li l-konsum eċċessiv jista' jwassal għal disturbi gastrointestinali.<br>3. Għandu jkun hemm dikjarazzjoni li tgħid li l-prodotti mhumiex maħsuba biex jintużaw mit-tfal. | | |
| | Prodotti tal-furnara u ħlewwiet | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żejt tas-*Schizochytrium sp.* li fih ħafna DHA u EPA** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku (DHA) u aċidu ejkosapentenojku (EPA) flimkien:* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt tal-mikroalgi" *Schizochytrium* sp. li fih ħafna DHA u EPA." | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u n-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu | 3 000 mg kuljum | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu | 450 mg kuljum | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 250 mg/ikla | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar | 200 mg/100 g | | | |
| | Ikel magħmul miċ-ċereali ipproċessat u ikel tat-trabi għat-trabi u t-tfal żgħar kif iddefiniti fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | | |
| | Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi | | | | |
| | Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | | | | |
| | Prodotti tal-furnara (Ħobżiet, Bziezen u Gallettini Ħelwin) | 200 mg/100 g | | | |
| | Ċereali tal-Kolazzjon | 500 mg/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Xaħmijiet għat-Tisjir | 360 mg/100 g | | | |
| | Analogi ta' Prodotti tal-Ħalib ħlief xarbiet | 600 mg/100 g għall-ġobon; 200 mg/100 g għall-prodotti tas-sojja u tal-ħalib tal-imitazzjoni (eskluż x-xarbiet) | | | |
| | Prodotti tal-Ħalib ħlief xarbiet magħmulin mill-ħalib | 600 mg/100 g għall-ġobon; 200 mg/100 g għall-prodotti tal-ħalib (fosthom il-ħalib, il-ġobon frisk u l-prodotti tal-jogurt; ħlief ix-xarbiet) | | | |
| | Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi analogi ta' prodotti tal-ħalib u xarbiet magħmulin mill-ħalib) | 80 mg/100 g | | | |
| | Bars Nutrittivi/taċ-Ċereali | 500 mg/100 g | | | |
| | Xaħam li Jiddellek u Taħwir tal-Ikel | 600 mg/100 g | | | |
| ▼M26 | | | | | |
| **Żejt tas- *Schizochytrium* sp. (ATCC PTA-9695)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt tal-mikroalgi *Schizochytrium* sp." | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib ħlief xarbiet magħmulin mill-ħalib | 200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet | 200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Xaħmiet li jiddelku u taħwir tal-ikel | 600 mg/100 g | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 500 mg/100 g | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 250 mg DHA kuljum għall-popolazzjoni ġenerali | | | |
| | | 450 mg DHA kuljum għan-nisa tqal u li jkunu qegħdin ireddgħu | | | |
| | Sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 250 mg/ikla | | | |

▼M26

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar | 200 mg/100 g | | | |
| | Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi | | | | |
| | Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Prodotti tal-furnara (ħobżiet, bziezen u galletini ħelwin) | 200 mg/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 500 mg/100 g | | | |
| | Xaħam għat-tisjir | 360 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi analogi ta' prodotti tal-ħalib u xarbiet magħmulin mill-ħalib) | 80 mg/100 ml | | | |
| | Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 200 mg/100 g | | | |
| | Purè tal-frott/tal-ħaxix | 100 mg/100 g | | | |
| ▼M68 | | | | | |
| Żejt tas-*Schizochytrium* sp.(FCC-3204) | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku (DHA)* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt tal-mikroalgi *Schizochytrium* sp.". | | |
| | Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | B'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsubin għall-popolazzjoni ġenerali l-fuq min 3 snin | 1 g kuljum | It-tikketti tas-supplimenti tal-ikel li fihom iż- zejt tas-*Schizochytrium* sp. (FCC-3204) għandu jkun fihom dikjarazzjoni li ma jistax jiġi kkunsmat min trabi u tfal żgħar taħt it-3 snin. | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M24 | | | | | |
| **Żejt tas- *Schizochytrium* sp.** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' DHA* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żejt tal-mikroalgi *Schizochytrium* sp." | | |
| | Prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet magħmula bil-ħalib | 200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet | 200 mg/100 g jew għall-analogi tal-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Xaħam li jiddellek u taħwir tal-ikel | 600 mg/100 g | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 500 mg/100 g | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 250 mg DHA kuljum għall-popolazzjoni ġenerali | | | |
| | | 450 mg DHA kuljum għan-nisa tqal u li jkunu qegħdin ireddgħu | | | |
| | Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 250 mg/ikla | | | |
| | Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar | 200 mg/100 g | | | |
| | Ikel biċ-ċereali u ikel tat-trabi pproċessat maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | | |
| | Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi | | | | |

▼M24

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) Nru 828/2014 | | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen, u gallettini ħelwin) | 200 mg/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 500 mg/100 g | | | |
| | Xaħam għat-tisjir | 360 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi analogi ta' prodotti tal-ħalib u xarbiet magħmulin bil-ħalib) | 80 mg/100 ml | | | |
| | Puree tal-frott/ħxejjex | 100 mg/100 g | | | |
| ▼M49 **Żejt tas-*Schizochytrium* sp. (T18)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "Żejt tal-mikroalgi *Schizochytrium* sp" | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib ħlief xarbiet magħmulin mill-ħalib | 200 mg/100 g jew għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib ħlief xarbiet | 200 mg/100 g jew għall-analogi għall-prodotti tal-ġobon 600 mg/100 g | | | |
| | Xaħam li jiddellek u taħwir tal-ikel | 600 mg/100 g | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 500 mg/100 g | | | |

▼M49

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Is-supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE | 250 mg DHA kuljum għall-popolazzjoni ġenerali | | | |
| | | 450 mg DHA kuljum għan-nisa tqal u li qegħdin ireddgħu | | | |
| | Sostituti tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 u sostituti ta' ikliet għall-kontroll tal-piż | 250 mg/ikla | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar | 200 mg/100 g | | | |
| | Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi | | | | |
| | Oġġetti tal-ikel li fuqhom ikollhom dikjarazzjonijet tan-nuqqas jew tal-preżenza mnaqqsa tal-glutina f'konformità mar-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont il-bżonnijiet nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsubin il-prodotti | | | |
| | Prodotti tal-furnara, (ħobżiet, bziezen u gallettini ħelwin) | 200 mg/100 g | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 500 mg/100 g | | | |

▼M49

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Xaħam għat-tisjir | 360 mg/100 g | | | |
| | Xarbiet mhux alkoħoliċi (inklużi analogi ta' prodotti tal-ħalib u xarbiet magħmulin mill-ħalib) | 80 mg/100 ml | | | |
| | Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |
| | Ikel ipproċessat biċ-ċereali u ikel tat-trabi maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 200 mg/100 g | | | |
| | Puree tal-frott/ħxejjex | 100 mg/100 g" | | | |
| ▼M61 | | | | | |
| **Żejt tas-*Schizochytrium* sp.(WZU477)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' aċidu dokosaeżaenojku* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom dan l-ikel għandha tkun "Żejt tal-mikroalgi *Schizochytrium* sp.". | | Awtorizzat fis-16 ta' Mejju 2021. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: Progress Biotech bv, Canaalstaete, Kanaalweg 33, 2903LR Capelle aan den Ijssel, in-Netherlands.<br>Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni minn Progress Biotech bv biss, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għal dak l-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika |
| | Formula tat-trabi u formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | F'konformità mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 | | | |

▼M61

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | proprjetarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Progress Biotech bv.<br><br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: is-16 ta' Mejju 2026. |
| ▼M54<br>**Bijomassa tal-ħmira li fiha s-selenju (*Yarrowia lipolytica*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "bijomassa tal-ħmira li fiha s-selenju (*Yarrowia lipolytica*)".<br><br>It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom il-bijomassa tal-ħmira li fiha s-selenju (*Yarrowia lipolytica*) għandu jkollu dikjarazzjoni li s-supplimenti tal-ikel ma għandhomx jiġu kkunsmati minn trabi u tfal taħt l-età ta' 4 snin/tfal taħt l-età ta' 7 snin/tfal taħt l-età ta' 11-il sena/tfal u adolexxenti taħt l-età ta' 18-il sena ([12]). | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE ([3]) minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal taħt l-età ta' erba' (4) snin. | 50 mg kuljum għal tfal minn 4 sa 6 snin, li jirriżulta f'10 µg ta' selenju kuljum<br><br>100 mg kuljum għal tfal minn 7 sa 10 snin, li jirriżulta f'20 µg ta' selenju kuljum<br><br>500 mg kuljum għal adoloxxenti minn 11 sa 17-il sena, li jirriżulta f'100 µg ta' selenju kuljum<br><br>800 mg kuljum għall-adulti, li jirriżulta f'160 µg ta' selenju kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M58 | | | | | |
| **il-melħ tas-sodju ta' 3'-Sijalillattożju (3'-SL)**<br><br>**(sors mikrobjali)** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi (espressi bħala 3'-Sijalillattożju)* | Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "melħ tas-sodju ta' 3'-Sijalillattożju".<br><br>It-tikketti tas-supplimenti tal-ikel li fihom il-melħ tas-sodju ta' 3'-Sijalillattożju għandu jkun fihom dikjarazzjoni li ma għandhomx jiġu kkunsmati:<br><br>(a) fil-jiem meta jittiekel ikel li jkun fih il-melħ tas-sodju ta' 3'-Sijalillattożju miżjud.<br><br>(b) mit-trabi u mit-tfal iż-żgħar | | Awtorizzat fit-18 ta' Frar 2021. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br><br>L-applikant: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, id-Danimarka. Sakemm idum il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel il-ġdid il-melħ tas-sodju ta' 3'-sijalillattożju huwa awtorizzat li jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni minn Glycom A/S biss, dment li ma jkunx hemm applikant sussegwenti li jikseb awtorizzazzjoni għal dan l-ikel il-ġdid mingħajr ma jirreferi għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika proprjetarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Glycom A/S.<br><br>Data tat-tmiem tal-protezzjoni tad-*data*: it-18 ta' Frar 2026. |
| | Prodotti tal-ħalib pasturizzati u prodotti tal-ħalib sterilizzati bla togħmiet miżjuda (fosthom prodotti UHT) | 0,25 g/L | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat b'togħmiet miżjuda, fosthom prodotti ttrattati bis-sħana | 0,25 g/L (xarbiet) | | | |
| | | 0,5 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Prodotti tal-ħalib iffermentat bla togħmiet miżjuda | 0,25 g/L (xarbiet) | | | |
| | | 2,5 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Xarbiet (xarbiet bit-togħmiet miżjuda, minbarra xarbiet b'pH ta' inqas minn 5) | 0,25 g/L | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 2,5 g/kg | | | |
| | Formula tat-trabi kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,2 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkummerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |
| | Formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,15 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkummerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |
| | Ikel biċ-ċereali u ikel tat-trabi pproċessat maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,15 g/L (xarbiet) fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkummerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |
| | | 1,25 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |
| | Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar | 0,15 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkummerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |
| | Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,5 g/L (xarbiet) | | | |
| | | 5 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |

▼M58

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE, minbarra l-ikel maħsub għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar | 0,5 g/kuljum | | | |
| ▼M57 | | | | | |
| **Il-melħ tas-sodju ta' 6'-Sijalillattożju (6'-SL)** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi (espressi bħala 6'-Sijalillattożju)* | Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "melħ tas-sodju ta' 6'-Sijalillattożju". | | Awtorizzat fis-17 ta' Frar 2021. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283. |
| **(sors mikrobjali)** | Prodotti tal-ħalib pasturizzati u prodotti tal-ħalib sterilizzati bla togħmiet miżjuda (fosthom prodotti UHT) | 0,5 g/L | It-tikketti tas-supplimenti tal-ikel li fihom il-melħ tas-sodju ta' 6'-Sijalillattożju (6'-SL) għandu jkun fihom dikjarazzjoni li ma għandhomx jiġu kkunsmati:<br>(a) fil-jiem meta jittiekel ikel li jkun fih il-melħ tas-sodju ta' 6'-Sijalillattożju miżjud.<br>(b) mit-trabi u mit-tfal iż-żgħar | | L-applikant: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, id-Danimarka. Sakemm idum il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel il-ġdid il-melħ tas-sodju ta' 6'-sijalillattożju huwa awtorizzat li jitqiegħed fis-suq fl-Unjoni minn Glycom A/S biss, dment li ma jkunx hemm applikant sussegwenti li jikseb awtorizzazzjoni għal dan l-ikel il-ġdid mingħajr ma jirreferi għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika proprjetarja protetta f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Glycom A/S.<br>Data tat-tmiem tal-protezzjoni tad-*data*: is-17 ta' Frar 2026. |
| | Prodotti tal-ħalib iffermentat bla togħmiet miżjuda | 0,5 g/L (xarbiet) | | | |
| | | 2,5 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Prodotti magħmulin mill-ħalib iffermentat b'togħmiet miżjuda, fosthom prodotti ttrattati bis-sħana | 0,5 g/L (xarbiet) | | | |
| | | 5,0 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Xarbiet (xarbiet bit-togħmiet miżjuda, minbarra xarbiet b'pH ta' inqas minn 5) | 0,5 g/L | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 5,0 g/kg | | | |
| | Formula tat-trabi kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,4 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkummerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |
| | Formula tal-prosegwiment kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,3 g/L fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkummerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |
| | Ikel biċ-ċereali u ikel tat-trabi pproċessat maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 0,3 g/L (xarbiet) fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkummerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |
| | | 2,5 g/kg għall-prodotti li mhumiex xarbiet | | | |

▼M57

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Xarbiet magħmulin bil-ħalib u prodotti simili maħsuba għat-tfal żgħar | 0,3 g/L (xarbiet) fil-prodott finali lest biex jiġi kkunsmat, ikkummerċjalizzat tali kwali jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur | | | |
| | Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 1,0 g/L (xarbiet) | | | |
| | | 10,0 g/kg (prodotti li mhumiex xarbiet) | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | Skont ir-rekwiżiti nutrittivi partikolari tal-persuni li għalihom huma maħsuba l-prodotti | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE, minbarra l-ikel maħsub għat-trabi u għat-tfal iż-żgħar | 1,0 g/kuljum | | | |

▼M22

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Il-ġulepp tas-*Sorghum bicolor* (L.) Moench**<br><br>**(Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | Mhux speċifikat | | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Ġulepp tas-Sorghum (*Sorghum bicolor*)" | | |

▼M9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata".<br><br>2. It-tikkettar ta' supplimenti tal-ikel li fihom l-estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata għandu jkollu dikjarazzjoni li tgħid li persuni li jkunu qegħdin jużaw xi mediċini jridu jikkunsmaw il-prodott biss taħt superviżjoni medika. | | |
| | Is-Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE (kapsuli, pirmli jew f'forma ta' trab) maħsubin għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u n-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu | 100 mg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt tas-sufara tal-qamħ li fih ħafna spermidina (*Triticum aestevium*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "estratt tas-sufara tal-qamħ li fih ħafna spermidina" | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsuba għall-popolazzjoni adulta, minbarra n-nisa tqal u n-nisa li jkunu qegħdin ireddgħu | Ekwivalent għal massimu ta' 6 mg kuljum ta' spermidina | | | |
| **Sukromalt** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Sukromalt".<br><br>2. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar għandu jkollha magħha indikazzjoni li l-prodott huwa sors ta' glukożju u ta' fruttożju. | | |
| | Mhux speċifikat | | | | |
| **Fibra mill-kannamiela** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | | | |
| | Ħobż | 8 % | | | |
| | Prodotti tal-furnara | 5 % | | | |
| | Prodotti ta' laħam u tal-muskoli | 3 % | | | |
| | Taħwir tal-ikel u ħwawar | 3 % | | | |
| | Ġobnijiet maħkuka | 2 % | | | |
| | Oġġetti tal-ikel speċjali tad-dieta | 5 % | | | |
| | Zlazi | 2 % | | | |
| | Xarbiet | 5 % | | | |
| ▼M50 | | | | | |
| **Zokkor miksub mill-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.)** | Mhux speċifikat | | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "zokkor miksub mill-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.)", "Glukożju miksub mill-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.)" jew "Fruttożju miksub mill-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.)", skont il-forma użata. | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt taż-żejt tal-ġirasol** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt taż-żejt tal-ġirasol" | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 1,1 g kuljum | | | |

▼M62

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Larva mnixxfa ta' *Tenebrio molito* (dudu tad-dqiq)** | *Il-Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li jkun fihom dan l-ikel għandha tkun "Larva mnixxfa ta' *Tenebrio molitor* (dudu tad-dqiq)".<br>2. It-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom il-larva mnixxfa ta' *Tenebrio molitor* (dudu tad-dqiq) għandu jkollu dikjarazzjoni li dan l-ingredjent jista' jikkawża reazzjonijiet allerġiċi għall-konsumaturi b'allerġiji magħrufa għall-krustaċji u l-prodotti tagħhom, u għall-akari tat-trab. Din id-dikjarazzjoni għandha tkun qrib il-lista tal-ingredjenti. | | Awtorizzat fit-22 ta' Ġunju 2021. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza xjentifika u *data* xjentifika proprjetarji protetti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br><br>Applikant: SAS EAP Group, 35 Boulevard du Libre Échange, 31650, Saint-Orens-de-Gameville, Franza.<br><br>Matul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq fl-Unjoni minn SAS EAP Group biss, sakemm applikant sussegwenti ma jiksibx l-awtorizzazzjoni għal dak l-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza xjentifika jew għad-*data* xjentifika proprjetarji protetti f'konformità mal-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' SAS EAP Group.<br><br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: it-22 ta' Ġunju 2026. |
| | Larva mnixxfa ta'*Tenebrio molitor,* sħiħa jew miżbuna | | | | |
| | Prodotti tal-proteina | 10 g/100 g | | | |
| | Gallettini | 10 g/100 g | | | |
| | Platti bbażati fuq il-legumi | 10 g/100 g | | | |
| | Prodotti bbażati fuq l-għaġin | 10 g/100 g | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Mikroalgi *Tetraselmis chuii* mnixxfa** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Mikroalgi *Tetraselmis chuii* mnixxfa" jew "Mikroalgi *T. chuii* mnixxfa"<br><br>Is-supplimenti tal-ikel li fihom il-mikroalgi *Tetraselmis chuii* mnixxfa għandu jkollhom fuqhom id-dikjarazzjoni li ġejja: "Fih ammonti negliġibbli ta' jodju" | | |
| | Zlazi | 20 % jew 250 mg kuljum | | | |
| | Imluħa speċjali | 1 % | | | |
| | Kondiment | 250 mg kuljum | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 250 mg kuljum | | | |
| ***Therapon barcoo*/ Scortum** | L-użu maħsub huwa eżatt bħal dak tas-salamun, jiġifieri l-preparazzjoni ta' prodotti tal-ħut u ikliet għat-tisjir, fosthom prodotti tal-ħut imsajrin, nejjin, affumikati u moħmija | | | | |
| **D-Tagatożju** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "D-Tagatożju".<br><br>2. It-tikkettar ta' kull prodott li jkollu livell ta' D-Tagatożju li jaqbeż il-15 g f'kull porzjon, u tax-xarbiet kollha li fl-istat aħħari tal-konsum ikun fihom aktar minn 1 % D-Tagatożju għandu jkollu fuqu dikjarazzjoni li tgħid li "l-konsum eċċessiv jista' jkollu effett lassattiv". | | |
| | Mhux speċifikat | | | | |

▼M49

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Estratt li fih ħafna tassifolina** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "Estratt li fih ħafna tassifolina" | | |
| | Jogurt abjad/Jogurt bil-frott(*) | 0,020 g/kg | | | |
| | Kefir(*) | 0,008 g/kg | | | |
| | Xorrox tal-butir(*) | 0,005 g/kg | | | |

▼M49

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Trab tal-ħalib(*) | 0,052 g/kg | | | |
| | Krema(*) | 0,070 g/kg | | | |
| | Krema qarsa(*) | 0,050 g/kg | | | |
| | Ġobon(*) | 0,090 g/kg | | | |
| | Butir(*) | 0,164 g/kg | | | |
| | Ħelu biċ-ċikkulata | 0,070 g/kg | | | |
| | Xarbiet mhux alkoħoliċi | 0,020 g/L | | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE maħsuba għall-popolazzjoni ġenerali, ħlief it-trabi, it-tfal żgħar u l-adoloxxenti taħt l-età ta' 14-il sena | 100 mg kuljum | | | |
| | (*) Meta jintuża fil-prodotti tal-ħalib, l-estratt li fih ħafna tassifolina ma jista' jissostitwixxi l-ebda kostitwent tal-ħalib, kompletament jew parzjalment | | | | |

▼M9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Trealożju** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | 1. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Trealożju" u għandha tintwera jew fuq it-tikketta tal-prodott jew fil-lista tal-ingredjenti tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu.<br>2. Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar għandu jkollha magħha indikazzjoni li "t-Trealożju huwa sors ta' glukożju". | | |
| | Mhux speċifikat | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M49 | | | | | |
| **Faqqiegħ ittrattat bil-UV (*Agaricus bisporus*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' vitamina $D_2$* | 1. Id-dežinjazzjoni fuq it-tikketta tal-ikel ġdid bħala tali jew tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "Faqqiegħ ittrattat bil-UV (*Agaricus bisporus*)".<br>2. Id-dežinjazzjoni fuq it-tikketta tal-ikel ġdid bħala tali jew tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun akkumpanjata minn indikazzjoni "intuża trattament b'dawl ikkontrollat biex jiżdiedu l-livelli ta' vitamina D" jew "intuża trattament b'dawl UV biex jiżdiedu l-livelli ta" vitamina $D_2$'. | | |
| | Faqqiegħ (*Agaricus bisporus*) | 20 µg ta' vitamina $D_2$/100 g piż frisk | | | |
| **Ħmira tal-furnara ttrattata bil-UV (*Saccharomyces cerevisiae*)** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' vitamina $D_2$* | Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minnu għandha tkun "Ħmira tal-vitamina D" jew "Ħmira tal-vitamina $D_2$" | | |
| | Ħobż u bziezen imħemmra bil-ħmira | 5 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| | Prodotti fini tal-forn li jkunu mħemmra bil-ħmira | 5 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| | Is-supplimenti tal-ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE | | | | |
| | Ħmira friska jew niexfa ppakkjata bil-lest biex tinħema d-dar | 45 µg/100 g għall-ħmira friska<br>200 µg/100 g għall-ħmira mnixxfa | 1. Id-dežinjazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel għandha tkun "Ħmira tal-vitamina D" jew "Ħmira tal-vitamina $D_2$".<br>2. It-tikkettar tal-ikel ġdid għandu jkollu fuqu dikjarazzjoni li l-oġġett tal-ikel hu maħsub biss għall-ħami u li ma jridx jittiekel nej.<br>3. It-tikkettar tal-ikel ġdid għandu jkollu fuqu struzzjonijiet għall-użu għall-konsumaturi finali sabiex ma tinqabiżx il-konċentrazzjoni massima ta' 5 µg/100 g ta' vitamina $D_2$ fil-prodotti finali li jinħmew id-dar. | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ħobż ittrattat bil-UV** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' vitamina $D_2$* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandu jkollha magħha d-dikjarazzjoni "fih il-vitamina D prodotta permezz ta' trattament bil-UV" | | |
| | Ħobż u bziezen imħemmra bil-ħmira (mingħajr affarijiet miżjuda fil-wiċċ) | 3 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| **Ħalib ittrattat bil-UV** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi ta' vitamina $D_3$* | 1. Id-denominazzjoni fuq it-tikketta tal-ikel ġdid għandha tkun "ittrattat bil-UV".<br>2. Meta l-ħalib ittrattat bir-radjazzjoni UV ikun fih ammont ta' vitamina D li jitqies li hu sinifikanti skont il-Punt 2 tal-Parti A tal-Anness XIII tar-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-denominazzjoni tat-tikkettar għandu jkollha magħha "fih il-vitamina D prodotta mit-trattament bir-radjazzjoni UV" jew "ħalib li fih il-vitamina D li tirriżulta mit-trattament bir-radjazzjoni UV". | | |
| | Il-ħalib sħiħ pasturizzat kif inhu ddefinit fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għall-konsum kif inhu | 5-32 µg/kg għall-popolazzjoni ġenerali minbarra t-trabi | | | |
| | Il-ħalib semixkumat pasturizzat kif inhu ddefinit fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 għall-konsum kif inhu | 1-15 µg/kg għall-popolazzjoni ġenerali mi9nbarra t-trabi | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M48 | | | | | |
| **Trab tal-faqqiegħ tal-vitamina $D_2$** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi tal-vitamina $D_2$* ([11]) | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel, għandha tkun "Trab tal-faqqiegħ trattat bil-UV li fih il-vitamina D" jew "trab tal-faqqiegħ trattat bil-UV li fih il-vitamina $D_2$"<br>It-tikkettar tas-supplimenti tal-ikel li fihom trab tal-faqqiegħ tal-vitamina $D_2$ għandu jagħti dikjarazzjoni li dawn m'għandhomx jiġu kkunsmati mit-trabi | | Awtorizzat fis-27 ta' Awwissu 2020. Din l-inklużjoni hija bbażata fuq evidenza u *data* xjentifiċi proprjetarji protetti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283.<br>Applikant: Oakshire Naturals, LP., PO Box 388 Kennett Square, Pennsylvania 19348, United States. Tul il-perjodu tal-protezzjoni tad-*data*, l-ikel ġdid tat-trab bil-faqqiegħ tal-vitamina $D_2$ huwa awtorizzat għat-tqegħid fis-suq tal-Unjoni biss minn Oakshire Naturals, LP., diment li applikant sussegwenti ma jiksibx awtorizzazzjoni għall-ikel ġdid mingħajr referenza għall-evidenza jew id-*data* xjentifiċi propretarji protetti skont l-Artikolu 26 tar-Regolament (UE) 2015/2283 jew bil-qbil ta' Oakshire Naturals, LP.<br>Id-data ta' tmiem il-protezzjoni tad-*data*: is-27 ta' Awwissu 2025. |
| | Ċereali tal-kolazzjon | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| | Ħobż u pastini mħemmra bil-ħmira | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| | Prodotti tal-qamħ u għeġejjen | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott jew minn taħlita ta' frott u ħaxix | 1,125 µg ta' vitamina $D_2$/100mL | | | |
| | Ħalib u prodotti tal-ħalib (għajr il-ħalib likwidu) | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g/1,125 µg ta' vitamina $D_2$/100mL (xarbiet) | | | |
| | Ġobon (għajr il-ġobon moxx, il-ġobon tar-rikotta u l-ġobon artab) | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| | Biċċiet u xarbiet sostituti tal-ikel | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g/1,125 µg ta' vitamina $D_2$/100mL (xarbiet) | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g/1,125 µg ta' vitamina $D_2$/100mL (xarbiet) | | | |
| | Analogi tal-laħam | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| | Sopop u brodijiet | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| | Ikliet ħfief estruži mill-ħaxix | 2,25 µg ta' vitamina $D_2$/100 g | | | |
| | Ikel għal Skopijiet Mediċi Speċjali kif definit skont ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 għajr dawk maħsuba għat-trabi | 15 µg kuljum | | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif definit fid-Direttiva 2002/46/KE maħsuba għall-popolazzjoni ġenerali għajr it-trabi | 15 µg kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| **Il-vitamina $K_2$ (menakwinon)** | Irid jintuża bi qbil mad-Direttiva 2002/46/KE, mar-Regolament (UE) Nru 609/2013 u/jew mar-Regolament (KE) Nru 1925/2006 | | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Menakwinon" jew "Vitamina $K_2$" | | |
| **Estratt tan-nuħħala tal-qamħ** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Estratt tan-Nuħħala tal-Qamħ" | L-"Estratt tan-Nuħħala tal-Qamħ" mhuwiex awtorizzat għas-suq bħala supplement tal-ikel jew bħala ingredjent ta' suppliment tal-ikel. Lanqas mhu permess li jinżied mal-formuli għat-trabi. | |
| | Birra u sostituti tagħha | 0,4 g/100 g | | | |
| | Ċereali lesti għall-ikel | 9 g/100 g | | | |
| | Prodotti tal-ħalib | 2,4 g/100 g | | | |
| | Meraq tal-frott u tal-ħaxix | 0,6 g/100 g | | | |
| | Soft drinks | 0,6 g/100 g | | | |
| | Preparazzjonijiet tal-laħam | 2 g/100 g | | | |

▼M45

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ksilo-oligosakkaridi** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* ([10]) | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Ksilo-oligosakkaridi" | | |
| | Ħobż abjad | 14 g/kg | | | |
| | Ħobż integrali | 14 g/kg | | | |
| | Ċereali tal-kolazzjon | 14 g/kg | | | |
| | Gallettini | 14 g/kg | | | |
| | Xarba tas-sojja | 3,5 g/kg | | | |
| | Jogurt ([9]) | 3,5 g/kg | | | |
| | Spreads tal-frott | 30 g/kg | | | |
| | Prodotti taċ-ċikkulata | 30 g/kg | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE għall-popolazzjoni adulta ġenerali | 2 g kuljum | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| ▼M30 | | | | | |
| Bijomassa tal-ħmira tal-*Yarrowia lipolytica* | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "bijomassa tal-ħmira tal-*Yarrowia lipolytica* meqruda bis-sħana" | | |
| | Is-Supplimenti tal-Ikel kif definiti fid-Direttiva 2002/46/KE, għajr is-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar | 6 g/kuljum għat-tfal minn għaxar snin 'il fuq, għall-adolexxenti u għall-popolazzjoni adulta ġenerali<br>3 g/kuljum għat-tfal ta' età bejn tlieta u disa' snin | | | |
| ▼M9 | | | | | |
| **Betaglukani mill-ħmira** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | Livelli massimi ta' betaglukani puri mill-ħmira (*Saccheromyces cerevisiae*) | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Betaglukani mill-ħmira (*Saccharomyces cerevisiae*)" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefinit fid-Direttiva 2002/46/KE, minbarra s-supplimenti tal-ikel għat-trabi u għat-tfal żgħar | 1,275 g/kuljum għal tfal ta' aktar minn 12-il sena u għall-popolazzjoni adulta ġenerali<br>0,675 g kuljum għal tfal ta' anqas minn 12-il sena | | | |
| | Sostituzzjoni tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 1,275 g kuljum | | | |
| | Ikel għal skopijiet mediċi speċjali kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 609/2013, minbarra l-ikel bi skopijiet mediċi speċjali maħsub għat-trabi u għat-tfal żgħar | 1,275 g kuljum | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-meraq tal-frott u/jew mill-ħxejjex fosthom il-meraq konċentrat u deidratat | 1,3 g/kg | | | |
| | Xarbiet bit-togħma tal-frott | 0,8 g/kg | | | |
| | Trab għall-preparazzjoni ta' xarbiet tal-kawkaw | 38,3 g/kg (trab) | | | |
| | Xarbiet oħrajn | 0,8 g/kg (lesti għax-xorb) | | | |
| | | 7 g/kg (trab) | | | |
| | Bars taċ-ċereali | 6 g/kg | | | |
| | Ċereali għall-kolazzjon | 15,3 g/kg | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ċereali istantanji għal kolazzjon sħun magħmulin minn qamħ sħiħ u b'ħafna fibra | 1,5 g/kg | | | |
| | Gallettini tat-tip cookie | 6,7 g/kg | | | |
| | Gallettini tat-tip kreker | 6,7 g/kg | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib | 3,8 g/kg | | | |
| | Prodotti tal-ħalib iffermentat | 3,8 g/kg | | | |
| | Analogi ta' prodotti tal-ħalib | 3,8 g/kg | | | |
| | Ħalib imnixxef/trab tal-ħalib | 25,5 g/kg | | | |
| | Sopop u taħlitiet tas-sopop | 0,9 g/kg (lesta biex tittiekel) | | | |
| | | 1,8 g/kg (ikkondensata) | | | |
| | | 6,3 g/kg (trab) | | | |
| | Ċikkulata u ħlewwiet | 4 g/kg | | | |
| | Bars jew trabijiet tal-proteini | 19,1 g/kg | | | |
| | Ġamm, marmellata u dlik ieħor magħmul mill-frott | 11,3 g/kg | | | |

▼M12

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Żeaksantina** | *Il-kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel il-ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "Żeaksantina" | | |
| | Supplimenti tal-ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | 2 mg kuljum | | | |

▼M9

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **L-pidolat taż-żingu** | *Kategorija tal-ikel speċifikat* | *Livelli massimi* | Id-denominazzjoni tal-ikel ġdid fuq it-tikkettar tal-oġġetti tal-ikel li fihom minn dan l-ikel għandha tkun "L-pidolat taż-żingu" | | |
| | Ikel kopert bir-Regolament (UE) Nru 609/2013 | 3 g kuljum | | | |
| | Xarbiet magħmulin mill-ħalib u xarbiet simili maħsuba għat-tfal żgħar | | | | |
| | Sostitut ta' ikla għall-kontroll tal-piż | | | | |
| | Ikel maħsub biex jagħmel tajjeb għall-użu ta' sforz muskolari qawwi, speċjalment għall-isportivi | | | | |

▼M9

| Ikel ġdid awtorizzat | Kundizzjonijiet li fihom jista' jintuża l-ikel ġdid | | Rekwiżiti tat-tikkettar speċifiċi oħrajn | Rekwiżiti oħrajn | ►M29 Protezzjoni tad-*Data* ◄ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Ikel li fuqu jkollu dikjarazzjoni dwar in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa tal-glutina skont ir-rekwiżiti tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 | | | | |
| | Supplimenti tal-Ikel kif iddefiniti fid-Direttiva 2002/46/KE | | | | |

([1]) Ir-Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35).

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 828/2014 tat-30 ta' Lulju 2014 dwar ir-rekwiżiti għall-għoti ta' informazzjoni lill-konsumaturi rigward in-nuqqas jew il-preżenza mnaqqsa ta' glutina fl-ikel (ĠU L 228, 31.7.2014, p. 5).

([3]) Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta' Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-supplimenti tal-ikel (ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51).

([4]) Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta' vitamini u minerali u ta' ċerti sustanzi oħra mal-ikel (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26)

([5]) Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/113/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 li għandha x'taqsam mal-ġamm tal-frott, il-ġelatini u l-marmellati u mal-purejiet tal-qastan mogħtija l-ħlewwa maħsuba għal konsum mill-bniedem (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 67)

([6]) Ir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).

►M32 ([7]) Il-livelli massimi tal-użu fil-prodott finali lest għall-użu, ikkummerċjalizzat kif inhu jew rikostitwit skont l-istruzzjonijiet tal-manifattur. ◄

►M44 ([8]) Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE tal-20 ta' Diċembru 2001 li tirrigwarda l-meraq tal-frott u ċerti prodotti simili maħsuba għall-konsum uman (ĠU L 10, 12.1.2002, p. 58). ◄

►M45 ([9]) Meta jintużaw fil-prodotti tal-ħalib, il-ksilo-oligosakkaridi ma għandhom jissostitwixxu l-ebda kostitwent tal-ħalib, kompletament jew parzjalment

([10]) Il-livelli massimi kkalkulati abbażi tal-ispeċifikazzjonijiet għall-Forma ta' trab 1. ◄

►M48 ([11]) Tintuża l-ispeċifikazzjoni minima għall-kontenut tal-vitamina D fit-trab tal-faqqiegħ tal-vitamina $D_2$ ta' 1 000 µg ta' vitamina $D_2$/gramma ta' trab tal-faqqiegħ. ◄

([12]) Skont il-grupp tal-età li jkun maħsub għalih is-suppliment tal-ikel.

**Tabella 2: Speċifikazzjonijiet**

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Aċidu *N*-Aċetil-D-newramminiku** | **Deskrizzjoni:** |
| | Aċidu *N*-Aċetil-D-newramminiku huwa trab kristallin abjad għal abjad miksur |
| | **Definizzjoni:** |
| | **Isem kimiku:** |
| | Ismijiet tal-IUPAC: |
| | Aċidu *N*-Aċetil-D-newramminiku (diidrat) |
| | Aċidu 5-Aċetammid-3,5-dideossi-D-gliċero-D-galatto-non-2-ulopiranosoniku (diidrat) |
| | Sinonimi: |
| | Aċidu sialiku (diidrat) |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Formula kimika**<br>$C_{11}H_{19}NO_9$ (aċidu)<br>$C_{11}H_{23}NO_{11}$ ($C_{11}H_{19}NO_9$ * $2H_2O$) (diidrat)<br>**Massa molekolari:**<br>309,3 Da (aċidu)<br>345,3 (309,3 + 36,0) (diidrat)<br>**Nru CAS:**<br>131-48-6 (aċidu liberu)<br>50795-27-2 (diidrat)<br>**Speċifikazzjonijiet:**<br>Deskrizzjoni: trab kristallin ta' lewn abjad għal abjad miksur<br>pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %): 1,7 – 2,5<br>Aċidu *N*-Aċetil-D-newramminiku (diidrat): > 97,0 %<br>Ilma (id-diidrat jagħmel 10,4 %): ≤ 12,5 % (w/w)<br>Rmied, issulfat: < 0,2 % (w/w)<br>Aċidu aċetetiku (bħala aċidu liberu u/jew aċetat tas-sodju): < 0,5 % (w/w)<br>**Metalli Tqal:**<br>Ħadid: < 20,0 mg/kg<br>Ċomb: < 0,1 mg/kg<br>Proteini residwi: < 0,01 % (w/w)<br>**Solventi residwi:**<br>2-Propanol: < 0,1 % (w/w)<br>Aċeton: < 0,1 % (w/w)<br>Aċetat tal-etil: < 0,1 % (w/w)<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>*Salmonella:* Assenti f'25 g<br>Għadd totali ta' aerobiċi mežofiliċi: < 500 CFU/g |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Enterobacteriacae: Assenti f'10 g<br>*Cronobacter (Enterobacter) sakazakii:* Assenti f'10 g<br>*Listeria monocytogenes:* Assenti f'25 g<br>*Bacillus cereus:* < 50 CFU/g<br>Ħmejjer: < 10 CFU/g<br>Mofof: < 10 CFU/g<br>Endotossini residwi: < 10 EU/mg<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw Kolonji; EU: Unitajiet Endotossini. |
| ***Adansonia digitata* polpa tal-frott imnixxef tal-(Baobab)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-frott tal-Baobab (*Adansonia digitata*) jinħasad mis-siġar. Il-qxur ibsin jinqasmu u l-polpa titneħħa minn maż-żerriegħa u minn mal-qoxra. Din tintaħan u tiġi sseparata f'lottijiet ta' polpa ħoxna u polpa fina (id-daqs tal-partikoli bejn 3 u 600 µ) imbagħad tiġi ppakkjata.<br>**Komponenti nutrittivi tipiċi:**<br>Ndewwa (telf mit-tnixxif) (g/100 g): 4,5-13,7<br>Proteina (g/100 g): 1,8-9,3<br>Xaħam (g/100 g): 0-1,6<br>Karboidrati totali (g/100 g): 76,3-89,5<br>Zokkor totali (fl-għamla ta' glukożju): 15,2-36,5<br>Sodju (g/100 g): 0,1-25,2<br>**Speċifikazzjonijiet analitiċi:**<br>Materjal barrani: Mhux aktar minn 0,2 %<br>Ndewwa (telf mit-tnixxif) (g/100 g): 4,5-13,7<br>Rmied (g/100 g): 3,8-6,6 |
| **Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli ta' *Ajuga reptans*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-estratt idroalkoħoliku mit-tessut ta' kolturi tal-*Ajuga reptans* L. li hu ekwivalent sostanzjali tal-estratti mill-partijiet 'il fuq mill-ħamrija li jwarrdu tal-*Ajuga reptans* li jinkisbu mill-kolturi tradizzjonali. |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **L-Alanil-L-Glutammina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-Glutammina L-Alanil-L tiġi prodotta permezz tal-fermentazzjoni b'razza tal-*Escherichia coli* ġenetikament modifikata. Waqt il-proċess tal-fermentazzjoni, l-ingredjent inixxi fil-medium tat-tkabbir imbagħad jiġi sseparat minn dan u jiġi ppurifikat sa konċentrazzjoni ta' > 98 %.<br>Dehra: Trab kristallin abjad<br>Purità: > 98 %<br>Spettometrija infraħamra: Konformità mal-istandard ta' referenza<br>Dehra tas-soluzzjoni: Bla kulur u lučidu<br>Assaġġ (niexef): 98-102 %<br>Sostanzi relatati (individwalment): ≤ 0,2 %<br>Residwu mat-tqabbid: ≤ 0,1 %<br>Telf mat-tnixxif: ≤ 0,5 %<br>Rotazzjoni ottika: +9,0 - +11,0°<br>pH (1 %; $H_2O$): 5,0-6,0<br>Ammonju ($NH_4$): ≤ 0,020 %<br>Klorur (Cl): ≤ 0,020 %<br>Sulfat ($SO_4$): ≤ 0,020 %<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>*Escherichia coli*: Assenza/g |
| **Żejt tal-alga miksub mill-mikroalgi *Ulkenia* sp.** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Żejt mill-mikroalgi *Ulkenia* sp.<br>Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg żejt<br>Ndewwa u volatili: ≤ 0,05 %<br>Materjal insaponifikabbli: ≤ 4,5 %<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %<br>Kontenut ta' DHA: ≥ 32 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M25 | |
| **Żejt taż-żerriegħa tal- *Allanblackia*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>iż-żejt taż-żerriegħa tal-*Allanblackia* jinkiseb miż-żerriegħa tal-ispeċi *allanblackia*: *A. floribunda* (sinonima ma' *A. parviflora*) u *A. stuhlmannii*.<br>**Kompożizzjoni tal-aċidi xaħmin (bħala % tat-total tal-aċidi xaħmin):**<br>Aċidu lawriku - Aċidu miristiku - Aċidu palmitiku (C12:0 – C14:0 – C16:0): is-somma ta' dawn l-aċidi < 4,0 %<br>Aċidu steariku (C18:0): 45-58 %<br>Aċidu olejku (C18:1): 40-51 %<br>Aċidi xaħmin poliinsaturati: < 2 %<br>**Karatteristiki:**<br>Aċidi xaħmin ħielsa: massimu 0,1 % tal-aċidi xaħmin totali<br>Aċidi xaħmin trans: massimu 1,0 % tal-aċidi xaħmin totali<br>Valur tal-perossidu: massimu 1,0 meq/kg<br>Materjal insaponifikabbli: massimu 1,0 % (w/w) taż-żejt<br>Valur tas-saponifikazzjoni: 185-198 mg KOH/g |
| ▼M9 | |
| **Estratt tal-werqa tal-*Aloe macroclada* Baker** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Estratt ġel f'għamla ta' trab li jinkiseb mill-weraq tal-*Aloe macroclada* Baker li hu ekwivalent sostanzjali tal-istess ġel li jinkiseb mill-weraq tal-*Aloe vera* (L.) Burm.f.<br>Rmied: 25 %<br>Fibra: 28,6 %<br>Xaħam: 2,7 %<br>Ndewwa: 4,7 %<br>Polisakkaridi: 9,5 %<br>Proteina: 1,63 %<br>Glukożju: 8,9 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M23<br><br>**Żejt tal-Krill tal-Antartiku mill-*Euphausia superba*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br><br>Biex jiġi prodott l-estratt tal-lipidi mill-Krill tal-Antartiku (*Euphausia superba*), il-krill mgħaffeġ iffriżat jew id-dqiq tal-krill imnixxef jgħaddi minn proċess ta' estrazzjoni tal-lipidi permezz ta' solvent tal-estrazzjoni approvat (skont id-Direttiva 2009/32/KE). Il-proteini u l-materjal tal-krill jitneħħew mill-estratt tal-lipidi permezz tal-filtrazzjoni. Is-solventi tal-estrazzjoni u l-ilma residwu jitneħħew bl-evaporazzjoni.<br><br>Il-valur tas-saponifikazzjoni: ≤ 230 mg KOH/g<br><br>Il-valur tal-perossidu (PV): ≤ 3 meq $O_2$/kg żejt<br><br>Stabbiltà f'kundizzjonijiet ta' ossidazzjoni: Jenħtieġ li l-prodotti tal-ikel kollha li fihom iż-żejt tal-Krill tal-Antartiku mill-*Euphausia superba* juru li huma stabbli f'kundizzjonijiet ta' ossidazzjoni permezz ta' metodoloġiji tal-ittestjar xierqa u rikonoxxuti nazzjonalment jew internazzjonalment (eż. l-AOAC).<br><br>Ndewwa u volatili: ≤ 3 % jew 0,6 espressi bħala attività tal-ilma f'temperatura ta' 25 °C<br><br>Fosfolipidi: ≥ 35 % sa < 60 %<br><br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1 %<br><br>EPA (aċidu ejkosapentenojku): ≤ 9 %<br><br>DHA (aċidu dokosaeżaenojku): ≤ 5 % |
| ▼M9<br><br>**Żejt tal-Krill tal-Antartiku li fih ħafna fosfolipidi miksub mill-*Euphasia superba*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br><br>Iż-żejt li fih ħafna fosfolipidi jinkiseb mill-krill tal-Antartiku (*Euphasia superba*) permezz ta' ħasil imtenni b'solventi approvati (skont id-Direttiva 2009/32/KE) biex jinżied il-kontenut ta' fosfolipidi fiż-żejt. Is-solventi jitneħħew mill-prodott finali permezz tal-evaporazzjoni.<br><br>Valur tas-saponifikazzjoni: ≤ 230 mg KOH/g<br><br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 3 meq $O_2$/kg żejt<br><br>Ndewwa u volatili: ≤ 3 % jew 0,6 espressi bħala attività tal-ilma f'temperatura ta' 25 °C<br><br>Fosfolipidi: ≥ 60 %<br><br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1 %<br><br>EPA (aċidu ejkosapentenojku): ≥ 9 %<br><br>DHA (aċidu dokosaeżaenojku): ≥ 5 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Żejt li fih ħafna aċidu arakidoniku miksub mill-fungus *Mortierella alpina*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żejt luċidu u isfar li fih ħafna aċidu arakidoniku jinkiseb permezz tal-fermentazzjoni tar-razez IS-4, I49-N18, FJRK-MA01 u CBS 210.32 mhux ġenetikament modifikat tal-faqqiegħ *Mortierella alpina* bl-użu ta' likwidu adattat. Imbagħad iż-żejt jinħareġ mill-bijomassa u jiġi ppurifikat.<br>Aċidu arakidoniku: ≥ 40 % skont il-piż tal-kontenut totali ta' aċidu xaħmi<br>Aċidi xaħmin liberi: ≤ 0,45 % tal-kontenut totali ta' aċidu xaħmi<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 0,5 % tal-kontenut totali ta' aċidu xaħmi<br>Materja insaponifikabbli: ≤ 1,5 %<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5 meq/kg<br>Valur tal-anisidin: ≤ 20<br>Valur aċiduż: ≤ 1,0 KOH/g<br>Ndewwa: ≤ 0,5 % |
| **Żejt tal-Argan mill-*Argania spinosa*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żejt tal-argan jinkiseb permezz tal-ippressar kiesaħ tal-qlub tal-frott tal-*Argania spinosa* (L.) Skeels, li jixbħu l-lewż. Il-qlub jistgħu jinħmew qabel ma jiġu ppressati, iżda mingħajr ma jkollhom kuntatt dirett mal-fjamma.<br>**Kompożizzjoni:**<br>Aċidu palmitiku (C16:0): 12-15 %<br>Aċidu stearikuu (C18:0): 5-7 %<br>Aċidu olejku (C18:1): 43-50 %<br>Aċidu linolejku (C18:2): 29-36 %<br>Materja insaponifikabbli: 0,3-2 %<br>Ammont totali ta' steroli: 100-500 mg/100 g<br>Tokoferoli totali: 16-90 mg/100 g<br>Aċidità oleika: 0,2-1,5 %<br>Valur tal-perossidu (PV): < 10 meq $O_2$/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Oleoreżina li fiha ħafna astaksantina mill-alga *Haematococcus pluvialis*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Astaksantina hija karotenojde li tiġi prodotta mill-alga *Haematococcus pluvialis*. Il-metodi tal-produzzjoni għat-tkabbir tal-alga jvarjaw; jistgħu jintużaw jew sistemi magħluqin esposti għad-dawl tax-xemx; jew għal dawl artifiċjali kkontrollat b'mod strett, inkella jistgħu jintużaw vaski miftuħin. Iċ-ċelloli tal-alga jinħasdu u jitnixxfu; l-oleoraża tiġi estratta bl-użu ta' $CO_2$ superkritiku jew bl-użu ta' solvent (aċetat etiliku). Astaksantina tiġi dilwita u standardizzata għal 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % jew 20 % bl-użu taż-żejt taż-żebbuġa, żejt tal-għosfor, żejt tal-ġirasol jew bl-użu ta' trigliċeridi b'katina medja (MCT).<br>**Il-kompożizzjoni tal-Oleoraża:**<br>Xaħam: 42,2- 99 %<br>Proteina: 0,3-4,4 %<br>Karboidrat: 0-52,8 %<br>Fibra: < 1,0 %<br>Rmied: 0,0-4,2 %<br>Speċifikazzjoni tal-Karotenojdi w/w%<br>Astaksantini totali: 2,9-11,1 %<br>9-ċis-astaksantina: 0,3-17,3 %<br>13-ċis-astaksantina: 0,2-7,0 %<br>Monoesteri tal-astaksantina: 79,8-91,5 %<br>Diesteri tal-astaksantina: 0,16-19,0 %<br>B-Karotina: 0,01-0,3 %<br>Lutejna: 0-1,8 %<br>Kantaksantina: 0-1,30 %<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Batterji aerobiċi totali: < 3 000 CFU/g<br>Ħmira u Moffa: < 100 CFU/g<br>Koliformi: < 10 CFU/g<br>*E. coli*: Negattiv<br>*Salmonella*: Negattiv<br>*Staphylococcus*: Negattiv |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Żerriegħa tal-ħabaq (*Ocimum basilicum*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-ħabaq (*Ocimum basilicum* L.) jappartjeni għall-familja "*Lamiaceae*" fl-ordni "Lamiales". Wara l-ħsad, iż-żrieragħ jitnaddfu b'mod mekkaniku. Il-fjuri, il-weraq u l-partijiet l-oħra tal-pjanta jitneħħew. L-ogħla livell ta' purità taż-żerriegħa tal-ħabaq irid jiġi żgurat permezz tal-iffiltrar (ottiku, mekkaniku). Il-proċess tal-produzzjoni ta' xarbiet tal-meraq tal-frott u ta' taħlitiet ta' meraq tal-frott u tal-ħaxix li fihom iż-żerriegħa tal-ħabaq (*Ocimum basilicum* L.) jinvolvi l-idratazzjoni minn qabel u l-pasturizzazzjoni taż-żerriegħa. Hemm fis-seħħ kontrolli mikrobijoloġiċi u sistemi ta' monitoraġġ.<br>Materja Niexfa: 94,1 %<br>Proteina: 20,7 %<br>Xaħam: 24,4 %<br>Karboidrat: 1,7 %<br>Fibra: 40,5 % (Metodu: AOAC 958.29)<br>Rmied: 6,78 % |
| ▼M32<br>**Betaina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-betaina (N,N,N-trimetilgliċina jew karbossi-N,N,N-trimetilmetanamminju), f'għamla ta' anidru $(CH_3)_3N^+CH_2COO^-$ (Nru tas-CAS: 107-43-7) u ta' monoidrat $(CH_3)3N^+CH_2COO^-.H_2O$ (Nru tas-CAS: 590-47-6) tinkiseb mill-ipproċessar tal-pitravi zokkrija (jiġifieri l-melassa, il-vinassa jew il-betaina-gliċerol).<br>**Karatteristiki/Kompożizzjoni**<br>Dehra: Kristalli bojod li jiċċirkolaw b'mod ħieles<br>Betaina: ≥ 99,0 % (w/w fuq bażi ta' piż xott)<br>Indewwa: ≤ 2,0 % (anidru); ≤ 15,0 % (monoidrat)<br>Irmied: ≤ 0,1 %<br>pH: 5,0-7,0<br>Proteini residwi: ≤ 1,0 mg/g<br>**Metalli tqal:**<br>Arseniku: < 0,1 mg/kg<br>Merkurju: < 0,005 mg/kg<br>Kadmju: < 0,01 mg/kg<br>Ċomb: < 0,05 mg/kg |

▼M32

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br><br>Għadd vijabbli totali: ≤ 100 CFU/g<br><br>Koliformi: Negattiv/10 g<br><br>*Salmonella* sp.: Negattiv/25 g<br><br>Ħmira: ≤ 10 CFU/g<br><br>Moffa: ≤ 10 CFU/g<br><br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji. |
| ▼M9<br>**Estratt iffermentat tal-fażola sewda** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br><br>L-estratt tal-fażola sewda ffermentata (estratt Touchi) huwa trab fin kannella ċar li fih ħafna proteina u jinkiseb bl-estrazzjoni tal-ilma minn fażola tas-sojja żgħira (*Glycine max (L.) Merr.*) iffermentata bl-*Aspergillus oryzae*. L-estratt fih inibitur α-glukosidaži.<br><br>**Karatteristiċi:**<br><br>Xaħam: ≤ 1,0 %<br><br>Proteina: ≥ 55 %<br><br>Ilma: ≤ 7,0 %<br><br>Rmied: ≤ 10 %<br><br>Karboidrat: ≥ 20 %<br><br>Attività inibitorja tal-α-glukosidaži: IC50 minimu 0,025 mg/ml<br><br>Isoflavun tas-sojja: ≥ 0,3 g/100 g |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Lattoferrina bovina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-lattoferrina bovina hija proteina li tokkorri b'mod naturali fil-ħalib tal-baqar. Din hija glikoproteina ferroleganti, ta' madwar 77 kDa, u tikkonsisti minn katina waħda ta' polipeptidi ta' 689 aċidu amminiku.<br>Il-proċess tal-produzzjoni: Il-lattoferrina bovina tiġi iżolata mill-ħalib xkumat jew mill-ġobon moxx permezz ta' skambju joniku u stadji sussegwenti ta' ultrafiltrazzjoni. Fl-aħħar nett din titnixxef jew b'mod lijofilizzat jew b'atomizzazzjoni u l-partikoli kbar jintgħarblu. Dan huwa trab fir-roża ċar prattikament bla riħa.<br>**Il-proprjetajiet fiżikokimiċi tal-lattoferrina bovina:**<br>Ndewwa: < 4,5 %<br>Rmied: < 1,5 %<br>Arseniku: < 2,0 mg/kg<br>Ħadid: < 350 mg/kg<br>Proteina: > 93 %<br>li minnhom il-lattoferrina bovina: > 95 %<br>li minnhom proteini oħrajn: < 5,0 %<br>pH (2 % ta' soluzzjoni, 20 °C): 5,2-7,2<br>Solubbiltà (2 % ta' soluzzjoni, 20 °C): sħiħa |

▼M34

| | |
|---|---|
| **Iżolat tal-proteini bażiċi tax-xorrox tal-ħalib bovin** | **Deskrizzjoni**<br>L-iżolat tal-proteini bażiċi tax-xorrox tal-ħalib bovin huwa trab griż safrani miksub mill-ħalib xkumat bovin permezz ta' sensiela ta' passi ta' iżolament u ta' purifikazzjoni.<br>**Karatteristiki/Kompożizzjoni**<br>Proteina totali (w/w tal-prodott): ≥ 90 %<br>Laktoferrin (w/w tal-prodott): 25-75 %<br>Laktoperossidaži (w/w tal-prodott): 10-40 %<br>Proteini oħra (w/w tal-prodott): ≤ 30 %<br>TGF-β2: 12-18 mg/100 g<br>Indewwa: ≤ 6,0 %<br>pH (5 % soluzzjoni w/v): 5,5 – 7,6 |

▼M34

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Lattożju: ≤ 3,0 %<br>Xaħam: ≤ 4,5 %<br>Irmied: ≤ 3,5 %<br>Ħadid: ≤ 25 mg/100 g<br>**Metalli Tqal**<br>Ċomb: < 0,1 mg/kg<br>Kadmju: < 0,2 mg/kg<br>Merkurju: < 0,6 mg/kg<br>Arseniku: < 0,1 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd ta' batterji mežofiliċi aerobiċi: ≤ 10 000 CFU/g<br>*Enterobacteriaceae*: ≤ 10 CFU/g<br>*Escherichia coli*: Negattiv/g<br>*Staphylococci* pożittiv koagulant: Negattiv/g<br>*Salmonella*: Negattiv/25 g<br>*Listeria*: Negattiv/25 g<br>*Cronobacter* spp.: Negattiv/25 g<br>Moffa: ≤ 50 CFU/g<br>Ħmira: ≤ 50 CFU/g<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Żejt taż-żerriegħa tal-*Buglossoides arvensis*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żejt raffinat tal-Buglossoides huwa estratt miż-żerriegħa tal-*Buglossoides arvensis* (L) I.M.Johnst<br>Aċidu alfa-linoleniku: ≥ 35 % w/w tat-total ta' aċidi xaħmin<br>Aċidu stearidoniku: ≥ 15 % w/w tat-total ta' aċidi xaħmin<br>Aċidu linoleiku: ≥ 8,0 % w/w tat-total ta' aċidi xaħmin<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 2,0 % tat-total ta' aċidi xaħmin |


▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Valur aċiduż: ≤ 0,6 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq $O_2$/kg<br>Kontenut insaponifikabbli: ≤ 2,0 %<br>Kontenut ta' proteini (total ta' nitroġenu): ≤ 10 µg/ml<br>Alkalojdi pirroliżidiniċi: Mhux traċċabbli b'limitu ta' detezzjoni ta' 4,0 µg/kg |
| **Żejt tal-*Calanus finmarchicus*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Dan l-ikel ġdid lewn ir-rubini, huwa żejt kemxejn viskuż b'riħa ħafifa ta' frott tal-baħar, li jiġi estratt mill-krustaċju (żooplankton marin) *Calanus finmarchicus*. L-ingredjent jikkonsisti primarjament minn esteri tax-xama' (> 85 %) b'am monti żgħar ta' trigliċeridi u lipidi newtrali oħrajn.<br>**Speċifikazzjonijiet:**<br>Ilma: < 1,0 %<br>Esteri tax-xama': > 85 %<br>Total ta' aċidi xaħmin: > 46 %<br>Aċidu ejkosapentenojku (EPA): > 3,0 %<br>Aċidu dokosaeżaenojku (DHA): > 4,0 %<br>Total ta' alkoħol xaħmi: > 28 %<br>C20:1 n-9 alcoħol xaħmi: > 9,0 %<br>C22:1 n-11 alcoħol xaħmi: > 12 %<br>Aċidi xaħmin trans: < 1,0 %<br>Esteri tal-astaksantina: < 0,1 %<br>Valur tal-perossidu (PV): < 3,0 meq. $O_2$/kg |

▼M66

| | |
|---|---|
| **L-Metilfolat tal-Kalċju** | **Deskrizzjoni:**<br>L-ikel il-ġdid huwa prodott permezz ta' sinteżi kimika li tibda mill-aċidu foliku.<br>Huwa trab kristallin ta' lewn abjad għal safrani ċar, kważi bla riħa, ftit li xejn solubbli fl-ilma u kemxejn solubbli jew insolubbli fil-biċċa l-kbira tas-solventi organiċi. |

▼M66

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Definizzjoni:**<br>Formula kimika: $C_{20}H_{23}CaN_7O_6$<br>Isem sistematiku: N-{4-[[((6S)-2-ammino-1,4,5,6,7,8-eżaidro-5-metil-4-osso-6-pteridinil)metil]ammino]benżoil}-L-aċidu glutammiku, melħ tal-kalċju.<br>Numru CAS: 129025-21-4 (Melħ tal-kalċju bi proporzjon mhux speċifikat ta' L-5-MTHF/$Ca^{2+}$) u 151533-22-1 (Melħ tal-kalċju bi proporzjon speċifikat 1:1 ta' L-5-MTHF/$Ca^{2+}$).<br>Piż molekulari: 497.5 Daltons<br>Sinonimi: L-Metilfolat, kalċju; Aċidu L-5-metiltetraidrofoliku, melħ tal-kalċju [(L-5-MTHF-Ca)]; aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku, melħ tal-kalċju [(6S)-5-MTHF-Ca]; aċidu (6S)-5-metil-5,6,7,8-tetraidropterojl-L-glutamiku, melħ tal-kalċju, u aċidu L-5-metil-tetraidrofoliku (L-5-MTHF) mingħajr il-katjon speċifiku.<br>Formula strutturali:<br><br>**Karatteristiċi**<br>Purità: > 95 % (Bażi niexfa)<br>L-ilma: ≤ 17,0 %<br>Kalċju (fuq bażi anidra u ħielsa minn solventi): 7,0 – 8,5 %<br>D metilfolat tal-kalċju (6R αS isomeru): ≤ 1,0 % |

▼M66

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Folat u sustanzi relatati oħra: ≤ 2,5 % |
| | Etanol: ≤ 0,5 % |
| | Ċomb: ≤ 1 mg/kg |
| | Il-boron: ≤ 10 mg/kg |
| | Kadmju: ≤ 0,5 mg/kg |
| | Merkurju: ≤ 1,0 mg/kg |
| | Arseniku ≤ 1,5 mg/kg |
| | Platinu ≤ 2 mg/kg |
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:** |
| | Għadd totali tal-batterji aerobiċi vijabbli: ≤ 1 000 UJK/g |
| | Għadd ta' ħmira u moffa totali: ≤ 100 UJK/g |
| | CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Baži taċ-ċuwingamm (glikol tal-monometossipolietilen)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:** |
| | L-ingredjent ġdid tal-ikel huwa polimeru sintetiku (In-numru tal-privattiva WO2006016179). Jikkonsisti f'polimeri bi friegħi ta' glikol tal-monometossipolietilen (MPEG) ittrapjantanti fuq poliisopren-graft-anidrid malejku (PIG-g-MA), u ta' MPEG li ma jkunx irreaġixxa (inqas minn 35 % skont il-piż). |
| | Lewn abjad għal abjad miksur. |
| | Nru CAS: 1246080-53-4 |
| | **Karatteristiċi:** |
| | Ndewwa: < 5,0 % |
| | Aluminju: < 3,0 mg/kg |
| | Litju: < 0,5 mg/kg |
| | Nikil: < 0,5 mg/kg |
| | Anidride residwu: < 15 μmol/g |
| | Indiċi tal-polidispersità: < 1,4 |
| | Isoprin: < 0,05 mg/kg |
| | Ossidu tal-etilen: < 0,2 mg/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Anidride malejka ħielsa: < 0,1 %<br>Total ta' oligomeri (inqas minn 1 000 Dalton): ≤ 50 mg/kg<br>Glikol tal-etilen: < 200 mg/kg<br>Glikol tad-dietilen: < 30 mg/kg<br>Monoetilen glikol metil etere: < 3,0 mg/kg<br>Dietilen glikol metil etere: < 4,0 mg/kg<br>Trietilen glikol-metil-etere: < 7,0 mg/kg<br>1,4-Dijoksan: < 2,0 mg/kg<br>Formaldeid: < 10 mg/kg |
| **Baži taċ-ċuwingamm (Kopolimeru tal-metil-vinil-etere u tal-anidride malejka)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-kopolimeru tal-metil-vinil-etere u tal-anidride malejka huwa kopolimeru anidru tal-metil-vinil-etere u tal-anidride malejka.<br>Trab ġieri, abjad jagħti fl-abjad miksur<br>Nru CAS: 9011-16-9<br>**Purità:**<br>Valur tal-assaġġ: Mill-inqas 99,5 % f'materja niexfa<br>Viskożità speċifika (1 % ta' MEK): 2-10<br>Residwu tal-metil-vinil-etere: ≤ 150 ppm<br>Residwu tal-anidride malejka: ≤ 250 ppm<br>Aċetaldeid: ≤ 500 ppm<br>Metanol: ≤ 500 ppm<br>Perossidu dilawrojl: ≤ 15 ppm<br>Ammont totali ta' metalli tqal: ≤ 10 ppm<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-kolonji aerobiċi: ≤ 500 CFU/g<br>Moffa/ħmira: ≤ 500 CFU/g<br>*Escherichia coli*: Negattiv fit-test<br>*Salmonella*: Negattiv fit-test<br>*Staphylococcus aureus:* Negattiv fit-test<br>*Pseudomonas aeruginosa*: Negattiv fit-test |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Żejt taċ-chia mis-*Salvia hispanica*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żejt taċ-chia jiġi prodott miż-żerriegħa taċ-chia (*Salvia hispanica* L.) (99,9 % pura) permezz tat-tagħsir kiesaħ. Ma jintużawx solventi u, ladarba jiġi magħsur, iż-żejt jinżamm f'tankijiet ta' dikantazzjoni u jsirlu proċess ta' filtrazzjoni biex jitneħħew l-impuritajiet. Jista' jiġi prodott ukoll permezz tal-estrazzjoni bis-$CO_2$ superkritiku.<br>**Il-proċess tal-produzzjoni:**<br>Prodott permezz tat-tagħsir kiesaħ. Ma jintużawx solventi u, ladarba jiġi magħsur, iż-żejt jinżamm f'tankijiet ta' dikantazzjoni u jsirlu proċess ta' filtrazzjoni biex jitneħħew l-impuritajiet.<br>Aċidità espressa bħala aċidu olejku: ≤ 2,0 %<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 10 meq/kg<br>Impuritajiet insolubbli: ≤ 0,05 %<br>Aċidu alfa-linoleniku: ≥ 60 %<br>Aċidu linoleiku: 15-20 % |
| **Żerriegħa taċ-chia (*Salvia hispanica*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iċ-Chia (*Salvia hispanica* L.) hija pjanta sajfija erbaċea annwali li tappartjeni għall-familja tal-*Labiatae*. Wara l-ħsad, iż-żrieragħ jitnaddfu b'mod mekkaniku. Il-fjuri, il-weraq u l-partijiet l-oħra tal-pjanta jitneħħew.<br>Materja niexfa: 90-97 %<br>Proteina: 15-26 %<br>Xaħam: 18-39 %<br>Karboidrat (*): 18-43 %<br>Fibra Mhux Raffinata (**): 18-43 %<br>Rmied: 3-7 %<br>(*) Il-karboidrati jinkludu l-valur tal-fibra<br>(**) Il-fibra mhux raffinata hija dik il-parti tal-fibra li tkun magħmula prinċipalment minn ċellulosa, pentosani u linjin, li mhumiex diġeribbli |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Il-proċess tal-produzzjoni:**<br>Il-proċess tal-produzzjoni tal-meraq tal-frott u ta' taħlitiet ta' meraq tal-frott li fihom iż-żerriegħa taċ-Chia jinvolvi l-idratazzjoni minn qabel u l-pasturizzazzjoni taż-żerriegħa. Hemm fis-seħħ kontrolli mikrobijoloġiċi u sistemi ta' monitoraġġ. |
| **Kompost ta' kitina-glukan mill-*Aspergillus niger*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-kitina-glukan tinkiseb mill-miċelju tal-*Aspergillus niger*; dan huwa trab ġieri, bla riħa, ta' lewn kemxejn safrani. Għandu kontenut ta' materja niexfa ta' 90 % jew aktar.<br>Il-kitin-glukan huwa fil-biċċa l-kbira magħmul minn żewġ polisakkaridi:<br>— il-kitin, magħmul minn unitajiet imtennija ta' N-aċetil-D-glukożammina (Nru CAS: 1398-61-4),<br>— il-beta (1, 3)-glukan, magħmul minn unitajiet imtennija ta' D-glukożju (Nru CAS: 9041-22-9).<br>Telf mat-tnixxif: ≤ 10 %<br>Kitin-glukan: ≥ 90 %<br>Proporzjon ta' kitin għal glukan: 30:70 sa 60:40<br>Rmied: ≤ 3,0 %<br>Lipidi: ≤ 1,0 %<br>Proteini: ≤ 6,0 % |
| **Kompost ta' kitina-glukan mill-*Fomes fomentarius*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-kompost tal-kitin-glukan jinkiseb mill-ħitan taċ-ċelloli tal-frott tal-faqqiegħ *Fomes fomentarius*. Dan huwa magħmul primarjament minn żewġ polisakkaridi:<br>— il-Kitin, magħmul minn unitajiet imtennija ta' N-aċetil-D-glukożammina (Nru CAS: 1398-61-4);<br>— Il-beta-(1,3)(1,6)-D-glukan, magħmul minn unitajiet imtennija ta' D-glukożju (Nru CAS: 9041-22-9).<br>Il-proċess tal-produzzjoni fih bosta passi, fosthom: it-tindif, it-tnaqqis tad-daqs u t-tħin, it-trattib fl-ilma, u t-tisħin f'soluzzjoni alkalina, il-ħasil u t-tnixxif. Ma ssirx idroliżi waqt il-proċess tal-produzzjoni.<br>Dehra: Trab kannella bla riħa u bla togħma<br>**Purità:**<br>Ndewwa: ≤ 15 %<br>Rmied: ≤ 3,0 %<br>Kitin-glukan: ≥ 90 %<br>Proporzjon ta' kitin għal glukan: 70:20<br>It-total ta' karboidrati, minbarra l-glukani: ≤ 0,1 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Proteini: ≤ 2,0 %<br>Lipidi: ≤ 1,0 %<br>Melanini: ≤ 8,3 %<br>Addittivi: Xejn<br>pH: 6,7-7,5<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb (ppm): ≤ 1,00<br>Kadmju (ppm): ≤ 1,00<br>Merkurju (ppm): ≤ 0,03<br>Arseniku (ppm): ≤ 0,20<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Total ta' batterji meżofili: ≤ $10^3$/g<br>Ħmira u moffa: ≤ $10^3$/g<br>Koliformi fi 30 °C: ≤ $10^3$/g<br>*E. coli*: ≤ 10/g<br>*Salmonella* u batterji patoġeniċi oħrajn: Assenti f'25 g |
| **Estratt ta' kitosan mill-faqqiegħ (*Agaricus bisporus*; *Aspergillus niger*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-estratt ta' kitosan (li fih primarjament il-poli(D-glukożammina)) jinkiseb miz-zkuk tal-*Agaricus bisporus* jew mill-miċelju tal-*Aspergillus niger*.<br>Il-proċess tal-produzzjoni bbrevettat fih bosta passi, fosthom: l-estrazzjoni u d-deaċetilazzjoni (l-idroliżi) f'medium alkalin, is-solubilizzazzjoni f'medium aċiduż, il-preċipitazzjoni f'medium alkalin, il-ħasil u t-tnixxif.<br>Sinonimu: Poli(D-glukożammina)<br>Numru CAS tal-kitosan: 9012-76-4<br>Formula tal-kitosan: $(C_6H_{11}NO_4)_n$<br>Dehra: trab fin ġieri<br>Aspett: Abjad miksur jagħti kemxejn fil-kannella<br>Riħa: Mingħajr riħa<br>**Purità:**<br>Kontenut tal-kitosan (% w/w skont il-piż niexef):≥ 85<br>Kontenut tal-glukan (% w/w skont il-piż niexef): ≤ 15<br>Telf fit-tnixxif (% w/w skont il-piż niexef): ≤ 10<br>Viskożità (1 % f'1 % ta' aċidu aċetiku): 1-15 |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Grad ta' aċetilizzazzjoni (fil-% mol skont il-piż imxarrab): 0-30<br>Viskożità (1 % f'1 % ta' aċidu aċetiku) (mPa.s): 1-14 għall-kitosan mill-Aspergillus niger; 12-25 għall-kitin mill-*Agaricus bisporus*<br>Rmied (% w/w skont il-piż niexef): ≤ 3,0<br>Proteini (% w/w skont il-piż niexef): ≤ 2,0<br>Id-daqs tal-partikoli: > 100 nm<br>Densità wara t-taptip ($g/cm^3$): 0,7-1,0<br>Kapaċità li jintrabat max-xaħam 800x 9 (w/w skont il-piż imxarrab): mogħdija<br>**Metalli tqal:**<br>Merkurju (ppm): ≤ 0,1<br>Ċomb (ppm): ≤ 1,0<br>Arseniku (ppm): ≤ 1,0<br>Kadmju (ppm): ≤ 0,5<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd aerobiku (CFU/g): ≤ $10^3$<br>Għadd ta' ħmira u moffa (CFU/g): ≤ $10^3$<br>*Escherichia coli* (CFU/g): ≤ 10<br>Enterobacteriaceae (CFU/g): ≤ 10<br>*Salmonella*: Assenti f'25 g<br>*Listeria monocytogenes*: Assenti f'25 g |
| **Sulfat tal-kondrojtina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Sulfat tal-kondrojtina (melħ tas-sodju) huwa prodott bijosintetiku. Jinkiseb permezz tas-sulfazzjoni kimika tal-kondrojtina miksuba mill-fermentazzjoni bil-batterju *Escherichia coli* O5:K4:H4 tar-razza U1-41 (ATCC 23502).<br>Sulfat tal-kondrojtina (melħ tas-sodju) (% bażi niexfa): 95-105<br>MWw (medja tal-piż) (kDa): 5-12<br>MWn (medja tal-għadd) (kDa): 4-11<br>Tixrid ($w_h/w_{0,05}$): ≤ 0,7<br>Mudell tas-sulfazzjoni (ΔDi-6S) (%): ≤ 85<br>Telf fit-tnixxif (%) (105 °C għal piż kostanti): ≤ 10,0<br>Residwu mat-tqabbid (% bażi niexfa): 20-30<br>Proteina (% bażi niexfa): ≤ 0,5<br>Endotossini (EU/mg): ≤ 100<br>Total ta' impuritajiet organiċi (mg/kg): ≤ 50 |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Pikolinat tal-Kromju** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-pikolinat tal-kromju huwa trab ġieri b'kulur li jagħti fl-aħmar, jitħallat kemxejn f'ilma ta' pH 7. Il-melħ jitħallat ukoll fis-solventi organiċi polari.<br>Isem kimiku: tris(2piridinakarbossilato-N,O)kromju(III) jew aċidu 2-piridinakarbossiliku, melħ tal-kromju(III)<br>Nru CAS: 14639-25-9<br>Formula kimika: $Cr(C_6H_4NO_2)_3$<br>Karatteristiċi kimiċi:<br>Pikolinat tal-Kromju: ≥ 95 %<br>Kromju (III): 12-13 %<br>Kromju (VI): mhux rilevat<br>Ilma: ≤ 4,0 % |
| ▼M53<br>**Bijomassa tal-ħmira li fiha l-kromu (*Yarrowia lipolytica*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel ġdid huwa l-bijomassa tal-ħmira li fiha l-kromu *Yarrowia lipolytica* mnixxfa u maqtula bis-sħana.<br>L-ikel ġdid huwa prodott permezz tal-fermentazzjoni fil-preżenza tal-klorur tal-kromu segwit minn għadd ta' passi ta' purifikazzjoni u pass ta' qtil bis-sħana tal-ħmira biex jiġi żgurat li ma jkunx hemm ċelloli vijabbli tal-*Yarrowia lipolytica* fl-ikel il-ġdid.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni:**<br>Kromu totali: 18–23 µg/g<br>Kromu (VI): < 10 µg/kg (jiġifieri l-limitu ta' detezzjoni)<br>Proteina: 40–50 g/100 g<br>Fibra: 24-32 g/100 g<br>Zokkrijiet: < 2 g/100 g<br>Xaħam: 6-12 g/100 g<br>Irmied totali: ≤ 15 %<br>Ilma: ≤ 5 %<br>Materja niexfa: ≥ 95 %<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 3,0 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 1,0 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 0,1 mg/kg |

▼M53

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd mikrobjali aerobiku totali: ≤ $5x10^3$ UJK/g<br>Għadd ta' ħmira u moffa totali: ≤ $10^2$ UJK/g<br>Ċelloli vijabbli tal-*Yarrowia lipolytica* ([14]): < 10 UJK/g (jiġifieri l-limitu ta' detezzjoni)<br>Koliformi: ≤ 10 UJK/g<br>*Salmonella* spp.: Assenti f'25 g<br>UJK: unitajiet li jifformaw kolonji |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Ħaxixa aromatika *Cistus incanus* L. Pandalis** | **Deskrizzjoni:**<br>Ħaxixa aromatika *Cistus incanus* L. Pandalis; speċi tal-familja *Cistaceae* nattiva tal-Peniżola Chalkidiki fir-reġjun tal-Mediterran.<br>**Kompożizzjoni:**<br>Ndewwa: 9-10 g/100 g ħaxix aromatizzanti<br>Proteina: 6,1 g/100 g ħaxix aromatizzanti<br>Xaħam: 1,6 g/100 g ħaxix aromatizzanti<br>Karboidrati: 50,1 g/100 g ħaxix aromatizzanti<br>Fibra: 27,1 g/100 g ħaxix aromatizzanti<br>Minerali: 4,4 g/100 g ħaxix aromatizzanti<br>Sodju: 0,18 g<br>Potassju: 0,75 g<br>Manjeżju: 0,24 g<br>Kalċju: 1,0 g<br>Ħadid: 65 mg<br>Vitamina $B_1$: 3,0 µg<br>Vitamina $B_2$: 30 µg<br>Vitamina $B_6$: 54 µg<br>Vitamina Ċ: 28 mg<br>Vitamina A: inqas minn 0,1 mg<br>Vitamina E: 40–50 mg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Tokoferol tat-tip alfa: 20–50 mg<br>Tokoferoli tat-tipi beta u gamma: 2-15 mg<br>Tokoferol tat-tip delta: 0,1-2 mg |
| **Ċitikolina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-ċitikolina hija prodotta permezz ta' proċess mikrobjali.<br>Il-ċitikolina hija magħmula miċ-ċitożina, mir-ribożju, mill-pirofosfat u mill-kolina.<br>Trab kristallin abjad<br>Isem kimiku: Kolina ċitidina 5′-pirofosfat, ċitidina 5′-(difosfat tat-triidroġenu) P'-[2-(trimetilammonju)etil]ester melħ intern<br>Formula kimika: $C_{14}H_{26}N_4O_{11}P_2$<br>Piż molekulari: 488,32 g/mol<br>Nru CAS: 987-78-0<br>pH (soluzzjoni tal-kampjun ta' 1 %): 2,5-3,5<br>**Purità:**<br>Valur tal-assaġġ: ≥ 98 % ta' materja niexfa<br>Telf fit-tnixxif (100 °C għal 4 sigħat): ≤ 5,0 %<br>Ammonju: ≤ 0,05 %<br>Arseniku: Mhux aktar minn 2 ppm<br>Aċidi fosforiċi liberi: ≤ 0,1 %<br>Aċidu 5′-ċitidiliku: ≤ 1,0 %<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-kolonji: ≤ $10^3$ CFU/g<br>Ħmira u moffa: ≤ $10^2$ CFU/g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'1 g |
| ***Clostridium butyricum*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>*Clostridium butyricum* (CBM 588) huwa batterju gram-pożittiv, jifforma l-ispori, anerobiku obbligat, mhuwiex patoġeniku u mhuwiex ġenetikament immodifikat. Numru tad-depożitu FERM BP-2789 |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-batterji aerobiċi vijabbli: ≤ $10^3$ CFU/g<br>*Escherichia coli*: Mhux traċċat f'1 g<br>*Staphylococcus aureus*: Mhux traċċat f'1 g<br>*Pseudomonas aeruginosa*: Mhux traċċat f'1 g<br>Ħmira u moffa: ≤ $10^2$ CFU/g |
| ▼M29<br>**D-ribożju** | **Deskrizzjoni**<br>Id-D-ribożju huwa monosakkaridu aldopentożju li huwa prodott permezz ta' fermentazzjoni bl-użu ta' razza defiċjenti fit-transketolażi tal-*Bacillus subtilis*.<br>Formula kimika: $C_5H_{10}O_5$<br>Nru CAS: 50-69-1<br>Massa molekolari: 150,13 Da<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni**<br>Dehra: Niexef b'konsistenza f'għamla ta' trab, b'lewn minn abjad sa kemxejn isfar<br>Rotazzjoni speċifika $[\alpha]_D^{25}$: – 19,0° sa – 21,0°<br>Purità tad-D-ribożju (% bażi xotta):<br>HPLC/RI ([8]) Metodu 98,0–102,0 %<br>Rmied: < 0,2 %<br>Telf mit-tnixxif (ndewwa): < 0,5 %<br>Ċarezza tas-soluzzjoni: trażmittanza ta' ≥ 95 %<br>**Metalli tqal**<br>Ċomb: ≤ 0,1 mg/kg<br>Arseniku: ≤ 0,1 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 0,1 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 0,1 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi**<br>L-għadd totali tal-kolonji: ≤ 100 CFU ([9])/g<br>Ħmira: ≤ 100 CFU/g |

▼M29

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Mofof: ≤ 100 CFU/g<br>Koliformi: ≤ 10 CFU/g<br>*Salmonella* sp: Negattiv/25 g |
| ▼M51<br>***Euglena gracilis* imnixxfa** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel ġdid huwa ċ-ċellola sħiħa mnixxfa Euglena, li hija l-bijomassa mnixxfa tal-mikroalga *Euglena gracilis*.<br>L-ikel ġdid jiġi prodott permezz ta' fermentazzjoni segwita minn filtrazzjoni u stadju ta' qtil ta' sħana tal-mikroalga biex tiġi żgurata l-assenza ta' ċelloli vijabbli ta' *Euglena gracilis* fl-ikel ġdid.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni:**<br>Total ta' karboidrati: ≤ 75 %<br>β-glukan: > 50 %<br>Proteina: ≥ 15 %<br>Xaħam: ≤ 15 %<br>Irmied: ≤ 10 %<br>Umdità: ≤ 6 %<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 0,5 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 0,5 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 0,05 mg/kg<br>Arseniku: ≤ 0,02 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd tal-kolonji aerobiċi: ≤ 10 000 UJK/g<br>Koliformi: ≤ 100 NAK/g<br>Ħmira u moffa: ≤ 500 UJK/g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'10 g<br>*Staphylococcus aureus*: Assenti f'10 g<br>*Salmonella*: Assenti f'25 g<br>*Listeria monocytogenes*: Assenti f'25 g<br>UJK: unitajiet li jifformaw kolonja.<br>NAK: in-numru l-aktar probabbli |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Estratt tat-trab tal-kawkaw bix-xaħam imneħħi** | Estratt tal-Kawkaw (*Theobroma cacao* L.)<br>Dehra: Trab kannella skur mingħajr impuritajiet viżibbli<br>Proprjetajiet fiżiċi u kimiċi:<br>Kontenut tal-polifenoli: Minimu ta' 55,0 % GAE<br>Kontenut tat-teobromina: Massimu ta' 10,0 %<br>Kontenut ta' rmied: Massimu ta' 5,0 %<br>Kontenut ta' ndewwa: Massimu ta' 8,0 %<br>Densità tal-massa: 0,40-0,55 g/cm$^3$<br>pH: 5,0-6,5<br>Solvent residwu: Massimu ta' 500 ppm |
| **Estratt tal-kawkaw b'livell baxx ta' xaħam** | Estratt tal-Kawkaw b'livell baxx ta' xaħam (*Theobroma cacao* L.)<br>Dehra: Trab aħmar skur jagħti fil-vjola<br>Estratt tal-kawkaw, konċentrat: Minimu ta' 99 %<br>Diossidu tas-siliċju (għajnuna teknoloġika): Massimu ta' 1,0 %<br>Flavanoli tal-kawkaw: Minimu ta' 300 mg/g<br>— Epikatekina: Minimu ta' 45 mg/g<br>Telf mat-tnixxif: Massimu ta' 5,0 % |

▼M67

| | |
|---|---|
| Żejt taż-żerriegħa tal-kosbor mill-*Coriandrum sativum* | Deskrizzjoni/Definizzjoni:<br>Iż-żejt taż-żerriegħa tal-kosbor huwa żejt li fih il-gliċeridi ta' aċidi grassi u li huwa prodott miż-żrieragħ tax-xitla tal-kosbor *Coriandrum sativum* L.<br>Lewn safrani sa kannella, togħma xejn partikolari<br>Nru tal-CAS: 8008-52-4<br>Kompożizzjoni tal-aċidi grassi:<br>Aċidu palmitiku (C16:0): 2–5 % |

▼M67

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Aċidu steariku (C18:0): < 1,5 % |
| | Aċidu petroseliniku (cis-C18:1(n-12)): 60–75 % |
| | Aċidu olejku (cis-C18:1(n-9)): 7–15 % |
| | Aċidu linolejku (C18:2) 12–19 % |
| | α-Aċidu linoleniku (C18:3): < 1,0 % |
| | Aċidi xaħmin trans: < 1,0 % |
| | Purità: |
| | Indiċi rifrattiv (20 °C): 1,466–1,474 |
| | Valur tal-aċidu: ≤ 4 mg KOH/g |
| | Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg |
| | Valur tal-jodju: 88–110 unitajiet |
| | Valur tas-saponifikazzjoni: 179–200 mg KOH/g |
| | Materjal insaponifikabbli: ≤ 15 g/kg |

▼M15

| | |
|---|---|
| **Trab tal-estratt tal-cranberries** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:** |
| | It-trab tal-estratt tal-cranberries huwa estratt f'għamla ta' trab li jinħall fl-ilma rikk fil-fenoli ppreparat permezz tal-estrazzjoni bl-etanol mill-konċentrat tal-meraq tal-frott matur u f'kundizzjoni tajba tal-kultivar tal-cranberry *Vaccinium macrocarpon*. |
| | **Karatteristiċi/Kompożizzjoni** |
| | Indewwa (% tal-piż skont il-piż): ≤ 4 |
| | Proantoċjanidini - PACs (% tal-piż skont il-piż xott) |
| | — Metodu ([3]) ([5]) OSC-DMAC: 55,0-60,0 jew |
| | — Metodu ([4]) ([5]) BL-DMAC: 15,0-18,0 |
| | Total tal-fenoli (GAE ([6]), % tal-piż skont il-piż xott) ([5]) |
| | — Metodu Folin-Ciocalteau: > 46,2 |
| | Solubbiltà (ilma): 100 %, mingħajr partiċelli insolubbli viżibbli |

▼M15

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Kontenut tal-etanol (mg/kg): ≤ 100<br>Analiżi bit-tgħarbil: 100 % minn ta' għarbiel b'malji tal-iskala 30<br>Dehra u aroma, bħala trab: Fluwidu, b'kulur aħmar skur. Aroma terrena mingħajr karattru maħruq.<br>**Metalli tqal:**<br>Arseniku (ppm): < 3<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Ħmira: < 100 CFU ([7])/g<br>Moffa: < 100 CFU/g<br>Għadd tal-kolonji aerobiċi: < 1 000 CFU/g<br>Koliformi: < 10 CFU/g<br>*Escherichia coli*: < 10 CFU/g<br>*Salmonella*: Assenti fi 375 g |
| ▼M9<br>**Frott niexef *Crataegus pinnatifida*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Frott niexef tal-ispeċi *Crataegus pinnatifida* u tal-familja *Rosaceae* nattiv fit-Tramuntana taċ-Ċina u fil-Korea.<br>**Kompożizzjoni**:<br>Materja niexfa: 80 %<br>Karboidrati: 55 g/kg piż frisk<br>Fruttożju: 26,5–29,3 g/100 g<br>Glukożju: 25,5-28,1 g/100 g<br>Vitamina Ċ: 29,1 mg/100 g piż frisk<br>Sodju: 2,9 g/100 g piż frisk<br>Il-frott ippriżervat fil-ġulepp jinkiseb permezz tal-ipproċessar termali tal-parti li tittiekel ta' speċi waħda ta' frott jew ta' diversi speċijiet ta' frott, sħaħ jew imqattgħin, imoddigħin minn passatur jew le, mingħajr konċentrazzjoni sinifikanti. Jistgħu jintużaw iz-zokkor, l-ilma, iċ-ċidru, il-ħwawar u l-meraq tal-lumi. |
| **α-ċiklodestrina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Sakkarid ċikliku li ma jirriduċix li jikkonsisti f'sitt unitajiet D-glukopiranosil marbuta b'α-1,4 prodotti bl-azzjoni taċ-ċiklodestrina glukosiltransferaži (CGTase, EC 2.4.1.19) fuq lamtu idrolizzat. L-irkupru u l-purifikazzjoni tal-α-ċiklodestrina jistgħu jsiru permezz ta' waħda minn dawn il-proċeduri li |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | ġejjin: il-preċipitazzjoni ta' kompost tal-α-ċiklodestrina b'1-dekanolu, li jinħall fl-ilma f'temperatura elevata u preċipitazzjoni mill-ġdid, l-estrazzjoni tal-kumplessant bil-fwar, u l-kristallizzazzjoni tal-α-ċiklodestrina mis-soluzzjoni; jew kromatografija bi skambju ta' joni jew permezz ta' ġel permeabbli segwit bil-kristallizzazzjoni tal-α-ċiklodestrina mil-likur matriċi ppurifikat; jew metodi ta' separazzjoni permezz ta' membrana, bħall-ultrafiltrazzjoni u l-ożmożi inversa: Deskrizzjoni: Kristallin solidu abjad jew kważi abjad li huwa prattikament mingħajr riħa.<br><br>Sinonimi: α-ċiklodestrina, α-destrina, ċikloeżaamilożju, ċiklomaltoeżaożju, α-ċikloamilaži<br><br>Isem kimiku: Ċikloeżaamilożju<br><br>Nru CAS: 10016-20-3<br><br>Formula kimika: $(C_6H_{10}O_5)_6$<br><br>Piż tal-formula: 972,85<br><br>Assaġġ: ≥ 98 % (bażi niexfa)<br><br>**Identifikazzjoni:**<br><br>Medda tat-tidwib: Jiddekomponi f'temperatura ogħla minn 278 °C<br><br>Solubbiltà: Solubbli faċilment fl-ilma; solubbli kemxejn fl-etanol<br><br>Rotazzjoni speċifika: $[\alpha]_D^{25}$: Bejn +145 ° u +151° (soluzzjoni ta' 1 %)<br><br>Kromatografija: Il-ħin ta' retenzjoni għall-ogħla livell fi kromatogramma likwida tal-kampjun jikkorrispondi ma' dak tal-α-ċiklodestrina fi kromatogramma ta' referenza ta' α-ċiklodestrina (li tista' tinkiseb mingħand *Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Germany jew Wacker Biochem Group, Adrian, MI, USA*) bl-użu tal-kundizzjonijiet deskritti fil-METODU TAL-ASSAĠĠ<br><br>**Purità:**<br><br>Ilma: ≤ 11 % (il-Metodu Karl Fischer)<br><br>Kumplessant residwu: ≤ 20 mg/kg<br><br>(1-dekanol)<br><br>Sustanzi li jnaqqsu: ≤ 0,5 % (fl-għamla ta' glukożju)<br><br>Rmied issulfat: ≤ 0,1 %<br><br>Ċomb: ≤ 0,5 mg/kg<br><br>**Metodu tal-assaġġ:**<br><br>Iddetermina permezz tal-kromatografija likwida bil-kundizzjonijet li ġejjin:<br><br>Soluzzjoni tal-kampjun: Iżen bi preċiżjoni madwar 100 mg mill-kampjun tat-test għal ġo flask volumetriku ta' 10 ml u żid 8 ml ilma dejonizzat. Ħoll il-kampjun kompletament permezz ta' banju ultrasoniku (10 - 15-il minuta) u ddilwih sal-marka bl-ilma ppurifikat dejonizzat. Iffiltra s-soluzzjoni b'filtru ta' 0,45 ta' mikrometru |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Soluzzjoni ta' referenza: Iżen bi preċiżjoni madwar 100 mg α-ċiklodestrina għal ġo flask volumetriku ta' 10 ml u żid 8 ml ilma dejonizzat. Ħoll il-kampjun kompletament permezz ta' banju ultrasoniku u ddilwih sal-marka bl-ilma ppurifikat dejonizzat.<br>Kromatografija: Kromatografu likwidu mgħammar b'individwatur tal-indiċi rifrattiv u b'reġistratur integranti.<br>Kolonna u ppakkjar: Nukleosil-100-$NH_2$ (10 μm) (*Macherey & Nagel Co. Düren*, il-Ġermanja) jew ħaġa oħra simili<br>Tul: 250 mm<br>Dijametru: 4 mm<br>Temperatura: 40 °C<br>Faži mobbli: aċetonitril/ilma (67/33, v/v)<br>Rata ta' tnixxija: 2,0 ml/min<br>Volum tal-injezzjoni: 10 μl<br>Proċedura: Injetta s-soluzzjoni tal-kampjun fil-kromatografu, irreġistra l-kromatogramma u kejjel l-erja tal-ogħla livell tal-α-ċiklodestrina. Ikkalkula l-perċentwal ta' α-ċiklodestrina fil-kampjun tat-test hekk kif ġej:<br>% ta' α-ċiklodestrina (bażi niexfa) = 100 × ($A_S/A_R$) ($W_R/W_S$)<br>meta<br>$A_S$ u $A_R$ huma l-erjas tal-ogħla livell ikkawżati mill-α-ċiklodestrina rispettivament għas-soluzzjoni tal-kampjun u għas-soluzzjoni ta' referenza.<br>$W_S$ u $W_R$ huma l-piżijiet (f'mg) tal-kampjun tat-test u tal-α-ċiklodestrina ta' referenza, rispettivament, wara korrezzjoni għall-kontenut tal-ilma. |
| **γ-ċiklodestrina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Sakkarid ċikliku li ma jirriduċix li jikkonsisti fi tmien unitajiet D-glukopiranosil marbuta-α-1,4 prodotti bl-azzjoni taċ-ċiklodestrina glukosiltransferaži (CGTase, EC 2.4.1.19) fuq lamtu idrolizzat. L-irkupru u l-ippurifikar ta' γ-ċiklodestrina jistgħu jitwettqu permezz tal-preċipitazzjoni ta' kumpless γ-ċiklodestrina bi 8-ċikloeżadeċen-1-one, id-dissoluzzjoni tal-kumpless bl-ilma u n-dekan, estrazzjoni permezz ta' fluss ta' fwar tal-faži milwiema u l-irkupru ta' gamma-CD mis-soluzzjoni permezz ta' kristallizzazzjoni.<br>Kristallin solidu abjad jew kważi abjad li huwa prattikament mingħajr riħa<br>Sinonimi: γ-ċiklodestrina, γ-destrina, ċikloottaamilożju, ċiklomaltoottaożju, γ-ċikloamilaži<br>Isem kimiku: Ċikloottaamilożju<br>Numru CAS: 17465-86-0<br>Formula kimika: $(C_6H_{10}O_5)_8$<br>Assaġġ: ≥ 98 % (bażi niexfa) |

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M9 | |
| | **Identifikazzjoni:**<br>Medda tat-tidwib: Jiddekomponi f'temperatura ogħla minn 285 °C<br>Solubbiltà: Solubbli faċilment fl-ilma; solubbli kemxejn fl-etanol<br>Rotazzjoni speċifika: $[\alpha]_D^{25}$: bejn + 174 ° u + 180 ° (soluzzjoni ta' 1 %)<br>**Purità:**<br>Ilma: ≤ 11 %<br>Kumplessant residwu (8-ċikloeżadeċen-1-one (CHDC)): ≤ 4 mg/kg<br>Solvent residwu (n-dekan): ≤ 6 mg/kg<br>Sustanzi li jnaqqsu: ≤ 0,5 % (fl-għamla ta' glukożju)<br>Rmied issulfat: ≤ 0,1 % |
| ▼M21<br>**Iż-żerriegħa mqaxxra tad-*Digitaria exilis* (Kippist) Stapf (fonio)**<br>**(Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni**<br>L-ikel tradizzjonali huwa ż-żerriegħa mqaxxra (bin-nuħħala mneħħija) tad-*Digitaria exilis* (Kippist) Stapf.<br>Id-*Digitaria exilis* (Kippist) Stapf hija pjanta annwali erbaċea tal-familja *Poaceae*.<br>**Il-komponenti nutrittivi tipiċi taż-żerriegħa mqaxxra tal-fonio**<br>Karboidrati: 76,1 g/100 g ta' fonio<br>Ilma: 12,4 g/100 g ta' fonio<br>Proteina: 6,9 g/100 g ta' fonio<br>Xaħam: 1,2 g/100 g ta' fonio<br>Fibra: 2,2 g/100 g ta' fonio<br>Rmied: 1,2 g/100 g ta' fonio<br>Kontenut ta' fitat: ≤ 2,1 mg/g |
| ▼M9<br>**Preparazzjoni tad-destran prodotta mil-*Leuconostoc mesenteroides*** | 1. **Għamla ta' trab**:<br>Karboidrati: 60 % bi: (Destran: 50 %, Mannitol: 0,5 %, Fruttożju: 0,3 %, Lewkrożju: 9,2 %)<br>Proteina: 6,5 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Lipidu: 0,5 %<br>Aċidu lattiku: 10 %<br>Etanol: traċċi<br>Rmied: 13 %<br>Ndewwa: 10 %<br>2. **Forma likwida:**<br>Karboidrati: 12 % bi: (Destran: 6,9 %, Mannitol: 1,1 %, Fruttożju: 1,9 %, Lewkrożju: 2,2 %)<br>Proteina: 2,0 %<br>Lipidu: 0,1 %<br>Aċidu lattiku: 2,0 %<br>Etanol: 0,5 %<br>Rmied: 3,4 %<br>Ndewwa: 80 % |
| **Żejt diaċigliċerol li joriġina mill-pjanti** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Magħmul mill-gliċerol u l-aċidi xaħmin miksuba miż-żjut veġetali li jittieklu, b'mod partikolari miż-żejt tal-fażola tas-sojja (*Glycine max*) jew miż-żejt tal-kolza (*Brassica campestris, Brassica napus*) bl-użu ta' enzima speċifika.<br>**Distribuzzjoni tal-Aċilgliċerol:**<br>Diaċilgliċeroli (DAG): ≥ 80 %<br>1,3-Diaċilgliċeroli (1,3-DAG): ≥ 50 %<br>Triaċilgliċeroli (TAG): ≤ 20 %<br>Monoaċilgliċeroli (MAG): ≤ 5,0 %<br>**Kompożizzjoni tal-Aċidi Xaħmin (MAG, DAG, TAG):**<br>Aċidu olejku (C18:1): 20-65 %<br>Aċidu linolejku (C18:2): 15-65 %<br>Aċidu linoleniku (C18:3): ≤ 15 %<br>Aċidi xaħmin saturati: ≤ 10 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Oħrajn**:<br>Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g<br>Ndewwa u volatilità: ≤ 0,1 %<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 1.0 meq/kg<br>Materjal insaponifikabbli: ≤ 2,0 %<br>Aċidi xaħmin trans≤ 1,0 %<br>MAG = monoaċilgliċeroli, DAG = diaċigliċeroli, TAG = triaċigliċeroli |
| **Diidrokapsjat (DHC)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Id-diidrokapsjat huwa ssintesizzat bl-esterifikazzjoni kkatalizzata minn enzim tal-vanillil-alkoħol u tal-aċidu 8-metilnonanojku. Wara l-esterifikazzjoni, id-diidrokapsjat jiġi estratt bl-n-eżan.<br>Likwidu viskuż minn bla kulur sa isfar<br>Formula kimika: $C_{18}$ $H_{28}$ $O_4$<br>Nru CAS: 205687-03-2<br>**Karatteristiċi fiżikokimiċi:**<br>Diidrokapsjat: > 94 %<br>Aċidu 8-Metilnonanojku: < 6,0 %<br>Vanillil-alkoħol: < 1,0 %<br>Sustanzi oħrajn relatati mas-sinteżi: < 2,0 % |

▼M13

| | |
|---|---|
| **Il-partijiet esposti mnixxfin tal-*Hoodia parviflora*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Huma l-partijiet esposti mnixxfin tal-*Hoodia parviflora* N.E.Br. (familja *Apocynaceae*)<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni**<br>Materjal veġetali: Il-partijiet esposti mnixxfin tal-pjanti ta' mill-inqas tliet snin<br>Dehra: Trab fin minn aħdar ċar għal kannella ċar<br>Solubbiltà (fl-ilma): > 25 mg/mL<br>Ndewwa: < 5,5 %<br>$A_w$: < 0,3 |

▼M13

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | pH: < 5,0<br>Proteina: < 4,5 g/100 g<br>Xaħam: < 3 g/100 g<br>Karboidrati (inkluża l-fibra): < 80 g/100 g<br>Fibra: < 55 g/100 g<br>Total taz-zokkor: < 10,5 g/100 g<br>Rmied: < 20 %<br>**Hoodigosides**<br>P57: 5–50 mg/kg<br>L: 1 000-6 000 mg/kg<br>O: 500-5 000 mg/kg<br>Total: 1 500-11 000 mg/kg<br>**Metalli tqal:**<br>Arseniku: < 1,00 mg/kg<br>Merkurju: < 0,1 mg/kg<br>Kadmju: < 0,1 mg/kg<br>Ċomb: < 0,5 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd tal-kolonji aerobiċi: < $10^5$ CFU/g<br>*Escherichia coli*: < 10 CFU/g<br>*Staphylococcus aureus*: < 50 CFU/g<br>Koliformi totali: < 10 CFU/g<br>Ħmira: ≤ 100 CFU/g<br>Moffa: ≤ 100 CFU/g<br>Speċi tas-*Salmonella*: Negattiv/25 g<br>*Listeria monocytogenes*: Negattiv/25 g<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Estratt imnixxef mil-*Lippia citriodora* magħmul mill-kolturi taċ-ċelloli** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Estratt imnixxef mil-*Lippia citriodora* (Palau) Kunth magħmul mill-kolturi taċ-ċelloli HTN®Vb. |
| **Estratt mill-kolturi taċ-ċelloli tal-*Echinacea angustifolia*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Estratt mill-għeruq tal-*Echinacea angustifolia* miksub minn koltura tat-tessut tal-pjanta li huwa sostanzjalment ekwivalenti għal estratt mill-għeruq tal-*Echinacea angustifolia* li jinkiseb fl-ilma-etanolu ttitrat għal 4 % ekinakożid. |
| ▼M31<br>**Estratt tal- *Echinacea purpurea* mill-kolturi taċ-ċelloli** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Estratt imnixxef tal-*Echinacea purpurea* mill-kolturi taċ-ċelloli EchiPure-PC™ |
| ▼M9<br>***Żejt tal-Echium plantagineum*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żejt tal-Echium huwa l-prodott isfar ċar li jinkiseb permezz tal-irfinar taż-żejt estratt miż-żerriegħa tal-aċidu L. Stearidoniku tal-*Echium plantagineum*: ≥ 10 % w/w tat-total ta' aċidi xaħmin<br>Aċidi xaħmin trans: ≥ 2,0 % (piż skont il-piż tat-total ta' aċidi xaħmin)<br>Valur aċiduż: ≤ 0,6 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq $O_2$/kg<br>Kontenut insaponifikabbli: ≤ 2,0 %<br>Kontenut ta' proteini (total ta' nitroġenu): ≤ 20 µg/ml<br>Alkalojdi pirroliżidiniċi: Mhux traċċabbli b'limitu ta' detezzjoni ta' 4,0 µg/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M49 | |
| **Florotannini tal-*Ecklonia cava*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni**<br>Il-Florotannini tal-*Ecklonia cava* jinkisbu permezz ta' estrazzjoni tal-alkoħol mill-alga tal-baħar li tittiekel *Ecklonia cava*. L-estratt huwa trab kannella skur, li fih ħafna florotannini, b'kontenut għoli ta' komposti polifenoliċi preżenti bħala metaboliti sekondarji f'ċerti speċi tal-alga kannella.<br>**Karatteristiki/Kompożizzjoni**<br>Kontenut ta' Florotannini: 90 ± 5 %<br>Attività tal-antiossidanti: > 85 %<br>Ndewwa: > 5 %<br>Irmied: > 5 %<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi**<br>Għadd totali ta' ċelloli vijabbli: < 3 000 CFU/g<br>Moffa/ħmira: < 300 CFU/g<br>Koliformi: Negattiv fit-test<br>*Salmonella* spp.: Negattiv fit-test<br>*Staphylococcus aureus:* Negattiv fit-test<br>**Metalli tqal u Aloġeni**<br>Ċomb: < 3,0 mg/kg<br>Merkurju: < 0,1 mg/kg<br>Kadmju: < 3,0 mg/kg<br>Arseniku: < 25,0 mg/kg<br>Arseniku inorganiku: < 0,5 mg/kg<br>Jodju: 150,0 – 650,0 mg/kg<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw Kolonji |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M18 | |
| **Idroliżat tal-membrana tal-bajd** | **Deskrizzjoni**<br>L-idroliżat tal-membrana tal-bajd huwa derivat mill-membrani tal-qxur tal-bajd ta' bajd tat-tiġieġ. Il-qxur tal-bajd jgħaddu minn separazzjoni idromekkanika sabiex jinkisbu l-membrani tal-bajd, li wara jkomplu jiġu pproċessati ulterjurment bl-użu tal-metodu ta' solubilizzazzjoni bi privattiva. Wara l-proċess ta' solubilizzazzjoni, is-soluzzjoni tiġi ffiltrata, ikkonċentrata, imnixxfa bl-atomizzazzjoni u mballata.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni**<br>**Parametri kimiċi** — **Metodi**<br>Total tal-komposti li fihom in-nitroġenu (% tal-piż skont il-piż): ≥ 88 — Kombustjoni skont AOAC 990.03 u AOAC 992.15<br>Kollaġen (% tal-piż skont il-piż): ≥ 15 — Sircol™ Assaġġ ta' Kollaġen Solubbli<br>Elastin (% tal-piż skont il-piż): ≥ 20 — Fastin™ Assaġġ ta' Elastin<br>Total ta' glikosamminoglikani (% tal-piż skont il-piż): ≥ 5 — USP26 (metodu tas-sulfat tal-kondrojtina K0032)<br>Kalċju: ≤ 1 %<br>**Parametri fiżiċi**<br>pH 6,5 – 7,6<br>Rmied (% tal-piż skont il-piż): ≤ 8<br>Ndewwa (% tal-piż skont il-piż): ≤ 9<br>Attività tal-ilma: ≤ 0,3<br>Solubbiltà (fl-ilma): solubbli<br>Densità tal-massa: ≥ 0,6 g/cc<br>**Metalli tqal**<br>Arseniku ≤ 0,5 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi**<br>Għadd tal-kolonji aerobiċi: ≤ 2 500 CFU/g<br>*Escherichia coli*: ≤ 5 MPN/g<br>*Salmonella*: Negattiv (f'25 g)<br>Koliformi: ≤ 10 MPN/g<br>*Staphylococcus aureus*: ≤ 10 CFU/g<br>Għadd tal-ispori mežofili: ≤ 25 CFU/g<br>Għadd tal-ispori termofili: ≤ 10 CFU/10 g |

▼M18

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Ħmira: ≤ 10 CFU/g<br>Moffa: ≤ 200 CFU/g<br>CFU: Colony Forming Units (Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji); MPN = Most Probable Number (Numru l-Iktar Probabbli); USP: United States Pharmacopeia (Farmakopea tal-Istati Uniti). |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Gallat tal-epigallokatekina fl-għamla ta' estratt ippurifikat mill-weraq tat-tè aħdar (*Camellia sinensis*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Estratt mill-weraq tat-tè aħdar (*Camellia sinensis L. Kuntze*) ippurifikat sew fl-għamla ta' trab fin ta' kulur bejn abjad miksur u roża ċar. Dan huwa magħmul minn minimu ta' 90 % ta' gallat tal-epigallo-katekina (EGCG), u l-punt tat-tidwib tiegħu huwa bejn madwar 210 °C u 215 °C<br>Dehra: trab ta' kulur bejn abjad miksur u roża ċar<br>Isem kimiku: polifenol (-) 3-gallat tal-epigallo-katekina<br>Sinonimi: gallat tal-epigallo-katekina (EGCG)<br>Nru CAS: 989-51-5<br>Isem INCI: gallat tal-epigallo-katekina<br>Massa molekolari: 458,4 g/mol<br>Telf mat-tnixxif: massimu ta' 5,0 %<br>**Metalli tqal:**<br>Arseniku: Massimu ta' 3,0 ppm<br>Ċomb: Massimu ta' 5,0 ppm<br>**Assaġġ**:<br>Minimu ta' 94 % EGCG (fuq materjal niexef)<br>massimu ta' 0,1 % kafeina<br>Solubbiltà: L-EGCG huwa pjuttost solubbli fl-ilma, fl-etanol, fil-metanol u fl-aċeton |
| **L-ergotijoneina** | **Definizzjoni**<br>Isem kimiku (IUPAC): (2S)-3-(2-tiosso-2,3-diidru-1*H*-imidażol-4-il)-2-(trimetilammonju)-Propanoat<br>Formula kimika: $C_9H_{15}N_3O_2S$<br>Massa molekolari: 229,3 Da<br>Nru CAS: 497-30-3 |

| *Parametru* | *Speċifikazzjoni* | *Metodu* |
|---|---|---|
| Dehra | Trab abjad | Viżiv |
| Rotazzjoni ottika | $[\alpha]_D \geq (+)\ 122°$ (c = 1, $H_2O$)[a)] | Polarimetrija |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet | | |
|---|---|---|---|
| | Purità kimika | < 99,5 %<br>< 99,0 % | HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]<br>1H-NMR |
| | Identifikazzjoni | Konformi mal-istruttura<br>C: 47,14 ± 0,4 %<br>H: 6,59 ± 0,4 %<br>N: 18,32 ± 0,4 % | 1H-NMR<br>Analiżi elementali |
| | Solventi residwi totali<br>(metanol, aċetat etiliku, isopropanol, etanol) | [Eur. Ph. 01/2008:50400]<br>< 1 000 ppm | Kromatografija b'faża gassuża<br>[Eur. Ph. 01/2008:20424] |
| | Telf fit-tnixxif | Standard intern < 0,5 % | [Eur. Ph. 01/2008:20232] |
| | Impuritajiet | < 0,8 % | HPLC/GPC jew 1H-NMR |
| | **Metalli tqal**[b) c)] | | |
| | Ċomb | < 3,0 ppm | ICP/AES |
| | Kadmju | < 1,0 ppm | (Pb, Cd) |
| | Merkurju | < 0,1 ppm | Fluworexxenza atomika (Hg) |
| | **Speċifikazzjonijiet mikrobijoloġiċi**[b)] | | |
| | Għadd totali ta' batterji aerobiċi vijabbli (TVAC) | ≤ 1 x $10^3$ CFU/g | [Eur. Ph. 01/2011:50104] |
| | Għadd totali tal-ħmira u tal-moffa (TYMC) | ≤ 1 x $10^2$ CFU/g | |
| | *Escherichia coli* | Assenti f'1 g | |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Eur. Ph.: Farmakopea Ewropea; 1H-NMR: reżonanza manjetika nukleari protonika; HPLC: kromatografija likwida ta' prestazzjoni għolja; GPC: kromatografija permezz ta' ġell permeabbli; ICP/AES: Spettrometrija tal-emissjoni atomika bi plażma akkoppjata induttivament;<br>CFU: unitajiet li jifformaw kolonji.<br>(a) Lit. $[\alpha]_D$ = (+) 126,6° (c = 1, $H_2O$)<br>(b) Analiżi mwettqa fuq kull lott<br>(c) Livelli massimi skont ir-Regolament (KE) Nru 1881/2006 |

▼M49

| | |
|---|---|
| **Estratt tat-tliet għeruq erbali (*Cynanchum wilfordii Hemsley*, *Phlomis umbrosa Turcz.* u *Angelica gigas Nakai*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni**<br>It-taħlita tat-tliet għeruq erbali hija trab fin kannella fl-isfar prodott permezz tal-ilma sħun, konċentrazzjoni permezz tal-evaporazzjoni, u tnixxif bl-isprej<br>**Kompożizzjoni tal-estratt ta' taħlita tat-tliet għeruq erbali**<br>Għerq tal-*Cynanchum wilfordii*: 32,5 % (w/w)<br>Għqer tal-*Phlomis umbrosa*: 32,5 % (w/w)<br>Għerq tal-*Angelica gigas*: 35,0 % (w/w)<br>**Speċifikazzjonijiet**<br>Telf mit-tnixxif: NMT 100 mg/g<br>**Assaġġ**<br>Aċidu ċinnamiku: 0,012 – 0,039 mg/g<br>Esteri metiliċi tax-shanzhiside: 0,20 – 1,55 mg/g<br>Nodakenina: 3,35 – 10,61 mg/g<br>Metossalin: < 3 mg/g<br>Fenoli: 13,0 – 40,0 mg/g<br>Kumarini: 13,0 – 40,0 mg/g<br>Iridojdi: 13,0 – 39,0 mg/g<br>Saponini: 5,0 – 15,5 mg/g<br>**Komponenti nutrittivi**<br>Karboidrati: 600 – 880 mg/g<br>Proteini: 70 – 170 mg/g<br>Xaħmijiet: < 4 mg/g<br>**Parametri mikrobijoloġiċi**<br>Għadd totali ta' kolonji vijabbli: < 5000 CFU/g<br>Ħmira u moffa totali: < 100 CFU/g<br>Batterji koliformi: < 10 CFU/g<br>*Salmonella*: Negattiv/25 g |

▼M49

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | *Escherichia coli*: Negattiv/25 g<br>*Staphylococcus aureus*: Negattiv/25 g<br>**Metalli tqal**<br>Ċomb: < 0,65 mg/kg<br>Arseniku: < 3,0 mg/kg<br>Merkurju: < 0,1 mg/kg<br>Kadmju: < 1,0 mg/kg<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw Kolonji |
| ▼M9<br>**EDTA tas-sodju ferriku** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-EDTA ferriku tas-sodju (aċidu etilendiamminatetraaċetiku) huwa trab minn isfar għal kannella, ġieri, mingħajr riħa, b'purità kimika ta' aktar minn 99 % (w/w). Huwa solubbli fl-ilma.<br>Formula kimika: $C_{10}H_{12}FeN_2NaO_8 * 3H_2O$<br>Karatteristiċi kimiċi:<br>pH ta' soluzzjoni ta' 1 %: 3,5-5,5<br>Ħadid: 12,5-13,5 %<br>Sodju: 5,5 %<br>Ilma: 12,8 %<br>Materja organika (CHNO): 68,4 %<br>EDTA: 65,5-70,5 %<br>Materjal insolubbli fl-ilma: ≤ 0,1 %<br>Aċidu nitrilo triaċetiku: ≤ 0,1 % |
| **Fosfat ferruż tal-ammonju** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-Fosfat ferruż tal-ammonju huwa trab fin u griż jagħti fl-aħdar u insolubbli fl-ilma iżda solubbli fl-aċidi minerali miżjudin bl-ilma.<br>Nru CAS: 10101-60-7<br>Formula kimika: $FeNH_4PO_4$<br>Karatteristiċi kimiċi:<br>pH ta' 5 % sospensjoni fl-ilma: 6,8-7,8<br>Ħadid (total): ≥ 28 %<br>Ħadid (II): 22-30 % (w/w)<br>Ħadid (III): ≤ 7,0 % (w/w)<br>Ammonja: 5-9 % (w/w)<br>Ilma: ≤ 3,0 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Peptidi tal-ħut mis-*Sardinops sagax*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ingredjent ta' ikel ġdid huwa taħlita peptidika, li tinkiseb minn idroliżi alkalina katalizzata minn proteażi ta' muskolu tal-ħut (*Sardinops sagax*), l-iżolament sussegwenti tal-frazzjoni peptidika bil-kromatografija b'kolonna, il-konċentrazzjoni taħt vakwu u tnixxif bl-isprej.<br>Trab abjad safrani<br>Peptidi [(1)] (peptidi b'katina qasira, dipeptidi u tripeptidi b'piż molekulari ta' inqas minn 2 kDa): ≥ 85 g/100 g<br>Val-Tyr (dipeptid): 0,1-0,16 g/100 g<br>Rmied: ≥ 10 g/100 g<br>Ndewwa: ≥ 8 g/100 g<br>[(1)] Metodu Kjeldahl |
| **Flavonojdi mill-*Glycyrrhiza glabra*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-flavonojdi li ġejjin mill-għeruq jew mis-salvaġġ tal-*Glycyrrhiza glabra* L. huma estratti bl-etanol segwit minn estrazzjoni ulterjuri ta' dan l-estratt etanoliku bit-trigliċeridi b'katina medja. Huwa likwidu ta' lewn kannella skur li jinkludi bejn 2,5 % u 3,5 % ta' glabridina.<br>Ndewwa: < 0,5 %<br>Rmied: < 0,1 %<br>Valur tal-perossidu (PV): < 0,5 meq/kg<br>Glabridina: 2,5-3,5 % ta' xaħam<br>Aċidu gliċirriżiniku: < 0,005 %<br>Xaħam, inkluż is-sustanzi tat-tip polifenol: ≥ 99 %<br>Proteina: < 0,1 %<br>Karboidrati: mhux traċċabbli |
| ▼M40 | |
| **Polpa tal-frott, meraq tal-polpa u meraq ikkonċentrat tal-polpa tat-*Theobroma cacao* L.**<br>**(Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni**<br>L-ikel tradizzjonali huwa l-polpa tal-frott mill-kawkaw (*Theobroma cacao* L), li huwa "sustanza milwiema, mużillaġinuża u aċiduża li fiha huma inkorporati ż-żrieragħ".<br>Il-polpa tal-frott tal-kawkaw tinkiseb billi jinqasam il-miżwed tal-kawkaw segwit b'separazzjoni mill-ħliefa u l-fażola; il-polpa tiġi mbagħad soġġetta għall-pastorizzazzjoni u l-iffriżar. Il-meraq tal-kawkaw u/jew il-meraq ikkonċentrat tal-polpa tal-kawkaw jiġu prodotti wara l-ipproċessar (trattament enżimatiku, pasturizzazzjoni, filtrazzjoni u konċentrazzjoni).<br>***Data* kompożizzjonali tipika tal-polpa tal-frott tal-kawkaw, tal-meraq tal-polpa, u tal-meraq ikkonċentrat tal-polpa**<br>Proteina (g/100 g): 0,0 sa 2,0<br>Xaħam totali (g/100 g): 0,0 sa 0,2<br>Zokkor totali (g/100 g): > 11,0<br>Il-livell Brix (° Brix): ≥ 14<br>pH: 3,3 sa 4,0<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi**<br>Għadd Totali tal-Kolonji (aerobiku): < 10 000 cfu ([9])/g<br>Enterobacteriacae: ≤ 10 cfu/g<br>*Salmonella*: Assenza f'25 g |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Estratt tal-fukojdan mill-alga *Fucus vesiculosus*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-fukojdan mill-alga *Fucus vesiculosus* huwa estratt permezz ta' estrazzjoni milwiema f'soluzzjoni aċida u bi proċessi filtranti mingħajr l-użu ta' solventi organiċi. L-estratt li jinkiseb jiġi kkonċentrat u jitnixxef biex jagħti estratt ta' fukojdan bl-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:<br>Trab b'kulur abjad miksur għal kannella<br>Riħa u Togħma: Riħa u togħma newtrali<br>Ndewwa: < 10 % (105 °C għal sagħtejn)<br>Valur tal-pH: 4,0-7,0 (sospensjoni ta' 1 % f'25 °C)<br>**Metalli tqal:**<br>Arseniku (inorganiku): < 1,0 ppm<br>Kadmju: < 3,0 ppm<br>Ċomb: < 2,0 ppm<br>Merkurju: < 1,0 ppm |
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd mikrobjali aerobiku totali: < 10 000 CFU/g<br>Ammont ta' ħmira u moffa: < 100 CFU/g<br>Għadd totali ta' enterobatterji: Assenza/g<br>*Escherichia coli*: Assenza/g<br>*Salmonella*: Assenti f'10 g<br>*Staphylococcus aureus*: Assenza/g<br>Il-kompożizzjoni ta' żewġ tipi ta' estratti awtorizzati abbażi tal-livell ta' fukojdan:<br>*Estratt 1:*<br>Fukojdan: 75-95 %<br>Alġinat: 2,0-5,5 %<br>Polifloroglukinol: 0,5-15 %<br>Mannitol: 1-5 %<br>Melħ naturali/Minerali Liberi: 0,5-2,5 %<br>Karboidrati oħrajn: 0,5-1,0 %<br>Proteina: 2,0-2,5 %<br>*Estratt 2:*<br>Fukojdan: 60-65 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Alġinat: 3,0-6,0 %<br>Polifloroglukinol: 20-30 %<br>Mannitol: < 1,0 %<br>Melħ naturali/Minerali Liberi: 0,5-2,0 %<br>Karboidrati oħrajn: 0,5-2,0 %<br>Proteina: 2,0-2,5 % |
| **Estratt tal-fukojdan mill-alga *Undaria pinnatifida*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-fukojdan mill-alga *Undaria pinnatifida* jinkiseb b'estrazzjoni milwiema f'soluzzjoni aċida u bi proċessi filtranti mingħajr l-użu ta' solventi organiċi. L-estratt li jinkiseb jiġi kkonċentrat u jitnixxef biex jagħti estratt ta' fukojdan bl-ispeċifikazzjonijiet li ġejjin:<br>Trab b'kulur abjad miksur għal kannella<br>Riħa u Togħma: Riħa u togħma newtrali<br>Ndewwa: < 10 % (105 °C għal sagħtejn)<br>Valur tal-pH: 4,0-7,0 (sospensjoni ta' 1 % f'25 °C)<br>**Metalli tqal:**<br>Arseniku (inorganiku): < 1,0 ppm<br>Kadmju: < 3,0 ppm<br>Ċomb: < 2,0 ppm<br>Merkurju: < 1,0 ppm<br>**Mikrobijoloġija:**<br>Għadd mikrobjali aerobiku totali: < 10 000 CFU/g<br>Ammont ta' ħmira u moffa: < 100 CFU/g<br>Għadd totali ta' enterobatterji: Assenza/g<br>*Escherichia coli*: Assenza/g<br>*Salmonella*: Assenti f'10 g<br>*Staphylococcus aureus*: Assenza/g<br>Il-kompożizzjoni ta' żewġ tipi ta' estratti awtorizzati abbażi tal-livell ta' fukojdan:<br>*Estratt 1:*<br>Fukojdan: 75-95 %<br>Alġinat: 2,0-6,5 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Polifloroglukinol: 0,5-3,0 %<br>Mannitol: 1-10 %<br>Melħ naturali/Minerali Liberi: 0,5-1,0 %<br>Karboidrati oħrajn: 0,5-2,0 %<br>Proteina: 2,0-2,5 %<br>*Estratt 2:*<br>Fukojdan: 50-55 %<br>Alġinat: 2,0-4,0 %<br>Polifloroglukinol: 1,0-3,0 %<br>Mannitol: 25-35 %<br>Melħ naturali/Minerali Liberi: 8-10 %<br>Karboidrati oħrajn: 0,5-2,0 %<br>Proteina: 1,0-1,5 % |
| **2′-Fukosillattożju (sintetiku)** | **Definizzjoni**:<br>Isem kimiku: α-L-Fukopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)- D-glukopiranożju<br>Formula kimika: $C_{18}H_{32}O_{15}$<br>Nru CAS: 41263-94-9<br>Piż molekulari: 488,44 g/mol<br>**Deskrizzjoni:**<br>2′-Fukosillattożju huwa trab ta' lewn abjad għal abjad miksur li jiġi prodott permezz ta' proċess ta' sinteżi kimika.<br>**Purità:**<br>2′-Fukosillattożju: ≥ 95 %<br>D-Lattożju: ≤ 1,0 w/w %<br>L-Fukożju: ≤ 1,0 w/w %<br>Isomeri tad-difukosil-D-lattożju: ≤ 1,0 w/w %<br>2′-Fukosil-D-lattulożju: ≤ 0,6 w/w %<br>pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %): 3,2-7,0<br>Ilma (%): ≤ 9,0 %<br>Rmied, issulfat: ≤ 0,2 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet | |
|---|---|---|
| | Aċidu aċetiku: ≤ 0,3 %<br>Solventi residwi (metanol, 2-propanol, aċetat tal-metil, aċeton): ≤ 50,0 mg/kg l-wieħed, ≤ 200,0 mg/kg flimkien<br>Proteini residwi: ≤ 0,01 %<br>**Metalli Tqal:**<br>Palladju: ≤ 0,1 mg/kg<br>Nikil: ≤ 3,0 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali ta' batterji aerobiċi mežofiliċi: ≤ 500 CFU/g<br>Ħmira u Moffa: ≤ 10 CFU/g<br>Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg | |
| **2′-Fukosillattożju (sors mikrobjali)** | ►M27 **Definizzjoni:**<br>Isem kimiku: α-L-Fukopiranosil-(1→2)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glukopiranożju<br>Formula kimika: $C_{18}H_{32}O_{15}$<br>Nru CAS: 41263-94-9<br>Piż molekulari: 488,44 g/mol | |
| | **Sors:**<br>Ir-razza tal-mikrobu tal-*Escherichia coli* K-12 ġenetikament modifikata | **Sors:**<br>Ir-razza tal-mikrobu tal-*Escherichia coli* BL21 ġenetikament modifikata |
| | **Deskrizzjoni:**<br>It-2′-Fukosillattożju huwa trab ta' lewn abjad għal abjad miksur li jiġi prodott permezz ta' proċess mikrobjali.<br>**Purità:**<br>2′-Fukosillattożju: ≥ 83 %<br>D-Lattożju: ≤ 10,0 %<br>L-Fukożju: ≤ 2,0 %<br>Difukosil-D-lattożju: ≤ 5,0 %<br>2′-Fukosil-D-lattulożju: ≤ 1,5 %<br>Is-somma tas-sakkaridi (2′-Fukosillattożju, D-Lattożju, L-Fukożju, Difukosil-D-lattożju, 2′-Fukosil-D-lattulożju): ≥ 90 %<br>pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %): 3,0-7,5<br>Ilma: ≤ 9,0 % | **Deskrizzjoni:**<br>It-2′-Fukosillattożju huwa trab ta' lewn abjad għal abjad miksur u s-soluzzjoni milwiema tal-konċentrat likwidu (45 % ± 5 % w/v) hija soluzzjoni milwiema minn bla kulur għal lewn kemxejn isfar. It-2′-Fukosillattożju huwa prodott permezz ta' proċess mikrobijoloġiku.<br>**Purità:**<br>2′-Fukosillattożju: ≥ 90 %<br>Lattożju: ≤ 5,0 %<br>Fukożju: ≤ 3,0 %<br>3′-Fukosillattożju: ≤ 5,0 %<br>Fukosilgalattożju: ≤ 3,0 %<br>Difukosillattożju: ≤ 5,0 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet | |
|---|---|---|
| | Rmied issulfat: ≤ 2,0 %<br>Aċidu aċetiku: ≤ 1,0 %<br>Proteini residwi: ≤ 0,01 %<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd totali ta' batterji aerobiċi mežofiliċi: ≤ 3 000 CFU/g<br>Ħmejjer: ≤ 100 CFU/g<br>Mofof: ≤ 100 CFU/g<br>Endotossini: ≤ 10 EU/mg | Glukożju: ≤ 3,0 %<br>Galattożju: ≤ 3,0 %<br>Ilma: ≤ 9,0 % (trab)<br>Rmied, issulfat: ≤ 0,5 % (trab u likwidu)<br>Proteini residwi: ≤ 0,01 % (trab u likwidu)<br>**Metalli Tqal:**<br>Ċomb: ≤ 0,02 mg/kg (trab u likwidu)<br>Arseniku: ≤ 0,2 mg/kg (trab u likwidu)<br>Kadmju: ≤ 0,1 mg/kg (trab u likwidu)<br>Merkurju: ≤ 0,5 mg/kg (trab u likwidu)<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd totali tal-kolonji: ≤ $10^4$ CFU/g (trab), ≤ 5 000 CFU/g (likwidu)<br>Ħmira u Moffa: ≤ 100 CFU/g (trab); ≤ 50 CFU/g (likwidu)<br>*Enterobacteriaceae*/Koliformi: assenti fi 11-il gramma (trab u likwidu)<br>*Salmonella*: negattiv/100 g (trab), negattiv/200 ml (likwidu)<br>*Cronobacter*: negattiv/100 g (trab), negattiv/200 ml (likwidu)<br>Endotossini: ≤ 100 EU/g (trab), ≤ 100 EU/ml (likwidu)<br>Aflatossina M1: ≤ 0,025 µg/kg (trab u likwidu) ◄ |
| ▼M55<br>**Taħlita tat-2'-Fukosillattożju/Difukosillattożju ("2'-FL/DFL")**<br>**(sors mikrobjali)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>It-taħlita tat-2'-Fukosillattożju/Difukosillattożju hija trab amorfu abjad jew abjad jagħti fl-isfar prodott bi proċess mikrobjali.<br>**Sors**: Ir-razza K-12 DH1 tal-*Escherichia coli* mmodifikata ġenetikament<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni:**<br>Dehra: Trab abjad jew abjad jagħti fl-isfar jew agglomerati<br>Is-somma ta' 2'-Fukosillattożju, Difukosillattożju, D-Lattożju, L-Fukożju, u 3-Fukosillattożju (% ta' materja niexfa): ≥ 92,0 % (piż skont il-piż)<br>Is-somma ta' 2'-Fukosillattożju u Difukosillattożju (% tal-materja niexfa): ≥ 85,0 % (piż skont il-piż) | |

▼M55

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | 2'-Fukosillattożju (% ta' materja niexfa): ≥ 75,0 % (piż skont il-piż)<br>Difukosillattożju (% ta' materja niexfa): ≥ 5,0 % (piż skont il-piż)<br>D-Lattożju: ≤ 10,0 % (piż skont il-piż)<br>L-Fukosillattożju: ≤ 1,0 % (piż skont il-piż)<br>2′-Fukosil-D-lattulożju: ≤ 2,0 (piż skont il-piż)<br>Is-somma tal-karboidrati l-oħra ([11]): ≤ 6,0 % (piż skont il-piż)<br>Indewwa: ≤ 6,0 % (piż skont il-piż)<br>Rmied, issulfat: ≤ 0,8 % (piż skont il-piż)<br>pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %): 4,0 sa -6,0<br>Proteini residwi: ≤ 0,01 % (piż skont il-piż)<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali ta' aerobiċi mežofiliċi: ≤ 1000 CFU/g<br>*Enterobacteriacae*: ≤ 10 CFU/g<br>*Salmonella* sp.: Negattiv/25 g<br>Ħmira: ≤ 100 CFU/g<br>Moffa: ≤ 100 CFU/g<br>Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji; EU: Unitajiet ta' Endotossini |
| ▼M9<br>**Galatto-oligosakkarid** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>**Il-galatto-oligosakkarid jiġi prodott mil-lattożju tal-ħalib permezz ta' proċess enzimatiku bl-użu ta' β-galattosidaži mill-*Aspergillus oryzae*, *Bifidobacterium bifidum, Pichia pastoris, Sporobolomyces singularis, Kluyveromyces lactis, Bacillus circulans, u Papiliotrema terrestris.***<br>GOS: minimu ta' 46 % Materja Niexfa<br>Lattożju: massimu ta' 40 % Materja Niexfa<br>Glukożju: massimu ta' 27 % Materja Niexfa<br>Galattożju: minimu ta' 0,8 % Materja Niexfa<br>Rmied: massimu ta' 4,0 % Materja Niexfa<br>Proteina: massimu ta' 4,5 % Materja Niexfa<br>Nitrit: massimu ta' 2 mg/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Glukożammina HCl mill-*Aspergillus niger* u minn razza ta' *E. Coli* K-12 ġenetikament modifikata** | Trab kristallin abjad mingħajr riħa<br>Formula molekulari: $C_6H_{13}NO_5 \cdot HCl$<br>Massa molekolari relattiva: 215,63 g/mol<br>D-Glukożammina HCl 98,0-102,0 % tal-istandard ta' referenza (HPLC)<br>Rotazzjoni speċifika + 70,0° - + 73,0° |
| **Sulfat tal-glukożammina KCl mill-*Aspergillus niger* u minn razza ta' *E. Coli* K-12 ġenetikament modifikata** | Trab kristallin abjad mingħajr riħa<br>Formula molekulari: $(C_6H_{14}NO_5)_2SO_4 \cdot 2KCl$<br>Massa molekolari relattiva: 605,52 g/mol<br>Sulfat ta' D-Glukożammina 2KCl 98,0-102,0 % tal-istandard ta' referenza (HPLC)<br>Rotazzjoni speċifika +50,0° sa +52,0° |
| **Sulfat tal-glukożammina NaCl mill-*Aspergillus niger* u minn razza ta' *E. coli* K-12 ġenetikament modifikata** | Trab kristallin abjad mingħajr riħa<br>Formula molekulari: $(C_6H_{14}NO_5)_2SO_4 \cdot 2NaCl$<br>Massa molekolari relattiva: 573,31 g/mol<br>D-Glukożammina HCl: 98-102 % tal-istandard ta' referenza (HPLC)<br>Rotazzjoni Ottika Speċifika: +52 ° - +54 ° |
| **Gomma tal-Gwar** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-gomma tal-gwar fl-istat naturali tagħha hija l-endosperma mitħuna ta' żerriegħa minn razez naturali tal-gwar *Cyamopsis tetragonolobus* L. Taub. (familja tal-*Leguminosae*). Tikkonsisti minn polisakkarid b'piż molekulari għoli, magħmul b'mod ewlieni minn unitajiet ta' galattopiranoża u mannopiranoża kkumbinati permezz ta' konnessjonijiet glikosidiċi, li jistgħu jiġu deskritti kimikament bħala galattomannan (kontenut ta' galattomannan ta' mhux inqas minn 75 %).<br>Dehra: Trab abjad għal safrani<br>Piż molekulari: Bejn 50 000 u 8 000 000 Daltons<br>Numru CAS: 9000-30-0<br>Numru EINECS: 232-536-8<br>Purità: Kif speċifikat fir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([1]) u fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/175 tal-5 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi kundizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni għall-gomma tal-gwar li toriġina mill-Indja jew li tintbagħat minn hemm, minħabba r-riskju ta' kontaminazzjoni mill-pentaklorofenol u mid-dijossini ([2]). |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Proprjetajiet fiżikokimiċi:**<br>**Trab**<br>Perjodu ta' stabbiltà: Sentejn<br>Kulur: Abjad<br>Riħa: Ħafifa<br>Dijametru medju tal-partikoli: 60-70 μm<br>Ndewwa: Massimu ta' 15 %<br>Viskożità* fil-ħin ta' siegħa -<br>Viskożità* fil-ħin ta' sagħtejn: Minimu ta' 3 600 mPa.s<br>Viskożità* fil-ħin ta' 24 siegħa: Minimu ta' 4 000 mPa.s<br>Solubbiltà: Solubbli fil-miszhun u fl-ilma kiesaħ<br>pH għal 10 g/L, f'temperatura ta' 25 °C - 6-7,5<br>**Laqx**<br>Ħajja utli: Sena<br>Kulur: Abjad għal abjad miksur mingħajr jew bi ftit li xejn tikek suwed<br>Riħa: Ħafifa<br>Dijametru medju tal-partikoli: 1-10 mm<br>Ndewwa: Massimu ta' 15 %<br>Viskożità* fil-ħin ta' siegħa: Minimu ta' 3 000 mPa.s<br>Viskożità* fil-ħin ta' sagħtejn —<br>Viskożità* fil-ħin ta' 24 siegħa —<br>Solubbiltà - Solubbli fil-miszhun u fl-ilma kiesaħ<br>pH għal 10 g/L, f'temperatura ta' 25 °C - 5-7,5<br>(*) Il-kejl tal-viskożità jsir fil-kundizzjonijiet li ġejjin: 1 %, 25 °C, 20 rpm |
| **Prodotti tal-ħalib ittrattat bis-sħana ffermentati bil-*Bacteroides xylanisolvens*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-prodotti tal-ħalib ittrattati bis-sħana u ffermentati jiġu prodotti bil-*Bacteroides xylanisolvens* (DSM 23964) bħala kultura li tibda l-fermentazzjoni. |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Il-ħalib parzjalment xkumat (li jkollu bejn 1,5 % u 1,8 % xaħam) jew il-ħalib xkumat (li jkollu 0,5 % xaħam jew inqas) jiġi ppasturizzat jew ittrattat bis-sħana f'temperatura għolja ħafna qabel ma tinbeda l-fermentazzjoni bil-*Bacteroides xylanisolvens* (DSM 23964). Il-prodott tal-ħalib iffermentat li jirriżulta minn dan il-proċess jiġi omoġenizzat u mbagħad ittrattat bis-sħana biex il-*Bacteroides xylanisolvens* (DSM 23964) ma jibqax attiv. Il-prodott finali ma jkunx fih ċelloli vijabbli tal-*Bacteroides xylanisolvens* (DSM 23964)([1]).<br>([1]) DIN EN ISO 21528-2 modifikat. |
| **Idrodossitirosol** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-idrodossitirosol huwa likwidu viskuż isfar ċar li jinkiseb permezz tas-sinteżi kimika<br>Formula molekulari: $C_8H_{10}O_3$<br>Piż molekulari: 154,6 g/mol<br>Nru CAS: 10597-60-1<br>Ndewwa ≤ 0,4 %<br>Riħa: Karatteristiku<br>Togħma: Kemxejn morr<br>Solubbiltà (fl-ilma): Jitħallat mal-ilma<br>pH: 3,5-4,5<br>Indiċi refrattiv: 1,571-1,575<br>**Purità:**<br>Idrodossitirosol: ≥ 99 %<br>Aċidu aċetiku: ≤ 0,4 %<br>Aċetat tal-idrossitirosol: ≤ 0,3 %<br>Is-somma tal-aċidu omovanilliku, l-aċidu iso-omovanilliku, u 3-metossi-4idrossifenilglikolu: ≤ 0,3 %<br>**Metalli Tqal**<br>Ċomb: ≤ 0,03 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 0,01 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 0,01 mg/kg<br>**Solventi Residwi**<br>Aċetat tal-etil: ≤ 25,0 mg/kg<br>Isopropanol: ≤ 2,50 mg/kg<br>Metanol: ≤ 2,00 mg/kg<br>Tetraidrofuran: ≤ 0,01 mg/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Proteina li Tistruttura s-Silġ tat-tip III HPLC 12** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-preparazzjoni tal-Proteina li Tistruttura s-Silġ (ISP) hija likwidu ta' kulur kannella ċar prodott mill-fermentazzjoni ta' varjant ta' ħmira tal-furnar ta' grad tal-ikel li tkun ġenetikament modifikata (*Saccharomyces cerevisiae*) u li fih ikun iddaħħal ġene sintetiku għall-ISP fil-ġenomu tal-ħmira. Il-proteina tiġi ffurmata u mormija fl-ambjent tat-tkabbir fejn tiġi sseparata miċ-ċelloli tal-ħmira permezz tal-mikrofiltrazzjoni u kkonċentrata permezz tal-ultrafiltrazzjoni. B'riżultat ta' dan, iċ-ċelloli tal-ħmira ma jkunux ittrasferiti għal ġol-preparazzjoni tal-ISP bħala ċelloli tal-ħmira jew taħt forma mibdula. Il-preparazzjoni tal-ISP tikkonsisti minn ISP fl-istat naturali tagħha, ISP glikosilata u proteini u peptidi mill-ħmira u miz-zokkor kif ukoll aċidi u mluħa li normalment jinstabu fl-ikel. Il-konċentrat jiġi stabilizzat b'bafer ta' aċidu ċitriku ta' 10 mM.<br>Assaġġ: ≥ 5 g/l ta' ISP attiva<br>pH: 2,5-3,5<br>Rmied: ≤ 2,0 %<br>DNA: Mhux traċċabbli |
| **Estratt milwiem mill-weraq niexef tal-*Ilex guayusa*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Likwidu kannella skur. Estratti milwiema mill-weraq niexef tal-*Ilex guayusa.*<br>**Kompożizzjoni:**<br>Proteina: < 0,1 g/100 ml<br>Xaħam: < 0,1 g/100 ml<br>Karboidrat: 0,2–0,3 g/100 ml<br>Total taz-zokkor: < 0,2 g/100 ml<br>Kafeina: 19,8-57,7 mg/100 ml<br>Teobromina: 0,14-2,0 mg/100 ml<br>Aċidi kloroġeniċi: 9,9-72,4 mg/100 ml |

▼M46

| | |
|---|---|
| **Infużjoni mill-weraq tal-kafe ta' *Coffea arabica* L. u/jew minn *Coffea canephora* Pierre ex A. Froehner**<br>**(Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel tradizzjonali jikkonsisti f'infużjoni ta' weraq minn *Coffea arabica* L. u/jew minn *Coffea canephora* Pierre ex A.Froehner (familja: Rubiaceae).<br>L-ikel tradizzjonali huwa ppreparat billi jitħallat massimu ta' 20 g ta' weraq niexef minn *Coffea arabica* L. u/jew *Coffea canephora* Pierre ex A.Froehner b' 1 L ta' ilma sħun. Il-weraq jitneħħew u l-infużjoni mbagħad tiġi soġġetta għal pastorizzazzjoni (minn tal-inqas 71 °C għal 15-il sekonda). |


▼M46

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Kompożizzjoni:**<br>Dehra: Likwidu aħdar kannella<br>Riħa u togħma: Karatteristika<br>Aċidu kloroġeniku (5-CQA): < 100 mg/L<br>Kafeina: < 80 mg/L<br>Gallat tal-epigallokatekina (EGCG): < 700 mg/L<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-kolonji: < 500 CFU/g<br>Għadd ta' ħmira u moffa totali: < 100 CFU/g<br>Koliformi totali: < 100 CFU/g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'1 g<br>*Salmonella*: Assenti f'25 g<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb (Pb): < 3,0 mg/L<br>Arseniku (As): < 2,0 mg/L<br>Kadmju (Cd): < 1,0 mg/L<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Isomalto-oligosakkarid** | **Trab:**<br>Solubbiltà (fl-ilma) (%): > 99<br>Glukożju (% bażi niexfa): ≤ 5,0<br>Iżomaltożju + DP3 sa DP9 (% bażi niexfa): ≥ 90<br>Ndewwa (%): ≤ 4,0<br>Rmied issulfat (g/100 g): ≤ 0,3<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb (mg/kg): ≤ 0,5<br>Arseniku (mg/kg): ≤ 0,5 |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Ġulepp:**<br>Solidi niexfa (g/100 g): > 75<br>Glukożju (% bażi niexfa): ≤ 5,0<br>Iżomaltożju + DP3 sa DP9 (% bażi niexfa): ≥ 90<br>pH: 4 - 6<br>Rmied issulfat (g/100 g): ≤ 0,3<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb (mg/kg): ≤ 0,5<br>Arseniku (mg/kg): ≤ 0,5 |
| **Iżomaltulożju** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Bħala disakkarid li jikkonsisti minn parti ta' glukożju u parti ta' fruttożju mwaħħlin ma' xulxin permezz ta' rabta alfa-1,6-glikosidika. Jista' jinkiseb mis-sukrożju permezz ta' proċess enzimatiku. Il-prodott kummerċjali huwa l-monoidrat. Dehra: Kważi bla riħa, kristalli bojod jew kważi bojod b'togħma ħelwa<br>Isem kimiku: 6-O-α-D-glukopiranosil-D-fruttofuranożju, monoidrat<br>Nru CAS: 13718-94-0<br>Formula kimika: $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot H_2O$<br>Formula strutturali<br><br>Piż tal-formula: 360,3 (monoidrat) |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Purità:**<br>Assaġġ: ≥ 98 % fuq il-bażi niexfa<br>Telf mat-tnixxif: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 sigħat)<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 0,1 mg/kg<br>Iddetermina permezz ta' teknika tal-assorbiment atomiku xierqa għal-livell speċifikat. L-għażla tad-daqs tal-kampjuni u l-metodu tal-preparazzjoni tal-kampjuni jistgħu jkunu bbażati fuq il-prinċipji tal-metodu deskritt fl-FNP 5 ([1]), "Metodi strumentali"<br>([1]) Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 — Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA), 1991, 322 pp., English, ISBN 92-5-102991-1. |
| **Lattitol** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Trab kristallin jew soluzzjoni bla kulur immanifatturata bl-idroġenazzjoni katalitika tal-lattożju. Il-prodotti kristallini jinsabu fil-forma anidra, monoidrata u diidrat. In-nikil jintuża bħala katalista.<br>Isem kimiku: 4-O-β-D-Galattopiranosil-D-glucitol<br>Formula kimika: $C_{12}H_{24}O_{11}$<br>Piż molekulari: 344,31 g/mol<br>Nru CAS: 585-86-4<br>**Purità:**<br>Solubilità (fl-ilma): Solubbli ħafna fl-ilma<br>Rotazzjoni speċifika $[\alpha]_D^{20}$ = + 13° sa + 16°<br>Assaġġ: ≥ 95 % d.b (d.b - espress abbażi tal-piż niexef)<br>Ilma: ≤ 10,5 %<br>Polioli oħrajn: ≤ 2,5 % d.b<br>Zokkriet ta' riduzzjoni: ≤ 0,2 % d.b<br>Kloruri: ≤ 100 mg/kg d.b<br>Sulfati: ≤ 200 mg/kg d.b<br>Rmied issulfat: ≤ 0,1 % d.b<br>Nikil: ≤ 2.0 mg/kg d.b<br>Arseniku: ≤ 3.0 mg/kg d.b<br>Ċomb: ≤ 1.0 mg/kg d.b |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Latto-*N*-neotetraożju (sintetiku)** | **Definizzjoni**:<br>Isem kimiku: β-D-Galattopiranosil-(1→4)-2-aċetamido-2-deossi-β-D-glukopiranosil-(1→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glukopiranożju<br>Formula kimika: $C_{26}H_{45}NO_{21}$<br>Nru CAS: 13007-32-4<br>Piż molekulari: 707,63 g/mol<br>**Deskrizzjoni:**<br>Il-latto-*N*-neotetraożju huwa trab abjad għal abjad miksur li huw prodott permezz ta' proċess ta' sinteżi kimika u jiġi iżolat permezz tal-kristallizzazzjoni.<br>**Purità:**<br>Assaġġ (mingħajr ilma): ≥ 96 %<br>D-Lattożju: ≤ 1,0 %<br>Latto-N-triożju II: ≤ 0,3 %<br>Isomeru tal-fruttożju latto-N-neotetraożju: ≤ 0,6 %<br>pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %): 5,0-7,0<br>Ilma: ≤ 9,0 %<br>Rmied, issulfat: ≤ 0,4 %<br>Aċidu aċetiku: ≤ 0,3 %<br>Solventi residwi (metanol, 2-propanol, aċetat tal-metil, aċeton): ≤ 50 mg/kg l-wieħed, ≤ 200 mg/kg flimkien<br>Proteini residwi: ≤ 0,01 %<br>Palladju: ≤ 0,1 mg/kg<br>Nikil: ≤ 3,0 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali ta' batterji aerobiċi mežofiliċi: ≤ 500 CFU/g<br>Ħmejjer: ≤ 10 CFU/g<br>Mofof: ≤ 10 CFU/g<br>Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg |
| ▼M64 | |
| **Lakto-*N*-neotetraożju (sors mikrobjali)** | **Definizzjoni:**<br>Isem kimiku: β-D-Galaktopiranożil-(1→4)-2-aċetamido-2-deoksi-β-D-glukopiranożil-(1→3)-β-D-galaktopiranożil-(1→4)-D-glukopiranożju<br>Formula kimika: $C_{26}H_{45}NO_{21}$<br>Nru CAS: 13007-32-4<br>Piż molekulari: 707,63 g/mol |

▼M64

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Sors:**<br>— Ir-razza K-12 ġenetikament modifikata tal-*Escherichia coli*, jew<br>— taħlita tar-razez ġenetikament modifikati PS-L*N*nT-JBT u DS-L*N*nT-JBT tal-*Escherichia coli* BL21(DE3)<br>**Deskrizzjoni:**<br>Il-Lakto-*N*-neotetraożju huwa trab ta' lewn abjad għal abjad mitfi li jiġi prodott permezz ta' proċess mikrobijoloġiku.<br>**Purità:**<br>Assaġġ (mingħajr ilma): ≥ 80 %<br>D-Lattożju: ≤ 10,0 %<br>Lakto-*N*-triożju II: ≤ 3,0 %<br>*para*-Lakto-*N*-neoeżaożju: ≤ 5,0 %<br>l-isomeru tal-fruttożju tal-Lakto-*N*-neotetraożju: ≤ 1,0 %<br>Is-somma tas-sakkaridi (Lakto-*N*-neotetraożju, D-Lattożju, Lakto-*N*-triożju II, *para*-Lakto-N-neoeżaożju, l-isomeru tal-fruttożju tal-Lakto-*N*-neotetraożju): ≥ 92 % (% w/w materja niexfa)<br>pH (20 °C, soluzzjoni ta' 5 %): 4,0-7,0<br>Ilma: ≤ 9,0 %<br>Irmied, issulfat: ≤ 1,0 %<br>Solventi residwi (metanol): ≤ 100 mg/kg<br>Proteini residwi: ≤ 0,01 %<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd totali ta' batterji mežofiliċi aerobiċi: ≤ 500 CFU/g<br>Ħmira u moffa: ≤ 50 CFU/g<br>Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji; EU: Unitajiet ta' Endotossini |

▼M43

▼M66

| | |
|---|---|
| **Latto-*N*-tetraożju ("LNT") (sors mikrobjali)** | **Definizzjoni:**<br>Formula kimika: $C_{26}H_{45}NO_{21}$<br>Isem kimiku: β-D-galattopiranosil-(1→3)-2-aċetamido-2-deossi-β-D-glukopiranosil-(1→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glukopiranożju<br>Massa molekolari: 707.63 Da<br>Nru CAS 14116-68-8<br>**Deskrizzjoni:**<br>Il-Latto-*N*-tetraożju huwa trab purifikat, amorfu, abjad jagħti fl-abjad miksur jew agglomerati li jiġi prodott permezz ta' proċess mikrobjali. |

▼M66

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Sors:**<br>Ir-razza ġenetikament modifikata tal-*Escherichia coli* ir-razza K-12 DH1<br>**Karatteristiki/Kompożizzjoni:**<br>Id-dehra: Trab abjad jew abjad jagħti fl-isfar jew agglomerati<br>Somma ta' latto-*N*-tetraożju, D-Lattożju u latto-*N*-triożju II (% ta' materja niexfa): ≥ 90,0 % (piż skont il-piż)<br>Latto-*N*-tetraożju (% ta' materja niexfa): ≥ 70,0 % (piż skont il-piż)<br>D-Lattożju: ≤ 12,0 % (piż skont il-piż)<br>Latto-*N*-triożju II:: ≤ 10,0 % (piż skont il-piż)<br>*Para*-latto-*N*-eżaożju-2: ≤ 3,5 % (piż skont il-piż)<br>Latto-*N*-tetraożju isomeru tal-fruttożju: ≤ 1,0 % (piż skont il-piż)<br>Is-somma tal-karboidrati l-oħra: ≤ 5,0 % (piż skont il-piż)<br>Indewwa: ≤ 6,0 % (piż skont il-piż)<br>Rmied, issulfat: ≤ 0,5 % (piż skont il-piż)<br>pH (soluzzjoni ta' 5 %, f'temperatura ta' 20 °C): 4,0 -6,0<br>Proteina residwa: ≤ 0,01 % (piż skont il-piż)<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd totali tal-kolonji ta' batterji mežofiliċi aerobiċi: ≤ 1 000 UJK/g<br>*Enterobacteriaceae*: ≤ 10 UJK/g<br>*Salmonella* spp.: Negattiv/25 g<br>Ħmira: ≤ 100 UJK/g<br>Moffa: ≤ 100 UJK/g<br>Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji |

▼M20

| | |
|---|---|
| **Il-frott artab tal-*Lonicera caerulea* L. (haskap)**<br>**(Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel tradizzjonali huwa l-frott artab frisk u ffriżat tal-*Lonicera caerulea* var. edulis.<br>Il-*Lonicera caerulea* L. hija sġajra deċidwa tal-familja *Caprifoliaceae.*<br>**Komponenti nutrittivi tipiċi tal-frott artab tal-haskap** (tal-frott artab frisk):<br>Karboidrati: 12,8 %<br>Fibra: 2,1 %<br>Lipidi: 0,6 %<br>Proteina: 0,7 % |

▼M20

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Rmied: 0,4 %<br>Ilma: 85,5 % |
| ▼M9<br>**Estratt tal-weraq tal-alfalfa mill-*Medicago sativa*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-alfalfa (*Medicago sativa* L.) tiġi pproċessata fl-ewwel sagħtejn wara li tinħasad. Titqatta' u titgħaffeġ. Meta tingħadda minn pressa ta' tip żejtni, l-alfalfa tipprovdi residwu fibruż u meraq mill-pressa (10 % tal-materja niexfa). Il-materja niexfa ta' dan il-meraq fiha madwar 35 % ta' proteina mhux raffinata. Il-meraq ippressat (pH 5,8-6,2) jiġi newtralizzat. It-tisħin minn qabel u l-injezzjoni tal-fwar jippermettu l-koagulazzjoni tal-proteini assoċjati mal-pigmenti karotenojdi u tal-klorofilla. Il-preċipitat proteiniku jiġi sseparat permezz taċ-ċentrifugazzjoni u mbagħad jitnixxef. Wara li jinżiedlu l-aċidu askorbiku, il-konċentrat tal-proteina tal-alfalfa jitfarrak u jinħażen fil-gass inerti jew fil-kesħa.<br>**Kompożizzjoni:**<br>Proteina: 45-60 %<br>Xaħam: 9-11 %<br>Karboidrati liberi (fibra solubbli): 1-2 %<br>Polisakkaridi (fibra insolubbli): 11-15 %<br>inkluża ċ-ċelluloża: 2-3 %<br>Minerali: 8-13 %<br>Saponini: ≤ 1,4 %<br>Isoflavoni: ≤ 350 mg/kg<br>Kumestrol: ≤ 100 mg/kg<br>Fitati: ≤ 200 mg/kg<br>L-kanavanin: ≤ 4,5 mg/kg |
| **Likopen** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-likopen sintetiku huwa prodott mill-kondensament Wittig ta' intermedji sintetiċi li jintużaw ħafna fil-produzzjoni ta' karotenojdi oħra li jintużaw fl-ikel. Il-likopen sintetiku jikkonsisti minn ≥ 96 % likopen u kwantitajiet żgħar ta' komponenti karotenojdi relatati oħrajn. Il-likopen huwa ppreżentat jew bħala trab f'matriċi addattata jew bħala dispersjoni żejtnija. Il-kulur huwa aħmar skur jew aħmar jagħti fil-vjola. Il-protezzjoni antiossidativa trid tkun żgurata.<br>Isem kimiku: Likopen<br>Nru CAS: 502-65-8 (translikopen kollu)<br>Formula kimika: $C_{40}H_{56}$<br>Piż tal-formula: 536,85 Da |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Likopen mill-*Blakeslea trispora*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-likopen ippurifikat mill-*Blakeslea trispora* jikkonsisti minn ≥ 95 % ta' likopen u ≤ 5 % ta' karotenojdi oħrajn. Jiġi ppreżentat jew bħala trab f'matriċi addattata jew bħala dispersjoni żejtnija. Il-kulur huwa aħmar skur jew aħmar jagħti fil-vjola. Il-protezzjoni antiossidativa trid tkun żgurata.<br>Isem kimiku: Likopen<br>Nru CAS: 502-65-8 (translikopen kollu)<br>Formula kimika: $C_{40}H_{56}$<br>Piż tal-formula: 536,85 Da |
| **Likopen mit-tadam** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-likopen ippurifikat mit-tadam (*Lycopersicon esculantum* L.) jikkonsisti minn ≥ 95 % ta' likopen u ≤ 5 % ta' karotenojdi oħrajn. Jiġi ppreżentat jew bħala trab f'matriċi addattata jew bħala dispersjoni żejtnija. Il-kulur huwa aħmar skur jew aħmar jagħti fil-vjola. Il-protezzjoni antiossidativa trid tkun żgurata.<br>Isem kimiku: Likopen<br>Nru CAS: 502-65-8 (translikopen kollu)<br>Formula kimika: $C_{40}H_{56}$<br>Piż tal-formula: 536,85 Da |
| **Oleoraża tal-likopen mit-tadam** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Ir-reżina żejtnija tal-likopen mit-tadam tinkiseb permezz ta' estrazzjoni mit-tadam misjur (*Lycopersicon esculentum Mill.*) bis-solventi bit-tneħħija sussegwenti tas-solvent. Dan huwa likwidu luċidu, viskuż ta' lewn li jvarja minn aħmar għal kannella skur.<br>Likopen totali: 5-15 %<br>Li minnu trans-likopen: 90-95 %<br>Karotenojdi totali (ikkalkolati bħala likopen): 6,5-16,5 %<br>Karotenojdi oħrajn: 1,75 %<br>(Fitoen/Fitofluwen/β-karotina): (0,5-0,75/0,4-0,65/0,2-0,35 %)<br>Tokoferoli totali: 1,5-3,0 %<br>Materja insaponifikabbli: 13-20 %<br>Total ta' aċidi xaħmin: 60-75 %<br>Ilma (Karl Fischer): ≤ 0,5 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M49 | |
| **Liżożima idrolizzata tal-abjad tal-bajd tat-tiġieġ** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni**<br>Il-liżożima idrolizzata tal-abjad tal-bajd tat-tiġieġ tinkiseb mil-liżożima tal-abjad tal-bajd tat-tiġieġ permezz ta' proċess enżimatiku, bl-użu tas-subtiliżina mill-*Bacillus licheniformis*.<br>Il-prodott huwa trab abjad għal isfar ċar.<br>**Speċifikazzjoni**<br>Proteina (TN(*) x 5,30): 80-90 %<br>Triptofan: 5-7 %<br>Proporzjon ta' Triptofan/LNAA(**): 0,18-0,25<br>Grad ta' idroliżi: 19-25 %<br>Ndewwa: > 5 %<br>Irmied: > 10 %<br>Sodju: > 6 %<br>**Metalli tqal**<br>Arseniku: < 1 ppm<br>Ċomb: < 1 ppm<br>Kadmju: < 0,5 ppm<br>Merkurju: < 0,1 ppm<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi**Għadd totali tal-kolonji aerobiċi: < $10^3$ CFU/g<br>Għadd totali tal-ħmira u l-moffa kkombinati: < $10^2$ CFU/g<br>Enterobatterji: < 10 CFU/g<br>*Salmonella* spp: Assenti f'25 g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'10 g<br>*Staphylococcus aureus*: Assenti f'10 g<br>*Pseudomonas aeruginosa*: Assenti f'10 g<br><br>(*) TN: nitroġenu totali<br>(**) LNAA: aċidi amminiċi newtrali kbar |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Ċitrat malat tal-manjeżju** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iċ-ċitrat malat tal-manjeżju huwa trab amorfu abjad għal abjad safrani.<br>Formula kimika: $Mg_5$ $(C_6H_5O_7)_2$ $(C_4H_4O_5)_2$<br>Isem kimiku: Pentamanjeżju di-(2-idrossibutanedioat)-di-(2- idrossipropan-1,2,3,-trikarbossilat)<br>Nru CAS: 1259381-40-2<br>Piż molekulari: 763,99 Daltons (anidru)<br>Solubbiltà: Solubbli faċilment fl-ilma (madwar 20 g f'100 ml)<br>Deskrizzjoni tiegħu fl-istat fiżiku: Trab amorfu<br>Manjeżju tal-assaġġ: 12,0-15,0 %<br>Telf fit-tnixxif (120 °C għal 4 sigħat): ≤ 15 %<br>Kulur (solidu): Trab abjad għal abjad safrani<br>Kulur (soluzzjoni milwiema ta' 20 %): Bla kulur għal safrani<br>Dehra (soluzzjoni milwiema ta' 20 %): Soluzzjoni lukida<br>pH (soluzzjoni milwiema ta' 20 %): Madwar 6,0<br>**Impuritajiet:**<br>Klorur: ≤ 0,05 %<br>Sulfat: ≤ 0,05 %<br>Arseniku: ≤ 3,0 ppm<br>Ċomb: ≤ 2,0 ppm<br>Kadmju: ≤ 1 ppm<br>Merkurju: ≤ 0,1 ppm |
| **Estratt mill-qoxra tas-siġra tal-manjolja** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-estratt mill-qoxra tas-siġra tal-manjolja jinkiseb mill-qoxra tal-pjanta *Magnolia officinalis* L. u jiġi prodott permezz tad-diossidu tal-karbonju superkritiku. Il-qoxra tinħasel u titnixxef fil-forn biex jitnaqqas il-kontenut ta' ndewwa qabel ma titgħaffeġ u jinkiseb l-estratt permezz tad-diossidu tal-karbonju superkritiku. L-estratt jinħall fl-etanol ta' grad mediku u jiġi kkristallizzat mill-ġdid biex jagħti l-estratt tal-qoxra tal-manjolja.<br>L-estratt tal-qoxra tal-manjolja huwa magħmul primarjament minn żewġ komposti fenoliċi, il-manjolol u l-ħonokjol.<br>Dehra: Trab ta' lewn kannella ċar<br>**Purità:**<br>Manjolol: ≥ 85,2 %<br>Ħonokjol: ≥ 0,5 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Manjolol u Ħonokjol: ≥ 94 %<br>Total ta' Ewdesmol: ≤ 2 %<br>Ndewwa: 0,50 %<br>**Metalli tqal:**<br>Arseniku (ppm): ≤ 0,5<br>Ċomb (ppm): ≤ 0,5<br>Ewgenol tal-metil (ppm): ≤ 10<br>Tubokurarin (ppm): ≤ 2,0<br>Alkalojdi totali (ppm): ≤ 100 |
| **Żejt tas-sufara tal-qamħirrum li fih ħafna materja insaponifikabbli** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żejt tas-sufara tal-qamħirrum li fih ħafna materja insaponifikabbli jiġi prodott permezz tad-distillazzjoni bil-vakwu u jvarja miż-żejt tas-sufara tal-qamħirrum irfinut minħabba l-konċentrazzjoni tal-frazzjoni insaponifikabbli (1,2 g fiż-żejt tas-sufara tal-qamħirrum irfinut u 10 g fiż-"żejt tas-sufara tal-qamħirrum li fih ħafna materja insaponifikabbli").<br>**Purità:**<br>Materja insaponifikabbli: > 9,0 g/100 g<br>Tokoferoli: ≥ 1,3 g/100 g<br>α-tokoferol (%): 10-25 %<br>β-tokoferol (%): < 3,0 %<br>γ-tokoferol (%): 68-89 %<br>δ-tokoferol (%): < 7,0 %<br>Steroli, alkoħol triterpeniku, metilsteroli: > 6,5 g/100 g<br>Aċidi xaħmin fit-trigliċeridi:<br>aċidu palmitiku: 10,0-20,0 %<br>aċidu steariku: < 3,3 %<br>aċidu olejku: 20,0-42,2 %<br>aċidu linolejku: 34,0-65,6 %<br>aċidu linoleniku: < 2,0 %<br>Valur aċiduż: ≤ 6,0 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 10 mEq $O_2$/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Metalli tqal:**<br>Ħadid (Fe): < 1 500 µg/kg<br>Ram (Cu): < 100 µg/kg<br>**Impuritajiet:**<br>Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH) Benżo(a)piren: < 2 µg/kg<br>It-trattament bil-faħam attiv huwa meħtieġ biex ikun żgurat li l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH) ma jiġux arrikkiti fil-produzzjoni taż-"żejt tas-sufara tal-qamħirrum b'materja insaponifikabbli għolja" |
| **Metilċelluloża** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Ċelluloži metilika hija ċelluloži akkwistata direttament minn razez naturali tal-materja minn pjanti fibruži u parzjalment eterifikata mal-gruppi metiliċi.<br>Isem kimiku: Etere metiliku taċ-ċelluloża<br>Formula kimika: Il-polimeri fihom unitajiet sostitwiti tal-anidroglukożju b'din il-formula ġenerali li ġejja:<br>C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3) fejn R1, R2, R3 jistgħu jkunu lkoll wieħed minn dawn li ġejjin:<br>— H<br>— $CH_3$ jew<br>— $CH_2CH_3$<br>Piż molekulari: Makromolekuli: minn madwar 20 000 (n madwar 100) sa madwar 380 000 g/mol (n madwar 2 000)<br>Assaġġ: Kontenut ta' mhux anqas minn 25 % u mhux aktar minn 33 % ta' gruppi metossiliċi (-$OCH_3$) u mhux aktar minn 5 % ta' gruppi idrossietossiliċi (-$OCH_2CH_2OH$)<br>Trab granulari jew fibruż, kemxejn igroskopiku bajdani jew xi ftit safrani jew fil-griż, mingħajr riħa u mingħajr togħma.<br>Solubbiltà: Jintefaħ fl-ilma, jipproduċi soluzzjoni luċida jew opalixxenti, viskuża u kollodjali. Insolubbli fl-etanol, fl-etere u fil-kloroformi. Solubbli fl-aċidu aċetiku glaċjali.<br>**Purità:**<br>Telf mat-tnixxif: ≤ 10 % (105 °C, 3 sigħat)<br>Irmied Issulfat: ≤ 1,5 % iddeterminat fi 800 ± 25 °C<br>pH: ≥ 5,0 u ≤ 8,0 (1 % soluzzjoni kollojdali)<br>**Metalli tqal:**<br>Arseniku: ≤ 3,0 mg/kg<br>Ċomb: ≤ 2,0 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 1,0 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 1,0 mg/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M11 | |
| **Klorur tal-1-Metilnikotinammid** | **Definizzjoni:**<br>Isem kimiku: klorur tat-3-karbamojl-1-metil-piridinjum<br>Formula kimika: $C_7H_9N_2OCl$<br>Nru CAS: 1005-24-9<br>Piż molekulari: 172,61 Da<br>**Deskrizzjoni**<br>il-klorur tal-1-Metilnikotinammid huwa solidu kristallin abjad jew abjad maħmuġ, prodott permezz ta' proċess ta' sinteżi kimika.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni**<br>Dehra: Solidu kristallin minn abjad sa abjad maħmuġ<br>Purità: ≥ 98,5 %<br>Trigonellina: ≤ 0,05 %<br>Aċidu Nikotiniku: ≤ 0,10 %<br>Nikotinammid ≤ 0,10 %<br>L-akbar impurità mhux magħrufa: ≤ 0,05 %<br>It-total ta' impuritajiet mhux magħrufa: ≤ 0,20 %<br>It-total ta' impuritajiet: ≤ 0,50 %<br>Solubbiltà: Jinħall fl-ilma u fil-metanol. Prattikament ma jinħallx fit-2-propanol u fid-diklorometan<br>Ndewwa: ≤ 0,3 %<br>Telf mat-tnixxif: ≤ 1,0 %<br>Residwu mat-tqabbid: ≤ 0,1 %<br>**Solventi Residwi u Metalli Tqal**<br>Metanol: ≤ 0,3 %<br>Metalli tqal: ≤ 0,002 %<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd mikrobjali aerobiku totali: ≤ 100 CFU/g<br>Ħmira/moffa: ≤ 10 CFU/g<br>Enterobacteriaceae: assenti f'1 g<br>*Pseudomonas aeruginosa*: assenti f'1 g<br>*Staphylococcus aureus:* assenti f'1 g<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku, melħ tal-glukożammina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Isem kimiku: N-[4-[[[(6S)-2-ammino-1,4,5,6,7,8-eżaidro-5-metil-4-osso-6-pteridinil]metil]ammino]benżoil]-L-aċidu glutammiku, melħ tal-glukosammina<br>Formula kimika: $C_{32}H_{51}N_9O_{16}$<br>Piż molekulari: 817,80 g/mol (anidruż)<br>Nru CAS: 1181972-37-1<br>Dehra: Trab ta' lewn bajdani għal kannella ċar<br>**Purità:**<br>Purità diastereoiżomerika: Mill-inqas 99 % ta' aċidu (6S)-5-metiltetraidrofoliku<br>Assaġġ tal-glukosammina: 34-46 % f'bażi xotta<br>Assaġġ tal-aċidu 5-metiltetraidrofoliku: 54-59 % f'bażi xotta<br>Ilma: ≤ 8,0 %<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 2,0 ppm<br>Kadmju: ≤ 1,0 ppm<br>Merkurju: ≤ 0,1 ppm<br>Arseniku: ≤ 2,0 ppm<br>Boron: ≤ 10 ppm<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd mikrobjali aerobiku totali: ≤ 100 CFU/g<br>Ħmira u moffa: ≤ 100 CFU/g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'10 g |
| **Monometilsilanetrijol (Siliċju organiku)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Isem kimiku: Silanetrijol, 1-metil-<br>Formula kimika: $CH_6O_3Si$<br>Piż molekulari: 94,14 g/mol<br>Nru CAS: 2445-53-6 |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Purità:**<br>Preparazzjoni tas-siliċju organiku (monometilsilanetrijol) (soluzzjoni milwiema):<br>Aċidità (pH): 6,4-6,8<br>Siliċju: 100-150 mg Si/l<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 1,0 µg/l<br>Merkurju: ≤ 1,0 µg/l<br>Kadmju: ≤ 1,0 µg/l<br>Arseniku: ≤ 3,0 µg/l<br>**Solventi:**<br>Metanol: ≤ 5,0 mg/kg (preżenza residwa) |
| **Estratt tal-miċelju mill-faqqiegħ Shiitake (*Lentinula edodes*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ingredjent tal-ikel ġdid huwa estratt milwiem sterili miksub mill-miċelju tal-*Lentinula edodes* ikkultivat ġo fermentazzjoni mgħaddsa. Huwa likwidu kannella ċar, kemxejn imdardar.<br>Il-lentinan huwa β-(1-3) β-(1-6)-D-glukan li għandu piż molekulari ta' madwar 5 x $10^5$ Daltons, livell ta' fergħat ta' 2/5 u struttura spirali terzjarja tripla.<br>**Purità/Kompożizzjoni tal-estratt miċeljali mil-*Lentinula edodes*:**<br>Ndewwa: 98 %<br>Materja niexfa: 2 %<br>Glukożju liberu: < 20 mg/ml<br>Proteini totali ([1]): < 0.1 mg/ml<br>Kostitwenti li fihom N ([2]): < 10 mg/ml<br>Lentinan: 0,8 – 1,2 mg/ml<br>([1]) Metodu Bradford<br>([2]) Metodu Kjeldahl |
| ▼M38<br>**Klorur tan-nikotinammidribosid** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel ġdid huwa forma sintetika tan-nikotinammidribosid.<br>L-ikel ġdid fih ≥ 90 % ta' klorur tan-nikotinammidribosid, b'mod predominanti fil-forma β tiegħu, filwaqt li l-komponenti li jifdal huma solventi residwi, prodotti sekondarji ta' reazzjoni u prodotti ta' degradazzjoni. |

▼M38

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Klorur tan-nikotinammidribosid:<br>Numru CAS: 23111-00-4<br>Numru tal-KE: 807-820-5<br>Isem tal-IUPAC: 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-diidrossi-5-(idrossimetil)ossolan-2-il]piridin-1-ju-3-karbossammid;klorur<br>Formula kimika: $C_{11}H_{15}N_2O_5Cl$<br>Piż molekulari: 290,7 g/mol<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni:**<br>Kulur: Abjad fil-kannella ċar<br>Forma: Trab<br>Identifikazzjoni: Ikkonfermata minn l-NMR (reżonanza manjetika nukleari)<br>Klorur tan-nikotinammidribosid: ≥ 90 %<br>Kontenut ta' ilma: ≤ 2 %<br>**Solventi residwi:**<br>Aċeton: ≤ 5 000 mg/kg<br>Metanol: ≤ 1 000 mg/kg<br>Aċetonitril: ≤ 50 mg/kg<br>Metil-terz-butil-etere: ≤ 500 mg/kg<br>**Prodotti sekondarji ta' reazzjoni:**<br>Aċetat tal-metil: ≤ 1 000 mg/kg<br>Aċetammid: ≤ 27 mg/kg<br>Aċidu aċetiku: ≤ 5 000 mg/kg<br>**Metalli tqal:**<br>Arseniku: ≤ 1 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd Totali tal-Kolonji: ≤ 1000 CFU/g<br>Ħmira u Moffa: ≤ 100 CFU/g<br>*Escherichia coli*: Assenza f'10 g |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Meraq tal-frott tan-Noni (*Morinda citrifolia*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-frott tan-Noni (il-frott tal-*Morinda citrifolia* L.) jiġi ppressat. Il-meraq li jinkiseb jiġi ppasturizzat. Jista' jsir pass fakultattiv ta' fermentazzjoni qabel jew wara l-ippressar.<br>Rubiadin: ≤ 10 µg/kg<br>Luċidin: ≤ 10 µg/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Trab tal-meraq tal-frott tan-Noni (*Morinda citrifolia*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żerriegħa u l-qoxra tal-frott tal-*Morinda citrifolia* imnixxef fix-xemx jitneħħew. Il-polpa li tinkiseb tiġi ffiltrata biex il-meraq jinfired mil-laħma tal-frott. It-tnixxif tal-meraq li jinkiseb jista' jsir b'żewġ modi:<br>Jew bl-atomizzazzjoni bl-użu ta' maltodestrini tal-qamħirrum, din it-taħlita tinkiseb billi r-rati tal-influss tal-meraq u tal-maltodestrini jinżammu kostanti<br>Inkella biż-żeodratazzjoni jew bit-tnixxif segwit b'taħlit ma' eċċipjent, dan il-proċess jippermetti li l-ewwel jitnixxef il-meraq imbagħad jitħallat mal-maltodestrini (l-istess ammont li jintuża fl-atomizzazzjoni). |
| **Purè u konċentrat tal-frott tan-noni (*Morinda citrifolia*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-frott *Morinda citrifolia* jinħasad bl-idejn. Iż-żerriegħa u l-qoxra jistgħu jinfirdu b'mod mekkaniku mill-frott mgħaffeġ. Wara l-pasturizzazzjoni, il-purè jiġi ppakkjat f'kontenituri li mhumiex settiċi u jinħażen f'kundizzjonijiet kesħin.<br>Il-konċentrat tal-*Morinda citrifolia* jitħejja mill-purè tal-*M. citrifolia* permezz ta' trattament b'enzimi pektinolitiċi (50-60 °C għal siegħa-sagħtejn). Imbagħad il-purè jissaħħan biex imewwet il-pectinases u mbagħad jitkessaħ mill-ewwel. Il-meraq jinfired f'karaffa ċentrifuga. Wara, il-meraq jinġabar u jiġi pasturizzat, qabel ma jiġi kkonċentrat f'evaporatur vakwu minn brix ta' 6 sa 8 għal brix ta' 49 sa 51 fil-konċentrat finali.<br><br>**Kompożizzjoni:**<br>**Purè**:<br>Ndewwa: 89-93 %<br>Proteina: < 0,6 g/100 g<br>Xaħam: ≥ 0,4 g/100 g<br>Rmied: < 1,0 g/100 g<br>Karboidrati totali: 5-10 g/100 g<br>Fruttożju: 0,5-3,82 g/100 g<br>Glukożju: 0,5-3,14 g/100 g<br>Fibra: < 0,5-3 g/100 g<br>5,15-dimetilmorindol (1): ≤ 0,254 µg/ml<br>Luċidin (1): Mhux traċċabbli<br>Aliżarin (1): Mhux traċċabbli<br>Rubiadin (1): Mhux traċċabbli<br>**Konċentrat**:<br>Ndewwa: 48-53 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Proteina: 3-3,5 g/100 g<br>Xaħam: < 0,04 g/100 g<br>Rmied: 4,5-5,0 g/100 g<br>Karboidrati totali: 37-45 g/100 g<br>Fruttożju: 9-11 g/100 g<br>Glukożju: 9-11 g/100 g<br>Fibra: 1,5-5,0 g/100 g<br>5,15-dimetilmorindol ([1]): ≤ 0,254 µg/ml<br>([1]) *B'metodu HPLC-UV żviluppat u vvalidat għall-analiżi tal-antrakwinoni fil-purè u fil-konċentrat tal-Morinda citrifolia. Limiti ta' detezzjoni: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindol); 50,0 ng/mL (luċidin); 6,3 ng/ml (aliżarin) u 62,5 ng/ml (rubiadin).* |
| **Weraq tan-noni (*Morinda citrifolia*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Wara li jinqatgħu, il-weraq tal-*Morinda citrifolia* jitnixxfu u jinħmew. Il-prodott għandu daqs tal-partiċelli li jvarja minn weraq imkisser għal trab mhux ipproċessat u trab fin. Kuluru huwa bejn kannella ħadrani u kannella.<br>**Purità/Kompożizzjoni:**<br>Ndewwa: < 5,2 %<br>Proteina: 17- 20 %<br>Karboidrat: 55-65 %<br>Rmied: 10-13 %<br>Xaħam: 4-9 %<br>Aċidu ossaliku: < 0,14 %<br>Aċidu tanniku: < 2,7 %<br>5,15-dimetilmorindol: < 47 mg/kg<br>Rubiadin: mhux traċċabbli, ≤ 10 µg/kg<br>Luċidin: mhux traċċabbli, ≤ 10 µg/kg |
| **Trab tal-frott tan-Noni (*Morinda citrifolia*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>It-trab tal-frott tan-Noni jsir mill-frott tan-noni (*Morinda citrifolia L.)* mgħaffeġ permezz tat-tnixxif bil-friża. Il-frott jitgħaffeġ u ż-żerriegħa titneħħa. Wara t-tnixxif bil-friża, meta jitneħħa l-ilma mill-frott tan-noni, il-polpa li tibqa' tintaħan sa ma ssir trab, imbagħad tingħalaq f'kapsuli. |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Purità/Kompożizzjoni**<br>Ndewwa: 5,3-9 %<br>Proteina: 3,8-4,8 g/100 g<br>Xaħam: 1-2 g/100 g<br>Rmied: 4,6-5,7 g/100 g<br>Karboidrati totali: 80-85 g/100 g<br>Fruttożju: 20,4-22,5 g/100 g<br>Glukożju: 22-25 g/100 g<br>Fibra: 15,4-24,5 g/100 g<br>5,15-dimetilmorindol ([1]): ≤ 2.0 µg/ml<br>([1]) *B'metodu HPLC-UV żviluppat u vvalidat għall-analiżi tal-antrakwinoni fit-trab tal-frott tal-Morinda citrifolia. Limiti ta' detezzjoni: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindol)* |
| **Mikroalgi *Odontella aurita*** | Siliċju: 3,3 %<br>Siliċju kristallin: massimu ta' 0,1-0,3 % bħala impurità |
| **Żejt bil-fitosteroli/fitostanoli miżjudin** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żejt li fih il-fitosteroli/fitostanoli miżjudin huwa magħmul minn frazzjoni ta' żejt u frazzjoni ta' fitosterol.<br>**Distribuzzjoni tal-Aċilgliċerol:**<br>Aċidi xaħmin liberi (espressi bħala aċidu olejku): ≤ 2,0 %<br>Monoaċilgliċeroli (MAG): ≤ 10 %<br>Diaċilgliċeroli (DAG): ≤ 25 %<br>Triaċilgliċeroli (TAG): Biex jinkiseb il-bilanċ<br>**Frazzjoni ta' fitosterol:**<br>β-sitosterol: ≤ 80 %<br>β-sitostanol: ≤ 15 %<br>kampesterol: ≤ 40 %<br>kampestanol: ≤ 5,0 %<br>stigmasterol: ≤ 30 %<br>brassikasterol ≤ 3,0 %<br>steroli/stanoli oħrajn: ≤ 3,0 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Oħrajn:**<br>Ndewwa u volatilità: ≤ 0,5 %<br>Valur tal-perossidu (PV): < 5,0 meq/kg<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1 %<br>Kompożizzjoni/Purità (GC-FID jew metodu ekwivalenti) ta' fitosteroli/fitostanoli:<br>Il-fitosteroli u l-fitostanoli estratti minn sorsi oħra għajr miż-żejt veġetali tajjeb għall-ikel, iridu jkunu ħielsa minn sustanzi kontaminanti, l-aħjar assigurazzjoni ta' dan huwa li l-purità tagħhom tkun ta' iktar minn 99 %. |
| **Żejt estratt mill-klamari** | Valur aċiduż: ≤ 0,5 KOH/g ta' żejt<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5 meq $O_2$/kg ta' żejt<br>Valur tal-anisidina-p: ≤ 20<br>Test kiesaħ f'0 °C: ≤ 3 sigħat<br>Ndewwa: ≤ 0,1 % (w/w)<br>Materja insaponifikabbli: ≤ 5,0 %<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %<br>Aċidu dokosaeżaenojku: ≥ 20 %<br>Aċidu ejkosapentenojku: ≥ 10 % |

▼M44

**Trabijiet taż-żerriegħa taċ-chia (*Salvia hispanica*) parzjalment sgrassati**

**Deskrizzjoni/Definizzjoni:**
L-ikel ġdid huwa trabijiet taż-żerriegħa taċ-chia (*Salvia hispanica*) parzjalment sgrassati miksuba bl-ippressar u t-tħin taż-żrieragħ sħaħ ta' *Salvia hispanica* L.
**Fiżiċi-sensorjali:**
Materjal barrani: 0,1 %

| | Trab b'kontenut għoli ta' proteini | Trab b'kontenut għoli ta' fibra |
|---|---|---|
| Daqs tal-partikola | ≤ 130 μm | ≤ 400 μm |
| **Kompożizzjoni kimika:** | | |
| | Trab ta' *Salvia hispanica* b'kontenut għoli ta' proteini | Trab ta' *Salvia hispanica* b'kontenut għoli ta' fibra |
| Umdità | ≤ 9,0 % | ≤ 9,0 % |
| Proteini | ≥ 40,0 % | ≥ 24,0 % |
| Xaħam | ≤ 17 % | ≤ 12 % |
| Fibra | ≤ 30 % | ≥ 50 % |

▼M44

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-kolonji: ≤ 10 000 CFU/g<br>Ħmira: ≤ 500 CFU/g<br>Moffa: ≤ 500 CFU/g<br>*Staphylococcus aureus*: ≤ 10 CFU/g<br>Koliformi: < 100 MPN/g<br>Enterobacteriacae: ≤ 100 CFU/g<br>*Bacillus cereus*: ≤ 50 CFU/g<br>*Escherichia coli*: < 10 MPN/g<br>*Listeria monocytogenes*: Assenza/g<br>*Salmonella* spp.: Assenza f'25 g<br><br>**Kontaminanti**:<br>Arseniku: ≤ 0,1 ppm<br>Kadmju: ≤ 0,1 ppm<br>Ċomb: ≤ 0,1 ppm<br>Merkurju: ≤ 0,1 ppm<br>Total ta' aflatossini: ≤ 4 ppb<br>Okratossina A: ≤ 1 ppb |

▼M59

| | |
|---|---|
| **Trab taż-żerriegħa tal-lift bix-xaħam parzjalment imneħħi mill-*Brassica rapa* L. u *Brassica napus* L.** | **Definizzjoni:** It-trab jiġi prodott miż-żrieragħ bix-xaħam parzjalment imneħħi tal-*Brassica rapa* L. u *Brassica napus* L. mhux ġenetikament modifikati, ta' kultivari żero doppju (00), permezz ta' serje ta' passi ta' proċessar biex jitnaqqsu l-glukosinolati u l-fitati.<br>**Sors:** Iż-żrieragħ tal-*Brassica rapa* L. u *Brassica napus* L.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni:**<br>Proteina (N × 6,25): 33,0-43,0 %<br>Lipidi: 14,0 – 22,0 %<br>Total ta' Karboidrati (**): 33,0 – 40,0 %<br>Total ta' Fibra (**): 33,0 – 43,0 % |

▼M59

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Umdità: < 7,0 % |
| | Irmied: 2,0 – 5,0 % |
| | Ammont totali ta' Glukosinolati: < 0,3 mmol/kg (≤ 120 mg/kg) |
| | Fitat: < 1,5 % |
| | Valur tal-perossidu (fil-piż tal-ikel ġdid): ≤ 3,0 mEq $O_2$/kg |
| | **Metalli Tqal:** |
| | Ċomb: < 0,2 mg/kg |
| | Arseniku (inorganiku): < 0,2 mg/kg |
| | Kadmju: < 0,2 mg/kg |
| | Merkurju: < 0,1 mg/kg |
| | Aluminju: < 35,0 mg/kg |
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:** |
| | Għadd totali tal-kolonji (30 °C): < 5 000 CFU/g |
| | *Enterobacteriaceae*: < 10 CFU/g |
| | *Salmonella* sp.: Negattiv/25 g |
| | Ħmira u moffa: < 100 CFU/g |
| | *Bacillus cereus*: < 100 CFU/g |
| | (*) Bid-differenza: 100 % - [proteina % + umdità % + xaħam % + irmied %] |
| | (**) AOAC 2011.25 (Gravimetrija enżimatika) |
| | CFU: Unitajiet li Jiffurmaw Kolonji, AOAC: Association of Official Agricultural Chemists |

▼M52

| | |
|---|---|
| **Estratt mill-*Panax notoginseng* u l-*Astragalus membranaceus*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:** |
| | L-ikel ġdid fih żewġ estratti. Wieħed huwa estratt bl-etanol mill-għeruq tal-*Astragalus membranaceus* (Fisch.) Bunge. L-ieħor huwa estratt bl-ilma sħun mill-għeruq tal-*Panax notoginseng* (Burkill) F.H. Chen li jitkompla jiġi kkonċentrat bl-użu tal-assorbiment fuq reżina u mbagħad eluzzjoni b'60 % etanol. Fi tmiem il-proċess tal-manifattura ż-żewġ estratti huma mħallta (45–47,5 % ta' kull estratt) mal-maltodestrina (5–10 %). |
| | **Karatteristiċi/Kompożizzjoni:** |
| | Saponini totali: 1,5-5 % |
| | Ginsenoside Rb1: 0,1-0,5 % |
| | Astragaloside I: 0,01-0,1 % |

▼M52

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet | | |
|---|---|---|---|
| | Karboidrati: ≥ 90 % | | |
| | Proteina: ≤ 4,5 % | | |
| | Irmied: ≤ 1 % | | |
| | Umdità: ≤ 5 % | | |
| | Xaħam: ≤ 1,5 % | | |
| | **Metalli tqal:** | | |
| | Arseniku: ≤ 0,3 mg/kg | | |
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:** | | |
| | Għadd totali tal-kolonji: ≤ 5 000 UJK/g | | |
| | Għadd ta' ħmira u moffa totali: ≤ 500 UJK/g | | |
| | Enterobacteriacae: < 10 UJK/g | | |
| | *Escherichia coli*: Assenti f'25 g | | |
| | *Salmonella*: Assenti f'375 g | | |
| | *Staphylococcus aureus*: Assenti f'25 g | | |
| | UJK: Unitajiet li jifformaw kolonji | | |

▼M9

| | *Parametru* | *Mira* | *Kummenti* |
|---|---|---|---|
| **Preparazzjonijiet ta' frott ippasturizzati permezz ta' trattament bi pressjoni għolja** | Il-ħżin tal-frott qabel it-trattament bi pressjoni għolja | Minimu ta' 15-il jum f'temperatura ta'– 20 °C | Il-frott jinħasad u jinħażen skont prattiki tajbin/iġjeniċi tal-agrikultura u tal-manifattura |
| | Frott miżjud | 40 % sa 60 % ta' frott maħlul | Il-frott jiġi omoġenizzat u jinżied mal-ingredjenti l-oħra |
| | pH | 3,2 sa 4,2 | |
| | $^{o}$ Brix | 7 sa 42 | Żgurat biż-żieda taz-zokkor |
| | $a_w$ | < 0,95 | Żgurat biż-żieda taz-zokkor |
| | Il-ħażna finali | massimu ta' 60 jum f'temperatura massima ta' + 5 °C | Ekwivalenti għal reġim tal-ħżin għal prodott ipproċessat b'mod konvenzjonali |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M35 | |
| **Fenilkapsaiċina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Fenilkapsaiċina (*N*-[(4-idrossi-3-metossifenil)metil]-7-fenilett-6-inammid, $C_{21}H_{23}NO_3$, nru CAS: 848127-67-3), hija sintetizzata b'mod kimiku permezz ta' proċess ta' sinteżi f'żewġ passi li jinvolvi fl-ewwel pass il-produzzjoni tal-aċidu aċetileniku intermedju permezz ta' reazzjoni tal-fenil aċetilen b'derivattiv ta' aċidu karbossiliku, u fit-tieni pass, serje ta' reazzjonijiet tal-aċidu aċetileniku intermedju b'derivattiv tal-vanillilammina biex tiġi prodotta l-fenilkapsaiċina.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni:**<br>Purità (% ta' materja niexfa): ≥ 98 %<br>Indewwa: ≤ 0,5 %<br>Prodotti sekondarji ta' produzzjoni relatati mas-sinteżi totali: ≤ 1,0 %<br>*N,N*-dimetil formammid: ≤ 880 mg/kg<br>Diklorometan: ≤ 600 mg/kg<br>Dimetossietan: ≤ 100 mg/kg<br>Aċetat tal-etil: ≤ 0,5 %<br>Solventi oħra: ≤ 0,5 %<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 1,0 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 1,0 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 0,1 mg/kg<br>Arseniku: ≤ 1,0 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-kolonji: ≤ 10 CFU/g<br>Koliformi: ≤ 10 CFU/g<br>*Escherichia coli*: Negattiv/10 g<br>*Salmonella* sp.: Negattiv/10 g<br>Ħmira u moffa: ≤ 10 CFU/g<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Lamtu tal-qamħirrum iffosfatat** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-lamtu tal-qamħirrum iffosfatat (fosfat tad-diammid iffosfatat) huwa lamtu reżistenti mmodifikat kimikament miksub minn lamtu b'kontenut għoli ta' amilożi billi jitħalltu t-trattamenti kimiċi biex joħolqu l-ħoloq inkroċjati tal-fosfati bejn ir-residwi tal-karboidrati u l-gruppi tal-idrossili esterifikati.<br>L-ingredjent tal-ikel ġdid huwa trab abjad jew kważi abjad.<br>Nru CAS: 11120-02-8<br>Formula kimika: $(C_6H_{10}O_5)_n$ $[(C_6H_9O_5)_2PO_2H]x$ $[(C_6H_9O_5)PO_3H_2]y$<br>n = għadd ta' unitajiet ta' glukożju; x, y = gradi ta' sostituzzjoni<br>Il-karatteristiċi kimiċi tal-fosfat tad-diammid iffosfatat:<br>Telf mat-tnixxif: 10-14 %<br>pH: 4,5-7,5<br>Fibra: ≥ 70 %<br>Lamtu: 7-14 %<br>Proteina: ≤ 0,8 %<br>Lipidi: ≤ 0,8 %<br>Fosfru residwu marbut: ≤ 0,4 % (fl-għamla ta' fosforu) minn sors ta' "qamħirrum li fih ħafna amilożju" |
| **Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tal-ħut** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ingredjent tal-ikel ġdid huwa trab isfar għal kannella. Il-fosfatidilserina tinkiseb mill-fosfolipidi tal-ħut permezz ta' transfosforilazzjoni enzimatika bl-aċidu amminiku L-serina.<br>**Speċifikazzjoni tal-prodott tal-fosfatidilserina immanifatturat mill-fosfolipidi tal-ħut:**<br>Ndewwa: < 5,0 %<br>Fosfolipidi: ≥ 75 %<br>Fosfatidilserina: ≥ 35 %<br>Gliċeridi: < 4,0 %<br>L-serina libera: < 1,0 %<br>Tokoferoli: < 0,5 %(1)<br>Valur tal-perossidu (PV): < 5,0 meq $O_2$/kg<br>(1) It-tokoferoli jistgħu jinżiedu bħala antiossidanti skont ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1129/2011 |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tas-sojja** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ingredjent tal-ikel ġdid huwa trab ta' lewn abjad miksur għal isfar ċar. Huwa disponibbli wkoll f'għamla likwida lucida ta' lewn kannella għal oranġjo. L-għamla likwida fiha t-triagliċeridi b'katina medja (MCT) bħala trasportatur. Fiha livelli iktar baxxi ta' Fosfatidilserina minħabba li tinkludi ammonti sinifikanti ta' żejt (MCT).<br>Il-Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tas-sojja tinkiseb mit-transfosfatidilazzjoni enzimatika tal-leċitina tas-sojja b'livelli għolja ta' fosfatidilkolina mal-aċidu amminiku L-serina. Il-fosfatidilserina tikkonsisti minn qafas tal-gliċerofosfat ikkonjugat b'żewġ aċidi xaħmin u L-serina permezz ta' konnessjoni tal-fosfodiesteru.<br>**Karatteristiċi tal-Fosfatidilserina mill-fosfolipidi tas-sojja:**<br>**Fil-forma ta' trab:**<br>Ndewwa: < 2,0 %<br>Fosfolipidi: ≥ 85 %<br>Fosfatidilserina: ≥ 61 %<br>Gliċeridi: < 2,0 %<br>L-serina libera: < 1,0 %<br>Tokoferoli: < 0,3 %<br>Fitosteroli: < 0,2 %<br>**Forma likwida:**<br>Ndewwa: < 2,0 %<br>Fosfolipidi: ≥ 25 %<br>Fosfatidilserina: ≥ 20 %<br>Gliċeridi: mhux applikabbli<br>L-serina libera: < 1,0 %<br>Tokoferoli: < 0,3 %<br>Fitosteroli: < 0,2 % |
| **Prodott tal-fosfolipidi li fih ammonti ugwali ta' fosfatidilserina u aċidu fosfatidiku** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-prodott huwa mmanifatturat permezz tal-konverżjoni enzimatika tal-leċitina tas-sojja. Il-prodott fosfolipidu huwa forma ta' fosfatidilserina u aċidu fosfatidiku bi proporzjon ugwali fl-għamla ta' trab ikkonċentrat ħafna, kannella safrani.<br>**Speċifikazzjoni tal-prodott:**<br>Ndewwa: ≤ 2,0 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Fosfolipidi totali: ≥ 70 %<br>Fosfatidilserina: ≥ 20 %<br>Aċidu fosfatidiku: ≥ 20 %<br>Gliċeridi: ≤ 1,0 %<br>L-serina libera: ≤ 1,0 %<br>Tokoferoli: ≤ 0,3 %<br>Fitosteroli: ≤ 2,0 %<br>Id-diossidu tas-siliċju jintuża b'kontenut massimu ta' 1,0 % |
| **Fosfolipidi mill-isfar tal-bajd** | 85 % u 100 % fosfolipidi puri mill-isfar tal-bajd |
| **Fitoglikoġenu** | **Deskrizzjoni:** Trab abjad għal abjad miksur li huwa polisakkarid bla riħa, bla kulur u bla togħma miksub mill-qamħirrum mhux immodifikat ġenetikament permezz ta' tekniki konvenzjonali tal-ipproċessar tal-ikel<br>**Definizzjoni:** Polimeru tal-glukożju $(C_6H_{12}O_6)n$ b'konnessjonijiet lineari ta' rabtiet glikosidiċi α(1 – 4) bil-frieħi f'kull 8 sa 12-il unità tal-glukożju b'rabtiet glikosidiċi α(1 – 6)<br>**Speċifikazzjonijiet**:<br>Karboidrati: 97 %<br>Zokkor: 0,5 %<br>Fibra: 0,8 %<br>Xaħam: 0,2 %<br>Proteina: 0,6 % |
| **Fitosteroli/fitostanoli** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-Fitosteroli u l-fitostanoli huma steroli u stanoli li jiġu estratti mill-pjanti u li jistgħu jiġu ppreżentati bħala steroli u stanoli liberi jew esterifikati b'aċidi xaħmin tal-ikel.<br>**Kompożizzjoni** (bil-metodu GC-FID jew metodu ekwivalenti):<br>β-sitosterol: < 81 %<br>β-sitostanol: < 35 %<br>kampesterol: < 40 %<br>kampestanol: < 15 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | stigmasterol: < 30 % |
| | brassikasterol: < 3,0 % |
| | steroli/stanoli oħrajn: < 3,0 % |
| | **Kontaminazzjoni/Purità** (bil-metodu GC-FID jew metodu ekwivalenti): |
| | Il-fitosteroli u l-fitostanoli estratti minn sorsi għajr miż-żejt veġetali tajjeb għall-ikel iridu jkunu ħielsa minn sustanzi kontaminanti, u l-aħjar assigurazzjoni ta' dan huwa li l-purità ta' aktar minn 99 % tal-ingredjent fitosterol/fitostanol. |
| **Żejt tal-qlub tal-għanbaqar** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:** |
| | Iż-żejt tal-qlub tal-għanbaqar huwa żejt veġetali li jinkiseb permezz tal-ippressar kiesaħ tal-qlub tal-għanbaqar (*Prunus domestica*). |
| | **Kompożizzjoni:** |
| | Aċidu olejku (C18:1): 68 % |
| | Aċidu linolejku (C18:2): 23 % |
| | γ-Tokoferol:80 % tat-total ta' tokoferoli |
| | β-Sitosterolu: 80-90 % tat-total ta' steroli |
| | Triolejn: 40-55 % ta' trigliċeridi |
| | Aċidu ċijanidriku: massimu ta' 5 mg/kg ta' żejt |
| **Proteini tal-patata (ikkoagulati) u idrolisati tagħhom** | Sustanza niexfa: ≥ 800 mg/g |
| | Proteina (N*6,25): ≥ 600 mg/g (sustanza niexfa) |
| | Rmied: ≤ 400 mg/g (sustanza niexfa) |
| | Glikolalkalojd (total): ≤ 150 mg/kg |
| | Lisinoalanina (total): ≤ 500 mg/kg |
| | Lisinoalanina (liberu): ≤ 10 mg/kg |
| **Prolil oligopeptidaži (preparazzjoni enzimatika)** | **Speċifikazzjoni tal-enzima:** |
| | Isem sistematiku: Prolil oligopeptidaži |
| | Sinonimi: Prolil endopeptidaži, endopeptidaži speċifika għall-prolina, endoprolilpeptidaži |
| | Piż molekulari: 66 kDa |
| | Numru tal-Enzima tal-Kummissjoni: EC 3.4.21.26 |
| | Numru CAS: 72162-84-6 |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Sors: Razza ġenetikament modifikata tal-*Aspergillus niger* (GEP-44)<br>**Deskrizzjoni:** Il-prolil oligopeptidaži hija disponibbli bħala preparazzjoni enzimatika li jkun fiha madwar 30 % maltodestrina.<br>**Speċifikazzjonijiet tal-preparazzjoni enzimatika tal-prolil oligopeptidaži:**<br>Attività: > 580 000 PPI([1])/g (> 34,8 PPU([2])/g)<br>Dehra: Mikrogranulat<br>Kulur: Abjad miksur għal oranġjo safrani. Il-kulur jista' jinbidel minn lott għal lott<br>Materja Niexfa: > 94 %<br>Glutina: < 20 ppm<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 1,0 mg/kg<br>Arseniku: ≤ 1,0 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 0,5 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 0,1 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-kolonji aerobiċi: ≤ $10^3$ CFU/g<br>Ħmira u moffa totali: ≤ $10^2$ CFU/g<br>Anerobi li jnaqqsu s-sulfat: ≤ 30 CFU/g<br>*Enterobacteriaceae*: < 10 CFU/g<br>*Salmonella*: Assenti f'25 g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'25 g<br>*Staphylococcus aureus*: Assenti f'10 g<br>*Pseudomonas aeruginosa*: Assenti f'10 g<br>*Listeria monocytogenes*: Assenti f'25 g<br>Attività antimikrobika: Nieqsa<br>Mikotossini: Taħt il-limiti ta' detezzjoni: Aflatossina B1, B2, G1, G2 (< 0,25 µg/kg), Aflatossini totali (< 2,0 µg/kg), Okratossina A (< 0,20 µg/kg), Tossina T-2 (< 5 µg/kg), Żearalenon (< 2,5 µg/kg), Fumoniżina B1 u B2 (< 2,5 µg/kg)<br>([1]) PPI – Protease Picomole International<br>([2]) PPU – Prolyl Peptidase Units (Unitajiet tal-Prolilpeptidaži) jew Proline Protease Units (Unitajiet tal-Proteaži Prolina) |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M47 | |
| **Estratt ta' proteina mill-kliewi tal-qżieqeż** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-estratt tal-proteina jinkiseb mill-kliewi tal-qżieqeż omoġenizzati permezz ta' taħlita ta' preċipitazzjoni bil-melħ u ċentrifugazzjoni b'veloċità qawwija. Il-preċipitat li jinkiseb essenzjalment fih proteini b'7 % enżima dijamminossidaži (nomenklatura tal-enzimi E.C. 1.4.3.22) u jerġa jiġi sospiż f'sistema ta' bafer fiżjoloġika. L-estratt tal-kliewi tal-qżieqeż miksub jiġi fformulat bħala pelits inkapsulati b'kisja enterika jew pilloli inkapsulati b'kisja enterika biex jintlaħqu s-siti attivi ta' diġestjoni.<br>Prodott Bażiku:<br>Speċifikazzjoni: selezzjoni misluta mill-proteina tal-kliewi tal-qżieqeż b'kontenut naturali ta' dijamminossidaži (DAO):<br>Kundizzjoni fiżika: likwidu<br>Kulur: fil-kannella<br>Dehra: soluzzjoni daqsxejn imdardra<br>Valur tal-pH: 6,4-6,8<br>Attività enżimatika: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (DAO Assaġġ bir-radjoestrazzjoni))<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>*Brachyspira* spp.: negattiv (reazzjoni katina bil-polimeraži f'ħin reali)<br>*Listeria monocytogenes*: negattiv (reazzjoni katina bil-polimeraži f'ħin reali)<br>*Staphylococcus aureus*: < 100 CFU/g<br>Influwenza A: negattiv (traskriptaži inversa u reazzjoni katina bil-polimeraži f'ħin reali)<br>*Escherichia coli*: < 10 CFU/g<br>L-għadd totali tal-kolonji aerobiċi: < $10^5$ CFU/g<br>L-għadd tal-ħmira u l-moffa: < $10^5$ CFU/g<br>*Salmonella*: Assenti f'10 g<br>Enterobacteriaceae reżistenti għall-imluħa biljuži: < $10^4$ CFU/g<br>**Prodott finali:**<br>Speċifikazzjoni: selezzjoni misluta mill-proteina tal-kliewi tal-qżieqeż b'kontenut naturali ta' DAO (E.C. 1.4.3.22) f'formulazzjoni b'kisja enterika:<br>Kundizzjoni fiżika: solida<br>Kulur: griż fl-isfar<br>Dehra: pelits mikro jew pilloli<br>Attività enżimatika: 110-220 kHDU DAO/g pelit jew g pillola (DAO REA (DAO Assaġġ bir-radjoestrazzjoni)) |

▼M47

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Stabbiltà fl-aċidu: 15-il minuta 0,1M HCl segwit minn 60 minuta Borat pH = 9,0: > 68 kHDU DAO/g pelit jew g pillola (DAO REA (DAO Assaġġ bir-radjoestrazzjoni)) |
| | Umdità: < 10 % |
| | *Staphylococcus aureus*: < 100 CFU/g |
| | *Escherichia coli*: < 10 CFU/g |
| | L-għadd tal-kolonji aerobiċi totali: < $10^4$ CFU/g |
| | L-għadd totali tal-ħmira u l-moffa kkombinati: < $10^3$ CFU/g |
| | *Salmonella*: Assenti f'10 g |
| | Enterobacteriaceae reżistenti għall-imluħa biljużi: < $10^2$ CFU/g |

▼M10

| | |
|---|---|
| **Melħ tad-disodju pirrokinolina kinon** | **Definizzjoni:** |
| | Isem kimiku: disodju 9-karbossi-4,5-diosso-1*H*-pirrolo[5,4-f]kinolin-2,7-dikarbossilat |
| | Formula kimika: $C_{14}H_4N_2Na_2O_8$ |
| | Nru CAS: 122628-50-6 |
| | Piż molekulari: 374,17 Da |
| | **Deskrizzjoni** |
| | Il-melħ tad-disodju pirrokinolina kinon huwa trab kannella fl-aħmar prodott mill-batterju mhux ġenetikament modifikat tar-razza *Hyphomicrobium denitrificans* CK-275. |
| | **Karatteristiċi/Kompożizzjoni** |
| | Dehra: Trab kannella fl-aħmar |
| | Purità: ≥ 99,0 % (piż xott) |
| | Assorbiment UV (A322/A259): 0,56 ± 0,03 |
| | Assorbiment UV (A233/A259): 0,90 ± 0,09 |
| | Ndewwa: ≤ 12,0 % |
| | **Solvent residwu** |
| | Etanol: ≤ 0,05 % |
| | **Metalli tqal** |
| | Ċomb: < 3 mg/kg |
| | Arseniku: < 2 mg/kg |

▼M10

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali ta' ċelloli vijabbli: ≤ 300 CFU/g<br>Moffa/ħmira ≤ 12 CFU/g<br>Koliformi: nieqsa f'1 g<br>*Hyphomicrobium denitrificans*: ≤ 25 CFU/g<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Żejt tal-kolza li fih ħafna materja insaponifikabbli** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Żejt tal-kolza li fih ħafna materja insaponifikabbli jiġi prodott minn distillazzjoni bil-vakwu u jvarja miż-żejt tal-kolza raffinat minħabba l-konċentrazzjoni tal-frazzjoni insaponifikabbli (1 g fiż-żejt tal-kolza raffinat u 9 g fiż-"żejt tal-kolza b'ħafna materja insaponifikabbli"). Hemm kemxejn inqas trigliċeridi li fihom l-aċidi xaħmin monoinsaturati u poliinsaturati.<br>**Purità:**<br>Materja insaponifikabbli: > 7,0 g/100 g<br>Tokoferoli: > 0,8 g/100 g<br>α-tokoferol (%): 30-50 %<br>γ-tokoferol (%): 50-70 %<br>δ-tokoferol (%): < 6,0 %<br>Steroli, alkoħol triterpeniku, metilsteroli: > 5,0 g/100 g<br>**Aċidi xaħmin fit-trigliċeridi:**<br>aċidu palmitiku: 3-8 %<br>aċidu stearikuu: 0,8-2,5 %<br>aċidu olejku: 50-70 %<br>aċidu linolejku: 15-28 %<br>aċidu linoleniku: 6-14 %<br>aċidu eruċiku: < 2,0 %<br>Valur aċiduż: ≤ 6,0 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 10 mEq $O_2$/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Metalli tqal:**<br>Ħadid (Fe): < 1 000 µg/kg<br>Ram (Cu): < 100 µg/kg<br>**Impuritajiet**:<br>Idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH) Benżo(a)piren: < 2 µg/kg<br>Jenħtieġ it-trattament bil-karbonju attiv biex jiġi żgurat li l-idrokarburi aromatiċi poliċikliċi (PAH) ma jinżidux fil-produzzjoni taż-żejt tal-kolza li fih ħafna materja insaponifikabbli. |
| **Proteina taż-żejt tal-kolza** | **Definizzjoni:**<br>Il-proteina tal-kolza hija estratt milwiem li fih ħafna proteini li jinkiseb minn pasta tal-kolza li toriġina mill-*Brassica napus* L. u mill-*Brassica rapa* L. mhux ġenetikament modifikati.<br>**Deskrizzjoni:**<br>Trab imnixxef bl-atomizzazzjoni, ta' lewn abjad għal abjad miksur<br>Ammont totali ta' proteina: ≥ 90 %<br>Proteina solubbli: ≥ 85 %<br>Ndewwa: ≤ 7,0 %<br>Karboidrati: ≤ 7,0 %<br>Xaħam: ≤ 2,0 %<br>Rmied: ≤ 4,0 %<br>Fibra: ≤ 0,5 %<br>Ammont totali ta' glukosinolati: ≤ 1 mmol/kg<br>**Purità:**<br>Ammont totali ta' fitat: ≤ 1,5 %<br>Ċomb: ≤ 0,5 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Ammont ta' ħmira u moffa: ≤ 100 CFU/g<br>Għadd ta' batterji aerobiċi: ≤ 10 000 CFU/g<br>Għadd totali ta' koliformi: ≤ 10 CFU/g<br>*Escherichia coli:* Assenti f'10 g<br>*Salmonella*: Assenti f'25 g |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M17 | |
| **Konċentrat raffinat tal-peptidi tal-gambli** | **Deskrizzjoni**<br>Il-konċentrat raffinat tal-peptidi tal-gambli huwa taħlita ta' peptidi miksuba mil-qxur u l-irjus tal-gambli tat-Tramuntana (*Pandalus borealis*) permezz ta' sensiela ta' passi ta' purifikazzjoni wara l-proteolisi enżimatika bl-użu ta' proteażi mill-*Bacillus licheniformis* u/jew mill-*Bacillus amyloliquefaciens*.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni**<br>Total ta' Materja niexfa (%): ≥ 95,0 %<br>Peptidi (piż skont il-piż tal-materja niexfa): ≥ 87,0 % li minnhom peptidi b'piż molekulari ta' < 2 kDa: ≥ 99,9 %<br>Xaħam (piż skont il-piż): ≤ 1,0 %<br>Karboidrati (piż skont il-piż): ≤ 1,0 %<br>Rmied (piż skont il-piż): ≤ 15,0 %<br>Kalċju: ≤ 2,0 %<br>Potassju: ≤ 0,15 %<br>Sodju: ≤ 3,5 %<br>**Metalli tqal**<br>Arseniku (inorganiku): ≤ 0,22 mg/kg<br>Arseniku (organiku): ≤ 51,0 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 0,09 mg/kg<br>Ċomb: ≤ 0,18 mg/kg<br>Total tal-merkurju: ≤ 0,03 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali ta' ċelloli vijabbli: ≤ 20 000 CFU/g<br>*Salmonella*: ND/25 g<br>*Listeria monocytogenes*: ND/25 g<br>*Escherichia coli*: ≤ 20 CFU/g<br>Pożittiv għall-koagulaži *Staphylococcus aureus:* ≤ 200 CFU/g<br>*Pseudomonas aeruginosa*: ND/25 g<br>Moffa/ħmira: ≤ 20 CFU/g<br>CFU: Colony Forming Units (Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji)<br>ND: Not Detectable (Mhux traċċabbli) |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Transresveratrolu** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>*It-Trans-resveratrolu* ***sintetiku*** *għandu l-għamla ta' kristalli ta' lewn abjad miksur għal abjad jagħti fil-kannella.*<br>Isem kimiku: 5-[(E)-2-(4-idrossifenil)etenil]benżen-1,3-diol<br>Formula kimika: $C_{14}H_{12}O_3$<br>Piż molekulari: 228,25 Da<br>Nru CAS: 501-36-0<br>**Purità:**<br>*Trans*-resveratrolu: ≥ 98 %-99 %<br>Total ta' prodotti sekondarji (sustanzi relatati): ≤ 0,5 %<br>Kwalunkwe sustanza waħda relatata: ≤ 0,1 %<br>Rmied issulfat: ≤ 0,1 %<br>Telf mat-tnixxif: ≤ 0,5 %<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 1,0 ppm<br>Merkurju: ≤ 0,1 ppm<br>Arseniku: ≤ 1,0 ppm<br>**Impuritajiet:**<br>Diisopropilammina: ≤ 50 mg/kg<br>***Sors mikrobjali***: Razza ġenetikament modifikata ta' *Saccharomyces cerevisiae*<br>Dehra: Trab ta' lewn abjad miksur għal isfar ċar<br>Id-daqs tal-partikoli: 100 % inqas minn 62,23 μm<br>Kontenut tat-Trans-resveratrolu: Minimu ta' 98 % w/w (abbażi ta' piż niexef)<br>Rmied: Massimu ta' 0,5 % w/w<br>Ndewwa: Massimu ta' 3 % w/w |
| **Estratt mill-għalla tas-serduq** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-estratt mill-għalla tas-serduq jinkiseb mill-*Gallus gallus* permezz tal-idrolisi enżematika tal-għalla tas-serduq u permezz ta' stadji sussegwenti ta' filtrazzjoni, konċentrazzjoni u preċipitazzjoni. Il-kostitwenti prinċipali tal-estratt mill-għalla tas-serduq huma glikosaminoglikani, aċidu jaluroniku, sulfat tal-kondrojtin A u sulfat tad-dermatan (sulfat tal-kondrojtin B). Trab igroskopiku abjad jew kważi abjad. |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Aċidu ħjaluroniku: 60-80 %<br>Sulfat tal-kondrojtin A: ≤ 5,0 %<br>Sulfat tad-dermatan (Sulfat tal-kondrojtin B): ≤ 25 %<br>pH: 5,0-8,5<br>**Purità:**<br>Kloruri: ≤ 1,0 %<br>Nitroġenu: ≤ 8,0 %<br>Telf mat-tnixxif: (105 °C għal 6 siegħat): ≤ 10 %<br>**Metalli tqal:**<br>Merkurju: ≤ 0,1 mg/kg<br>Arseniku: ≤ 1,0 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 1,0 mg/kg<br>Kromju: ≤ 10 mg/kg<br>Ċomb: ≤ 0,5 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-batterji aerobiċi vijabbli: ≤ $10^2$ CFU/g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'1 g<br>*Salmonella*: Assenti f'1 g<br>*Staphylococcus aureus*: Assenti f'1 g<br>*Pseudomonas aeruginosa*: Assenti f'1 g |
| **Żejt tas-Sacha Inchi mill-*Plukenetia volubilis*** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żejt tas-Sacha Inchi huwa żejt veġetali ppressat 100 % fil-kiesaħ li jinkiseb miż-żerriegħa tal-*Plukenetia volubiis* L. Huwa likwidu trasparenti li jleqq f'temperatura ambjentali. It-togħma tiegħu hija ħafifa u tagħti fil-frott u fil-ħxejjex ħodor, mingħajr ebda togħma mhux pjaċevoli.<br>Dehra, limpidezza, leqqaġni, kulur: F'temperatura ambjentali dan iż-żejt huwa ġieri, nadif, ileqq u ta' lewn id-deheb safrani<br>Riħa u togħma: Frott u ħaxix, mingħajr togħmiet jew irwejjaħ mhux pjaċevoli |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Purità:**<br>Ilma u Volatili: < 0,2 g/100 g<br>Impuritajiet insolubbli fl-eżan: < 0,05 g/100 g<br>Aċidità oleika: < 2,0 g/100 g<br>Valur tal-perossidu (PV): < 15 meq $O_2$/kg<br>Aċidi xaħmin trans: < 1,0 g/100 g<br>Total tal-aċidi xaħmin insaturati: > 90 %<br>Aċidu alfa-linoleniku Omega 3 (ALA): > 45 %<br>Aċidi xaħmin saturati: < 10 %<br>Ma fihx aċidi xaħmin trans (< 0,5 %)<br>Ma fihx aċidu eruċiku (< 0,2 %)<br>Aktar minn 50 % ta' trigliċeridi tri-linolenin u di-linolenin<br>Kompożizzjoni u livell tal-fitosteroli<br>Ma fihx kolesterol (< 5,0 mg/100 g) |
| **Salatrimi** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-kelma Salatrim hija l-akronimu magħruf internazzjonalment għal (molekuli tat-trigliċerid aċil bi ktajjen qosra u twal). Is-salatrim jinħadem permezz tal-interesterifikazzjoni mhux enzimatika tat-triaċetina, tat-tripropjonina, tat-tributirina, jew ta' taħlitiet tagħhom maż-żejt idroġenizzat tal-kolza, tal-fażola tas-sojja, taż-żerriegħa tal-qoton, jew tal-ġirasol. Deskrizzjoni: Likwidu lučidu, ta' lewn jagħti fl-ambra li jista' jasal sa solidu ċerulju ta' lewn ċar f'temperatura ambjentali. Ma fihx partikoli li jagħtu riħa stramba jew qarsa.<br>Distribuzzjoni tal-esteri tal-gliċerolu:<br>Triagliċeroli: > 87 %<br>Diaċilgliċeroli: ≤ 10 %<br>Monoaċigliċeroli: ≤ 2,0 %<br>Kompożizzjoni tal-aċidu xaħmi:<br>MOLE % LCFA (aċidi xaħmin b'katina twila): 33-70 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | MOLE % SCFA (aċidi xaħmin b'katina qasira): 30-67 %<br>Aċidi xaħmin saturati b'katina twila: < 70 % skont il-piż<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %<br>Aċidi xaħmin ħielsa espressi bħala aċidu olejku: ≤ 0,5 %<br>Profil tat-triaċilgliċerolu:<br>Triesteri (qosra/twal ta' 0,5 sa 2,0): ≥ 90 %<br>Triesteri (qosra/twal = 0): ≤ 10 %<br>Materjal insaponifikabbli: ≤ 1,0 %<br>Ndewwa: ≤ 0,3 %<br>Rmied: ≤ 0,1 %<br>Kulur: ≤ 3,5 Aħmar (Lovibond)<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 2,0 Meq/Kg |
| **Żejt tas-*Schizochytrium sp.* li fih ħafna DHA u EPA** | Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg żejt<br>Stabbiltà ossidattiva: Il-prodotti kollha tal-ikel li fihom iż-żejt tas-*Schizochytrium sp.* b'kontenut għoli ta' DHA u EPA jenħtieġ li juru l-istabbiltà ossidattiva permezz ta' metodoloġija tal-ittestjar xierqa u rikonoxxuta fil-livell nazzjonali/internazzjonali (eż. AOAC)<br>Ndewwa u volatili: ≤ 0,05 %<br>Materjal insaponifikabbli: ≤ 4,5 %<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1 %<br>Kontenut ta' DHA: ≥ 22,5 %<br>Kontenut ta' EPA: ≥ 10 % |
| ▼M26<br>**Żejt tas-*Schizochytrium* sp. (ATCC PTA-9695)** | L-ikel il-ġdid jinkiseb mir-razza ATCC PTA-9695 tal-mikroalgi *Schizochytrium* sp.<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg żejt<br>Materjal insaponifikabbli: ≤ 3,5 %<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 2,0 %<br>Aċidi xaħmin liberi: ≤ 0,4 %<br>Aċidu dokosapentaenojku (DPA) n-6: ≤ 7,5 %<br>Kontenut ta' DHA: ≥ 35 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M68 | |
| Żejt tas-*Schizochytrium* sp.(FCC-3204) | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel ġdid huwa żejt prodott mir-razza FCC-3204 tal-mikroalgi *Schizochytrium* sp.<br>**Kompożizzjoni:**<br>Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg żejt<br>Indewwa u volatili: ≤ 0,05 %<br>Materjal insaponifikabbli: ≤ 4,5 %<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %<br>Aċidu dokosaeżaenojku (DHA): ≥ 32,0 %<br>valur tal-anisidina-p: ≤ 10 |
| ▼M9 | |
| **Żejt tas-*Schizochytrium* sp.** | Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg żejt<br>Ndewwa u volatili: ≤ 0,05 %<br>Materjal insaponifikabbli: ≤ 4,5 %<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %<br>Kontenut ta' DHA: ≥ 32,0 % |
| ▼M42 | |
| **Żejt tas-*Schizochytrium* sp. (T18)** | Valur tal-aċidu: ≤ 0,8 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg żejt<br>Ndewwa u volatili: ≤ 0,05 %<br>Materjal insaponifikabbli: ≤ 3,5 %<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 2,0 %<br>Aċidi xaħmin liberi: ≤ 0,4 %<br>Kontenut ta' DHA: ≥ 35 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M61 | |
| **Żejt tas-*Schizochytrium* sp.(WZU477)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel il-ġdid huwa żejt prodott mir-razza WZU477 tal-mikroalgi *Schizochytrium* sp.<br>**Kompożizzjoni:**<br>Valur aċiduż: ≤ 0,5 mg KOH/g<br>Valur tal-perossidu (PV): ≤ 5,0 meq/kg żejt<br>Ndewwa u volatili: ≤ 0,05 %<br>Materjal insaponifikabbli: ≤ 4,5 %<br>Aċidi xaħmin trans: ≤ 1,0 %<br>Aċidu dokosaeżaenojku (DHA): ≥ 32,0 %<br>Valur tal-anisidina-p: ≤ 10 |
| ▼M22 | |
| **Il-ġulepp tas-*Sorghum bicolor* (L.) Moench.**<br>**(Ikel tradizzjonali minn pajjiż terz)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni**<br>L-ikel tradizzjonali huwa l-ġulepp tas-*Sorghum bicolor* (L.) Moench (tal-ġeneru *Sorghum*; tal-familja *Poaceae* (alt. *Gramineae*)).<br>Il-ġulepp jinkiseb miz-zkuk tas-*S. bicolor*, wara li jsiru l-proċessi tal-produzzjoni bħat-tgħaffiġ, l-estrazzjoni u l-evaporazzjoni li tinkludi trattament bis-sħana biex jinkiseb ġulepp b'minimu ta' 74 Brix<br>**Id-*data* dwar il-kompożizzjoni tal-ġulepp tas-*Sorghum bicolor* (L.) Moench**<br>Ilma: 22,7 g/100 g<br>Rmied: 2,4<br>Total ta' żokkor: > 74,0 g/100 g |
| ▼M9 | |
| **Estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-estratt mill-fażola tas-sojja ffermentata huwa trab mingħajr riħa u ta' lewn abjad ħalib. Huwa magħmul minn 30 % trab tal-estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata u 70 % ta' destrina reżistenti (bħala trasportatur) mil-lamtu tal-qamħirrum, li jinżied waqt l-ipproċessar. Il-Vitamina $K_2$ titneħħa waqt il-proċess tal-manifattura.<br>L-estratt tal-fażola tas-sojja ffermentata fih in-nattokinaži iżolata minn natto, oġġett tal-ikel prodott mill-fermentazzjoni ta' fażola tas-sojja mhux ġenetikament modifikata (*Glycine max* (L.)) b'razza magħżula ta' *Bacillus subtilis* var. natto.<br>Attività nattokinaži: 20 000 sa 28 000 unità ta' degradazzjoni tal-fibrina f'kull gramma([1])<br>Identità: Affermabbli |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Kundizzjoni: Mingħajr togħmiet jew irwejjaħ offensivi<br>Telf mat-tnixxif: ≤ 10 %<br>Vitamina $K_2$: ≤ 0,1 mg/kg<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 5,0 mg/kg<br>Arseniku: ≤ 3,0 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-batterji aerobiċi vijabbli: ≤ $10^3$ CFU(3)/g<br>Ħmira u moffa: ≤ $10^2$ CFU/g<br>Koliformi: ≤ 30 CFU/g<br>Batterji li jifformaw l-ispori: ≤ 10 CFU/g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'25 g<br>*Salmonella*: Assenti f'25 g<br>*Listeria*: Assenti f'25 g<br>(1) Metodu tal-assaġġ kif deskritt minn Takaoka et al. (2010). |

▼M54

| | |
|---|---|
| **Bijomassa tal-ħmira li fiha s-selenju (*Yarrowia lipolytica*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel ġdid huwa l-bijomassa tal-ħmira li fiha s-selenju tal-*Yarrowia lipolytica* mnixxfa u maqtula bis-sħana.<br>L-ikel ġdid huwa prodott permezz ta' fermentazzjoni fil-preżenza ta' selenit tas-sodju segwit minn għadd ta' passi ta' purifikazzjoni inkluż pass ta' qtil bis-sħana tal-ħmira biex jiġi żgurat in-nuqqas ta' ċelloli vijabbli tal-*Yarrowia lipolytica* fl-ikel il-ġdid.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni:**<br>Total ta' selenju: 165–200 µg/g<br>Se-metjonina (13): 100–140 µg/g<br>Proteina: 40–50 g/100 g<br>Fibra: 24–32 g/100 g<br>Zokkrijiet: < 1 g/100 g<br>Xaħam: 6–12 g/100 g<br>Irmied totali: ≤ 15 %<br>Ilma: ≤ 5 %<br>Materja niexfa: ≥ 95 % |

▼M54

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 3,0 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 1,0 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 0,1 mg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd mikrobjali aerobiku totali: ≤ $5\times10^3$UJK/g<br>Għadd ta' ħmira u moffa totali: ≤ $10^2$UJK/g<br>Ċelloli vijabbli tal-*Yarrowia lipolytica* ([14]): < 10 UJK/g (jiġifieri l-limitu ta' detezzjoni)<br>Koliformi: ≤ 10 UJK/g<br>*Salmonella* spp.: Assenti f'25 g<br>UJK: unitajiet li jifformaw kolonji |

▼M58

| | |
|---|---|
| **il-melħ tas-sodju ta' 3'-Sijalillattożju (3'-SL) (sors mikrobjali)** | **Deskrizzjoni:**<br>Il-melħ tas-sodju ta' 3'-Sijalillattożju (3'-SL) huwa trab jew agglomerat ippurifikat abjad jew abjad jagħti fl-isfar prodott permezz ta' proċess mikrobjali u fih livelli limitati ta' lattożju, ta' 3' sijalil-lattulożju u ta' aċidu sialiku.<br>**Sors:** Ir-razza tal-*Escherichia coli* mmodifikata ġenetikament K-12 DH1<br>**Definizzjoni:**<br>Formula kimika: $C_{23}H_{38}NO_{19}Na$<br>Isem kimiku: Melħ tas-sodju ta' *N*-Aċetil-α-D-newraminil-(2→3)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glukożju<br>Massa molekolari: 655.53 Da<br>Nru CAS 128596-80-5<br>**Karatteristiki/Kompożizzjoni:**<br>Dehra: Trab jew agglomerat abjad jew abjad jagħti fl-isfar<br>Is-somma tal- melħ tas-sodju ta' 3'-Sijalillattożju, D-Lattożju, u l-aċidu Sialiku (% tal-materja niexfa): ≥ 90,0 % (piż skont il-piż)<br>Melħ tas-sodju ta' 3'-Sijalillattożju (% tal-materja niexfa) ≥ 88,0 % (piż skont il-piż)<br>D-Lattożju: ≤ 5,0 % (piż skont il-piż)<br>Aċidu Sialiku: ≤ 1,5 % (piż skont il-piż)<br>3'-Sialil-lattulożju: ≤ 5,0 % (piż skont il-piż)<br>Is-somma tal-karboidrati l-oħra: ≤ 3,0 % (piż skont il-piż)<br>Indewwa: ≤ 8,0 % (piż skont il-piż)<br>Sodju: 2,5 – 4,5 % (piż skont il-piż)<br>Klorur: ≤ 1,0 % (piż skont il-piż)<br>pH (soluzzjoni ta' 5 % f'temperatura ta' 20 °C): 4,5 -6,0<br>Proteina residwa: ≤ 0,01 % (piż skont il-piż) |

▼M58

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd totali tal-kolonji ta' batterji mežofiliċi aerobiċi: ≤ 1000 CFU/g<br>*Enterobacteriaceae*: ≤ 10 CFU/g<br>*Salmonella* sp.: Assenza f'25 g<br>Ħmira: ≤ 100 CFU/g<br>Moffa: ≤ 100 CFU/g<br>Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji; EU: Unitajiet ta' Endotossini |

▼M57

| | |
|---|---|
| **Il-melħ tas-sodju ta' 6'-Sijalillattożju (6'-SL)**<br>**(sors mikrobjali)** | **Deskrizzjoni:**<br>Il-melħ tas-sodju ta' 6'-Sijalillattożju (6'-SL) huwa trab jew agglomerat ippurifikat abjad jew abjad jagħti fl-isfar prodott permezz ta' proċess mikrobjali u fih livelli limitati ta' lattożju, ta' 6' sijalil-lattulożju u ta' aċidu sialiku.<br>**Sors:** Ir-razza tal-*Escherichia coli* mmodifikata ġenetikament K-12 DH1<br>**Definizzjoni:**<br>Formula kimika: $C_{23}H_{38}NO_{19}Na$<br>Isem kimiku: Melħ tas-sodju ta' N-Aċetil-α-D-newraminil-(2→6)-β-D-galattopiranosil-(1→4)-D-glukożju<br>Massa molekolari: 655,53 Da<br>Numru CAS 157574-76-0<br>**Karatteristiki/Kompożizzjoni:**<br>Dehra: Trab jew agglomerat abjad jew abjad jagħti fl-isfar<br>Is-somma tal-melħ tas-sodju ta' 6'-Sijalillattożju, D-Lattożju, u l-aċidu Sialiku (% tal-materja niexfa): ≥ 94,0 % (piż skont il-piż)<br>Melħ tas-sodju ta' 6'-Sijalillattożju (% tal-materja niexfa) ≥ 90,0 % (piż skont il-piż)<br>D-Lattożju: ≤ 5,0 % (piż skont il-piż)<br>Aċidu Sialiku: ≤ 2,0 % (piż skont il-piż)<br>6'-Sialil-lattulożju: ≤ 3,0 % (piż skont il-piż)<br>Is-somma tal-karboidrati l-oħra: ≤ 3,0 % (piż skont il-piż)<br>Indewwa: ≤ 6,0 % (piż skont il-piż)<br>Sodju: 2,5 – 4,5 % (piż skont il-piż)<br>Klorur: ≤ 1,0 % (piż skont il-piż)<br>pH (soluzzjoni ta' 5 % f'temperatura ta' 20 °C): 4,5 -6,0<br>Proteina residwa: ≤ 0,01 % (piż skont il-piż) |

▼M57

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>L-għadd totali tal-kolonji ta' batterji mežofiliċi aerobiċi: ≤ 1 000 CFU/g<br>*Enterobacteriaceae*: ≤ 10 CFU/g<br>*Salmonella* sp.: Assenza f'25 g<br>Ħmira: ≤ 100 CFU/g<br>Moffa: ≤ 100 CFU/g<br>Endotossini residwi: ≤ 10 EU/mg<br>CFU: Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji; EU: Unitajiet ta' Endotossini |

▼M41

| | |
|---|---|
| **Estratt tas-sufara tal-qamħ li fih ħafna spermidina (*Triticum aestivum*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-estratt tas-sufara tal-qamħ li fih ħafna spermidina jinkiseb mis-sufara tal-qamħ li mhux iffermentata u li ma tkunx qed tinbet (*Triticum aestivum*) permezz tal-proċess ta' estrazzjoni solidu-likwidu li jimmira speċifikament, iżda mhux esklużivament, il-poliammini.<br>Spermidina:(N- (3-amminopropil)butan-1,4-diammina): 0,8–2,4 mg/g<br>Spermina: 0,4-1,2 mg/g<br>Triklorur tal-ispermidina < 0,1 µg/g<br>Putrexxina: < 0,3 mg/g<br>Kadaverina: ≤ 16,0 µg/kg<br>**Mikotossini:**<br>Aflatossini (total): < 0,4 µg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Batterji aerobiċi totali: < 10 000 CFU/g<br>Ħmira u moffa: < 100 CFU/g<br>*Escherichia coli:* < 10 CFU/g<br>*Salmonella:* Assenti f'25 g<br>*Listeria monocytogenes:* Assenti f'25 g |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Sukromalt** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Is-sukromalt huwa taħlita kumplessa ta' sakkaridi li tinħadem mis-sukrożju u minn idroliżat tal-lamtu permezz ta' reazzjoni enzimatika. F'dan il-proċess, l-unitajiet tal-glukożju jeħlu mas-sakkaridi mill-idroliżat tal-lamtu permezz ta' enzima li jipproduċi l-batterju *Leuconostoc citreum* jew permezz ta' razza rikombinanti tal-organiżmu ta' produzzjoni l-*Bacillus licheniformis*. L-oligosakkaridi li jirriżultaw minn dan huma kkaratterizzati mill-preżenza tal-komposti glikosidiċi α-(1→6) u α-(l→3). Il-prodott ġenerali huwa xropp li barra dawn l-oligosakkaridi fih il-fruttożju b'mod ewlieni, iżda fih ukoll id-disakkarid lewkrożju u disakkaridi oħrajn.<br>Solidi totali: 75-80 % |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Ndewwa: 20-25 %<br>Sulfatażju: Massimu ta' 0,05 %<br>pH: 3,5-6,0<br>Konduttività < 200 (30 %)<br>Nitroġenu < 10 ppm<br>Fruttożju: 35-45 % piż niexef<br>Lewkrożju: 7-15 % piż niexef<br>Disakkaridi oħrajn: Massimu ta' 3 %<br>Sakkaridi aktar għoljin: 40-60 % piż niexef |
| **Fibra mill-kannamiela** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-fibra mill-kannamiela tinkiseb mill-ħitan xotti taċ-ċelloli jew minn residwu fibruż li jifdal wara l-espressjoni jew l-estrazzjoni tal-meraq taz-zokkor mill-kannamiela, tal-ġenotip tas-Sakkarum. Din tikkonsisti primarjament miċ-ċelluloża u mill-emiċelluloża.<br>Il-proċess tal-produzzjoni fih bosta passi, fosthom: it-tqattigħ, id-diġestjoni alkalina, it-tneħħija tal-linjini u ta' komponenti oħrajn li mhumiex taċ-ċelluloża, l-ibbliċjar tal-fibri ppurifikati, il-ħasil bl-aċidu u n-newtralizzazzjoni.<br>Ndewwa: ≤ 7,0 %<br>Rmied: ≤ 0,3 %<br>Fibra totali (AOAC) niexfa (kollha insolubbli): ≥ 95 %<br>li minnhom: Emiċelluloża (20-25 %) u ċelluloża (70-75 %)<br>Siliċe (ppm): ≤ 200<br>Proteina: 0,0 %<br>Xaħam: Traċċa<br>pH: 4-7<br>**Metalli tqal:**<br>Merkurju (ppm): ≤ 0,1<br>Ċomb (ppm): ≤ 1,0<br>Arseniku (ppm): ≤ 1,0<br>Kadmju (ppm): ≤ 0,1<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Ħmira u moffa (CFU/g): ≤ 1 000<br>*Salmonella*: Assenti<br>*Listeria monocytogenes*: Assenti |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M50 | |
| **Zokkor miksub mill-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iz-zokkor jinkiseb mill-meraq ikkonċentrat tal-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.) jew permezz ta' proċess ta' tnixxif jew permezz ta' proċess ta' purifikazzjoni għall-produzzjoni ta' glukożju jew fruttożju ta' purità għolja.<br>**Zokkor prodott bi proċess ta' tnixxif**<br>Kompożizzjoni nutrizzjonali:<br>Zokkor totali (g/100 g): > 80<br>Ndewwa (%): < 5<br>Kriterji mikrobijoloġiċi:<br>Għadd Totali tal-Kolonji (aerobiku) (cfu/g): < $10^4$<br>Moffa u Ħmira (cfu/g): < 50<br>Enterobacteriaceae (cfu/g): < 10<br>*Salmonella* spp.: Assenza f'25 g<br>*Alicyclobacillus:* Assenza f'50 g<br>Batterji termoaċidofiliċi: Assenza f'50 g<br>**Zokkor prodott bi proċess ta' purifikazzjoni**<br>Kompożizzjoni nutrizzjonali ta' Glukożju miksub mill-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.):<br>Kontenut tal-glukożju (%): > 93<br>Irmied (%): < 0,2<br>Ndewwa (%): < 1,0<br>Kompożizzjoni nutrizzjonali ta' Fruttożju miksub mill-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.):<br>Kontenut tal-fruttożju (%): > 98<br>Kontenut tal-glukożju (%): < 0,5 %<br>Irmied (%): < 0,2<br>Ndewwa (%):< 0,5<br>Kriterji mikrobijoloġiċi għall-glukożju u l-fruttożju miksuba mill-polpa tal-kawkaw (*Theobroma cacao* L.):<br>Għadd Totali tal-Kolonji (aerobiku) (cfu/g): < $10^4$<br>*Salmonella* spp.: Assenza f'25 g |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Estratt taż-żejt tal-ġirasol** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-estratt mill-ġirasol jinkiseb b'fattur ta' konċentrazzjoni ta' 10 tal-frazzjoni insaponifikabbli taż-żejt tal-ġirasol irfinut estratt miż-żerriegħa tal-ġirasol, *Helianthus Annuus* L.<br>**Kompożizzjoni:**<br>Aċidu olejku (C18:1): 20 %<br>Aċidu linolejku (C18:2): 70 %<br>Materja insaponifikabbli: 8,0 %<br>Fitosteroli: 5,5 %<br>Tokoferoli: 1,1 % |
| ▼M62<br>**Larva mnixxfa ta' *Tenebrio molito* (dudu tad-dqiq)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel ġdid huwa d-dudu tad-dqiq imnixxef bis-sħana, sħiħ (larva mismuta, imnixxfa fil-forn) jew mitħuna (larva mismuta, imnixxfa fil-forn u mitħuna). It-terminu "dudu tad-dqiq" jirreferi għall-forma ta' larva ta' *Tenebrio molitor*, speċi ta' insetti fil-familja tal-ħanfus *Tenebrionidae* (darkling beetles).<br>Id-dudu sħiħ huwa maħsub għall-konsum mill-bniedem u l-ebda parti ma titneħħa.<br>Huwa meħtieġ perjodu minimu ta' 24 siegħa ta' sawm qabel l-istadju tat-tnixxif termali, sabiex il-larva tkun tista' tbattal il-kontenut tal-imsaren.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni:**<br>Irmied (% w/w): 3,5 sa 4,5<br>Indewwa (% w/w): 1-8<br>Proteina kruda (N x 6,25) (% w/w): 56-61<br>Karboidrati diġeribbli ([15]) (% w/w): 1-6<br>Xaħam (% w/w): 25-30<br>li minnhom saturati (% w/w): 4-9<br>Valur tal-perossidu (Meq $O_2$/kg xaħam): ≤ 5<br>Fibra (% w/w): 4-7<br>Ċitina (% tal-piż skont il-piż): 4-7<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 0,075 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 0,1 mg/kg |

▼M62

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Mikotossini:**<br>Aflatossini (Is-somma ta' B1, B2, G1, G2): ≤ 4 µg/kg<br>Aflatossina B1: ≤ 2 µg/kg<br>Deossinivalenol: ≤ 200 µg/kg<br>Okratossina A: ≤ 1 µg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali ta' kolonji aerobiċi: ≤ $10^5$ CFU ([7])/g<br>Ħmira u moffa: ≤ 100 CFU/g<br>*Escherichia coli*: ≤ 50 CFU/g<br>*Salmonella* spp.: Mhux individwata f'25 g<br>*Listeria monocytogenes*: Mhux individwata f'25 g<br>Anaerobi li jirriduċu s-sulfit: ≤ 30 CFU/g<br>*Bacillus cereus* (test preżuntiv): ≤ 100 CFU/g<br>Enterobacteriaceae (test preżuntiv): < 10 CFU/g<br>*Staphylococci* koagulaży-pożittivi: ≤ 100 UJK/g |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Mikroalgi *Tetraselmis chuii* mnixxfa** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-prodott imnixxef jinkiseb mill-mikroalgi marini *Tetraselmis chuii*, tal-familja *Chlorodendraceae* li jiġu kkultivati fl-ilma baħar sterili ġo bijoreatturi magħluqin li huma insulati mill-arja ta' barra.<br>**Purità/Kompożizzjoni:**<br>Identifikat permezz tal-markatur nukleari rDNA 18 S (is-sekwenza analizzat mhux inqas minn 1 600 par bażiku) fil-bażi tad-*data* taċ-Ċentru Nazzjonali għall-informazzjoni Bijoteknoloġika (National Centre for Biotechnology information - NCBI): Mhux anqas minn 99,9 %<br>Umdità: ≤ 7,0 %<br>Proteini: 35-40 %<br>Rmied: 14-16 %<br>Karboidrati: 30-32 %<br>Fibra: 2-3 %<br>Xaħam: 5-8 %<br>Aċidi xaħmin saturati: 29-31 % tat-total tal-aċidi xaħmin<br>Aċidi xaħmin monoinsaturati: 21-24 % tat-total tal-aċidi xaħmin<br>Aċidi xaħmin poliinsaturati: 44-49 % tat-total tal-aċidi xaħmin<br>Jodju: ≤ 15 mg/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ***Therapon barcoo*/Scortum** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Is-Scortum/*Therapon barcoo* hija speċi ta' ħuta tal-familja Terapontidae. Din hija speċi ta' ħuta tal-ilma ħelu endemika għall-Awstralja. Illum il-ġurnata qed titrabba fil-farms tal-ħut.<br>Identifikazzjoni Tassonomika: Klassi: Actinopterygii > ordni: Perciformes > familja: Terapontidae > ġenus: *Therapon* jew *Scortum barcoo*<br>Kompożizzjoni tal-laħam tal-ħuta:<br>Proteini (%): 18-25<br>Ndewwa (%): 65-75<br>Irmied (%): 0,5-2,0<br>Enerġija (KJ/Kg): 6000-11500<br>Karboidrati (%): 0,0<br>Xaħam (%): 5-15<br>Aċidi xaħmim (mg FA/g fillet):<br>Σ PUFA n-3: 1,2-20,0<br>Σ PUFA n-6: 0,3-2,0<br>PUFA n-3/n-6: 1,5-15,0<br>Total tal-aċidi omega 3: 1,6-40,0<br>Total tal-aċidi omega 6: 2,6-10,0 |
| **D-Tagatożju** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>It-tagatożju huwa prodott permezz tal-isomerizzazzjoni tal-galattożju b'konverżjoni kimika jew enzimatika, jew permezz tal-epimerizzazzjoni tal-fruttożju b'konverżjoni enzimatika. Dawn huma konverżjonijiet ta' pass wieħed.<br>Dehra: Kristalli bojod jew kważi bojod<br>Isem kimiku: D-tagatożju |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Sinonimu: D-*lyxo*-Essulożju<br>Numru CAS: 87-81-0<br>Formula kimika: $C_6H_{12}O_6$<br>Piż tal-formula: 180,16 (g/mol)<br>**Purità:**<br>Assaġġ: ≥ 98 % abbażi tal-piż niexef<br>Telf mat-tnixxif: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 sigħat)<br>Rotazzjoni Speċifika: $[\alpha]_D^{20}$: – 4 sa – 5,6° (1 % soluzzjoni milwiema)([1])<br>Medda tat-tidwib: 133-137 °C<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 1,0 mg/kg(*)<br>(*) Iddetermina permezz ta' teknika tal-assorbiment atomiku xierqa għal-livell speċifikat. L-għażla tad-daqs tal-kampjuni u l-metodu tal-preparazzjoni tal-kampjuni jistgħu jkunu bbażati fuq il-prinċipji tal-metodu deskritt fl-FNP 5. "Metodi strumentali"[1].<br>([1]) Food and nutrition paper 5 Rev 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 p.; English – ISBN 92-5-102991-1 |
| **►M49 Estratt li fih ħafna tassifolina ◄** | **Deskrizzjoni:**<br>L-estratt li fih ħafna tassifolina mill-injam tal-Lerċi tad-Daħurja (*Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr) huwa trab abjad għal isfar ċar li jikkristallizza minn soluzzjonijiet milwiema jaħarqu.<br>**►M49 Definizzjoni:**<br>Isem kimiku: [(2R,3R)-2-(3,4 diidrossifenil)-3,5,7-triidrossi-2,3-diidrokromen-4-on, imsejjaħ ukoll (+) trans (2R,3R)- diidrokwerċetin] u b'mhux aktar minn 2 % tal-forma ċis- ◄<br>**Speċifikazzjonijiet:**<br>*Parametru fiżiku*<br>Ndewwa: ≤ 10 %<br>*Analiżi tal-kompost*<br>Tassifolina (m/m): ≥ 90,0 % tal-piż niexef |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | ***Metalli tqal, Pestiċidi***Ċomb: ≤ 0,5 mg/kg<br>Arseniku: ≤ 0,02 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 0,5 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 0,1 mg/kgDiklorodifeniltrikloroetan (DDT): ≤ 0,05 mg/kg<br>***Solventi residwi***<br>Etanol: < 5 000 mg/kg<br>***Kriterji mikrobijoloġiċi***<br>Għadd Totali tal-Kolonji (TPC): ≤ $10^4$ CFU/g<br>Enterobatterji: ≤ 100/g<br>Ħmira u Moffa: ≤ 100 CFU/g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'1 g<br>*Salmonella*: Assenti f'10 g<br>*Staphylococcus aureus*: Assenti f'1 g<br>*Pseudomonas*: Assenti f'1 g<br>**Il-medda normali tal-komponenti tal-estratt li fih ħafna tassifolina (bħala sustanza niexfa)**<br><br>*Komponenti tal-estratt Kontenut, medda normalment osservata (%)* — *Komponenti tal-estratt Kontenut, medda normalment osservata (%)*<br>Tassifolina — 90 – 93<br>Aromadendrina — 2,5 – 3,5<br>Erjodiktijol — 0,1 – 0,3<br>Kwerċetina — 0,3 – 0,5<br>Narinġenina — 0,2 – 0,3<br>Kempferolina — 0,01 – 0,1<br>Pinoċembrina — 0,05 – 0,12<br>Flavonojdi mhux identifikabbli 1 - 3 — 1 – 3<br>Ilma(*) — 1,5<br><br>(*) Fil-forma idratata tagħha, u waqt il-proċess tat-tnixxif, it-tassifolina hija kristall. Dan jirriżulta fl-inklużjoni tal-ilma tal-kristallizzazzjoni fi kwantità ta' 1,5 %. |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Trealożju** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Disakkarid li ma jirriduċix li jikkonsisti minn żewġ partijiet ta' glukożju marbutin b'rabta 1-glukożidika α-1. Jista' jinħoloq bi proċess enzimatiku b'ħafna passi mil-lamtu milwiem jew mis-sukrożju. Il-prodott kummerċjali huwa d-diidrat. Kważi bla riħa, kristalli bojod jew kważi bojod b'togħma ħelwa<br>Sinonimi: α,α-trealożju<br>Isem kimiku: diidrat ta' α-D-glukopiranosil-α-D-glukopiranosid<br>Nru CAS: 6138-23-4 (diidrat)<br>Formula kimika: $C_{12}H_{22}O_{11} \cdot 2H_2O$ (diidrat)<br>Piż tal-formula: 378,33 (diidrat)<br>Assaġġ: ≥ 98 % fuq il-bażi niexfa<br>Iddetermina permezz ta' teknika tal-assorbiment atomiku xierqa għal-livell speċifikat. L-għażla tad-daqs tal-kampjuni u l-metodu tal-preparazzjoni tal-kampjuni jistgħu jkunu bbażati fuq il-prinċipji tal-metodu deskritt fl-FNP 5 (1), "Metodi strumentali"<br>**Metodu tal-assaġġ:**<br>Prinċipju: it-trealożju jiġi identifikat bil-kromatografija likwida u jiġi kkwantifikat bi tqabbil ma' standard referenzjali li jkun fih it-trealożju standard<br>Preparazzjoni ta' soluzzjonijiet kampjuni: iżen bi preċiżjoni madwar 3 g mill-kampjun niexef tat-test għal ġo flask volumetriku ta' 100 ml u żid madwar 80 ml ilma dejonizzat ippurifikat. Ħoll il-kampjun kompletament u ddilwih sal-marka b'ilma dejonizzat ippurifikat. Iffiltra s-soluzzjoni b'filtru ta' 0,45 ta' majkron<br>Preparazzjoni ta' soluzzjoni standard: iżen bi preċiżjoni kwantitajiet niexfa ta' trealożju ta' standard referenzjali u ħollhom fl-ilma biex tikseb soluzzjoni b'konċentrazzjoni magħrufa ta' madwar 30 mg ta' trealożju f'kull ml.<br>Apparat: kromatografu likwidu mgħammar b'individwatur tal-indiċi rifrattiv u b'reġistratur integranti<br>Kundizzjonijiet:<br>Kolonna: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) jew ekwivalenti<br>— tul: 300 mm<br>— dijametru: 10 mm<br>— temperatura: 50 °C<br>Fażi mobbli: ilma<br>rata ta' fluss: 0,4 ml/min<br>Volum tal-injezzjoni: 8 µl<br>Proċedura: injetta separatament volumi ugwali tas-soluzzjoni kampjun u tas-soluzzjoni standard fil-kromatografu.<br>Irreġistra l-kromatogrammi u kejjel id-daqs tar-reazzjoni tal-ogħla livell tat-trealożju<br>Ikkalkula l-kwantità ta' mg ta' trealożju f'1 ml tas-soluzzjoni kampjun bil-formula li ġejja: |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | % trealożju = 100 × ($R_U$/$R_S$) ($W_S$/$W_U$)<br>meta<br>$R_S$ = l-erja tal-ogħla livell tat-trealożju fil-preparazzjoni standard<br>$R_U$ = l-erja tal-ogħla livell tat-trealożju fil-preparazzjoni kampjun<br>$W_S$ = il-piż f'mg tat-trealożju fil-preparazzjoni standard<br>$W_U$ = il-piż tal-kampjun niexef f'mg<br>**Karatteristiċi:**<br>Identifikazzjoni:<br>Solubbiltà: Solubbli faċilment fl-ilma, kemxejn solubbli fl-etanol<br>Rotazzjoni speċifika: $[\alpha]_D^{20}$ = +179° (5 % soluzzjoni milwiema, diidrat), +199° (5 % soluzzjoni milwiema, sustanza anidra)<br>Punt tat-titwib: 97 °C (diidrat)<br>**Purità:**<br>Telf mat-tnixxif: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 sigħat)<br>Irmied totali: ≤ 0,05 %<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 1,0 mg/kg |
| ▼M49<br>**Faqqiegħ ittrattat bil-UV (*Agaricus bisporus*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni**<br>Faqqiegħ *Agaricus bisporus* imkabbar kummerċjalment li jiġi ttrattat b'dawl UV meta jinħasad.<br>Radjazzjoni UV: proċess ta' radjazzjoni bid-dawl ultravjola fil-frekwenza ta' 200-800 nm.<br>**Vitamina $D_2$**<br>Isem kimiku: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol<br>Sinonimu: Ergokalċiferol<br>Nru CAS: 50-14-6<br>Piż molekulari: 396,65 g/mol<br>**Kontenut**<br>Vitamina $D_2$ fil-prodott finali: 5-20 µg/100 g piż frisk mal-iskadenza tal-ħajja tal-prodott fuq l-ixkaffa. |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M49 | |
| **Ħmira tal-furnara ttrattata bil-UV (*Saccharomyces cerevisiae*)** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni**<br>Il-ħmira tal-furnara (*Saccharomyces cerevisiae*) tiġi ttrattata b'dawl ultravjola biex l-ergosterol jiġi kkonvertit f'vitamina $D_2$ (ergokalċiferol). Il-kontenut tal-vitamina $D_2$ fil-konċentrat tal-ħmira jvarja bejn 800 000-3 500 000 IU vitamina D/100 g (200-875 µg/g). Il-ħmira tista' tkun diżattivata.<br>Il-konċentrat tal-ħmira hija mħallta mal-ħmira regolari tal-furnara sabiex ma taqbiżx il-livell massimu tal-ħmira ppakkjata minn qabel friska jew imnixxfa biex tinħema d-dar.<br>Granuli ġierja lewn il-kannella ċar.<br>**Vitamina $D_2$**<br>Isem kimiku: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol<br>Sinonimu: Ergokalċiferol<br>Nru CAS: 50-14-6<br>Piż molekulari: 396,65 g/mol<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi tal-konċentrat tal-ħmira**<br>Koliformi: $\leq 10^3$/g<br>*Escherichia coli*: ≤ 10/g<br>*Salmonella*: Assenti f'25 g |
| ▼M9 | |
| **Ħobż ittrattat bil-UV** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-ħobż ittrattat bir-radjazzjoni UV huwa ħobż u bziezen bil-ħmira (mingħajr affarijiet miżjuda fil-wiċċ) li jkunu ġew ittrattati bir-radjazzjoni ultravjola wara l-ħami sabiex l-ergosterol jinbidel f'vitamina $D_2$ (f'ergokalċiferol).<br>Radjazzjoni UV: Proċess ta' radjazzjoni bid-dawl ultravjola fil-frekwenza ta' 240 sa 315 nm għal mhux aktar minn 5 sekondi b'input tal-enerġija ta' 10 sa 50 $mJ/cm^2$.<br>**Vitamina $D_2$:**<br>Isem kimiku: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol<br>Sinonimu: Ergokalċiferol<br>Nru CAS: 50-14-6<br>Piż molekulari: 396,65 g/mol<br>**Kontenut**:<br>Vitamina $D_2$ (ergokalċiferol) fil-prodott finali: 0,75-3 µg/100 g([1])<br>Ħmira fl-għaġina: 1-5 g/100 g([2])<br>([1]) EN 12821, 2009, Standard Ewropew.<br>([2]) Kalkolu tar-riċetta. |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **Halib ittrattat bil-UV** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-ħalib ittrattat bir-radjazzjoni UV huwa ħalib tal-baqra (sħiħ u semixkumat) li wara l-pasturizzazzjoni, jiġi ttrattat bir-radjazzjoni ultravjola (UV) permezz ta' fluss turbulenti. It-trattament tal-ħalib ippasturizzat bir-radjazzjoni UV jirriżulta f'żieda ta' konċentrazzjonijiet ta' vitamina $D_3$ (kolekalċiferol) permezz tal-konverżjoni ta' 7-deidrokolesterol fil-vitamina $D_3$.<br>Radjazzjoni UV: Proċess ta' radjazzjoni bid-dawl ultravjola fil-frekwenza ta' 200-310 nm b'input tal-enerġija ta' 1 045 J/l.<br>**Vitamina $D_3$:**<br>Isem kimiku: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metileptan-2-il]-2,3,3a, 5,6,7-eżaidro-1H-inden-4-iliden]etiliden]-4-metilidenċikloeżan-1-ol<br>Sinonimu: Kolekalċiferol<br>Nru CAS: 67-97-0<br>Piż molekulari: 384,6377 g/mol<br>**Kontenut**:<br>Vitamina $D_3$ fil-prodott finali:<br>Ħalib sħiħ([1]): 0,5-3,2 µg/100 g([2])<br>Ħalib semixkumat(1): 0,1-1,5 µg/100 g([2])<br>([1]) Kif iddefinit fir-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 671).<br>([2]) HPLC |

▼M48

| | |
|---|---|
| **Trab tal-faqqiegħ tal-vitamina $D_2$** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Trab tal-faqqiegħ tal-vitamina $D_2$ huwa trab granulari magħmul minn faqqiegħ *Agaricus bisporus* espost għall-UV.<br>Il-faqqiegħ jinħasel, jiġi omoġenizzat u jiġi sospiż fl-ilma biex jipproduċi demel likwidu tal-faqqiegħ. Id-demel likwidu tal-faqqiegħ jingħadda minn taħt lampa UV. Imbagħad, id-demel likwidu jiġi ffiltrat, jitnixxef u jintaħan, u jipproduċi trab tal-faqqiegħ tal-vitamina $D_2$.<br>Radjazzjoni UV: Proċess ta' radjazzjoni bid-dawl ultravjola f'medda ta' tul tal-mewġa simili għall-ikel ġdid trattat bil-UV awtorizzat skont ir-Regolament dwar l-ikel ġdid.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni**<br>Kontenut tal-vitamina $D_2$: 1 000 - 1 300 µg/g ta' trab tal-faqqiegħ ([12])<br>Indewwa: ≤ 10,0 %<br>Irmied: ≤ 13,5 % |


▼M48

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Metalli tqal**<br>Ċomb (f'Pb): ≤ 0,5 mg/kg<br>Kadmju: ≤ 0,5 mg/kg<br>Merkurju: ≤ 0,1 mg/kg<br>Arseniku: ≤ 0,3 mg/kg<br>**Mikotossini**<br>Aflatossini (is-somma ta' B1+B2+G1+G2): < 4 µg/kg<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd totali tal-kolonji: ≤ 5 000 CFU ([7])/g<br>Ħmira u moffa: ≤ 100 CFU/g<br>*Salmonella* sp.: Assenti f'25 g<br>*Staphylococcus aureus*: ≤ 10 CFU/g<br>*Escherichia coli*: ≤ 10 CFU/g<br>Coliforms: ≤ 10 CFU/g<br>*Enterobacteriaceae*: ≤ 10 CFU/g<br>*Listeria monocytogenes*: Assenti f'25 g |

▼M9

| | |
|---|---|
| **Il-vitamina $K_2$ (menakwinon)** | Dan l-ikel ġdid huwa prodott permezz ta' proċess sintetiku jew mikrobijoloġiku.<br>Il-Vitamina $K_2$ (2-metil-3-kollu-trans-poliprenil-1,4-naftokwinoni), jew is-serje menakwinon, hija grupp ta' derivattivi tan-naftokwinon prenilat. L-għadd ta' residwi tal-isopren, meta unità waħda ta' isopren fiha ħames karboni li jagħmlu l-katina laterali, jintuża biex jikkaratterizza l-omologi tal-menakwinon li fihom primarjament MK-7 u b'mod aktar limitat MK-6.<br>Is-serje tal-Vitamina $K_2$ (menakwinoni) bil-menakwinon-7 (MK-7)(n = 6) tkun $C_{46}H_{64}O_2$, menakwinon-6 (MK-6)(n = 5) tkun $C_{41}H_{56}O_2$ u menakwinon-4 (MK-4)(n = 3) tkun $C_{31}H_{40}O_2$.<br>Isem Kimiku: (kollha-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-Eptametil-2,6,10,14,18,22,26-oktakosaeptaenil)-3-metil-1,4-naftalenedion<br>Numru CAS: 2124-57-4<br>Formula molekulari: $C_{46}H_{64}O_2$ |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Piż molekulari: 649 g/mol<br><br>*2-metil-1,4-naftokwinon (frazzjoni ta' menadjon)*<br>***Speċifikazzjoni tal-Vitamina $K_2$ sintetika (menakwinon-7)***<br>Dehra: Trab isfar<br>Purità: Massimu ta' 6,0 % ċis-isomeru, massimu ta' 2,0 % impuritajiet oħrajn<br>Kontenut: 97-102 % Menakwinon-7 (li jinkludi mill-inqas 92 % it-trans-Menakwinon-7 kollha)<br>***Speċifikazzjonijiet tal-Vitamina $K_2$ li ssir b'mod mikrobijoloġiku (menakwinon-7)***<br>Sors: *Bacillus subtilis* spp. natto u *Bacillus licheniformis*<br>Dehra: Trab isfar jew sospensjoni ta' żejt |
| **Estratt tan-nuħħala tal-qamħ** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Trab kristallin abjad li jinkiseb permezz ta' estrazzjoni enzimatika min-nuħħala tat-*Triticum aestivum* L. li fiha ħafna oligosakkaridi arabinossilan<br>Materja niexfa: Minimu ta' 94 %<br>Oligosakkaridi arabinossilan: Minimu ta' 70 % ta' materja niexfa<br>Grad medju tal-polimerizzazzjoni tal-oligosakkaridi arabinossilan: 3-8<br>Aċidu feruliku (marbut mal-oligosakkaridi arabinossilan): 1-3 % ta' materja niexfa<br>Total ta' poli/oligosakkaridi: Minimu ta' 90 %<br>Proteina: Massimu ta' 2 % ta' materja niexfa<br>Rmied: Massimu ta' 2 % ta' materja niexfa |

02017R2470 — MT — 09.09.2021 — 027.001 — 202

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Parametri mikrobijoloġiċi:**<br>Batterji mesofiliċi - l-għadd totali: Massimu ta' 10 000/g<br>Ħmejjer: Massimu ta' 100/g<br>Faqqiegħ: Massimu ta' 100/g<br>*Salmonella*: Assenti f'25 g<br>*Bacillus cereus*: Massimu ta' 1000/g<br>*Clostridium perfringens*: Massimu ta' 1000/g |

▼M19

**Ksilo-oligosakkaridi**

**Deskrizzjoni:**

L-ikel ġdid huwa taħlita ta' ksilo-oligosakkaridi (XOS) li jinkisbu miċ-ċifċiegħ tal-qamħirrum (*Zea mays* sottospeċi *mays*) permezz tal-idroliżi bi ksilanaża mit-*Trichoderma reesei*, segwita minn proċess ta' purifikazzjoni.

**Karatteristiċi/Kompożizzjoni**

| Parametru | Forma ta' trab 1 | Forma ta' trab 2 | Forma ta' ġulepp |
|---|---|---|---|
| Ndewwa (%) | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | 70-75 |
| Proteina (g/100 g) | < 0,2 | | |
| Rmied (%) | ≤ 0,3 | | |
| pH | 3,5-5,0 | | |
| Total tal-kontenut ta' karboidrati (g/100 g) | ≥ 97 | ≥ 95 | ≥ 70 |
| Kontenut ta' XOS (bażi niexfa) (g/100 g) | ≥ 95 | ≥ 70 | ≥ 70 |
| Karboidrati oħra (g/100 g) ([a]) | 2,5-7,5 | 2-16 | 1,5-31,5 |
| Total ta' monosakkaridi (g/100 g) | 0-4,5 | 0-13 | 0-29 |
| Glukożju (g/100 g) | 0-2 | 0-5 | 0-4 |
| Arabinożju (g/100 g) | 0-1,5 | 0-3 | 0-10 |
| Ksilożju (g/100 g) | 0-1,0 | 0-5 | 0-15 |
| Total ta' disakkaridi (g/100 g) | 27,5-48 | 25-43 | 26,5-42,5 |

▼M19

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ksilobijożju (XOS DP2) (g/100 g) | 25-45 | 23-40 | 25-40 |
| | Ċellobijożju (g/100 g) | 2,5-3 | 2-3 | 1,5-2,5 |
| | Total ta' oligosakkaridi (g/100 g) | 41-77 | 36-72 | 32-71 |
| | Ksilotri,ożju (XOS DP3) (g/100 g) | 27-35 | 18-30 | 18-30 |
| | Ksilotetraożju (XOS DP4) (g/100 g) | 10-20 | 10-20 | 8-20 |
| | Ksilopentaożju (XOS DP5) (g/100 g) | 3-10 | 5-10 | 3-10 |
| | Ksiloeżaożju (XOS DP6) (g/100 g) | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
| | Ksiloettaożju (XOS DP7) (g/100 g) | 0-7 | 2-7 | 2-6 |
| | Maltodestrina (g/100 g) ([b]) | 0 | 20-25 | 0 |
| | Ram (mg/kg) | < 5,0 | | |
| | Ċomb (mg/kg) | < 0,5 | | |
| | Arseniku (mg/kg) | < 0,3 | | |
| | *Salmonella* (CFU ([c])/25 g) | Negattiv | | |
| | *E. coli* (MPN ([d])/100 g) | Negattiv | | |
| | Ħmira (CFU/g) | < 10 | | |
| | Moffa (CFU/g) | < 10 | | |
| | DP: Degree of polymerization (Grad ta' polimerizzazzjoni)<br>([a]) Karboidrati oħra jinkludu l-monosakkaridi (glukożju, ksilożju u arabinożju) u ċ-ċellobijożju.<br>([b]) Il-kontenut ta' maltodestrina huwa kkalkulat skont l-ammont miżjud fil-proċess.<br>([c]) CFU: Colony Forming Units (Unitajiet li Jiffurmaw il-Kolonji)<br>([d]) MPN: Most Probable Number (Numru l-Iktar Probabbli) | | | |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| ▼M30 | |
| Bijomassa tal-ħmira tal-*Yarrowia lipolytica* | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-ikel ġdid huwa l-bijomassa tal-ħmira tal-*Yarrowia lipolytica* mnixxfa u meqruda bis-sħana.<br>**Karatteristiċi/Kompożizzjoni:**<br>Proteina: 45-55 g/100 g<br>Fibra: 24-30 g/100 g<br>Zokkor: < 1,0 g/100 g<br>Xaħam: 7-10 g/100 g<br>Irmied totali: ≤ 12 %<br>Kontenut ta' ilma: ≤ 5 %<br>Kontenut ta' materja niexfa: ≥ 95 %<br>**Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br>Għadd Mikrobjali Aerobiku Totali: ≤ $5 \times 10^3$ CFU/g<br>Għadd ta' Ħmira u Moffa Totali: ≤ $10^2$ CFU/g<br>Ċelloli vijabbli tal-*Yarrowia lipolytica* ([10]): < 10 CFU/g (jiġifieri l-limitu ta' detezzjoni)<br>Koliformi: ≤ 10 CFU/g<br>*Salmonella* spp.: Nuqqas f'25 g |
| ▼M9 | |
| **Betaglukani mill-ħmira** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Il-betaglukani huma polisakkaridi kumplessi b'massa molekolari għolja (100 - 200 kDa), li jinsabu fil-ħitan taċ-ċelloli ta' bosta ħmejjer u ċereali.<br>L-isem kimiku tal-"betaglukani tal-ħmira" huwa (1-3),(1-6)-ß-D-glukani.<br>Il-betaglukani jikkonsistu minn struttura ta' residwi tal-glukożju marbuta fi ß-1-3 li huma mifruqa b'konnessjonijiet ta' ß-1-6, li huma konnessi magħhom il-kitina u l-mannoproteini b'rabtiet ta' ß-1-4.<br>Il-betaglukani jiġu iżolati mill-ħmira *Saccharomyces cerevisiae*.<br>L-istruttura terzjarja tal-ħitan taċ-ċelloli tal-glukan tas-*Saccharomyces cerevisiae* tikkonsisti fi ktajjen ta' residwi marbutin ß-1,3 tal-glukożju, mifruqa b'ħolqiet ß-1,6, li jiffurmaw sinsla li magħha hemm marbutin il-kitina permezz ta' rabtiet ß-1,4, il-glukani ß-1,6 u xi mannoproteini. |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Dan l-ikel ġdid jinsab fi tliet forom differenti: solubbli, insolubbli u insolubbli fl-ilma, iżda dispersibbli f'ħafna matriċi likwidi.<br>**Il-karatteristiċi kimiċi tal-beta-glukani tal-ħmira (*Saccharomyces cerevisiae*):**<br>**Forma solubbli:**<br>Karboidrati totali: > 75 %<br>Beta-glukani (1,3/1,6): > 75 %<br>Rmied: < 4,0 %<br>Ndewwa: < 8,0 %<br>Proteina: < 3,5 %<br>Xaħam: < 10 %<br>**Forma insolubbli:**<br>Karboidrati totali: > 70 %<br>Beta-glukani (1,3/1,6): > 70 %<br>Rmied: ≤ 12 %<br>Ndewwa: < 8,0 %<br>Proteina: < 10 %<br>Xaħam: < 20 %<br>**Insolubbli fl-ilma, imma dispersibbli f'ħafna matriċi likwidi:**<br>(1,3)-(1,6)-ß-D-Glukani: > 80 %<br>Rmied: < 2,0 %<br>Ndewwa: < 6,0 %<br>Proteina: < 4,0 %<br>Total ta' xaħam: < 3,0 %<br>*Data mikrobijoloġika solubbli għal insolubbli fl-ilma, iżda dispersibbli f'ħafna matriċi likwidi:*<br>Għadd totali tal-kolonji: < 1 000 CFU/g<br>Enterobacteriacae: < 100 CFU/g<br>Koliformi totali: < 10 CFU/g |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | Ħmira: < 25 CFU/g<br>Moffa: < 25 CFU/g<br>*Salmonella*: Assenti f'25 g<br>*Escherichia coli*: Assenti f'1 g<br>*Bacillus cereus*: < 100 CFU/g<br>*Staphylococcus aureus*: Assenti f'1 g<br>*Metalli tqal għal insolubbli fl-ilma, iżda dispersibbli f'ħafna matriċi likwidi:*<br>►**M31** Ċomb: < 0,2 mg/kg<br>Arseniku: < 0,2 mg/kg<br>Merkurju: < 0,1 mg/kg<br>Kadmju: < 0,1 mg/kg ◄ |
| **Żeaksantina** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>Iż-żeaksantina hija pigment taż-żantofill li huwa naturali, huwa karotenojdu ossiġenat.<br>Iż-żeaksantina sintetika hija ppreżentata jew bħala trab imnixxef bl-atomizzazzjoni li jkollu bażi ta' ġelatina jew ta' lamtu ("żibġiet żgħar") miżjud bl-α-tokoferol u bil-palmitat tal-askorbil inkella jiġi ppreżentat bħala sospensjoni ta' żejt tal-qamħirrum bl-α-tokoferol miżjud. Iż-żeaksantina sintetika hija prodotta permezz ta' sintesi kimika minn molekuli iżgħar li ssir f'diversi stadji.<br>Trab kristallin ta' lewn aħmar jagħti fl-oranġjo bi ftit li xejn riħa.<br>Formula kimika: $C_{40}H_{56}O_2$<br>Nru CAS: 144-68-3<br>Piż molekulari: 568,9 daltons<br>**Karatteristiċi fiżikokimiċi:**<br>Telf mat-tnixxif: < 0,2 %<br>Transżeaksantina kollha: > 96 %<br>Ċis-żeaksantina: < 2,0 %<br>Karotenojdi oħrajn: < 1,5 %<br>Ossidu tat-trifenilfosfina (Nru CAS 791-28-6): < 50 mg/kg |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| **L-pidolat taż-żingu** | **Deskrizzjoni/Definizzjoni:**<br>L-pidolat taż-żingu huwa trab abjad għal abjad miksur b'riħa karatteristika.<br>Denominazzjoni internazzjonali komuni (INN): Aċidu L-piroglutamiku, melħ taż-żingu<br>Sinonimi: 5-ossoprolin taż-żingu, piroglutamat taż-żingu, pirrolidon karbossilat taż-żingu, Żingu PCA, L-pidolat taż-żingu<br>Nru CAS: 15454-75-8<br>Formula molekulari: $(C_5\ H_6\ NO_3)_2\ Zn$<br>Massa molekolari anidra relattiva: 321,4<br>Dehra: Trab ta' lewn abjad għal abjad maħmuġ<br>**Purità:**<br>L-pidolat taż-żingu (purità): ≥ 98 %<br>pH (soluzzjoni milwiema ta' 10 %): 5,0-6,0<br>Rotazzjoni speċifika: 19,6 º- 22,8 º<br>Ilma: ≤ 10,0 %<br>Aċidu glutamiku: < 2,0 %<br>**Metalli tqal:**<br>Ċomb: ≤ 3,0 ppm<br>Arseniku: ≤ 2,0 ppm<br>Kadmju: ≤ 1,0 ppm<br>Merkurju: ≤ 0,1 ppm |

▼M9

| Ikel Ġdid Awtorizzat | Speċifikazzjonijiet |
|---|---|
| | **Kriterji mikrobijoloġiċi:**<br><br>Għadd totali ta' batterji mesofiliċi vijabbli: ≤ 1 000 CFU/g<br><br>Ħmira u moffa: ≤ 100 CFU/g<br><br>Patoġenu: Assenti |

([1]) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 tad-9 ta' Marzu 2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 83, 22.3.2012, p. 1)

([2]) Ir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/175 tal-5 ta' Frar 2015 li jistabbilixxi li jistabbilixxi kundizzjonijiet speċjali applikabbli għall-importazzjoni għall-gomma tal-gwar li toriġina mill-Indja jew li tintbagħat minn hemm, minħabba r-riskju ta' kontaminazzjoni mill-pentaklorofenol u mid-dijossini (ĠU L 30, 6.2.2015, p. 10)

►**M15** ([3]) Metodu OSC-DMAC (4-dimetilamminokinnamaldeid) (Ocean Spray Cranberries, Inc) Martin MA, Ramos S, Mateos R, Marais JPJ, Bravo-Clemente, L, Khoo C and Goya L. Food Res Intl 2015 71: 68-82. Modified from Cunningham DG, Vannozzi S, O'Shea E, Turk R (2002) In: Ho C-T, Zheng QY (eds) Quality Management of Nutraceuticals ACS Symposium series 803, Washington DC. *Quantitation of PACs by DMAC Color Reaction pp* 151-166.

([4]) Metodu BL-DMAC (4-dimetilamminokinnamaldeid) (Brunswick Lab) Validazzjoni minn bosta laboratorji ta' metodu standard għall-kwantifikazzjoni tal-proantoċjanidini fit-trabijiet tal-cranberries. Prior RL, Fan E, Ji H, Howell A, Nio C, Payne MJ, Reed J. *J Sci Food Agric.* 2010 Jul;90(9):1473-8.

([5]) Il-valuri differenti għal dawn it-tliet parametri huma minħabba l-metodi differenti użati.

([6]) GAE: Gallic Acid Equivalents (Ekwivalenti ta' Aċidu Galliku).

([7]) CFU: Unitajiet li Jiffurmaw Kolonji. ◄

►**M29** ([8]) HPLC/RI: Kromatografija likwida ta' prestazzjoni għolja flimkien ma' detezzjoni tal-indiċi rifrattiv.

([9]) CFU: Unità li tifforma kolonja. ◄

([10]) Iridu jiġu ttestjati immedjatament wara l-pass tat-trattament bis-sħana. Il-miżuri jridu jkunu fis-seħħ biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni kroċjata biċ-ċelloli vijabbli tal-*Yarrowia lipolytica* waqt l-imballaġġ u/jew il-ħżin tal-ikel ġdid.

([11]) 2'-Fukosil-galattożju, Glukożju, Galattożju, Mannitol, Sorbitol, Galattitol, Trieżożju, Allo-lattożju u karboidrati oħra relatati strutturalment.

►**M48**([12]) Konvertiti mill-Unitajiet Internazzjonali (IU) bl-użu tal-fattur ta' konverżjoni ta' 0,025μg = 1 IU. ◄

([13]) Espress f'selenju.

([14]) Applikabbli fl-istadji kollha wara l-istadju tat-trattament bis-sħana biex jiggarantixxi n-nuqqas ta' ċelloli vijabbli ta' *Yarrowia lipolytica* u biex l-ewwel jiġi ttestjat immedjatament wara l-istadju tat-trattament bis-sħana. Il-miżuri jridu jkunu fis-seħħ biex tiġi evitata l-kontaminazzjoni kroċjata biċ-ċelloli vijabbli tal-*Yarrowia lipolytica* waqt l-imballaġġ u/jew il-ħżin tal-ikel ġdid.

([15]) Karboidrati diġestibbli = 100 — (proteina mhux raffinata + xaħam + fibra + irmied + umdità).