Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 255/2005

z 15. februára 2005

o trvalých povoleniach určitých prídavných látok v krmivách

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 45, 16.2.2005, s. 3)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Nariadenie Komisie (EÚ) č. 171/2011 z 23. februára 2011	L 49	11	24.2.2011
►M2	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1053 z 1. júla 2015	L 171	8	2.7.2015
►M3	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1399 zo 17. augusta 2015	L 217	1	18.8.2015

▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 255/2005

z 15. februára 2005

o trvalých povoleniach určitých prídavných látok v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív ([1]), a najmä na jej články 3 a 9d ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ([2]), a najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 1831/2003 stanovuje povolenie prídavných látok používaných vo výžive zvierat v Európskej únii.

(2) Článok 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 ustanovuje prechodné opatrenia pre žiadosti na povolenie prídavných látok do krmív, predložených v súlade so smernicou 70/524 pred dátumom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

(3) Žiadosti o povolenie prídavných látok, uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, boli predložené pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4) Počiatočné námietky členských štátov voči týmto žiadostiam, podané podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EH, boli Komisii predložené pred dátumom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. Tieto žiadosti sa budú teda naďalej posudzovať v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

(5) Použitie mikroorganického preparátu *Bacillus cereus* var. *toyoi* (NCIMB 40112/CNCM I-1012) bolo po prvýkrát prechodne povolené na vykrmovanie dobytka podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1411/1999 ([3]).

(6) Použitie mikroorganického preparátu *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) bolo po prvýkrát prechodne povolené pre teľatá podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1636/1999 ([4]).

([1]) Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).
([2]) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
([3]) Ú. v. ES L 164, 30.6.1999, s. 56.
([4]) Ú. v. ES L 194, 27.7.1999, s. 17.

▼B

(7) Predložené boli nové údaje na podporu týchto žiadostí o povolenie bez časového obmedzenia týchto dvoch mikroorganických preparátov, bližšie určených v prílohe I k tomuto nariadeniu. Vyhodnotenie ukazuje, že sú splnené podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS pre takéto povolenie.

(8) Použitie enzýmového preparátu endo-1, 3 (4)-beta-glukanázy a endo-1, 4-beta-xylanázy, vyrobeného z *Aspergillus niger* (NRRL 25541), bolo po prvýkrát prechodne povolené pre nosnice podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1436/98 ([1]).

(9) Na podporu žiadosti o povolenie tohto enzýmového preparátu bez časového obmedzenia boli predložené nové údaje.

(10) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) doručil svoje stanovisko o účinnosti používania tohto prípravku pre nosnice dňa 14. septembra 2004.

(11) Vyhodnotenie dokazuje, že sú splnené podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS.

(12) Použitie enzýmového preparátu 6-fytázy, vyrobeného podľa *Aspergillus oryzae* (DSM 11857), bolo po prvýkrát prechodne povolené na výkrm kurčiat, nosníc, moriek, pri výkrme mladých prasiat a ošípaných podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1353/2000 ([2]) a na výkrm prasníc podľa nariadenia Komisie (ES) č. 261/2003 ([3]). Použitie tohto enzýmového preparátu bolo povolené bez časového obmedzenia pre tieto kategórie zvierat podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1465/2004 ([4]).

(13) Na podporu žiadosti o povolenie na prípravu rovnakého enzýmového preparátu, vyrobeného podľa kmeňa DSM 14223, *Aspergillus oryzae* bez časového obmedzenia pre uvedené kategórie zvierat boli predložené nové údaje.

(14) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) doručil svoje stanovisko o používaní tohto preparátu, vyrobeného z *Aspergillus oryzae* kmeňa DSM 14223 namiesto kmeňa DSM 11857, z ktorého sa usudzuje, že tento preparát nepredstavuje riziko pre zdravie ľudí, pre uvedené kategórie zvierat ani pre prostredie podľa podmienok stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu.

(15) Vyhodnotenie ukazuje, že boli splnené podmienky v článku 3a smernice 70/524/EHS pre povolenie tohto preparátu bez časového obmedzenia.

([1]) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.
([2]) Ú. v. ES L 155, 28.6.2000 s. 15.
([3]) Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003 s. 12.
([4]) Ú. v. EÚ L 270, 18.8.2004 s. 11.

▼B

(16) Použitie enzýmového preparátu endo-1, 4-beta-xylanázy, vyrobeného podľa *Aspergillus niger* (CBS 270.95), bolo po prvýkrát prechodne povolené na výkrm kurčiat podľa nariadenia Komisie (ES) č. 1436/98 a na výkrm moriek podľa nariadenia Komisie (ES) č. 654/2000 ([1]).

(17) Na podporu žiadosti povolenia tohto enzýmového preparátu bez časového obmedzenia boli predložené nové údaje.

(18) Vyhodnotenie ukazuje, že sú splnené podmienky stanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS o povolení.

(19) Preto by malo byť používanie týchto troch enzýmových preparátov, bližšie uvedených v prílohe II, povolené bez časového obmedzenia.

(20) Vyhodnocovanie žiadostí ukazuje, že sa musia vyžadovať isté postupy na ochranu pracovníkov pred vystavením sa riziku, ktoré je spojené s týmito prídavnými látkami, ako je stanovené v prílohách. Táto ochrana musí byť zaistená žiadosťou smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o prijatí opatrení na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci ([2]).

(21) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Preparáty, ktoré patria do skupiny „mikroorganizmov“, sú povolené na používanie bez časového obmedzenia ako prídavné látky do výživy zvierat podľa podmienok stanovených v prílohe I.

Článok 2

Preparáty, ktoré patria do skupiny „enzýmov“ sú povolené na použitie bez časového obmedzenia ako prídavné látky do výživy zvierat podľa podmienok stanovených v prílohe II.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

([1]) Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 26.
([2]) Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

▼B

PRÍLOHA I

	ES č.	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						CFU/kg kompletného krmiva			
	Mikroorganizmy								
▼M3	_____								
▼M2	_____								

▼B

PRÍLOHA II

ES č.	Prísada	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					Jednotka činnosti/kg kompletného krmiva			
Enzýmy								
„E 1601	Endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1, 4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza a endo-1, 4-beta-xylanáza, vyrobený podľa *Aspergillus niger* (NRRL 25541) s minimálnou aktivitou: Endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza: 1 100 U ([1])/g Endo-1, 4-beta-xylanáza: 1 600 U ([2])/g	nosnice	—	endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza: 138 U endo-1, 4-beta-xylanáza: 200 U	— —	1. V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania , životnosť a stabilitu voči tabletovaniu. 2. Odporúčaná dávka na kilogram kompletného krmiva: endo-1, 3 (4)-beta-glukanáza: 138 U endo-1, 4-beta-xylanáza: 200 U. 3. Na použitie na zložené krmivo bohaté na polysacharidy bez škrobu (najmä arabinoxylanóza a beta-glukóza), napríklad zmiešaná strava s obsahom obilnín (napr. jačmeňa, pšenice, raže, tritikalu).	bez časového obmedzenia
▼M1 ———								
▼B			nosnice	—	300 FYT	—	1. V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 450–1 000 FYT. 3. Pri použití v krmive, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.	bez časového obmedzenia

▼B

ES č.	Prísada	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					Jednotka činnosti/kg kompletného krmiva			
			morky a moriaky na výkrm	—	250 FYT	—	1. V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT. 3. Na použitie v krmive, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.	bez časového obmedzenia
			mladé ošípané	—	250 FYT	—	1. V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT. 3. Na použitie v krmive, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín. 4. Na použitie pre odstavené mladé ošípané približne do 35 kg.	bez časového obmedzenia
			ošípané na výkrm	—	250 FYT	—	1. V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 500–1 000 FYT. 3. Na použitie pre krmivo, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.	bez časového obmedzenia

▼B

ES č.	Prísada	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
					Jednotka činnosti/kg kompletného krmiva			
			prasnice	—	750 FYT	—	1. V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 750–1 000 FYT. 3. Na použitie pre krmivo, ktoré obsahuje viac ako 0,25 % fosforu viazaného na fytín.	bez časového obmedzenia
E 1618	Endo-1, 4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok endo-1, 4-beta-xylanáza, vyrobený podľa *Aspergillus niger* (CBS 270.95) s minimálnou aktivitou: v pevnej forme: 28 000 EXU ([4])/g v tekutej forme: 14 000 EXU/ml	kurčatá na výkrm	—	2 800 EXU	—	1. V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 2 800–5 600 EXU. 3. Na použitie v krmive, ktoré je bohaté na polysacharidy bez obsahu škrobu (najmä arabinoxylanóza), napr. s obsahom pšenice viac ako 50 %.	bez časového obmedzenia
			morky a moriaky na výkrm	—	5 600 EXU	—	1. V návode na použitie prídavnej látky a zmesi uveďte teplotu skladovania, životnosť a stabilitu voči tabletovaniu. 2. Odporúčaná dávka na kg kompletného krmiva: 5 600 EXU. 3. Na použitie v krmive, ktoré je bohaté na polysacharidy bez obsahu škrobu (najmä arabinoxylanóza), napr. s obsahom pšenice viac ako 30 % a obsahom raže viac ako 30 %.	bez časového obmedzenia“

([1]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľňuje 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty glukózy) z ovseného beta-glukánu za minútu pri pH 4,0 a 30 °C.
([2]) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľňuje 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) z arabinoxylanu za minútu pri pH 3,5 a 55 °C.
([4]) 1 EXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľňuje 1 mikromol redukujúcich cukrov (ekvivalenty xylózy) z arabinoxylanu za minútu pri pH 3,5 a 55 °C.