KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1332/2004,

20. juuli 2004,

mis käsitleb teatavate söödalisandite alalist lubamist

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ söödalisandite kohta, [1] eriti selle artiklit 3 ja artikli 9d lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1) Direktiiv 70/524/EMÜ näeb ette lisandite kasutamise lubamist ühenduses. Selle direktiivi C lisa II osas nimetatud lisandid on lubatud tähtajatult eeldusel, et on täidetud teatud tingimused.

(2) *Aspergillus oryzae* (DSM 10287) poolt toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ensüümpreparaadi kasutamine oli esmakordselt ajutiselt lubatud broilerkanade, broilerkalkunite ja põrsaste puhul määrusega (EÜ)1436/98. [2]

(3) *Humicola insolens* (DSM 10442) poolt toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja endo-1,4-beeta-glükanaasi ensüümpreparaadi kasutamine oli esmakordselt ajutiselt lubatud broilerkanade puhul määrusega (EÜ) nr 1436/98. [2]

(4) Tähtajatu loa taotluse toetuseks nende ensüümpreparaatide kasutamiseks esitati uusi andmeid. Hindamine näitab, et direktiiviga 70/524/EMÜ sätestatud tingimused nimetatud loa saamiseks on mõlemal juhul täidetud.

(5) Niisiis peaks nende ensüümpreparaatide kasutamine olema teatavatel tingimustel lubatud tähtajatult.

(6) Taotluste hindamine näitab, et kaitsmaks töötajaid kokku puutumast käesoleva määruse lisades sätestatud lisanditega, peaksid olema nõutavad teatud protseduurid. Selline kaitse peaks olema kindlustatud tööl töötajate tervise ja ohutuse parandamist edendavaid meetmeid käsitleva nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiivi 89/391/EMÜ rakendamisega. [3]

(7) Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ensüümide rühma kuuluvaid käesoleva määruse I ja II lisas nimetatud valmistisi võib lisas ettenähtud tingimustel lubada piiramatu aja jooksul kasutada söödalisandina.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. juuli 2004

Komisjoni nimel
komisjoni liige
David BYRNE

---

[1] EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1756/2002 (EÜT L 265, 3.10.2002, lk 1).

[2] EÜT L 191, 7.7.1998, lk 15.

[3] EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

I LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Maksimaalne vanus	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsusühikud täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
E 1607	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8	*Aspergillus oryzae* (DSM 10287) poolt toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaaspreparaat minimaalse aktiivsusega: Kaetud: 1 000 FXU ([1])/g Vedelal kujul: 650 FXU/ml	Broilerkanad	—	100 FXU	400 FXU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 100–400 FXU. 3. Kasutamiseks tärklisest mitte pärinevate polüsahhariidide rikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segasöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % teravilja (nt nisu, otra, rukist või tritikalet)	Piiramata
			Broilerkalkunid	—	100 FXU	400 FXU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 100–400 FXU. 3. Kasutamiseks tärklisest mitte pärinevate polüsahhariidide rikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segasöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % teravilja (nt nisu, otra, rukist või tritikalet).	Piiramata
			Põrsad	—	200 FXU	400 FXU	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 200–400 FXU. 3. Kasutamiseks tärklisest mitte pärinevate polüsahhariidide rikkas (peamiselt arabiinoksülaanid) segasöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 50 % teravilja (nt nisu, otra, rukist või tritikalet). 4. Kasutamiseks võõrutatud põrsastel kuni kehakaaluni umbes 35 kg.	Piiramata

([1]) 1 FXU on ensüümi hulk, mis vabastab 7,8 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) asonisu arabiinoksülaanist minutis pH taseme 6,0 ja temperatuuri 50 °C juures.

II LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Maksimaalne vanus	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsusühikud täissööda kilogrammi kohta			
Ensüümid								
E 1608	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EÜ 3.2.1.8 Endo-1,4-beeta-glükanaas EÜ 3.2.1.4	*Humicola insolens*'i (DSM 10442) poolt toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi ja endo-1,4-beeta-glükanaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: Kaetud: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 800 FXU (1)/g Endo-1,4-beeta-glükanaas: 75 FBG (2)/g Vedelal kujul: Endo-1,4-beeta-ksülanaas: 550 FXU/ml Endo-1,4-beeta-glükanaas: 50 FBG/ml	Broilerkanad	—	400 FXU 36 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutusjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja granuleerimispüsivus. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: 400-1 000 FXU 36-94 FBG. 3. Kasutamiseks tärklisest mitte pärinevate polüsahhariidide rikkas (peamiselt arabiinoksülaanid ja beetaglükaanid) segasöödas, nt sellises, mis sisaldab üle 40 % taimseid koostisosi (oder, kaer, nisu, rukis, tritikale, sorgo või lupiin).	Piiramata

(1) 1 FXU on ensüümi hulk, mis vabastab 3,1 mikromooli redutseerivaid suhkruid (ksüloosi ekvivalente) asonisu arabiinoksülaanist minutis pH taseme 6,0 ja temperatuuri 50 °C juures.
(2) 1 FBG on ensüümi hulk, mis vabastab 1 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosi ekvivalente) odra beeta-glükaanist minutis pH taseme 5,0 ja temperatuuri 30 °C juures.