UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1332/2004

z dne 20. julija 2004

o trajnem dovoljenju nekaterih dodatkov v krmi

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi za živali [1] in zlasti člena 3 in člena 9d(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Direktiva 70/524/EGS zagotavlja podlago za izdajo dovoljenj za dodatke, ki se uporabljajo v Skupnosti. Dodatki, ki so navedeni v delu II Priloge C k tej direktivi, se lahko dovolijo brez časovne omejitve, v kolikor so izpolnjeni določeni pogoji.

(2) Uporaba encimskega pripravka iz endo-1,4-betaksilanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oryzae* (DSM 10287), je bila začasno prvič dovoljena za piščance za pitanje, purane za pitanje in pujske z Uredbo (ES) št. 1436/98 [2].

(3) Uporaba encimskega pripravka iz endo-1,4-betaksilanaze in endo-1,4-betaglukanaze, ki ju proizvaja *Humicola insolens* (DSM 10442), je bila začasno prvič dovoljena za piščance za pitanje z Uredbo Komisije (ES) št. 1436/98 [2].

(4) Predloženi so bili novi podatki v prid prošenj za izdajo dovoljenja brez časovne omejitve za vsakega od teh encimskih pripravkov. Vrednotenje kaže, da vsak pripravek izpolnjuje pogoje določene v Direktivi 70/524/EGS za pridobitev takšnega dovoljenja.

(5) Torej se uporabo teh encimskih pripravkov dovoli brez časovne omejitve pod določenimi pogoji.

(6) Vrednotenje uporabe kaže, da so potrebni določeni postopki za zaščito delavcev pred izpostavitvijo dodatkom, ki so navedeni v prilogah. Takšna zaščita se mora zagotoviti z izvajanjem Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu [3].

(7) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki spadajo v skupino „encimov“, kot je opredeljeno v prilogah I in II, se brez časovne omejitve dovolijo kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v teh prilogah.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2004

Za Komisijo
David BYRNE
Član Komisije

[1] UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1756/2002 (UL L 265, 3.10.2002, str. 1).
[2] UL L 191, 7.7.1998, str. 15.
[3] UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

PRILOGA I

Registracijska št. ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta oz. kategorija živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
Encimi								
E 1607	Endo-1,4-betaksilanaza ES 3.2.1.8	Pripravek iz endo-1,4-betaksilanaze, ki jo proizvaja *Aspergillus oryzae* (DSM 10287), z najmanjšo aktivnostjo: kot prevleka: 1 000 FXU ([1])/g v tekoči obliki: 650 FXU/ml	Piščanci za pitanje	—	100 FXU	400 FXU	(1) V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. (2) Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100-400 FXU. (3) Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % žitaric (npr. pšenice, ječmena, rži ali tritikale).	Brez časovne omejitve
			Purani za pitanje	—	100 FXU	400 FXU	(1) V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. (2) Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100-400 FXU. (3) Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % žitaric (npr. pšenice, ječmena, rži ali tritikale).	Brez časovne omejitve
			Pujski	—	200 FXU	400 FXU	(1) V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. (2) Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 200-400 FXU. (3) Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polisaharidi (zlasti arabinoksilani), ki npr. vsebujejo več kakor 50 % žitaric (npr. pšenice, ječmena, rži ali tritikale). (4) Za uporabo pri odstavljenih pujskih do približno 35 kg.	Brez časovne omejitve

([1]) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 7,8 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz azopšenice na minuto pri pH 6,0 in 50 °C.

PRILOGA II

Registracijska št. ES	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta oz. kategorija vrst živali	Najvišja starost	Najmanjša vsebnost	Največja vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za trženje
					Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
Encimi								
E 1608	Endo-1,4-betaksilanaza EC 3.2.1.8 Endo-1,4-betaglukanaza EC 3.2.1.4	Pripravek iz endo-1,4-betaksilanaze in endo-1,4-betaglukanaze, ki ju proizvaja *Humicola insolens* (DSM 10442), z najmanjšo aktivnostjo: kot prevleka: Endo-1,4-betaksilanaza: 800 FXU (1)/g Endo-1,4-betaglukanaza: 75 FBG (2)/g v tekoči obliki: Endo-1,4-betaksilanaza: 550 FXU/ml Endo-1,4-betaglukanaza: 50 FBG/ml	Piščanci za pitanje	—	400 FXU 36 FBG	1 000 FXU 94 FBG	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 400-1 000 FXU 36-94 FBG. 3. Za uporabo v krmni mešanici, bogati z neškrobnimi polosaharidi (zlasti arabinoksilani in betaglukani), ki npr. vsebujejo več kakor 40 % rastlinskih sestavin (ječmena, ovsa, pšenice, rži, tritikale, sirka ali volčjega boba).	Brez časovne omejitve

(1) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 3,1 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz arabinoksilana iz azopšenice na minuto pri pH 6,0 in 50 °C.
(2) 1 FBG je količina encima, ki sprosti 1 mikromol reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz betaglukana iz ječmena na minuto pri pH 5,0 in 30 °C.