375R3025

20.11.75 Ἐπίσημη Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων Ἀριθ. N 300/5

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) ἀριθ. 3025/75 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τῆς 17ης Νοεμβρίου 1975

περί τροποποιήσεως τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1470/68 τῆς Ἐπιτροπῆς «περί τῆς λήψεως καί ἀναγωγῆς δειγμάτων καθώς καί τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς περιεκτικότητος τῶν ἐλαιούχων σπόρων σέ ἔλαιο, σέ ξένα σώματα καί σέ ὑγρασία»

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Ἔχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Οἰκονομικῆς Κοινότητος,

τόν κανονισμό ἀριθ. 136/66/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου τῆς 22ας Σεπτεμβρίου 1966 περί δημιουργίας κοινῆς ὀργανώσεως ἀγορᾶς στόν τομέα τῶν λιπαρῶν οὐσιῶν, ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 1707/73([2]), καί ἰδίως τό ἄρθρο 26 παράγραφος 3 καί τό ἄρθρο 27 παράγραφος 5,

τόν κανονισμό ἀριθ. 142/67/ΕΟΚ τοῦ Συμβουλίου τῆς 21ης Ἰουνίου 1967 περί τῶν ἐπιστροφῶν κατά τήν ἐξαγωγή τῶν κραμβοσπόρων, γογγυλοσπόρων καί ἡλιανθοσπόρων([3]), ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 2429/72([4]), καί ἰδίως τό ἄρθρο 6,

Ἐκτιμώντας:

ὅτι γιά τόν ἀκριβή προσδιορισμό τῆς περιεκτικότητος τῶν κραμβοσπόρων καί γογγυλοσπόρων σέ σπόρους *Sinapis arvensis*, πρέπει νά προβλεφθεῖ κατάλληλη μέθοδος·

ὅτι, γιά τό σκοπό αὐτό, συντρέχει λόγος νά τροποποιηθεῖ ὁ κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1470/68 τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς 23ης Σεπτεμβρίου 1968 περί τῆς λήψεως καί ἀναγωγῆς τῶν δειγμάτων καθώς καί τοῦ προσδιορισμοῦ τῆς περιεκτικότητος τῶν ἐλαιούχων σπόρων σέ ἔλαιο, σέ ξένα σώματα καί σέ ὑγρασία([5]), ὅπως τροποποιήθηκε τελευταῖα ἀπό τόν κανονισμό (ΕΟΚ) ἀριθ. 2377/74([6])·

ὅτι τά μέτρα πού προβλέπονται στόν παρόντα κανονισμό εἶναι σύμφωνα μέ τή γνώμη τῆς Ἐπιτροπῆς Διαχειρίσεως Λιπαρῶν Οὐσιῶν,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Ἄρθρο 1

Τό κείμενο τοῦ ἄρθρου 1 παράγραφος 1 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1470/68 ἀντικαθίσταται ἀπό τό ἀκόλουθο κείμενο:

«1. Μέ τήν ἐπιφύλαξη τῶν ἑπομένων παραγράφων, ἡ λήψη δειγμάτων, ἡ ἀναγωγή τῶν δειγμάτων γιά τό ἐργαστήριο σέ δείγματα γιά ἀνάλυση καθώς καί ὁ προσδιορισμός τῆς περιεκτικότητος σέ ξένα σώματα καί ὑγρασία, πού ἀναφέρονται στό ἄρθρο 4 τοῦ κανονισμοῦ ἀριθ. 282/67/ΕΟΚ, στό ἄρθρο 2 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 651/71 καί στό ἄρθρο 33 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1204/72, πραγματοποιοῦνται κατά τίς μεθόδους πού καθορίζονται ἀντίστοιχα στά παραρτήματα I, II, III, IV, καί IVα τοῦ παρόντος κανονισμοῦ.»

Ἄρθρο 2

Τό κείμενο τοῦ ἄρθρου 2 α) τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1470/68 ἀντικαθίσταται ἀπό τό ἀκόλουθο κείμενο:

«1. Ἡ διάκριση μεταξύ τῶν σπόρων *Sinapis arvensis* (ἄγριο σινάπι ἤ λαψάνα) καί τῶν κραμβοσπόρων καί γογγυλοσπόρων ἐπιτυγχάνεται μέ τή χρησιμοποίηση μεγεθυντικοῦ φακοῦ πού νά δίδει μεγέθυνση μεγαλύτερη ἤ ἴση πρός 4.

2. Σέ περίπτωση ἀμφιβολίας, ἡ διάκριση πού προβλέπεται στήν παράγραφο 1 ἐπιτυγχάνεται μέ τή χρησιμοποίηση τῆς μεθόδου πού ἀναφέρεται στό παράρτημα IVα.»

Ἄρθρο 3

Ὁ κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1470/68 συμπληρώνεται μέ τό παράρτημα IVα), τοῦ ὁποίου τό κείμενο ἀναγράφεται στό παράρτημα τοῦ παρόντος κανονισμοῦ·

Ὁ παρών κανονισμός εἶναι ὑποχρεωτικός ὡς πρός ὅλα τά μέρη του καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

Ἔγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 17 Νοεμβρίου 1975.

Γιά τήν Ἐπιτροπή

P. J. LARDINOIS

Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς

([1]) ΕΕ ἀριθ. 172 τῆς 30.9.1966, σ. 3025/66.
([2]) ΕΕ ἀριθ. N 175 τῆς 29.6.1973, σ. 5.
([3]) ΕΕ ἀριθ. N 125 τῆς 26.6.1967, σ. 2461/67.
([4]) ΕΕ ἀριθ. N 264 τῆς 23.11.1972, σ. 1.
([5]) ΕΕ ἀριθ. N 239 τῆς 28.9.1968, σ. 2.
([6]) ΕΕ ἀριθ. N 254 τῆς 19.9.1974, σ. 7.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IVa

Προσδιορισμός τῆς περιεκτικότητος τῶν κραμβοσπόρων σέ σπόρους Sinapis arvensis (ἄγριο σινάπι ἤ λαψάνα)

Χρησιμοποιούμενο ὑλικό

Ἀναλυτικός ζυγός.

Κόσκινο μέ στρογγυλές ὀπές τῶν 1,8 χιλιοστῶν.

Διηθητικό χαρτί μή φθορίζον, τύπου χρωματογραφίας.

Διάλυμα KOH τῶν 5%.

Λυχνία ὑπεριωδῶν ἐκπέμπουσα φωτισμόν 365 – 366 n.m.

Κουτιά μέ κάλυμμα, κατά προτίμηση κουτιά Petri.

Μετρητής πνευματικός ἤ ἠλεκτρονικός.

Τρόπος ἐργασίας

1. Ἡ ἀνάλυση ἐνεργεῖται σέ τμῆμα ἀκέραιο ὑποπολλαπλάσιο τῆς ποσότητος κραμβοσπόρων, ἀπαλλαγμένο ἀπό ξένα σώματα ἄλλα ἐκτός ἀπό τούς σπόρους *Sinapis arvensis*.

2. Δύο δείγματα, πού εἶναι ζυγισμένα μέ ἀκρίβεια 0,001 τοῦ γραμμαρίου καί ἔχουν βάρος 5 γραμμάρια τό καθένα, τοποθετοῦνται χωριστά στό κόσκινο μέ τίς στρογγυλές ὀπές τῶν 1,8 χιλιοστῶν.

   Οἱ σπόροι πού διαπερνοῦν τό κόσκινο ζυγίζονται καί σημειώνεται τό βάρος τους.

3. Τό διηθητικό χαρτί προσαρμόζεται στό σχῆμα τοῦ πυθμένα τῶν χρησιμοποιουμένων κουτιῶν καί τοποθετεῖται μέσα σ' αὐτά. Τό διάλυμα τοῦ KOH 5%, πού παρασκευάζεται κατά τή στιγμή τῆς ἀναλύσεως, γιά νά μήν μετατραπεῖ σέ ἀνθρακικό, χύνεται στό διηθητικό χαρτί γιά νά τό ὑγράνει.

   Ἡ περίσσεια ὑγροῦ ἀπομακρύνεται.

4. Οἱ σπόροι πού περνοῦν μέσα ἀπό τό κόσκινο τοποθετοῦνται στό διηθητικό χαρτί, ἐνδεχομένως μέ τή βοήθεια πνευματικοῦ ἤ ἠλεκτρονικοῦ μετρητοῦ καί σημειώνεται ὁ ἀριθμός τους. Κατά τή διάρκεια τῆς ἐργασίας αὐτῆς, οἱ κατεστραμμένοι σπόροι ἀποβάλλονται, γιατί δύνανται νά δημιουργήσουν ἀνοικτό γαλάζιο φθορισμό.

   Μετά τήν τοποθέτηση τῶν σπόρων, τά κουτιά (ἀπό πλαστικό) πρέπει νά καλυφθοῦν μέ τά καλύμματά τους, γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἐξάτμιση πού θά καθιστοῦσε τά ἀποτελέσματα ἀνακριβή. Ἀφήνετε νά ἐνεργήσει στούς 20 βαθμούς ἐπί 45 λεπτά.

5. Παρατηροῦνται οἱ σπόροι μέ λυχνία ὑπεριωδῶν, ἐκπέμπουσα φωτισμόν 365 – 366 n.m.

   Μόνο οἱ σπόροι *Sinapis arvensis* θά προκαλέσουν τήν ἐμφάνιση φωτεινοῦ φθορισμοῦ κιτρινοπρασίνου χρώματος. Οἱ κραμβόσποροι δέν προκαλοῦν φθορισμό (ἐκτός τῆς ἐξαιρέσεως πού ἀναφέρθηκε στό σημεῖο 4).

   Οἱ σπόροι *Sinapis arvensis* μετροῦνται καί σημειώνεται ὁ ἀριθμός τους.

6. Ὑπολογισμός τῆς περιεκτικότητος τῶν κραμβοσπόρων, σέ σπόρους *Sinapis arvensis*.

   α) Ὑπολογίζεται τό ποσοστό (S) σέ ἀριθμό σπόρων *Sinapis arvensis* σέ σχέση μέ τόν ἀριθμό τῶν σπόρων πού τοποθετήθηκαν στό διηθητικό χαρτί.

   θ) Ἐκφράζεται ἡ μάζα (K) σέ γραμμάρια σπόρων *Sinapis arvensis* στό δεῖγμα πού κρατήθηκε (5 γραμμάρια), ἐφαρμόζοντας τόν ἀκόλουθο τύπο:

$$K = \frac{T \times S}{100}$$

ὅπου T = τό βάρος σέ γραμμάρια τῶν σπόρων πού πέρασαν μέσα ἀπό τό κόσκινο (σημεῖο 2). 'Η μάζα σέ γραμμάρια (X) τῶν σπόρων *Sinapis arvensis* πού περιλαμβάνονται στό ἀρχικό δεῖγμα, ὑπολογίζεται ἐφαρμόζοντας τόν ἀκόλουθο τύπο:

$$X = \frac{M_\alpha \times K}{M_5}$$

ὅπου M_α = ἡ μάζα σέ γραμμάρια τοῦ ἀρχικοῦ δείγματος κραμβοσπόρων ἀπαλλαγμένων ἀπό σκόνες (M_1) καί ξένα σώματα ($M_{5_a} + M_{3_a}$) καταχωρημένων σύμφωνα μέ τό παράρτημα IV. M_5 = ἡ μάζα τοῦ δείγματος τῶν 5 γραμμαρίων περίπου.

γ) Προσδιορίζεται τό ποσοστό Y τῆς μάζας σέ γραμμάρια (X) τῶν σπόρων *Sinapis arvensis* στό ἀρχικό δεῖγμα ἐφαρμόζοντας τόν ἀκόλουθο τύπο:

$$Y = \frac{X \times 100}{M_0}$$

ὅπου M_0 = ἡ μάζα σέ γραμμάρια τῆς ἀρχικῆς ποσότητος δοκιμῆς.

7. Οἱ διατάξεις πού ἀφοροῦν τήν ἐπαναληπτικότητα πού προβλέπεται στό σημεῖο 6 περίπτωση 2 τοῦ παραρτήματος IV, εἶναι ἐφαρμόσιμες.»