Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1259/2004

2004 m. liepos 8 d.

dėl ilgalaikio leidimo pašaruose naudoti jau leidžiamus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 239, 2004 7 9, p. 8)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2013 m. gegužės 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 403/2013	L 121	26	2013 5 3
►M2	2014 m. kovo 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 290/2014	L 87	84	2014 3 22
►M3	2015 m. liepos 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1053	L 171	8	2015 7 2

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1259/2004

2004 m. liepos 8 d.

dėl ilgalaikio leidimo pašaruose naudoti jau leidžiamus priedus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1756/2002 ([2]), ypač į jo 3 straipsnį ir 9d straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1) Direktyvoje 70/524/EEB numatyta, kad, negavus Bendrijos leidimo, nė vienas priedas nebūtų išleistas į apyvartą.

(2) Direktyvos 70/524/EEB C priedo II dalyje nurodytų priedų, įskaitant ir mikroorganizmus ir fermentus, atveju gali būti išduodamas leidimas neribotam laikui naudoti naują priedą, jei laikomasi 3 straipsnio a dalyje nustatytų sąlygų.

(3) Mikroorganizmo *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) preparatą pirmą kartą buvo leista laikinai naudoti mėsiniams viščiukams Komisijos reglamente (EB) Nr. 1636/1999 ([3]).

(4) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraišką dėl leidimo neribotam laikui naudoti šį mikroorganizmą.

(5) Įvertinus pateiktą paraišką dėl leidimo naudoti tą mikroorganizmą, matyti, kad tenkinamos Direktyvoje 70/524/EEB dėl leidimo neribotam laikui numatytos sąlygos.

(6) Todėl reikėtų neribotam laikui leisti I priede nurodytą mikroorganizmą naudoti mėsiniams viščiukams.

(7) Skysto pavidalo fermento endo-1,4-beta-gliukanazės, endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252), preparatą naudoti mėsiniams viščiukams pirmą kartą buvo laikinai leista Komisijos reglamente (EB) Nr. 1436/1998 ([4]), o granulių pavidalo – Komisijos reglamente (EB) Nr. 937/2001 ([5]).

([1]) OL L 270, 1970 12 14, p. 1.
([2]) OL L 265, 2002 10 3, p. 1.
([3]) OL L 194, 1999 7 27, p. 17.
([4]) OL L 191, 1998 7 7, p. 15.
([5]) OL L 130, 2001 5 12, p. 25.

▼B

(8) Fermento endo-1,3 (4)-beta- gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), preparatą naudoti mėsiniams viščiukams pirmą kartą buvo laikinai leista Komisijos reglamente (EB) Nr. 654/2000 ([1]).

(9) Fermento endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101), preparatą naudoti mėsiniams viščiukams pirmą kartą buvo laikinai leista Komisijos reglamente (EB) Nr. 866/1999 ([2]).

(10) Fermento endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Aspergillus niger* (CBS 520.94), preparatą naudoti mėsiniams viščiukams pirmą kartą buvo laikinai leista Komisijos reglamente (EB) Nr. 1436/1998 ([3]).

(11) Kieto pavidalo fermento endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136), preparatą naudoti mėsiniams viščiukams pirmą kartą buvo laikinai leista Komisijos reglamente (EB) Nr. 1353/2000 ([4]), o skysto pavidalo – Komisijos reglamente (EB) Nr. 2188/2002 ([5]).

(12) Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys paraiškas dėl leidimo neribotam laikui naudoti kiekvieną iš šių fermento preparatų.

(13) Įvertinus pateiktas paraiškas dėl leidimo naudoti kiekvieną iš tų fermento preparatų, matyti, kad tenkinamos Direktyvoje 70/524/EEB dėl leidimo neribotam laikui numatytos sąlygos.

(14) Todėl reikėtų neribotam laikui leisti fermento preparatus naudoti mėsiniams viščiukams, laikantis II, III, IV, V ir VI prieduose nurodytų sąlygų.

(15) Įvertinus pateiktas paraiškas, matyti, kad reikėtų reikalauti tam tikrų procedūrų, siekiant apsaugoti darbuotojus nuo šio reglamento prieduose išvardytų pašarų priedų. Tokia apsauga turėtų būti užtikrinta, taikant 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvą 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo ([6]), su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 ([7]).

(16) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

([1]) OL L 79, 2000 3 30, p. 26.
([2]) OL L 108, 1999 4 27, p. 21.
([3]) OL L 191, 1998 7 7, p. 15.
([4]) OL L 155, 2000 6 28, p. 15.
([5]) OL L 333, 2002 12 10, p. 5.
([6]) OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
([7]) OL L 284, 2003 10 31, p. 1.

▼B

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

▼M3

———————

▼M2

2 straipsnis

III, V ir VI prieduose nurodytus „fermentų“ grupei priklausančius preparatus leidžiama neribotą laiką naudoti kaip pašarų priedus laikantis minėtuose prieduose nustatytų reikalavimų.

▼B

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3

———————

▼M1

———————

▼B

III PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ilgiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo pabaiga
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčių pašarų			
Fermentai								
E 1603	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: kapsulės: 50 FBG ([1])/g skysta forma: 120 FBG/ml	Mėsiniai viščiukai	—	10 FBG	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčių pašarų: 15–20 FBG. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašarus, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač beta-gliukanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 60 % augalinių ingredientų (kukurūzų, lubinų, kviečių, miežių, sojos, ryžių, rapsų ar žirnių).	Neribotam laikui

([1]) 1 FBG - fermento kiekis, atpalaiduojantis vieną mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentų) per minutę iš miežių betagliukano, esant pH 5,0 ir 30 °C temperatūrai.

▼M2

———————

▼B

V PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ilgiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo pabaiga
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčių pašarų			
Fermentai								
E 1605	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Aspergillus niger* (CBS 520.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: kieto pavidalo: endo-1,4-beta-ksilanazės: 600 U ([1])/g skysto pavidalo: endo-1,4-beta-ksilanazės: 300 U/ml	Mėsiniai viščiukai	—	300 U	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčių pašarų: endo-1,4-beta-ksilanazės: 300-600 U. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašarus, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % kviečių.	Neribotam laikui

([1]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolio ksilozės per minutę iš beržų ksilano, esant 5,3 pH ir 50° C temperatūrai.

▼B

VI PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Ilgiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo pabaiga
					Aktyvumo vienetai 1 kilogramui visaverčių pašarų			
Fermentai								
E 1606	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8	Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: kieto ir skysto pavidalo: 100 IU ([1])/g arba ml	Mėsiniai viščiukai	—	10 IU	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčių pašarų: 10 IU. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašarus, turinčiuose daug nekrakmolinių polisacharidų (ypač arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kviečių.	Neribotam laikui

([1]) 1 IU – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš beržų ksilano, esant 4,5 pH ir 30 °C temperatūrai.