Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1259/2004

ze dne 8. července 2004

o trvalém povolení některých doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech

(Text s významem pro EHP)

(Úř. věst. L 239, 9.7.2004, s. 8)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 403/2013 ze dne 2. května 2013	L 121	26	3.5.2013
►M2	Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 290/2014 ze dne 21. března 2014	L 87	84	22.3.2014
►M3	Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1053 ze dne 1. července 2015	L 171	8	2.7.2015

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1259/2004

ze dne 8. července 2004

o trvalém povolení některých doplňkových látek, které jsou již povoleny v krmivech

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech ([1]), naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 1756/2002 ([2]), a zejména na článek 3 a čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že žádná doplňková látka nesmí být uvedena do oběhu, aniž by na ni bylo vydáno povolení Společenství.

(2) V případě doplňkových látek uvedených v části II přílohy C směrnice 70/524/EHS, která zahrnuje mikroorganismy a enzymy, může být vydáno časově neomezené povolení doplňkové látky, která je již povolena, jsou-li splněny podmínky podle čl. 3 písm. a).

(3) Použití přípravku z mikroorganismu *Enterococcus faecium* (DSM 10663/NCIMB 10415) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1636/1999 ([3]).

(4) Žádost o časově neomezené povolení tohoto mikroorganismu byla podpořena novými údaji.

(5) Hodnocení žádosti o povolení, která byla s ohledem na tento mikroorganismus předložena, dokazuje, že byly splněny podmínky pro časově neomezené povolení stanovené směrnicí 70/524/EHS.

(6) Použití tohoto mikroorganismu pro výkrm kuřat upřesněné v příloze I by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(7) Použití přípravku z enzymů endo-1,4-beta-glukanáza, endo-1,3(4)-beta-glukanáza a endo-1,4-beta-xylanáza produkovaných *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat v kapalné formě nařízením Komise (ES) č. 1436/1998 ([4]) a v granulované formě nařízením Komise (ES) č. 937/2001 ([5]).

([1]) Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
([3]) Úř. věst. L 194, 27.7.1999, s. 17.
([4]) Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.
([5]) Úř. věst. L 130, 12.5.2001, s. 25.

▼B

(8) Použití přípravku z enzymu endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaného *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 654/2000 ([1]).

(9) Použití přípravku z enzymu endo-1,3(4)-beta-glukanáza produkovaného *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 866/1999 ([2]).

(10) Použití přípravku z enzymu endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného *Aspergillus niger* (CBS 520.94) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat nařízením Komise (ES) č. 1436/1998 ([3]).

(11) Použití přípravku z enzymu endo-1,4-beta-xylanáza produkovaného *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) bylo dočasně povoleno, poprvé pro výkrm kuřat v pevné formě nařízením Komise (ES) č. 1353/2000 ([4]) a v kapalné formě nařízením Komise (ES) č. 2188/2002 ([5]).

(12) Žádosti o časově neomezené povolení těchto přípravků z enzymů byly podpořeny novými údaji.

(13) Hodnocení žádostí o povolení, které byly s ohledem na každý z těchto přípravků z enzymů předloženy, dokazuje, že byly splněny podmínky pro časově neomezené povolení stanovené směrnicí 70/524/EHS.

(14) Použití těchto přípravků z enzymů pro výkrm kuřat za podmínek stanovených v přílohách II, III, IV, V a VI by proto mělo být povoleno bez časového omezení.

(15) Hodnocení těchto žádostí dokazuje, že je třeba požadovat některé postupy na ochranu zaměstnanců před vystavením vlivu doplňkových látek uvedených v přílohách. Tato ochrana musí být zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci ([6]), pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 ([7]).

(16) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

([1]) Úř. věst. L 79, 30.3.2000, s. 26.
([2]) Úř. věst. L 108, 27.4.1999, s. 21.
([3]) Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 15.
([4]) Úř. věst. L 155, 28.6.2000, s. 15.
([5]) Úř. věst. L 333, 10.12.2002, s. 5.
([6]) Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
([7]) Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1.

▼B

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

▼M3

———————

▼M2

Článek 2

Přípravky náležející do skupiny „enzymů“ uvedené v přílohách III, V a VI se povolují k použití bez časového omezení jako doplňková látka ve výživě zvířat za podmínek stanovených v uvedených přílohách.

▼B

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M3

———————

▼M1

———————

▼B

PŘÍLOHA III

Č. ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Max. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Doba povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
Enzymy								
E 1603	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Přípravek endo-1,3(4)-beta-glukanázy produkované *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) s minimem aktivity pro: potahovanou formu: 50 FBG ([16])/g kapalnou formu: 120 FBG/ml	Výkrm kuřat	—	10 FBG	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 15–20 FBG. 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně beta-glukany), např. obsahujících více než 60 % rostlinných přísad (kukuřice, vlčí bob, pšenice, ječmen, sója, rýže, řepka olejka nebo hrách).	Časově neomezené

([1]) 1 FBG je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (ekvivalenty glukózy) za minutu z beta-glukanu ječmene při pH 5,0 a teplotě 30 °C.

▼M2

———————

▼B

PŘÍLOHA V

Č. ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Max. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Doba povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
Enzymy								
E 1605	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkovaný *Aspergillus niger* (CBS 520.94) s minimem aktivity pro: pevnou formu: endo-1,4-beta-xylanáza: 600 U ([1])/g kapalnou formu: endo-1,4-beta-xylanáza: 300 U/ml	Výkrm kuřat	—	300 U	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: endo-1,4-beta-xylanáza: 300–600 U 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahujících více než 50 % pšenice.	Časově neomezené

([1]) 1 U je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol xylózy z xylanu březového dřeva za minutu při pH 5,3 a teplotě 50 °C.

▼B

PŘÍLOHA VI

Č. ES	Doplňková látka	Chemický vzorec, popis	Druh nebo kategorie zvířat	Max. stáří	Min. obsah	Max. obsah	Jiná ustanovení	Doba povolení
					Jednotky aktivity na kg kompletního krmiva			
Enzymy								
E 1606	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované *Bacillus subtilis* (LMG-S 15136) s minimem aktivity pro: pevnou nebo kapalnou formu: 100 IU ([1])/g nebo ml	Výkrm kuřat	—	10 IU	—	1. V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování. 2. Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 10 IU. 3. Pro použití do krmných směsí bohatých na neškrobové polysacharidy (hlavně arabinoxylany), např. obsahujících více než 40 % pšenice.	Časově neomezené

([1]) 1 IU je množství enzymu, které uvolní 1 mikromol redukujících cukrů (měřeno v ekvivalentu xylózy) z xylanu březového dřeva za minutu při pH 4,5 a teplotě 30 °C.