ΟΔΗΓΙΑ 94/39/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 25ης Ιουλίου 1994

για την κατάρτιση καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

την οδηγία 93/74/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για τις ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής [1], και ιδίως το άρθρο 6 στοιχείο α),

Εκτιμώντας:

ότι στην οδηγία 93/74/ΕΟΚ προβλέπεται η κατάρτιση ενός θετικού καταλόγου των χρήσεων για τις οποίες προορίζονται οι ζωοτροφές με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής· ότι στον εν λόγω κατάλογο πρέπει να περιλαμβάνονται επακριβείς ενδείξεις όσον αφορά τη χρήση αυτών των ζωοτροφών, δηλαδή ο επιδιωκόμενος στόχος ιδιαίτερης διατροφής, τα ουσιώδη θρεπτικά χαρακτηριστικά τους, οι δηλώσεις σήμανσης και, κατά περίπτωση, οι ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη σήμανση·

ότι ορισμένοι επιδιωκόμενοι στόχοι ιδιαίτερης διατροφής δεν μπορεί να περιληφθούν προς το παρόν στον κατάλογο των χρήσεων λόγω της απουσίας κοινοτικών μεθόδων ελέγχου για την ενεργειακή αξία τροφών για ζώα συντροφιάς, και για τις διαιτητικές ινώδεις ουσίες των ζωοτροφών· ότι ο κατάλογος αυτός πρέπει να συμπληρωθεί ευθύς ως αποφασιστούν οι μέθοδοι αυτοί·

ότι ο κατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί, κατά περίπτωση, ανάλογα με την εξέλιξη των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων·

ότι τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Μόνιμης Επιτροπής Ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1

Τα κράτη μέλη επιτρέπουν την εμπορία των ζωοτροφών με τις οποίες επιδιώκονται στόχοι ιδιαίτερης διατροφής κατά την έννοια της οδηγίας 93/74/ΕΟΚ εφόσον οι χρήσεις για τις οποίες προορίζονται περιλαμβάνονται στο μέρος Β του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας και εφόσον πληρούν τους λοιπούς όρους που θεσπίζονται στο εν λόγω μέρος του παραρτήματος.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τήρηση των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο μέρος Α του παραρτήματος υπό τον τίτλο «Γενικές διατάξεις».

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 1995. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, οι τελευταίες αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.*

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 1994.

Για την Επιτροπή

René STEICHEN

Μέλος της Επιτροπής

[1] ΕΕ αριθ. L 237 της 22. 9. 1993, σ. 23.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α

Γενικές διατάξεις

1. Όταν, για ορισμένους από τους ειδικούς σκοπούς, στη στήλη 2 του μέρους Β παρατίθενται ομάδες θρεπτικών χαρακτηριστικών περισσότερες από μία, που εμφαίνονται με «ή/και» και αφορούν τον ίδιο στόχο, ο παρασκευαστής έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση εκατέρας ή και αμφοτέρων των ομάδων χαρακτηριστικών, ώστε να επιτευχθεί ο θρεπτικός σκοπός που ορίζεται στη στήλη 1. Για κάθε επιλεγόμενη δυνατότητα, δίδονται στη στήλη 4 οι αντίστοιχες αναγραφόμενες στην ετικέτα δηλώσεις.

2. Όταν στη στήλη 2 ή στη στήλη 4 του μέρους Β αναφέρεται μια ομάδα προσθέτων, τα χρησιμοποιούμενα πρόσθετα(-ο) πρέπει να έχουν εγκριθεί στην οδηγία 70/524/ΕΟΚ του Συμβουλίου [1] ως ανταποκρινόμενα στα καθορισμένα βασικά χαρακτηριστικά.

3. Όταν στη στήλη 4 του μέρους Β απαιτείται η αναγραφή της(των) πηγής(-ών) των συστατικών ή των αναλυτικών συστατικών, ο παρασκευαστής πρέπει να παρέχει ακριβείς πληροφορίες [π.χ. ειδική ονομασία του(των) συστατικού(-ών), το είδος του ζώου ή το μέρος αυτού] διά των οποίων είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η συμμόρφωση της ζωοτροφής προς τα αντίστοιχα απαραίτητα θρεπτικά χαρακτηριστικά.

4. Όταν στη στήλη 4 του μέρους Β απαιτείται η δήλωση κάποιας ουσίας η οποία έχει εγκριθεί και ως πρόσθετο και συνοδεύεται από την έκφραση «ολική», η δηλούμενη περιεκτικότητα πρέπει να αναφέρεται στην ποσότητα της ουσίας που περιέχει εκ φύσεως η συγκεκριμένη ζωοτροφή χωρίς να έχει προστεθεί τίποτα, ή, κατά παρέκκλιση της οδηγίας 70/524/ΕΟΚ, στη συνολική ποσότητα της ουσίας που περιέχει εκ φύσεως και στην ποσότητα της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε ως πρόσθετο.

5. Οι δηλώσεις «εφόσον έχει προστεθεί», στις απαιτήσεις της στήλης 4, είναι υποχρεωτικές όταν η ενσωμάτωση ή η περαιτέρω προσθήκη του συστατικού ή του πρόσθετου αποσκοπεί στο να καταστήσει δυνατή την επίτευξη του ειδικού σκοπού.

6. Οι δηλώσεις που πρέπει να παρέχονται σύμφωνα με τη στήλη 4 του μέρους Β και αφορούν αναλυτικά συστατικά και πρόσθετα πρέπει να είναι ποσοτικές.

7. Η συνιστώμενη διάρκεια χρήσεως στη στήλη 5 δείχνει ένα εύρος χρόνου εντός του οποίου πρέπει κανονικά να επιτευχθεί ο ειδικός σκοπός. Οι παρασκευαστές μπορούν να συνιστούν διάρκεια χρήσεως με μεγαλύτερη ακρίβεια, εντός των καθορισμένων ορίων.

8. Όταν με μια ζωοτροφή επιδιώκονται περισσότεροι του ενός στόχοι ιδιαίτερης διατροφής, η συγκεκριμένη ζωοτροφή πρέπει να ανταποκρίνεται στις αντίστοιχες καταχωρίσεις του μέρους Β.

9. Σε περιπτώσεις συμπληρωματικών ζωοτροφών που προορίζονται για ειδικούς θρεπτικούς σκοπούς, στις οδηγίες χρήσεως που αναγράφονται στην ετικέτα πρέπει να δίδονται κατευθύνσεις σχετικά με το ισόρροπο του ημερήσιου σιτηρεσίου.

[1] ΕΕ αριθ. L 270 της 14. 12. 1970, σ. 1.

ΜΕΡΟΣ Β

Κατάλογος προβλεπόμενων χρήσεων

Στόχος ιδιαίτερης διατροφής	Ουσιώδη θρεπτικά χαρακτηριστικά	Είδος ή κατηγορία ζώων	Δηλώσεις επισήμανσης	Συνιστώμενη διάρκεια χρήσεως	Άλλες διατάξεις
1	2	3	4	5	6
Υποστήριξη νεφρικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας (1)	Χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο και περιορισμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υψηλής όμως ποιότητας	Σκύλοι και γάτες	— Πηγή(-ές) πρωτεϊνών — Ασβέστιο — Φωσφόρος — Κάλιο — Νάτριο — Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί)	Κατ' αρχήν, έως 6 μήνες (2)	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως» Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να ορίζεται: «Συνεχής παροχή νερού»
Διάλυση λίθων στρουβίτη (3)	— Ιδιότητες οξίνισης των ούρων χαμηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο και περιορισμένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υψηλής όμως ποιότητας	Σκύλοι	— Πηγή(-ές) πρωτεϊνών — Ασβέστιο — Φωσφόρος — Νάτριο — Μαγνήσιο — Κάλιο — Χλωριούχα άλατα — Θείο — Πρόσθετα οξίνισης των ούρων	5 έως 12 εβδομάδες	Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να αναγράφεται: «Συνεχής παροχή νερού» Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»
	— Ιδιότητες οξίνισης των ούρων και χαμηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο	Γάτες	— Ασβέστιο — Φωσφόρος — Νάτριο — Μαγνήσιο — Κάλιο — Χλωριούχα άλατα — Θείο — Ολική ταυρίνη — Πρόσθετα οξίνισης των ούρων		

1	2	3	4	5	6
Περιορισμός της επανεμφάνισης λίθων στρουβίτη (3)	Ιδιότητες οξίνισης των ούρων και μέτρια περιεκτικότητα σε μαγνήσιο	Σκύλοι και γάτες	— Ασβέστιο — Φωσφόρος — Νάτριο — Μαγνήσιο — Χλωριούχα άλατα — Θείο — Κάλιο — Πρόσθετα οξίνισης των ούρων	Έως 6 εβδομάδες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»
Περιορισμός του σχηματισμού λίθων από άλατα του ουρικού οξέος	Χαμηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες υψηλής όμως ποιότητας	Σκύλοι και γάτες	Πηγή(-ές) πρωτεϊνών	Έως 6 μήνες, αλλά ισοβίως σε περιπτώσεις μη αναστρέψιμης διαταραχής του μεταβολισμού του ουρικού οξέος	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»
Περιορισμός του σχηματισμού λίθων από άλατα του οξαλικού οξέος	— Χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη D και ιδιότητες αλκάλωσης των ούρων	Σκύλοι και γάτες	— Φωσφόρος — Ασβέστιο — Νάτριο — Μαγνήσιο — Κάλιο — Χλωριούχα άλατα — Θείο — Ολική βιταμίνη D — Υδροξυπρολίνη — Πρόσθετα αλκάλωσης των ούρων	Έως 6 μήνες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»
Περιορισμός του σχηματισμού λίθων κυστίνης	— Χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, μέτρια περιεκτικότητα σε θειούχα αμινοξέα και ιδιότητες αλκάλωσης των ούρων	Σκύλοι και γάτες	— Σύνολο θειούχων αμινοξέων — Νάτριο — Κάλιο — Χλωριούχα άλατα — Θείο — Πρόθετα αλκάλωσης των ούρων	Κατ' αρχήν, έως ένα έτος	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως»
Περιορισμός της δυσανεξίας σε διάφορα συστατικά και θρεπτικά συστατικά (4)	— Επιλεγμένη(-ες) πηγή(-ές) πρωτεϊνών	Σκύλοι και γάτες	— Πηγή(-ές) πρωτεϊνών — Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί)	3 έως 8 εβδομάδες· εάν εξαφανιστούν τα συμπτώματα δυσανεξίας, η ζωοτροφή μπορεί να χρησιμοποιείται επ' αόριστον	—

1	2	3	4	5	6
	ή/και — Επιλεγμένη(-ες) πηγή(-ές) υδατανθράκων		— Πηγή(-ές) υδατανθράκων — Περιεκτικότητα σε βασικά λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί)		
Μείωση οξειών διαταραχών της απορροφητικής λειτουργίας του εντέρου	— Αυξημένη περιεκτικότητα σε ηλεκτρολύτες και υψηλής πεπτικότητας συστατικά	Σκύλοι και γάτες	— Πολύ εύπεπτα συστατικά της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση — Νάτριο — Κάλιο — Πηγή(-ές) κολλωδών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί)	1 έως 2 εβδομάδες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: — «Κατά τη διάρκεια των περιόδων οξείας διάρροιας και ανάρρωσης από οξεία διάρροια» — «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»
Αντιστάθμιση της δυσπεψίας [5]	Πολύ εύπεπτα συσταστικά και χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος	Σκύλοι και γάτες	Συστατικά υψηλής πεπτικότητας της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση	3 έως 12 εβδομάδες, αλλά ισοβίως σε περίπτωση χρόνιας παγκρεατικής ανεπάρκειας	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»
Υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας	Χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και αυξημένη αναλογία K/Na	Σκύλοι και γάτες	— Νάτριο — Κάλιο — Μαγνήσιο	Κατ' αρχήν έως 6 μήνες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως»
Ρύθμιση της παροχής γλυκόζης (σακχαρώδης διαβήτης)	Χαμηλή περιεκτικότητα σε ταχέως διασπώμενους προς γλυκόζη υδατάνθρακες	Σκύλοι και γάτες	— Πηγή(-ές) υδατανθράκων — Επεξεργασία υδατανθράκων κατά περίπτωση — Άμυλο — Συνολικό σάκχαρο — Φρουκτόζη (εφόσον έχει προστεθεί) — Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί) — Πηγή(-ές) λιπαρών οξέων με αλυσίδες βραχέος και μέσου μήκους (εφόσον έχουν προστεθεί)	Κατ' αρχήν έως 6 μήνες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για την παράταση της διάρκειας χρήσεως»

1	2	3	4	5	6
Υποστήριξη της ηπατικής λειτουργίας σε περίπτωση χρόνιας ηπατικής ανεπάρκειας	— Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, μέτρια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος, υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα και υψηλή περιεκτικότητα σε υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες	Σκύλοι	— Πηγή(-ές) πρωτεϊνών — Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα — Υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση — Νάτριο — Ολικός χαλκός	Κατ' αρχήν έως 6 μήνες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για παράταση της διάρκειας χρήσεως»
	— Υψηλής ποιότητας πρωτεΐνες, μέτρια περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, μέτρια περιεκτικότητα σε λίπος και υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα	Γάτες	— Πηγή(-ές) πρωτεϊνών — Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα — Νάτριο — Ολικός χαλκός		
Ρύθμιση του μεταβολισμού των λιπιδίων σε περίπτωση υπερλιπιδαιμίας	Χαμηλή περιεκτικότητα σε λίπος και υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα	Σκύλοι και γάτες	— Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα — Περιεκτικότητα σε n-3 λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί)	Κατ' αρχήν έως 2 μήνες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για παράταση της διάρκειας χρήσεως»
Μείωση της παρουσίας χαλκού στο ήπαρ	Χαμηλή περιεκτικότητα σε χαλκό	Σκύλοι	Ολικός χαλκός	Κατ' αρχήν έως 6 μήνες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου όπως και για παράταση της διάρκειας χρήσεως»
Υποστήριξη της δερματικής λειτουργίας σε περίπτωση δερματώσεως και υπερβολικής τριχοπτώσεως	Υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα	Σκύλοι και γάτες	Περιεκτικότητα σε απαραίτητα λιπαρά οξέα	Έως 2 μήνες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»
Μείωση του κινδύνου για επιλόχειο πάρεση	— Χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο	Γαλακτοπαραγωγοί αγελάδες	— Ασβέστιο — Φωσφόρος — Μαγνήσιο	1 έως 4 εβδομάδες προ του τοκετού	Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να αναγράφεται «Η παροχή της ζωοτροφής να διακόπτεται μετά τον τοκετό»

1	2	3	4	5	6
	ή/και — Χαμηλή αναλογία κατιόντων/ανιόντων		— Ασβέστιο — Φωσφόρος — Νάτριο — Κάλιο — Χλωριούχα άλατα — Θείο		
Μείωση του κινδύνου κετώσεως (6) (7)	Συστατικά που παρέχουν προδρόμους γλυκόζης σαν πηγές ενέργειας	Γαλακτοπαραγωγοί αγελάδες και προβατίνες	— Συστατικά που παρέχουν προδρόμους γλυκόζης σαν πηγές ενέργειας — Προπανοδιόλη 1,2 (εφόσον έχει προστεθεί σαν πρόδρομος γλυκόζης) — Γλυκερίνη (εφόσον έχει προστεθεί σαν πρόδρομος γλυκόζης)	3 έως 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό (8) τις τελευταίες 6 εβδομάδες πριν τον τοκετό και τις πρώτες 3 εβδομάδες μετά τον τοκετό (9)	
Μείωση του κινδύνου τετανίας (υπομαγνησιαιμία)	Υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο, ευκόλως προσλαμβανόμενοι υδατάνθρακες, χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και χαμηλή περιεκτικότητα σε κάλιο	Μηρυκαστικά	— Άμυλο — Ολικό σάκχαρο — Μαγνήσιο — Νάτριο — Κάλιο	3 έως 10 εβδομάδες σε περιόδους ταχείας αναπτύξεως της χλόης	Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να δίνονται κατευθύνσεις για το ισόρροπο του σιτηρεσίου ως προς τις ινώδεις ουσίες που θα πρέπει να περιέχει και τις ευκόλως διαθέσιμες ενεργειακές πηγές Στις ζωοτροφές για πρόβατα, στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Ειδικώς για γαλακτοπαραγωγές προβατίνες»
Μείωση του κινδύνου οξέωσης	Χαμηλή περιεκτικότητα σε ευκόλως ζυμώσιμους υδατάνθρακες και υψηλή ρυθμιστική ικανότητα	Μηρυκαστικά	— Άμυλο — Ολικό σάκχαρο	2 μήνες το πολύ (10)	Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να δίνονται κατευθύνσεις για το ισόρροπο του σιτηρεσίου ως προς τις ινώδεις ουσίες που θα πρέπει να περιέχει και τις πηγές ευκόλως ζυμώσιμων υδατανθράκων Σε περίπτωση ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Ειδικώς για αγελάδες υψηλής απόδοσης»

1	2	3	4	5	6
					Σε περίπτωση ζωοτροφών για μηρυκαστικά πάχυνσης, στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα θα πρέπει να αναγράφεται: «Ειδικώς για ... (11) εντατικής πάχυνσης»
Σταθεροποίηση του ισοζυγίου ύδατος και ηλεκτρολυτών	Κυρίως ηλεκτρολύτες και ευκόλως απορροφούμενοι υδατάνθρακες	Μόσχοι Χοιρίδια Αμνοί Ερίφια Πώλοι	— Πηγή(ές) υδατανθράκων — Νάτριο — Κάλιο — Χλωριούχα άλατα	1 έως 7 ημέρες (1 έως 3 ημέρες εάν τρέφονται αποκλειστικά)	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: — «Σε περίπτωση κινδύνου πεπτικών διαταραχών και κατά τη διάρκεια πεπτικών διαταραχών (διάρροια)» — «Πριν από τη χρησιμοποίηση, συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»
Μείωση του κινδύνου σχηματισμού ουρολίθων	Χαμηλή περιεκτικότητα σε φωσφόρο και μαγνήσιο, και ιδιότητες οξίνισης των ούρων	Μηρυκαστικά	— Ασβέστιο — Φωσφόρος — Νάτριο — Μαγνήσιο — Κάλιο — Χλωριούχα άλατα — Θείο — Πρόσθετα οξίνισης των ούρων	Έως 6 εβδομάδες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Ειδικώς για νεαρά ζώα εντατικής πάχυνσης» Στις οδηγίες χρήσεως πρέπει να αναγράφεται: «Συνεχής παροχή νερού»
Μείωση της αντίδρασης των ζώων στο στρές	— Υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο ή/και — Συστατικά υψηλής πεπτικότητας	Χοίροι	Μαγνήσιο — Συστατικά υψηλής πεπτικότητας της επεξεργασίας — Περιεκτικότητα σε n-3 λιπαρά οξέα (εφόσον έχουν προστεθεί)	1 έως 7 ημέρες	Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες η χρήση της εν λόγω ζωοτροφής θα ήταν κατάλληλη
Σταθεροποίηση της φυσιολογικής πέψεως	— Χαμηλή ρυθμιστική ικανότητα, και συστατικά υψηλής πεπτικότητας	Χοιρίδια	— Συστατικά υψηλής πεπτικότητας της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση — Ρυθμιστική ικανότητα — Πηγή(ές) στυπτικών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί) — Πηγή(ές) κολλωδών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί)	2 έως 4 εβδομάδες	Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Σε περίπτωση κινδύνου πεπτικών διαταραχών, ή κατά τη διάρκεια πεπτικών διαταραχών ή κατά την ανάρρωση από πεπτικές διαταραχές»

1	2	3	4	5	6
	— Συστατικά υψηλής πεπτικότητας	Χοίροι	— Συστατικά υψηλής πεπτικότητας της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση — Πηγή(ές) στυπτικών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί) — Πηγή(ές) κολλωδών ουσιών (εφόσον έχουν προστεθεί)		
Μείωση του κινδύνου δυσκοιλιότητας	Συστατικά που διεγείρουν την αφόδευση	Χοιρομητέρες	Συστατικά που διεγείρουν την αφόδευση	10 έως 14 ημέρες προ του τοκετού και 10 έως 14 ημέρες μετά τον τοκετό	—
Μείωση του κινδύνου για σύνδρομο του λιπώδους ήπατος	Χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο και υψηλό ποσοστό μεταβολιστέας ενέργειας από λιπίδια με υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	Ωοτόκοι όρνιθες	— Ενεργειακή αξία (δήλωση σύμφωνα με τη μέθοδο ΕΟΚ) — Ποσοστό μεταβολιστέας ενέργειας από λιπίδια — Περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα	Έως 12 εβδομάδες	—
Αντιστάθμιση της δυσαπορρόφησης	Χαμηλό ποσοστό κεκορεσμένων λιπαρών οξέων και υψηλό ποσοστό λιποδιαλυτών βιταμινών	Πουλερικά (εξαιρούνται χήνες και περιστέρια)	— Ποσοστό κεκορεσμένων λιπαρών οξέων ως προς τα ολικά λιπαρά οξέα — Ολική βιταμίνη Α — Ολική βιταμίνη Δ — Ολική βιταμίνη Ε — Ολική βιταμίνη Κ	Κατά τις 2 πρώτες εβδομάδες μετά την εκκόλαψη	—
Αντιστάθμιση του κινδύνου χρόνιων πεπτικών διαταραχών του λεπτού εντέρου	Υψηλής πεπτικότητας υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη	Ιπποειδή	Συστατικά υψηλής πεπτικότητας πηγή υδατανθράκων, πρωτεϊνών και λιπών, της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση	Έως 3 μήνες	Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες θα ήταν κατάλληλη η χρήση της εν λόγω ζωοτροφής Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»
Μείωση του κινδύνου πεπτικών διαταραχών του παχέος εντέρου	Υψηλή περιεκτικότητα σε ινώδεις ουσίες αλλά και συστατικά υψηλής πεπτικότητας	Ιπποειδή	Συστατικά υψηλής πεπτικότητας της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση	1 έως 2 εβδομάδες	Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες θα ήταν κατάλληλη η χρήση της εν λόγω ζωοτροφής Στη συσκευασία, το δοχείο ή την ετικέτα πρέπει να αναγράφεται: «Πριν από τη χρησιμοποίηση συνιστάται να ληφθεί η γνώμη ενός κτηνιάτρου»

1	2	3	4	5	6
Μείωση της αντίδρασης στο στρες	Πολύ εύπεπτα συστατικά και υψηλή περιεκτικότητα σε μαγνήσιο	Ιπποειδή	— Μαγνήσιο — Συστατικά υψηλής πεπτικότητας, της επεξεργασίας συμπεριλαμβανομένης κατά περίπτωση	2 έως 4 εβδομάδες	Πρέπει να δίδονται οδηγίες σχετικά με τις καταστάσεις κατά τις οποίες θα ήταν κατάλληλη η χρήση της εν λόγω ζωοτροφής
Αναπλήρωση των απωλειών ηλεκτρολυτών σε περιπτώσεις υπερβολικής εφίδρωσης	Κυρίως ηλεκτρολύτες και ευκόλως απορροφούμενοι υδατάνθρακες	Ιπποειδή	— Νάτριο — Κάλιο — Χλωριούχα άλατα — Γλυκόζη	1 έως 2 ημέρες	Στις οδηγίες χρήσεως θα πρέπει να αναγράφεται: «Συνεχής παροχή νερού»

(1) Κατά περίπτωση, ο παρασκευαστής μπορεί να συνιστά τη χρήση τους σε περιπτώσεις πρόσκαιρης νεφρικής ανεπάρκειας.

(2) Εάν η ζωοτροφή συνιστάται για προσωρινή νεφρική ανεπάρκεια η συνιστώμενη περίοδος χρήσης πρέπει να είναι 2 έως 4 εβδομάδες.

(3) Σε περίπτωση ζωοτροφών για γάτες, ο ιδιαίτερος θρεπτικός σκοπός μπορεί να συμπληρωθεί με τους ακόλουθους όρους: «νόσος της κατωτέρας ουροφόρου οδού των αιλουροειδών» ή «ουρολογικό σύνδρομο των αιλουροειδών — (FUS)».

(4) Σε περίπτωση ζωοτροφών για μια ιδιαίτερη δυσανεξία, η διατύπωση «συστατικά και θρεπτικά συστατικά» μπορεί να αντικαθίστανται από ειδική αναφορά στη συγκεκριμένη δυσανεξία.

(5) Ο παρασκευαστής μπορεί να συμπληρώνει το ιδιαίτερο θρεπτικό αναφέροντας και την «εξωκρινή παγκρεατική ανεπάρκεια».

(6) Ο όρος «κέτωσις» μπορεί να αντικατασταθεί από τους όρους: «υπερκετοναιμία» και «οξοναιμία».

(7) Οι παρασκευαστές δύνανται να συνιστούν τη χρήση τους κατά την ανάρρωση από κέτωση.

(8) Αφορά τις γαλακτοπαραγωγούς αγελάδες.

(9) Αφορά τις προβατίνες.

(10) Σε περίπτωση ζωοτροφών για γαλακτοπαραγωγές αγελάδες: «το πολύ 2 μήνες από την έναρξη γαλακτοπαραγωγής».

(11) Να αναγραφεί η αντίστοιχη κατηγορία των μηρυκαστικών.