32000R2437

L 280/28 *EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS* 2000 11 4

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2437/2000

2000 m. lapkričio 3 d.

dėl nuolatinio leidimo naudoti pašarų priedą ir laikino leidimo naudoti naują pašarų priedą

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1887/2000 ([2]), ypač į jos 3 straipsnį,

kadangi:

(1) Direktyvoje 70/524/EEB yra numatyta, kad, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, gali būti leidžiama naudoti naujus priedus.

(2) Minėtos direktyvos 9d straipsnyje yra numatyta, kad jos C priedo II dalyje nurodyto tipo priedą leidžiama naudoti tada, kai, įvertinus dokumentus, įsitikinama, kad laikomasi minimos direktyvos 3a straipsnio reikalavimų.

(3) Minėtos direktyvos 9e straipsnyje yra numatyta, kad, įvertinus anksčiau minėtus dokumentus, to paties tipo priedą galima leisti naudoti laikinai, t. y. ne ilgiau kaip keturis metus, jei laikomasi tos direktyvos 3a straipsnio b–e punktų reikalavimų ir jei pagal turimus rezultatus galima daryti išvadą, kad laikomasi ir 3a straipsnio a punkto reikalavimų.

(4) Įvertinus pateiktus dokumentus, paaiškėjo, kad šio reglamento I ir II prieduose aprašyti mikroorganizmų preparatai atitinka anksčiau minėtos direktyvos 3a straipsnio b–e punktų reikalavimus. Be to, jei šis preparatas yra skirtas paršeliams, jis atitinka 3a straipsnio a punkto reikalavimus.

(5) Atsižvelgiant į turimus rezultatus, galima daryti prielaidą, kad 3a straipsnio a punkto reikalavimo yra laikomasi, kai tas pats mikroorganizmų preparatas yra naudojamas šio reglamento II priede išvardytų rūšių gyvūnams.

(6) Įvertinus pateiktus dokumentus, paaiškėjo, kad šio reglamento III priede aprašyti fermentų preparatai atitinka anksčiau minėtos direktyvos 9e straipsnyje nurodytus pirminio patvirtinimo (leidimo naudoti) reikalavimus, kai naudojami šio reglamento III priede nurodytų rūšių gyvūnams remiantis ten pat pateiktomis kitomis nuostatomis.

(7) 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo ([3]) ir su ja susijusios atskiros direktyvos, pirmiausia Tarybos direktyva 90/679/EEB ([4]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 97/65/EB ([5]), dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe, yra visos taikytinos priedus pašaruose naudojantiems ir juos keičiantiems darbuotojams.

(8) Gyvūnų mitybos mokslinis komitetas pateikė palankią nuomonę apie fermentų bei mikroorganizmų preparatų nekenksmingumą ir mikroorganizmų preparato veiksmingumą paršeliams.

(9) Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Direktyva 70/524/EEB, šio reglamento I ir II prieduose išvardytus „mikroorganizmų“ grupei priskiriamus preparatus leidžiama naudoti kaip pašarų priedus laikantis minimuose prieduose nustatytų reikalavimų.

2 straipsnis

Remiantis Direktyva 70/524/EEB, šio reglamento III priede išvardytus „fermentų“ grupei priskiriamus preparatus leidžiama naudoti kaip pašarų priedus laikantis tame priede nustatytų reikalavimų.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

([1]) OL L 270, 1970 12 14, p. 1.
([2]) OL L 227, 2000 9 7, p. 13.
([3]) OL L 183, 1989 6 29, p. 1.
([4]) OL L 374, 1990 12 31, p. 1.
([5]) OL L 335, 1997 12 6, p. 17.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2000 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu
David BYRNE
Komisijos narys

I PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					KSV/kg visaverčių kombinuotųjų pašarų			
E 1700	*Bacillus licheniformis* (DSM 5749) *Bacillus subtilis* (DSM 5750) (Santykiu 1/1)	*Bacillus licheniformis* ir *Bacillus subtilis* mišinys, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip $3,2 \times 10^9$ KSV/g priedo ($1,6 \times 10^9$ KSV/g kiekvienos bakterijos)	Paršeliai	2 mėn.	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	Neribotas

II PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					KSV/kg visaverčių kombinuotųjų pašarų			
20	*Bacillus licheniformis* (DSM 5749) *Bacillus subtilis* (DSM 5750) (Santykiu 1/1)	*Bacillus licheniformis* ir *Bacillus subtilis* mišinys, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip $3,2 \times 10^9$ KSV/g priedo ($1,6 \times 10^9$ KSV/g kiekvienos bakterijos)	Paršavedės	15 dienų iki paršiavimosi laktacijos metu	$0,96 \times 10^9$	$1,92 \times 10^9$	Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	2001 9 30
			Mėsinės kiaulės	–	$0,48 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant	2001 9 30
			Mėsiniai viščiukai	–	$3,2 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant Gali būti naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, į kurių sudėtį įeina leidžiami kokcidiostatikai: amproliumetopabatas, diklazurilas, halofuginonas, metilbenzokvatas/metilchlorpindolas, natrio monenzinas, nifurzolis ir robenidinas.	2001 9 30
			Mėsiniai kalakutai	–	$1,28 \times 10^9$	$3,2 \times 10^9$	Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant Gali būti naudojama kombinuotuosiuose pašaruose, į kurių sudėtį įeina leidžiami kokcidiostatikai: amproliumetopabatas, diklazurilas, halofuginonas, metilbenzokvatas/metilchlorpindolas, natrio monenzinas, nifurzolis ir robenidinas	2001 9 30

III PRIEDAS

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai kg visaverčių kombinuotųjų pašarų			
53	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 Alfa-amilazė EB 3.2.1.1 Bacilolizinas EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-ksilanazė: EC 3.2.1.8	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizino, gauto iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 2 350 U/g [1] Endo-1,4-beta-gliukanazės: 4 000 U/g [2] Alfa-amilazės: 400 U/g [3] Bacilolizino: 450 U/g [4] Endo-1,4-beta-ksilanazės: 20 000 U/g [5]	Paršeliai	2 mėn.	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 2 350 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 4 000 U Alfa-amilazė: 400 U Bacilolizinas: 450 U Endo-1,4-beta-ksilanazė: 20 000 U	– – – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 2 350 U endo-1,4-beta-gliukanazės: 4 000 U alfa-amilazės: 400 U bacilolizino: 450 U endo-1,4-beta-ksilanazės: 20 000 U 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia betagliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 25 % miežių ir 20 % kukurūzų	2001 9 30
			Mėsiniai viščiukai	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 175 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 2 000 U Alfa-amilazė: 200 U Bacilolizinas: 225 U Endo-1,4-beta-ksilanazė: 10 000 U	– – – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-gliukanazės: 2 000– 4 000 U alfa-amilazės: 200– 400 U bacilolizino: 225–450 U endo-1,4-beta-ksilanazės: 10 000– 20 000 U 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia betagliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % kviečių	2001 9 30

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai kg visaverčių kombinuotųjų pašarų			
54	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 Alfa-amilazė EB 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-ksilanazė: EC 3.2.1.8	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), ir endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 10 000 U/g [1] Endo-1,4-beta-gliukanazės: 120 000 U/g [2] Alfa-amilazės: 400 U/g [3] Endo-1,4-beta-ksilanazės: 210 000 U/g [5]	Mėsiniai viščiukai	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 000 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 12 000 U Alfa-amilazė: 40 U Endo-1,4-beta-ksilanazė: 21 000 U	– – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 1 000–2 000 U endo-1,4-beta-gliukanazės: 12 000– 24 000 U alfa-amilazės: 40– 80 U endo-1,4-beta-ksilanazės: 21 000– 42 000 U 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia betagliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 45 % kviečių	2001 9 30
55	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 Alfa-amilazė EB 3.2.1.1 Bacilolizinas EC 3.4.24.28	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), ir bacilolizino, gauto iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 3 000 U/g [1] Endo-1,4-beta-gliukanazės: 5 000 U/g [2] Alfa-amilazės: 540 U/g [3] Bacilolizino: 450 U/g [4]	Paršeliai	2 mėn.	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 500 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 2 500 U Alfa-amilazė: 270 U Bacilolizinas: 225 U	– – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 1 500–3 000 U endo-1,4-beta-gliukanazės: 2 500–5 000 U alfa-amilazės: 270–540 U bacilolizino: 225–450 U kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų, pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 35 % kviečių ir 15 % miežių	2001 9 30

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai kg visaverčių kombinuotųjų pašarų			
			Mėsinės kiaulės	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 500 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 2 500 U Alfa-amilazė: 270 U Bacilolizinas: 225 U	– – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 1 500–3 000 U endo-1,4-beta-gliukanazės: 2 500–5 000 U alfa-amilazės: 270–540 U bacilolizino: 225–450 U 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų, pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % miežių	2001 9 30
			Mėsiniai viščiukai	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 500 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 2 500 U Alfa-amilazė: 270 U Bacilolizinas: 225 U	– – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 1 500–3 000 U endo-1,4-beta-gliukanazės: 2 500– 5 000 U alfa-amilazės: 270– 540 U bacilolizino: 225–450 U 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų, pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 50 % kukurūzų ir 50 % kviečių	2001 9 30

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai kg visaverčių kombinuotųjų pašarų			
			Dedeklės vištos	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 1 500 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 2 500 U Alfa-amilazė: 270 U Bacilolizinas: 225 U	– – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 1 500–3 000 U endo-1,4-beta-gliukanazės: 2 500– 5 000 U alfa-amilazės: 270– 540 U bacilolizino: 225–450 U 3. Skirta dėti į kombinuotuosius pašarus, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų, pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kukurūzų ir 10 % rugių	2001 9 30
56	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 Alfa-amilazė EB 3.2.1.1 Bacilolizinas EC 3.4.24.28	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), ir bacilolizino, gauto iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 6 000 U/g [1] Endo-1,4-beta-gliukanazės: 3 500 U/g [2] Alfa-amilazės: 1 400 U/g [3] Bacilolizino: 450 U/g [4]	Mėsiniai viščiukai	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 6 000 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 3 500 U Alfa-amilazė: 1 400 U Bacilolizinas: 450 U	– – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 6 000 U endo-1,4-beta-gliukanazės: 3 500 U alfa-amilazės: 1 400 U bacilolizino: 450 U 3. Skirta dėti į kombinuotuosius pašarus, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia arabinoksilanų ir beta-gliukanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % miežių	2001 9 30

Nr. (arba EB Nr.)	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis arba kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma	Didžiausia norma	Kitos nuostatos	Leidimo naudoti laikas
					Aktyvumo vienetai kg visaverčių kombinuotųjų pašarų			
57	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 Alfa-amilazė EB 3.2.1.1 Bacilolizinas EC 3.4.24.28	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), ir bacilolizino, gauto iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 3 000 U/g (1) Endo-1,4-beta-gliukanazės: 9 000 U/g (2) Alfa-amilazės: 540 U/g (3) Bacilolizino: 450 U/g (4)	Mėsiniai viščiukai	–	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 3 000 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 9 000 U Alfa-amilazė: 540 U Bacilolizinas: 450 U	– – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 3 000 U endo-1,4-beta-gliukanazės: 9 000 U alfa-amilazės: 540 U bacilolizino: 450 U 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia celiuliozės ir hemiceliuliozės), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % saulėgrąžų miltų ir 10 % sojos miltų	2001 9 30
58	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4 Alfa-amilazė EB 3.2.1.1 Bacilolizinas EC 3.4.24.28	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-gliukanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), ir bacilolizino, gauto iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,3(4)-beta-gliukanazės: 2 350 U/g (1) Endo-1,4-beta-gliukanazės: 5 000 U/g (2) Alfa-amilazės: 400 U/g (3) Bacilolizino: 5 000 U/g (4)	Paršeliai	2 mėn.	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 2 350 U Endo-1,4-beta-gliukanazė: 5 000 U Alfa-amilazė: 400 U Bacilolizinas: 5000 U	– – – –	1. Priedo ir premikso vartojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant 2. Rekomenduojama norma kilogramui visaverčių kombinuotųjų pašarų: endo-1,(3)4-beta-gliukanazės: 2 350U endo-1,4-beta-gliukanazės: 5 000 U alfa-amilazės: 400 U bacilolizino: 5 000 U 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje daug nekrakmolinių polisacharidų (daugiausia beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % miežių	2001 9 30

(1) Vienas U – fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,0056 µmol redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentų) per minutę iš miežių betagliukano, esant 7,5 pH ir 30 °C.
(2) Vienas U – fermento kiekis, atpalaiduojantis 0,0056 µmol redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentų) per minutę iš karboksimetilceliuliozės, esant 4,8 pH ir 50 °C.
(3) Vienas U – tai fermento kiekis, hidrolizuojantis per minutę iš vandenyje netirpaus krakmolo polimero vieną mikromolį gliukozidų junginių, esant 7,5 pH ir 37 °C.
(4) Vienas U – fermento kiekis, pagaminantis per minutę vieną mikrogramą trichloracetinėje rūgštyje tirpaus azo-kazeino, esant 7,5 pH ir 37 °C.
(5) Vienas U – fermento kiekis, kuris atpalaiduoja 0,0067 mikromolio redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentų) per minutę iš beržo medienos ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C.