2026/1429

22.7.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2026/1429 НА КОМИСИЯТА

от 30 юни 2026 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Lyso IPA Hand Disinfection“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 22 юни 2016 г. Schuelke & Mayr GmbH подаде заявление до Европейската агенция по химикали („Агенцията“) в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 и член 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013 на Комисията ([2]) за предоставяне на разрешение на Съюза за идентичната група биоциди — съгласно посоченото в член 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013 — с наименование „Lyso IPA Hand Disinfection“ от продуктов тип 1 съгласно описанието в приложение V към Регламент (ЕС) № 528/2012. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-VT025199-03. Заявлението се отнася до групата биоциди „desmanol pure“, разрешена с Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1905 на Комисията ([3]), с номер на разрешението EU-0033833-0000.

(2) Групата биоциди „Lyso IPA Hand Disinfection“ съдържа пропан-2-ол като активно вещество, което е включено в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества за продуктов тип 1.

(3) На 11 февруари 2025 г. Агенцията предостави на Комисията своето становище ([4]) и проекта на обобщение на характеристиките на биоцидите („SPC“) в съответствие с член 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013.

(4) В становището си Агенцията стига до заключението, че предложените различия между групата биоциди „Lyso IPA Hand Disinfection“ и свързаната референтна група биоциди „desmanol pure“ се ограничават до информация, която може да бъде счетена за административно изменение съгласно предвиденото в Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията ([5]), и че — въз основа на оценката на свързаната референтна група биоциди „desmanol pure“ и при спазване на указаното в проекта на обобщение на характеристиките на биоцидите — идентичната група биоциди „Lyso IPA Hand Disinfection“ отговаря на условията по член 19, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 414/2013 на Комисията от 6 май 2013 г. за установяване на процедурата за разрешаване на идентични биоциди в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 125, 7.5.2013 г., стр. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Регламент за изпълнение (ЕС) 2025/1905 на Комисията от 11 септември 2025 г. за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „desmanol pure“ в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L, 2025/1905, 3.10.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1905/oj).

([4]) Становище на Европейската агенция по химикали от 11 февруари 2025 г. относно предоставянето на разрешение на Съюза за идентичната група биоциди „Lyso IPA Hand Disinfection“, UBP-C-1793933-11-00/F, https://echa.europa.eu/fr/opinions-on-applications-for-union-authorisation.

([5]) Регламент за изпълнение (ЕС) № 354/2013 на Комисията от 18 април 2013 г. относно измененията на биоциди, разрешени по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 109, 19.4.2013 г., стр. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) На 13 ноември 2025 г. Агенцията предаде на Комисията преработения проект на обобщение на характеристиките на групата биоциди „Lyso IPA Hand Disinfection“ на всички официални езици на Съюза в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(6) Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за идентичната група биоциди „Lyso IPA Hand Disinfection“.

(7) Датата на изтичане на срока на валидност на разрешението следва да бъде съобразена с датата на изтичане на срока на разрешението за свързаната референтна група биоциди „desmanol pure“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На Schuelke & Mayr GmbH се предоставя разрешение на Съюза номер EU-0034272-0000 за предоставянето на пазара и употребата на идентичната група биоциди „Lyso IPA Hand Disinfection“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцидите, посочено в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 11 август 2026 г. до 30 септември 2035 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 30 юни 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБОБЩЕНИЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРОДУКТА ЗА БИОЦИДИ

Lyso IPA Hand Disinfection

Продуктов(и) тип(ове)

PT01: Човешка хигиена

Номер на разрешително: EU-0034272-0000

Номер на актив R4BP: EU-0034272-0000

ЧАСТ I.

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

Глава 1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Наименование на групата**

Име	Lyso IPA Hand Disinfection

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

1.3. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Schuelke & Mayr GmbH
	Адрес	Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt DE
Номер на разрешително	EU-0034272-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0034272-0000	
Дата на издаване на разрешението	11 август 2026 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	30 септември 2035 г.	

1.4. **Производител(и) на продукта**

Име на производителя	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH
Адрес на производителя	Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Германия
Местонахождение на производствените обекти	A.F.P. Antiseptica Forschungs- und Produktionsgesellschaft mbH site 1 Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Германия

Име на производителя	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH
Адрес на производителя	Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Германия
Местонахождение на производствените обекти	Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH site 1 Kaiser-Wilhelm-Straße 133 12247 Berlin Германия

Име на производителя	Sterisol AB
Адрес на производителя	Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Швеция
Местонахождение на производствените обекти	Sterisol AB site 1 Kronoängsgatan 3 592 23 Vadstena Швеция

Име на производителя	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz
Адрес на производителя	Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Германия
Местонахождение на производствените обекти	Rudolf Dankwardt GmbH - Jessenitz site 1 Lagerstr. 15 19249 Jessenitz - Werk / Lübtheen Германия

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Пропан-2-ол
Име на производителя	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol)
Адрес на производителя	Römerstraße 733 47443 Moers Германия
Местонахождение на производствените обекти	Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 1 Römerstraße 733 47443 Moers Германия Ineos Solvents Germany GmbH (formerly Sasol) site 2 Shamrockstr. 88 44623 Herne Германия

Активно вещество	Пропан-2-ол
Име на производителя	Shell Chemicals Europe B.V.
Адрес на производителя	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Нидерландия
Местонахождение на производствените обекти	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V. Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Нидерландия

Глава 2. СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	63,1 - 75 % (w/w)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0 - 0,5 % (w/w)

2.2. **Вид(ове) формулация**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

ЧАСТ II.

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО МЕТА SPC

Глава 1. МЕТА SPC 1 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 1 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC1

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-1

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (w/w)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 1**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #1 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #2 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали

	Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #3 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и вируси (вируцидна активност в ограничен спектър): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка

	Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте 5 ml (свити шепи) в дланта си (2-4 натискания на помпата). Разтривайте ръцете и предмишниците си поне за 45 секунди. Повторете стъпката (изсипване, втриване) още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на хирургичния биоцид за ръце трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #4 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #5 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)

Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #6 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #7 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	не е релевантно
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #7.1.: (професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост Употреба #7.2.: (професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #7.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #7.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #7.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #7.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируцидна активност в ограничен спектър): Изсипете 5 ml (свити шепи) (2-4 натискания на помпата) от продукта или напръскайте 5 ml (свити шепи) в дланта си. Разтривайте ръцете и предмишниците най-малко за 45 секунди. Повторете стъпката (изсипване, втриване) още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #8 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #8.1.: (Професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети, козметични студия, грижи за възрастни хора и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #8.2.: (Професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #8.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #8.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #8.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #8.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируцидна активност в ограничен спектър): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #9 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба – бактерии, дрожди – изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали;

	Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #10 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #10.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба # 10.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #10.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #10.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #10.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #10.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируцидна активност в ограничен спектър): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m^3 за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 1

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Schülke® 1	
Номер на разрешително	EU-0034272-0001 1-1	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 % (w/w)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,5 % (w/w)

Глава 1. META SPC 2 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 2 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC2

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-2

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА META SPC 2

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (w/w)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 2**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #11 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #12 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта (1-2 натискания на помпата) или напръскайте в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #13 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #14 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #15 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #16 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони о (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия).
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #17 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Описание на областта на употреба: #Употреба 17.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) или в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост #Употреба 17.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения и др.), лекарски или зъболекарски кабинети
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: #Употреба 17.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) #Употреба 17.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: #Употреба 17.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) #Употреба 17.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)

Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (една свита шепа) от продукта или го напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #18 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #18.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони(напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #18.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---

Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #18.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #18.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: #Употреба 18.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) #Употреба 18.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (една свита шепа) от продукта или го напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #19 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба – бактерии, дрожди – изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #20 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #20.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба #20.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #20.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #20.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #20.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #20.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.11. **Описание на употребите**

Таблица 11.

Употреба #21 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (при специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.12. **Описание на употребите**

Таблица 12.

Употреба #22 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.12.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.12.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.12.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.12.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.12.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.13. **Описание на употребите**

Таблица 13.

Употреба #23 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.13.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.13.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.13.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.13.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.13.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.14. **Описание на употребите**

Таблица 14.

Употреба #24 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.14.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.14.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.14.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.14.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.14.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 2

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Schülke® 2			
Номер на разрешително		EU-0034272-0002 1-2			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 % (w/w)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,5 % (w/w)

Глава 1. META SPC 3 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 3 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC3

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-3

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 3

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 3**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #25 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #26 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)

Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #27 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и вируси (вируцидна активност в ограничен спектър): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #28 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #29 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #30 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)

Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #31 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #31.1.: (професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост Употреба #31.2.: (професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #31.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #31.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #31.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #31.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #32 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #32.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони(напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #32.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети).
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---

Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #32.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #32.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #32.1: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #32.2: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #33 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #34 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #34.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони о (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия). Употреба #34.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети).
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #34.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #34.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо)

	Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #34.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #34.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 3

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Schülke® 3			
Номер на разрешително		EU-0034272-0003 1-3			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 % (w/w)

Глава 1. META SPC 4 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 4 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC4

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-4

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА META SPC 4

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 4**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #35 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания).
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #36 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #37 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #38 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #39 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #40 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #41 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #41.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост Употреба #41.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #41.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #41.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: #Употреба 41.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) #Употреба 41.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #42 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #42.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост Употреба #42.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---

Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #42.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #42.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #42.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #42.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #43 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #44 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #44.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба #44.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #44.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #44.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #44.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #44.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефикасност срещу бактерии, дрожди и обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.11. **Описание на употребите**

Таблица 11.

Употреба #45 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания/специален случай: конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.12. **Описание на употребите**

Таблица 12.

Употреба #46 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.12.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.12.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.12.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.12.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.12.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.13. **Описание на употребите**

Таблица 13.

Употреба #47 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание:
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.13.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.13.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.13.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.13.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.13.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.14. **Описание на употребите**

Таблица 14.

Употреба #48 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания/специален случай: конюнктивит).
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.14.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.14.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.14.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.14.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.14.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m^3 за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 4

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Schülke® 4			
Номер на разрешително		EU-0034272-0004 1-4			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 % (w/w)

Глава 1. META SPC 5 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 5 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC5

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-5

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА META SPC 5

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 5**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 5**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА META SPC 5

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #49 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #50 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вирупидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вирупидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вирупидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вирупидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вирупидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)

Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #51 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #52 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE

	Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #53 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #54 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вирусидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вирусидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE): 36 месеца

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #55 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #55.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #55.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #55.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #55.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #55.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #55.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #56 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #56.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #56.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #56.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #56.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #56.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #56.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургичен дезинфектант за ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #57 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба – бактерии, дрожди, гъбички – изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицид, дрождицид, фунгицид: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #58 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба – бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #58.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба #58.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #58.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #58.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #58.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #58.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургичен дезинфектант за ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (HDPE), контейнер (HDPE), бидон (HDPE), IBC (HDPE със стоманена рамка): 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 5

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 5

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Schülke® 5			
Номер на разрешително		EU-0034272-0005 1-5			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	63,1 % (w/w)

Глава 1. META SPC 6 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 6 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC6

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-6

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА META SPC 6

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 6**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 6**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 6

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. EUH208: Съдържа Изоевгенол. Може да причини алергична реакция.
Препоръки за безопасност	P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #59 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 125, 500 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана) Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #60 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 125, 500 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана) Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #61 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #61.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба #61.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #61.1.: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #61.2.: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #61.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #61.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 125, 500 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана) Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE

	Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургичен дезинфектант за ръце: Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #62 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 125, 500 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана) Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 6

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 6

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Manorapid® r.f.u.	
	Neoseptin r.f.u.	
	Novosept r.f.u.	
	Novoseptin r.f.u.	
	Lyorthol r.f.u.	
	Desocid r.f.u.	
	Cosmo r.f.u.	
	Fordesin r.f.u.	
	Skin-Des r.f.u.	
	Dermorapid r.f.u.	
	Dermoguard r.f.u.	
	Aldovet r.f.u.	
	Vetfarm r.f.u.	
	MDI r.f.u.	
	Antiseptica r.f.u.	
	Saltero r.f.u.	
	Prop70 r.f.u.	

		Sterisol Isoprop			
		MENNO® DERM I-PA			
		Actoderm			
Номер на разрешително		EU-0034272-0006 1-6			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	63,14 % (w/w)

Глава 1. МЕТА SPC 7 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 7 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC7

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-7

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 7

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 7**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	63,14 - 63,14 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 7**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 7

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

Препоръки за безопасност	P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #63 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 125, 500 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана) Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #64 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 125, 500 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана) Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали

	Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #65 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #65.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба #65.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #65.1.: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #65.2.: Срещу бактерии, дрожди, туберкулозни бактерии и обвити вируси: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #65.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #65.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 125, 500 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана) Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургичен дезинфектант за ръце: Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

5-30 l туба, 220 l бидон, 1 000 l контейнер: Напълнете повторно или прехвърлете в други контейнери/устройства, ако е необходимо.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

Всички материали трябва да са напълно съвместими с продукта. Дозаторът или контейнерът, който се пълни отново, трябва минимално да съдържа следната информация на етикета:

— Номер на разрешителното;

— Търговското наименование на биоцида;

— Идентичността и съдържанието на всяка активна съставка;

— Инструкциите за употреба, включително времето за прилагане, необходимо за биоцидното действие;

— Информацията съгласно CLP.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #66 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване – на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 125, 500 1 000 ml Опаковка: HDPE Капачка: Клик-клак капачка: PP или помпено устройство: сложна система (PE-LD, PP, PBT, POM, EVA, неръждаема стомана) Кутия: 5, 10, 20, 30 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Бидон: 220 l Опаковка: HDPE Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали IBC: 1 000 l Опаковка: HDPE със стоманена рамка Капачка: HDPE, LDPE, PP или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), LDPE, PE-LD (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 30 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: 36 месеца

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 7

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m^3 за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 7

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Manorapid® pure	
	Desocid pure	
	Neoseptin pure	
	Novosept pure	
	Novoseptin pure	
	Lyorthol pure	
	Cosmo pure	
	Fordesin pure	
	Saltero pure	
	Prop70 pure	
	Skin-Des pure	
	Dermorapid pure	
	Dermoguard pure	
	Aldovet pure	
	Vetfarm pure	
	MDI pure	
	Antiseptica pure	
	Sterisol Isoprop pure	
	Des HD	
	MENNO® DERM I-P	
	Plurasept HD	
	Opynol	
Номер на разрешително	EU-0034272-0007 1-7	

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	63,14 % (w/w)

Глава 1. МЕТА SPC 8 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 8 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC8

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-8

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 8

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 8**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (w/w)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 8**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 8

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

	P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #67 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност: Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #68 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #69 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и вируси (вируцидна активност в ограничен спектър): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте 5 ml (свити шепи) в дланта си (2-4 натискания на помпата). Разтривайте ръцете и предмишниците най-малко за 45 секунди. Повторете стъпката (изсипване, втриване) още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #70 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #71 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #72 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE

	Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #73 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #73.1.: (професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост Употреба #73.2.: (професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #73.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #73.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Честота: Употреба #73.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #73.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #73.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #73.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте 3 ml (една шепа) в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) (2-4 натискания на помпата) от продукта или напръскайте 5 ml (свити шепи) в дланта си. Разтривайте ръцете и предмишниците най-малко за 45 секунди. Повторете стъпката (изсипване, втриване) още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #74 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #74.1.: (Професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети, козметични студия, грижи за възрастни хора и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #74.2.: (Професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #74.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #74.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #74.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #74.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #75 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #76 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #76.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба #76.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения), лекарски или зъболекарски кабинети
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: ---
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #76.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #76.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #76.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #76.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците ви са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 8

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 8

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Schülke® 1			
Номер на разрешително		EU-0034272-0008 1-8			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 % (w/w)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,5 % (w/w)

Глава 1. META SPC 9 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 9 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC9

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-9

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 9

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 9**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (w/w)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,25 - 0,5 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 9**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 9

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. H412: Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P273: Да се избягва изпускане в околната среда. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #77 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #78 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта (1-2 натискания на помпата) или напръскайте в дланта си. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #79 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #80 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #81 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #82 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони о (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия).
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #83 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито #Употреба 83.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) или в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост #Употреба 83.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони като болници (включително интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения и др.), лекарски или зъболекарски кабинети
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: #Употреба 83.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) #Употреба 83.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: #Употреба 83.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) #Употреба 83.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце: Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце: Изсипете 5 ml (една свита шепа) от продукта или го напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #84 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #84.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони(напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #84.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #84.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #84.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: #Употреба 84.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) #Употреба 84.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте в дланта си (2-4 натискания на помпата) и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

--

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #85 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи на ръцете) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #86 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #86.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба #86.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #86.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #86.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #86.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #86.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси:

Изсипете 3 ml от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата). Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна активност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.11. **Описание на употребите**

Таблица 11.

Употреба #87 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (при специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.12. **Описание на употребите**

Таблица 12.

Употреба #88 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.12.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

4.12.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.12.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.12.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.12.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.13. **Описание на употребите**

Таблица 13.

Употреба #89 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.13.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.13.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.13.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.13.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.13.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.14. **Описание на употребите**

Таблица 14.

Употреба #90 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.14.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

4.14.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.14.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.14.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.14.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 9

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 9

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Schülke® 2			
Номер на разрешително		EU-0034272-0009 1-9			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 % (w/w)
1-Tetradecanol	Tetradecan-1-ol	Неактивно вещество	112-72-1	204-000-3	0,5 % (w/w)

Глава 1. META SPC 10 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 10 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC10

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-10

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 10

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 10**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 10**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 10

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #91 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #92 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #93 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и вируцидна активност в ограничен спектър: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #94 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #95 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #96 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси): Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #97 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #97.1.: (професионална, промишлена): Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост Употреба #97.2.: (професионална): Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #97.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #97.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #97.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #97.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE

	Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #98 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #98.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони(напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #98.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони, напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети).
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #98.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #98.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #98.1: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #98.2: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #99 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #100 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #100.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони о (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия). Употреба #100.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети).
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #100.1.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Употреба #100.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси и вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #100.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #100.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (вкл. активност срещу обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди.

Хирургическа дезинфекция на ръцете (вкл. активност срещу вируси (вируцидна активност в ограничен спектър)): Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 10

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 10

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Schülke® 3			
Номер на разрешително		EU-0034272-0010 1-10			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 % (w/w)

Глава 1. META SPC 11 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 11 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC11

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-11

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА META SPC 11

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 11**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 - 75 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 11**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 11

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #101 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания).
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #102 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #103 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #104 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #105 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #106 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #107 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #107.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост Употреба #107.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #107.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #107.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: #Употреба 107.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) #Употреба 107.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефикасност срещу бактерии, дрожди и обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #108 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #108.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост Употреба #108.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #108.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #108.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #108.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #108.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце Ефективен срещу бактерии, дрожди и обвити вируси:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #109 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/ отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу бактерии и дрожди: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #110 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, микобактерии, обвити вируси - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #110.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба #110.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #110.1.: Срещу бактерии, дрожди и обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Срещу микобактерии: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,9 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #110.2.: Срещу бактерии, дрожди, микобактерии и обвити вируси: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 90 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #110.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #110.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефикасност срещу бактерии, дрожди и обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна микобактерицидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 45 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.11. **Описание на употребите**

Таблица 11.

Употреба #111 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания/специален случай: конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -

Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.12. **Описание на употребите**

Таблица 12.

Употреба #112 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.12.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.12.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.12.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.12.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

--

4.12.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.13. **Описание на употребите**

Таблица 13.

Употреба #113 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за дезинфекция в медицински зони, като лекарски кабинети (само в специални случаи, напр. конюнктивит)

Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вирулицидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.13.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

4.13.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.13.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.13.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.13.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.14. **Описание на употребите**

Таблица 14.

Употреба #114 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения. (напр. в случай на заболявания/специален случай: конюнктивит)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Срещу вируси (ограничен спектър на вируцидна активност): 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 3,16 g активно вещество. Време за контакт: 120 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.14.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръце. Втривайте за най-малко 60 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.14.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

Избягвайте дезинфекция в присъствието на деца < 6 години.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.14.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.14.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.14.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 11

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 11

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Schülke® 4			
Номер на разрешително		EU-0034272-0011 1-11			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	75 % (w/w)

Глава 1. META SPC 12 АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Мета SPC 12 идентификатор**

Идентификатор	desmanol pure meta SPC12

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-12

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	PT01: Човешка хигиена

Глава 2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 12

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 12**

Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	63,1 - 63,1 % (w/w)

2.2. **Вид (видове) формулация на мета SPC 12**

Тип(ове) формулация	AL Всяка друга течност

Глава 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 12

Предупреждения за опасност	H225: Силно запалима течност и пара. H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите. H336: Може да предизвика сънливост или световъртеж. EUH066: Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.
Препоръки за безопасност	P101: При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. P102: Да се съхранява извън обсега на деца. P103: Прочетете внимателно и следвайте всички инструкции. P210: Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. P261: Избягвайте вдишване на изпарения. P261: Избягвайте вдишване на аерозоли. P264: Измийте ръцете старателно след употреба. P271: Да се използва само на открито или на добре проветриво място. P304+P340: ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. P305+P351+P338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P312: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ при неразположение. P312: Обадете се в лекар при неразположение. P337+P313: При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински помощ. P403+P235: Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. P405: Да се съхранява под ключ. P501: Да се изхвърли съдържанието в съответствие с местните и национални разпоредби. P501: Да се изхвърли съдът в съответствие с местните и национални разпоредби.

Глава 4. РАЗРЕШЕНА(И) УПОТРЕБА(И) НА МЕТА SPC

4.1. **Описание на употребите**

Таблица 1.

Употреба #115 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вирусидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.2. **Описание на употребите**

Таблица 2.

Употреба #116 Хигиенен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вирусидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вирусидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml

	Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вирупидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.3. **Описание на употребите**

Таблица 3.

Употреба #117 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо

Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.4. **Описание на употребите**

Таблица 4.

Употреба #118 Хигиенен дезинфектант за ръце - промишлен потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в промишлени зони, напр. фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Ефикасност срещу бактерии, дрожди, обвити вируси: Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.5. **Описание на употребите**

Таблица 5.

Употреба #119 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в частни зони/здравни грижи в домашни помещения (напр. в случай на заболявания)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете подходяща вентилация по време и след нанасянето на продукта, като отворите прозорците или включите механичната вентилация в банята/кухнята.

Да се съхранява далеч от домашни животни.

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

Употребата е ограничена само за възрастни.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

4.6. **Описание на употребите**

Таблица 6.

Употреба #120 Хигиенен дезинфектант за ръце - непрофесионален потребител - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вирусидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицидна, дрождецидна, вирусидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вирусидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 3 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	широка общественост (неспециалисти)
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали

	торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Продуктът е ограничен само за употреба от възрастни.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

В случай на сухота на кожата, използвайте подходящ лосион за поддържане на кожата.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE) и торбичка/саше (PE): 6 дни

4.7. **Описание на употребите**

Таблица 7.

Употреба #121 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #121.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #121.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #121.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #121.2.: : 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #121.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #121.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце:

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и разтрийте ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургическа дезинфекция на ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.8. **Описание на употребите**

Таблица 8.

Употреба #122 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална, промишлена употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо
Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #122.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) и в промишлени зони като фармацевтичната или хранително-вкусовата промишленост. Употреба #122.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #122.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #122.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #122.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #122.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	промишлена професионална

Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургичен дезинфектант за ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.9. **Описание на употребите**

Таблица 9.

Употреба #123 Хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки
Област(и) на употреба	използване на закрито Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Бактерицид, дрождицид, фунгицид: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

4.10. **Описание на употребите**

Таблица 10.

Употреба #124 Хигиенен/хирургичен дезинфектант за ръце - професионална употреба - бактерии, дрожди, гъбички, туберкулозни бактерии, обвити вируси, вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) - изливане или изпомпване - на закрито

Вид продукт	PT01: Човешка хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	Неприложимо
Целеви организъм(и) (включително етап на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Дрожди Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Гъбички Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Туберкулозни бактерии Общоприето наименование: Туберкулозни бактерии Етап на развитие: вегетативни клетки Научно наименование: Обвити вируси Общоприето наименование: Обвити вируси Етап на развитие: неприложимо Научно наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Общоприето наименование: Вируси (вируцидна активност в ограничен спектър) Етап на развитие: неприложимо

Област(и) на употреба	използване на закрито Употреба #124.1.: Готов за употреба хигиенен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети, грижи за възрастни хора, козметични студия) Употреба #124.2.: Готов за употреба хирургичен дезинфектант за ръце за употреба в медицински зони (напр. болници, интензивни отделения/отделения за интензивно лечение, педиатрични отделения, лекарски кабинети)
Метод(и) на прилагане	Метод: Изливане или изпомпване (спецификация на дозатора: дозираща помпа/изходен резултат: кондензат) Подробно описание: -
Степен и честота на приложение	Дозиране: Употреба #124.1.: Бактерицидна, дрождецидна, вируцидна активност срещу обвити вируси: 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 30 сек. Вируцидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност: 2 x 3 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 1,65 g активно вещество. Време за контакт: 60 сек. (общо) Употреба #124.2.: 2 x 5 ml на дезинфекция, съответстващи на 2 x 2,76 g активно вещество. Време за контакт: 180 сек. (общо) Брой и времеви график на прилагане: Честота: Употреба #124.1.: съгласно изискванията (обикновено 25 прилагания на ден) Употреба #124.2.: съгласно изискванията (обикновено 4 прилагания на ден)
Категория(и) потребители	професионална
Размери и материал на опаковките	Бутилка: 50, 60, 75, 95, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали торбичка/саше: 40, 50, 90, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 750, 800, 950, 1 000 ml Опаковка: PET/ALU/PE, PET/PE или PET-SiO/PE Капачка: PP, PC, PE, HDPE, LDPE или комбинация от тези материали ; Помпено устройство: PP, PC, PE, HDPE, LDPE, EVA, POM, PBT, неръждаема стомана, силикон, силикагел, NBR, TPE, стъкло или комбинация от тези материали Съкращения: HDPE (полиетилен с висока плътност), PP (полипропилен), PC (поликарбонат), PE (полиетилен), LDPE (полиетилен с ниска плътност), EVA (етилен винилацетат), POM (полиоксиметилен), PBT (полибутилен терефталат), PET (полиетилен терефталат), NBR (нитрил бутадиенов каучук), TPE (термопластичен еластомер), ALU (алуминий)

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Готов за употреба продукт. Нанасяйте продукта само върху здрава повърхност на човешката кожа. Измийте и подсушете ръцете си, преди да използвате продукта.

Хигиенен дезинфектант за ръце (ефективен срещу бактерии, дрожди, обвити вируси):

Изсипете 3 ml (една шепа) от продукта или го напръскайте в дланта си (1-2 натискания на помпата) и втрийте в ръцете. Втривайте за най-малко 30 секунди. За допълнителна вирусидна активност в ограничен спектър, фунгицидна и туберкулоцидна ефективност повторете тази стъпка още веднъж.

Хирургичен дезинфектант за ръце:

Изсипете 5 ml (свити шепи) от продукта или напръскайте (2-4 натискания на помпата) в дланта си и разтрийте ръцете и предмишниците. Втривайте за най-малко 90 секунди. Повторете тази стъпка още веднъж. Уверете се, че ръцете и предмишниците са мокри от продукта през цялото време на прилагане.

Преливането/повторното пълнене на биоцида за ръце за хирургическа употреба трябва да се извършва само при асептични условия.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се пази от пряка слънчева светлина.

Да се съхранява на стайна температура в оригиналния контейнер.

Срок на годност:

Бутилка (PE), торбичка/саше (PE): 6 дни

Глава 5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 12

5.1. **Указания за употреба**

Начин на прилагане:

Стъпка 1: Нанесете дезинфектанта и втрийте в дланта си. Разтрийте длан в длан, за да разнесете дезинфектанта върху целите ръце и пръсти.

Стъпка 2: Разтрийте гърба на лявата си ръка с дланта на дясната. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 3: Разтворете пръстите си и разтрийте ципите между пръстите. Обърнете и повторете действието.

Стъпка 4: Разтрийте длан в длан със сключени пръсти (5 пъти).

Стъпка 5: Разтрийте палеца на всяка ръка с въртеливо движение.

Стъпка 6: Разтрийте върховете на пръстите си срещу противоположната длан с кръгови движения. Разтрийте китката с две ръце. Оставете ръцете да изсъхнат напълно.

Не използвайте продукта заедно с други продукти.

Винаги четете етикета или листовката преди употреба и следвайте всички указани инструкции.

Да се съхранява извън обсега на деца и нецелеви животни/домашни любимци.

Да се избягва контакт с очите.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.

Уверете се, че нанесеният продукт е напълно изсъхнал, преди да влезете в помещение или зона, където хората ще останат за по-дълъг период от време.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

Данни за вероятните преки или косвени ефекти:

Няма.

Указания за първа помощ:

Обща информация

Отведете хората на безопасно място. Спазвайте мерките за самозащита при оказване на първа помощ. Незабавно свалете замърсените дрехи и обувки. Потърсете медицинска помощ, ако се появят симптоми.

При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Ако се появи дразнене, измийте с вода и потърсете лекарска помощ. В случай на неволно излагане на кожата: измийте с вода.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Изплакнете с вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете да промивате в продължение на 5 минути. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го оставете в покой, в позиция, улесняваща дишането. Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата.

При симптоми: Обадете се на тел. 112/линейка за медицинска помощ.

При липса на симптоми: Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

Информация за здравния персонал/лекаря: Предприемете животоподдържащи мерки, ако е необходимо,

Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Симптомите могат да включват парене, сълзене, зачервяване, подуване и замъглено зрение. Изпаренията имат наркотично действие и могат да причинят главоболие, умора, замаяност и гадене. Кашлица. Задух, след което се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.

Спешни мерки за опазване на околната среда:

Да се избягва изтичане на концентрати в почвата, подпочвените води или подземните води, например чрез съдове за събиране

Съберете изтичащия продукт с подходящ материал (напр. пръст, пясък, диатомит, вермикулит, универсални свързващи вещества).

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

При замърсяване на почва или водоеми уведомете компетентните органи.

Пазете се от опасност от експлозия.

Изпаренията са по-тежки от въздуха, разпространяват се по земята и се събират в по-ниските или ограничени пространства (канализация, мазета, резервоари).

Да се използват инструменти, които не предизвикват искри, и оборудване, устойчиво на експлозия.

Вземете предохранителни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Осигурете електрическа непрекъснатост чрез свързване и заземяване (оземка) на цялото оборудване.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Изхвърлете съдържанието/контейнера в специален пункт за събиране на отпадъци в съответствие с местните/националните/международните разпоредби.

Остатъците от продукта трябва да се събират и обезвреждат в съответствие с националното законодателство за обезвреждане на отпадъци и всички изисквания на регионалните и/или местните власти.

Да се избягва (директно) изливане (на неразтворен продукт) в природата/канализационната система.

Да не се излива в канализацията.

Разливите да се разреждат с вода и да се подсушават.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Глава 6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Препоръка за професионалната употреба:

P280 Използвайте предпазни очила

Моля, имайте предвид европейската референтна стойност от 129,2 mg/m³ за активното вещество пропан-2-ол (CAS №: 67-63-0), използвана за оценка на риска на групата биоциди.

По отношение на забележката „Категория(и) потребители“: Професионалисти (включително промишлени потребители) означава обучени специалисти, ако това се изисква от националното законодателство.

Глава 7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 12

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование		Schülke® 5			
Номер на разрешително		EU-0034272-0012 1-12			
Общоприето наименование	Наименование по IUPAC	Функция	CAS номер	Номер на ЕО	Съдържание (%)
Пропан-2-ол		Активно вещество	67-63-0	200-661-7	63,1 % (w/w)