31995D0117

KOMISIJAS LĒMUMS

(1995. gada 30. marts),

ar ko, piemērojot Padomes Direktīvas 91/494/EEK 5. panta 3. punktu, nosaka kritērijus tādu kaušanai paredzētu mājputnu pārbaudei, kuri cēlušies Ņūkāslas slimības uzraudzības zonā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(95/117/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 26. jūnija Direktīvu 91/494/EEK par dzīvnieku veselības nosacījumiem, kas reglamentē Kopienas iekšējo tirdzniecību ar svaigu mājputnu gaļu un tās importu no trešām valstīm [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 93/121/EK [2], un jo īpaši tās 5. panta 3. punktu,

tā kā, piemērojot Direktīvas 91/494/EEK 5. panta 3. punkta noteikumus, jo īpaši jānosaka virusoloģiskās testēšanas metodes attiecībā uz Ņūkāslas slimību; tā kā šajā sakarā ir lietderīgi sīki noteikt paraugu ņemšanas procedūru, testu veikšanas un testu rezultātu interpretācijas procedūru;

tā kā notikusi apspriešanās ar Zinātnisko veterināro komiteju un tā sniegusi ziņojumu 1994. gada 12. decembrī;

tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Piemērojot Direktīvas 91/494/EEK 5. panta 3. punktu, virusoloģisko paraugu ņemšanai un virusoloģiskajai testēšanai, lai noteiktu Ņūkāslas slimības vīrusu, jāatbilst pielikumā noteiktajām prasībām.

2. pants

Šo lēmumu piemēro no 1995. gada 1. aprīļa.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 1995. gada 30. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER

[1] OV L 268, 24.9.1991., 35. lpp.
[2] OV L 340, 31.12.1993., 39. lpp.

PIELIKUMS

1. **Paraugu ņemšana**

No katras mājputnu saimes ņem vismaz 60 paraugus, kas ietver vismaz 30 uztriepes no kloākas un 30 uztriepes no trahejas. Paraugus ņem no vismaz 60 putniem. Paraugus ņem piecas dienas pirms kaušanas un dzesinātus, bet ne sasaldētus ved testu veikšanai uz valsts Ņūkāslas slimības laboratoriju.

2. **Paraugu apstrāde**

Kopā grupē ne vairāk kā piecus viena veida paraugus. Uztriepes novieto pietiekamā antibiotiskā vidē, lai tās būtu pilnībā iegremdētas, un pēc sakratīšanas apmēram divas stundas atstāj apkārtējās vides temperatūrā (vai ilgāku laiku 4 °C temperatūrā), un pēc tam dzidrina centrifugējot (piemēram, 800 līdz 1 000 × g 10 minūtes).

3. **Antibiotiskā vide**

Tipisks vides piemērs kloakālo uztriepju novietošanai ir 10 000 vienību/ml penicilīna, 10 mg/ml streptomicīna, 0,25 mg/ml gentamicīna un 5 000 vienību/ml mikostatīna fosfāta buferētā fizioloģiskajā šķīdumā ar pH 7,2 līdz 7,4. Var pievienot 50 µg/ml oksitetraciklīna. Attiecībā uz uztriepēm no trahejas antibiotiku koncentrāciju var pieckārt samazināt. Veidojot vidi, ir svarīgi pēc antibiotiku pievienošanas noteikti pārbaudīt pH līmeni un to noteikti vēlreiz koriģēt.

4. **Vīrusa izolēšana embrionētās vistu olās**

Dzidrināto centrifugāta šķidrumu 0,2 ml daudzumā inokulē vismaz četru tādu embrionētu vistu olu alantoja maisā, kas inkubētas 8 līdz 11 dienas. Vislabāk, ja šīs olas ir iegūtas no saimes, kurā nav īpašu patogēnu, bet, ja tas nav iespējams, var izmantot olas, kas iegūtas no saimes, kurā nav konstatētas Ņūkāslas slimības vīrusa antivielas. Inokulētas olas glabā 37 °C temperatūrā un ik dienas ovoskopē. Pakāpeniski olas ar beigtiem vai mirstošiem embrijiem un visas pārējās olas četras dienas pēc inokulācijas atdzesina līdz 4 °C temperatūrai un pārbauda alantoja-amnija šķidrumus attiecībā uz hemaglutinācijas aktivitāti.

5. **Interpretācija**

Testa rezultātus uzskata par negatīviem, ja nav konstatēta hemaglutinācijas aktivitāte un nav izolēts vīruss. Ņūkāslas slimības vīrusa izolēšana nozīmē to, ka saimi uzskata par iespējami inficētu saimi un attiecībā uz to piemēro Padomes Direktīvas 92/66/EEK [1] 4. panta prasības. Ja izrādās, ka vīrusam ir vakcināla izcelsme, paraugu ņemšanu un pārbaudi atkārto.

[1] OV L 260, 5.9.1992., 1. lpp.