PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2025/241

ze dne 7. února 2025,

kterým se povolují metody třídění pro klasifikaci jatečně upravených těl prasat v Česku a zrušuje rozhodnutí 2005/1/ES

(oznámeno pod číslem C(2025) 745)

(Pouze české znění je závazné)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 ([1]), a zejména na čl. 20 první pododstavec písm. p) a t) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Článek 10 nařízení (EU) č. 1308/2013 stanoví, že klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla prasat se použijí v souladu s přílohou IV částí B uvedeného nařízení. Příloha IV část B oddíl IV bod 1 uvedeného nařízení stanoví, že pro účely klasifikace jatečně upravených těl prasat se podíl libového masa hodnotí pomocí metod třídění povolených Komisí, že povoleny jsou pouze statisticky ověřené metody vyhodnocování založené na fyzickém měření jedné nebo více anatomických částí jatečně upraveného těla prasete a že metody třídění podléhají dodržení maximální tolerance statistické chyby při posuzování. Tato tolerance je vymezena v příloze V části A bodu 1 druhém pododstavci nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ([2]).

(2) Rozhodnutím Komise 2005/1/ES ([3]) se v Česku povolilo používání šesti metod třídění jatečně upravených těl prasat.

(3) Česko požádalo Komisi o povolení těchto nových metod: „Fat-O-Meater II (FOM II)“. Za tímto účelem Česko předložilo podrobný popis pokusné disekce s uvedením zásad, na nichž je tato nová metoda založena, výsledky pokusné disekce a rovnice používané k odhadu procentního podílu libového masa v protokolu podle čl. 11 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182.

(4) Česko rovněž požádalo Komisi o povolení aktualizovaného vzorce pro tři metody („Zwei-Punkte-Messverfahren“, „Ultra-sound IS-D-05“ a „Needle IS-D-15“), které již byly povoleny rozhodnutím 2005/1/ES pro třídění jatečně upravených těl prasat na jeho území.

(5) Z posouzení uvedených žádostí vyplynulo, že podmínky a minimální požadavky pro povolení nových metod třídění a aktualizace rovnice pro povolené metody stanovené v příloze V části A nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 jsou splněny. Nové metody třídění a nové vzorce by proto měly být v Česku povoleny.

(6) Česko Komisi požádalo, aby smělo stanovit obchodní úpravu jatečně upravených těl prasat odlišně od standardní obchodní úpravy stanovené v příloze IV části B bodu III nařízení (EU) č. 1308/2013.

([1]) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat (Úř. věst. L 171, 4.7.2017, s. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1182/oj).

([3]) Rozhodnutí Komise 2005/1/ES ze dne 27. prosince 2004, kterým se povolují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (Úř. věst. L 1, 4.1.2005, s. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/1(1)/oj).

(7) Změny týkající se metod třídění či přístrojů používaných pro třídění by neměly být povoleny, pokud je výslovně neschválí prováděcí rozhodnutí Komise.

(8) Z důvodu jasnosti a právní jistoty by rozhodnutí 2005/1/ES mělo být zrušeno.

(9) Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

K vyhodnocení obsahu libového masa v jatečně upraveném těle prasete podle přílohy IV části B oddílu IV bodu 1 nařízení (EU) č. 1308/2013 se v Česku povolují tyto metody třídění:

a) metoda třídění „Zwei-Punkte-Messverfahren“ a s ní související metody vyhodnocování, jež jsou podrobně uvedeny v části I přílohy;

b) přístroj „Fat-O-Meater (FOM)“ a příslušné metody vyhodnocování, jež jsou podrobně stanoveny v části II přílohy;

c) přístroj „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“ a metody vyhodnocování s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části III přílohy;

d) přístroj „Ultra FOM 300“ a s ním související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části IV přílohy;

e) přístroj „Ultra-sound IS-D-05“ a s ním související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části V přílohy;

f) přístroj „Needle IS-D-15“ a s ním související metody hodnocení, jež jsou podrobně uvedeny v části VI přílohy;

g) přístroj „Fat-O-Meater II (FOM II)“ a příslušné metody vyhodnocování, jež jsou podrobně stanoveny v části VII přílohy.

Metodu třídění „Zwei-Punkte-Messverfahren“ lze použít pouze na jatkách, kde týdenní porážka v ročním průměru nepřesahuje 200 prasat.

Článek 2

Bez ohledu na standardní obchodní úpravu uvedenou v části B oddílu III přílohy IV nařízení (EU) č. 1308/2013 mohou být jatečně upravená těla prasat v Česku obchodována:

a) bez uší; uši se odstraní před vážením a tříděním. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

hmotnost jatečně upraveného těla za tepla = hmotnost jatečně upraveného těla za tepla bez uší + 0,274 kg;

b) aniž se před vážením a tříděním odstraní plstní sádlo. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

hmotnost jatečně upraveného těla za tepla = 1,65651 + 0,96139 × hmotnost jatečně upraveného těla za tepla s plstním sádlem;

c) aniž se odstraní plstní sádlo a bez uší; uši se odstraní před vážením a tříděním. V případě této obchodní úpravy se zaznamenaná hmotnost jatečně upraveného těla za tepla přizpůsobí podle tohoto vzorce:

hmotnost jatečně upraveného těla za tepla = 1,65651 + 0,96139 × (hmotnost jatečně upraveného těla za tepla s plstním sádlem a bez uší + 0,274 kg).

Článek 3

Změny schválených metod třídění či přístrojů používaných pro třídění uvedených v článku 1 jsou povoleny prováděcím rozhodnutím Komise.

Článek 4

Rozhodnutí 2005/1/ES se zrušuje.

Článek 5

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 7. února 2025.

Za Komisi
Christophe HANSEN
člen Komise

PŘÍLOHA

METODY TŘÍDĚNÍ PRO KLASIFIKACI JATEČNĚ UPRAVENÝCH TĚL PRASAT V ČESKU

ČÁST I

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

(1) Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí metody známé jako „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“.

(2) Tato metoda je prováděna pomocí posuvného měřítka, přičemž třídění se určuje predikční rovnicí. Vychází z ručního měření na řezu vedeném podélnou osou jatečně upraveného těla.

(3) Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

$$Y = 61{,}84184 - 0{,}46816 \times BF + 0{,}07998 \times MD$$

kde:

Y = odhadovaný procentní podíl libového masa;

BF = minimální tloušťka viditelného tuku (včetně kůže) na středním hýžďovci (M. glutaeus medius) měřená na řezu vedeném podélnou osou jatečně upraveného těla (v mm)

MD = tloušťka svalu v milimetrech měřená jakožto nejkratší vzdálenost mezi lebečním koncem svalu glutaeus medius a hřbetním okrajem páteřního kanálu.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 60 až 120 kg.

ČÁST II

Fat-O-Meater (FOM)

(1) Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí metody známé jako „Fat-O-Meater (FOM)“.

(2) Přístroj je vybaven sondou o průměru 6 milimetrů obsahující fotodiodu Siemens typu SFH 950/960. Provozní vzdálenost se pohybuje od 3 do 103 milimetrů. Výsledky měření se pomocí počítače převedou na odhadovaný obsah libového masa.

(3) Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

$$Y = 70{,}28164 - 0{,}75376 \times S + 0{,}00270 \times M$$

kde:

Y = odhadovaný procentní podíl libového masa;

S = tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 6,5 cm od podélné osy jatečně upraveného těla mezi druhým a třetím posledním žebrem;

M = tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 60 až 120 kg.

ČÁST III

Hennessy Grading Probe (HPG 4)

(1) Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí metody známé jako „Hennessy Grading Probe (HGP 4)".

(2) Přístroj je vybaven sondou o šířce 5,95 milimetrů (a 6,3 milimetrů u hrany horní části sondy) obsahující fotodiodu (Siemens LED typu LYU 260-EO) a fotodetektor typu 58 MR, jejíž operační vzdálenost se pohybuje mezi 0 až 120 milimetry. Výsledky měření se přepočtou na odhadovaný podíl libového masa pomocí samotného přístroje HGP 4 nebo počítače, na který je napojen.

(3) Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

$$Y = 69{,}11354 - 0{,}67804 \times S + 0{,}00432 \times M$$

kde:

Y = odhadovaný procentní podíl libového masa;

S = tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi třetím a čtvrtým posledním žebrem,

M = tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 60 až 120 kg.

ČÁST IV

Ultra FOM 300

(1) Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí metody známé jako „Ultra FOM 300".

(2) Přístroj je vybaven ultrazvukovou sondou se 3,5 MHz. Mikroprocesor digitalizuje, ukládá a zpracovává ultrazvukový signál. Výsledky měření se převedou na odhadovaný podíl libového masa prostřednictvím samotného přístroje Ultra-FOM.

(3) Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

$$Y = 66{,}78382 - 0{,}80922 \times S + 0{,}04746 \times M$$

kde:

Y = odhadovaný procentní podíl libového masa;

S = tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi druhým a třetím posledním žebrem (měření známé jako „P2"),

M = tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 60 až 120 kg.

ČÁST V

Ultra-sound IS-D-05

(1) Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí přístroje známého jako „Ultra-sound IS-D-05“.

(2) Přístroj na třídění IS-D-05 je zařízení na měření tloušťky libového masa a tloušťky sádla založené na reakci ultrazvukových impulsů, které jsou postupně převáděny do přesně stanoveného místa na jatečně upraveném těle. Ultrazvuková sonda skenuje jatečně upravené tělo pomocí série 3 × 100 ultrazvukových impulsů s frekvencí v okamžiku skenování 4 MHz.

(3) Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

$$Y = 69{,}17386 - 0{,}83174 \times BF + 0{,}03530 \times MD$$

kde:

Y = odhadovaný procentní podíl libového masa;

BF = tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech mezi druhým a třetím žebrem do posledního žebra, 7 centimetrů od hřbetní podélné osy kolmo na kůži,

MD = tloušťka svalu v milimetrech mezi druhým a třetím žebrem do posledního žebra, 7 centimetrů od hřbetní podélné osy kolmo na jatečně upravené tělo.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 60 až 120 kg.

ČÁST VI

Needle IS-D-15

(1) Pravidla stanovená v této části se použijí při třídění jatečně upravených těl prasat pomocí přístroje známého jako „Needle IS-D-15“.

(2) Přístroj na třídění IS-D-15 využívá vpichovou sondu, která se zavádí do určeného místa na jatečně upraveném těle; hloubka měření je přibližně 140 mm. Za jehlou je umístěno speciální optické zařízení, které pomocí optického kanálu osvětluje okolní tkáň nebo oblast a skenuje množství odražené světelné energie s definovanou vlnovou délkou. Terminál je rovněž vybaven přesným bezkontaktním měřicím zařízením, které určuje momentální hloubku zavedení s přesností na 46 mikrometrů.

(3) Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

$$Y = 67{,}86508 - 0{,}74820 \times BF + 0{,}04786 \times MD$$

kde:

Y = odhadovaný procentní podíl libového masa;

BF = tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech mezi druhým a třetím žebrem do posledního žebra, 7,5 centimetrů od hřbetní podélné osy kolmo na kůži.

MD = tloušťka svalu v milimetrech mezi druhým a třetím žebrem do posledního žebra, 7,5 centimetrů od hřbetní podélné osy kolmo na jatečně upravené tělo.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 60 až 120 kg.

ČÁST VII

Fat-O-Meater II (FOM II)

(1) Pravidla stanovená v této části se použijí při klasifikaci jatečně upravených těl prasat pomocí přístroje zvaného „Fat-O-Meater II (FOM II)“.

(2) Přístroj se skládá z optické sondy s nožem, hloubkového měřiče s operační vzdáleností v rozpětí 0 až 125 milimetrů a zařízení pro sběr a rozbor údajů.

(3) Obsah libového masa v jatečně upraveném těle se vypočítá podle tohoto vzorce:

$$Y = 65{,}73183 - 0{,}75225 \times BF + 0{,}07957 \times MD$$

kde:

Y =	odhadovaný procentní podíl libového masa;
BF =	tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech mezi druhým a třetím žebrem do posledního žebra, 6,5 centimetrů od hřbetní podélné osy kolmo na kůži.
MD =	tloušťka svalu v milimetrech mezi druhým a třetím žebrem do posledního žebra, 6,5 centimetrů od hřbetní podélné osy kolmo na jatečně upravené tělo.

Tento vzorec platí pro jatečně upravená těla o hmotnosti 60 až 120 kg.