I

(Akty, ktorých uverejnenie je povinné)

SMERNICA KOMISIE 2006/60/ES

zo 7. júla 2006,

ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy k smernici Rady 90/642/EHS, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí trifloxystrobínu, tiabendazolu, abamektínu, benomylu, karbendazímu, metyltiofanátu, myklobutanylu, glyfozátu, trimetylsulfónia, fenpropimorfu a chlormekvátu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 90/642/EHS z 27. novembra 1990 o stanovení maximálnych hladín pre rezíduá pesticídov v a na určitých produktoch rastlinného pôvodu vrátane ovocia a zeleniny ([1]), a najmä na jej článok 7,

so zreteľom na smernicu Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh ([2]), a najmä na jej článok 4 ods. 1 písm. f),

keďže:

(1) V súlade so smernicou 91/414/EHS sú za povolenia používať prípravky na ochranu rastlín pri osobitných plodinách zodpovedné členské štáty. Takéto povolenia musia byť založené na zhodnotení účinkov na ľudské zdravie a zdravie zvierat a vplyvu na životné prostredie. K faktorom, ktoré treba zohľadniť pri takýchto hodnoteniach, patrí vystavenie pracovníka a iných prítomných osôb pôsobeniu týchto prípravkov, ich vplyv na pôdu, vodu a vzduch, ako aj vplyv na ľudí a zvieratá prostredníctvom požitia rezíduí na ošetrených plodinách.

(2) Maximálne hladiny rezíduí (MRL) odrážajú použitie minimálnych množstiev pesticídov na dosiahnutie efektívnej ochrany rastlín, ktoré sa aplikujú tak, aby množstvo rezíduí bolo najmä z hľadiska odhadovaného potravinového príjmu prakticky čo najmenšie a toxicky prijateľné.

(3) Maximálne hladiny rezíduí pesticídov, na ktoré sa vzťahuje smernica 90/642/EHS, sa majú neustále kontrolovať a môžu sa upravovať, aby sa zohľadnili nové alebo zmenené spôsoby použitia pesticídov. Informácie o nových alebo zmenených spôsoboch použitia pesticídov boli oznámené Komisii, a to bude mať za následok zmeny v hladinách rezíduí trifloxystrobínu, tiabendazolu, abamektínu, skupiny benomylu (benomyl, karbendazím, metyltiofanát), myklobutanylu, glyfozátu, trimetylsulfónia a fenpropimorfu.

(4) Pokiaľ ide o chlórmekvát, Komisii boli oznámené informácie, ktoré ju oprávňujú dočasne na obdobie troch rokov stanoviť MRL pre hrušky.

(5) Dlhodobé vystavenie spotrebiteľov účinkom týchto pesticídov prostredníctvom potravinových produktov, ktoré môžu obsahovať rezíduá týchto pesticídov, bolo posúdené a vyhodnotené v súlade s postupmi a praktikami používanými v rámci Spoločenstva, pričom sa zohľadnili usmernenia uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou ([3]). V tomto vyhodnotení sa vzala do úvahy skutočnosť, že abamektín a tiabendazol sa používajú aj ako veterinárne liečivá určené pre zvieratá na produkciu potravín a že pokiaľ ide o tieto dve látky, maximálne hladiny rezíduí boli stanovené v súlade s ustanoveniami nariadenia Rady (EHS) č. 2377/90 ([4]). Na základe tohto posúdenia a vyhodnotenia by bolo potrebné stanoviť MRL týchto pesticídov, aby sa zabezpečilo, že ich prijateľný denný príjem sa neprekročí.

([1]) Ú. v. ES L 350, 14.12.1990, s. 71. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/53/ES (Ú. v. EÚ L 154, 8.6.2006, s. 11).

([2]) Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/45/ES (Ú. v. EÚ L 130, 18.5.2006, s. 27).

([3]) Usmernenia pre predpoklad potravinového príjmu rezíduí pesticídov (revidované), vypracované v rámci Programu GEMS/potraviny v spolupráci Kódexovým výborom pre rezíduá pesticídov, uverejnené Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

([4]) Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 205/2006 (Ú. v. EÚ L 34, 7.2.2006, s. 21).

(6) Pokiaľ ide o benomyl, karbendazím, metyltiofanát, fenpropimorf a chlórmekvát, ktoré majú stanovenú akútnu referenčnú dávku (ARfD), v súlade s postupmi a praxou, ktoré sa v súčasnosti používajú v Spoločenstve, a so zreteľom na usmernenia, ktoré uverejnila Svetová zdravotnícka organizácia, sa vykonalo posúdenie a vyhodnotenie akútneho vystavenia spotrebiteľov účinkom pesticídov prostredníctvom jednotlivých potravinových produktov s možným obsahom rezíduí. Stanoviská Vedeckého výboru pre rastliny, najmä inštrukcie a odporúčania týkajúce sa ochrany spotrebiteľa potravinových produktov ošetrených pesticídmi ([1]), sa zohľadnili. Na základe posúdenia potravinového príjmu by bolo potrebné stanoviť MRL týchto pesticídov, aby sa zabezpečilo, že ich akútna referenčná dávka sa neprekročí. Pokiaľ ide o ďalšie látky, posúdenie dostupných informácií preukázalo, že ARfD sa nepožaduje, a preto krátkodobé posúdenie nie je potrebné.

(7) Maximálne hladiny rezíduí sa na nižšej hranici analytického určenia stanovujú vtedy, keď povolené použitie prípravkov na ochranu rastlín nemá za následok zistiteľné hladiny rezíduí pesticídov v alebo na potravinárskom výrobku, alebo ak takéto použitie nie je povolené, alebo ak použitie, ktoré členské štáty povolili, nebolo podložené potrebnými údajmi, alebo ak použitie v tretích krajinách, ktorých následkom boli rezíduá v alebo na potravinárskych výrobkoch, ktoré sa môžu uviesť do obehu na trhu v rámci Spoločenstva, nebolo podložené potrebnými údajmi.

(8) Preto je vhodné pre tieto pesticídy stanoviť nové MRL.

(9) Stanovenie alebo úpravy prechodných maximálnych hladín rezíduí na úrovni Spoločenstva nezabraňujú členským štátom stanoviť prechodné maximálne hladiny rezíduí pre glyfosát, trimetylsulfónium a trifloxistrobín v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS a jej prílohy VI. Obdobie štyroch rokov sa považuje za postačujúce na povolenie ďalšieho použitia týchto látok. Prechodné MRL Spoločenstva by sa potom mali stať konečnými.

(10) Vlčí bôb sa vo viacerých členských štátoch používa ako potravina. Použitie glyfosátu na vlčom bôbe je povolené. Vloženie položky „vlčí bôb“ a stanovenie MRL pre túto plodinu je preto potrebné z hľadiska ochrany spotrebiteľa pred nadmerným obsahom rezíduí pesticídov použitých pri vlčom bôbe.

(11) Smernica 90/642/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(12) Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 90/642/ES sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe I v skupine „3. Strukoviny“ sa pridáva položka „vlčí bôb“, tak aby sa pojem „celý produkt“ v poslednom stĺpci vzťahoval na všetky štyri položky.

2. Príloha II sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 20. januára 2007 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou okrem skupiny benomylu a metyltiofanátu, pre ktoré ich prijmú a uverejnia do 14. septembra 2006, a pre chlórmekvát do 31. júla 2006. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 21. januára 2007 okrem skupiny benomylu a metyltiofanátu, pre ktoré sa uplatňujú do 15. septembra 2006, a chlórmekvát do 1. augusta 2006.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

([1]) Stanovisko k otázkam týkajúcim sa zmien a doplnení príloh k smerniciam Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS (stanovisko poskytol Vedecký výbor pre rastliny 14. júla 1998); stanovisko týkajúce sa rozličných rezíduí pesticídov v ovocí a zelenine (stanovisko poskytol Vedecký výbor pre rastliny 14. júla 1998); http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scp/outcome_ppp_en.html.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 7. júla 2006

Za Komisiu
Markos KYPRIANOU
člen Komisie

PRÍLOHA

Príloha II k smernici 90/642/EHS sa mení a dopĺňa takto:

1. poznámka pod čiarou k položke chlórmekvát použitý na hrušky sa nahrádza týmto textom: „Dočasná MRL stanovená na 0,2 mg/kg sa uplatňuje do 31. júla 2009“;

2. v časti A sa stĺpce týkajúce sa trifloxystrobínu, tiabendazolu, abamektínu, benomylu, karbendazímu, metyltiofanátu, myklobutanylu, glyfozátu, trimetylsulfónia a fenpropimorfu nahrádzajú týmto textom:

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL	Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobín	Tiaben-dazol	Abamektín (zmes avarmectínu B 1a, avarmectínu B 1b a delta-8,9 izomér avarmectínu B1a)	Zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím	Metyltiofanát	Myklobutanyl	Glyfozát	Trimetyl-sulfónium, kation ako dôsledok použitia glyfozátu	Fenpro-pimorf
„1. **Ovocie čerstvé, sušené alebo nevarené, zachované zmrazením, bez obsahu pridaného cukru; orechy**									
i) CITRUSOVÉ PLODY	0,3 (P)	5	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	3			0,05 (*)
grapefruity									
citróny									
limety									
mandarínky (vrátane klementínok a iných hybridov)							0,5 (P)	0,5 (P)	
pomaranče							0,5 (P)	0,5 (P)	
pomelá									
iné							0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
ii) ORECHY STROMOVÉ (nevylúpané alebo vylúpané)	0,02 (*) (P)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,2	0,05 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
mandle									
para orechy									
kešu orechy									
gaštany									
kokosové orechy									
lieskovce									
makadamové orechy									
pekanové orechy									

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL	Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobín	Tiaben-dazol	Abamektín (zmes avarmectínu B 1a, avarmectínu B 1b a delta-8,9 izomér avarmectínu B1a)	Zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím	Metyltiofanát	Myklobutanyl	Glyfozát	Trimetyl-sulfónium, katión ako dôsledok použitia glyfozátu	Fenpro-pimorf
píniové oriešky									
pistácie									
vlašské orechy									
iné									
iii) JADROVÉ OVOCIE	0,5 (P)		0,01 (*)	0,2	0,5	0,5	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
jablká		5							
hrušky		5							
dule									
iné		0,05 (*)							
iv) KÔSTKOVÉ OVOCIE		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
marhule	1 (P)			0,2	2	0,3			
čerešne	1 (P)			0,5	0,3	1			
broskyne (vrátane nektáriniek a podobných hybridov)	1 (P)			0,2	2	0,5			
slivky	0,2 (P)			0,5	0,3	0,5			
iné	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
v) BOBUĽOVÉ A DROBNÉ OVOCIE		0,05 (*)						0,05 (*) (P)	
a) stolové a vínne hrozno	5 (P)		0,01 (*)			1	0,5 (P)		0,05 (*)
stolové hrozno				0,3	0,1 (*)				
vínne hrozno				0,5	3				
b) jahody (iné ako divorastúce)	0,5 (*) (P)		0,1	0,1 (*)	0,1 (*)	1	0,1 (*) (P)		1
c) krovité ovocné druhy (iné ako divorastúce)	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
ostružiny			0,1			1			
ostružinové maliny									
loganové černice									
maliny			0,1			1			
iné			0,01 (*)			0,02 (*)			

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL	Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobín	Tiaben-dazol	Abamektín (zmes avarmectínu B 1a, avarmectínu B 1b a delta-8,9 izomér avarmectínu B1a)	Zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím	Metyltiofanát	Myklobutanyl	Glyfozát	Trimetyl-sulfónium, kation ako dôsledok použitia glyfozátu	Fenpro-pimorf
d) iné drobné ovocie a bobuľoviny (iné ako divorastúce)			0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)		1
čučoriedky									
brusnice									
ríbezle (červené, čierne a biele)	1 (P)					1			
egreše	1 (P)					1			
iné	0,02 (*) (P)					0,02 (*)			
e) divorastúce bobuľoviny a ovocie	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)		0,05 (*)
vi) RÔZNE OVOCIE			0,01 (*)						
avokáda		15							
banány	0,05 (P)	5				2			2
datle									
figy									
kivi									
kumkváty									
liči									
mangá		5							
olivy (stolové)									
olivy (na výrobu oleja)							1 (P)	1 (P)	
papáje		10		0,2	1				
plody mučenky									
ananásy									
granátové jablká									
iné	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL	Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobín	Tiaben-dazol	Abamektín (zmes avarmectínu B 1a, avarmectínu B 1b a delta-8,9 izomér avarmectínu B1a)	Zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím	Metyltiofanát	Myklobutanyl	Glyfozát	Trimetyl-sulfónium, kation ako dôsledok použitia glyfozátu	Fenpro-pimorf
2. **zelenina čerstvá alebo tepelne neupravená, mrazená alebo sušená**									
i) KOREŇOVÁ A HĽUZOVÁ ZELENINA	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
cvikla									
mrkva						0,2			
maniok (kasava)		15							
zeler									
chren						0,2			
topinambury									
paštrnák						0,2			
koreň petržlenu						0,2			
reďkovka									
kozia brada									
sladké zemiaky		15							
kvaka									
okrúhlica									
jamy		15							
iné		0,05 (*)				0,02 (*)			
ii) CIBUĽOVÁ ZELENINA	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
cesnak									
cibuľa									
šalotka									
cibuľa jarná									
iné									
iii) PLODOVÁ ZELENINA		0,05 (*)					0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) ľuľkovité									
rajčiaky	0,5 (P)		0,02	0,5	2	0,3			

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL	Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobín	Tiaben-dazol	Abamektín (zmes avarmectínu B 1a, avarmectínu B 1b a delta-8,9 izomér avarmectínu B1a)	Zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím	Metyltiofanát	Myklobutanyl	Glyfozát	Trimetyl-sulfónium, kation ako dôsledok použitia glyfozátu	Fenpro-pimorf
papriky			0,05			0,5			
baklažány			0,02	0,5	2	0,3			
ibištek jedlý				2	1				
iné	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
b) tekvicovité s jedlou šupou	0,2 (P)		0,02	0,1 (*)	0,1 (*)	0,1			
uhorky									
uhorky nakladačky									
cukety									
iné									
c) tekvicovité s nejedlou šupou			0,01 (*)	0,1 (*)	0,3	0,2			
melón cukrový	0,3 (P)								
tekvica									
melón vodový/dyňa červená									
iné	0,02 (*) (P)								
d) sladká kukurica	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
iv) HLÚBOVÁ ZELENINA	0,02 (*) (P)		0,01 (*)			0,02 (*)	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
a) hlúbová zelenina tvoriaca ružice				0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
brokolica (vrátane odrody calabrese)		5							
karfiol									
iné		0,05 (*)							
b) Hlúbová zelenina hlávková		0,05 (*)							
ružičkový kel				0,5	1				0,5
hlávková kapusta									
iné				0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
c) Hlúbová zelenina listová		0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
čínska kapusta									

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL	Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobín	Tiaben-dazol	Abamektín (zmes avarmectínu B 1a, avarmectínu B 1b a delta-8,9 izomér avarmectínu B1a)	Zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím	Metyltiofanát	Myklobutanyl	Glyfozát	Trimetyl-sulfónium, kation ako dôsledok použitia glyfozátu	Fenpro-pimorf
kel kučeravý									
iné									
d) kaleráb		0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)				0,05 (*)
v) LISTOVÁ ZELENINA A ČERSTVÉ BYLINKY	0,02 (*) (P)	0,05 (*)		0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
a) šalát a podobné plodiny			0,1						
žerucha									
valeriánka poľná						5			
šalát									
endívia (širokolistá)									
rukola									
listy a stonky listovej zeleniny									
iné						0,02 (*)			
b) špenát a podobné plodiny			0,01 (*)			0,02 (*)			
špenát									
mangold									
iné									
c) potočnica lekárska			0,01 (*)			0,02 (*)			
d) witloof (belgická čakanka)		1	0,01 (*)			0,02 (*)			
e) bylinky			0,01 (*)			0,02 (*)			
trebuľka									
cesnak pažítkový									
petržlenová vňať									
zelerová vňať									
iné									
vi) STRUKOVINY (čerstvé)		0,05 (*)	0,01 (*)				0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
fazuľa (so strukmi)	0,5 (P)			0,2	0,1 (*)	0,3			

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL	Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobín	Tiaben-dazol	Abamektín (zmes avarmectínu B 1a, avarmectínu B 1b a delta-8,9 izomér avarmectínu B1a)	Zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím	Metyltiofanát	Myklobutanyl	Glyfozát	Trimetyl-sulfónium, kation ako dôsledok použitia glyfozátu	Fenpro-pimorf
fazuľa (bez strukov)									
hrach (so strukmi)				0,2	0,1 (*)				
hrach (bez strukov)									
iné	0,02 (*) (P)			0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			
vii) STONKOVÁ ZELENINA (čerstvá)	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
špargľa									
artičoky bodliakové (kardy)									
zeler stonkový									
fenikel									
artičoky pravé						0,5			
pór									1
rebarbora									
iné						0,02 (*)			0,05 (*)
viii) HUBY	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)
a) pestované huby		10					0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
b) divorastúce huby		0,05 (*)					50 (P)	20 (P)	
3. **Strukoviny**	0,02 (*) (P)	0,05 (*)	0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)		0,05 (*) (P)	0,05 (*)
fazuľa							2 (P)		
šošovica									
hrach							10 (P)		
vlčí bôb							10 (P)		
iné							0,1 (*) (P)		
4. **Olejnaté semená**	0,05 (*) (P)	0,05 (*)	0,02 (*)			0,05 (*)			0,05 (*)
ľanové semeno							10 (P)		
arašidy									
mak									
sezamové semená									

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL	Rezíduá pesticídov a maximálna hladina rezíduí (mg/kg)								
	Trifloxy-strobín	Tiaben-dazol	Abamektín (zmes avarmectínu B 1a, avarmectínu B 1b a delta-8,9 izomér avarmectínu B1a)	Zmes benomylu a karbendazímu vyjadrená ako karbendazím	Metyltiofanát	Myklobutanyl	Glyfozát	Trimetyl-sulfónium, kation ako dôsledok použitia glyfozátu	Fenpro-pimorf
slnečnicové semená							20 (P)		
semená repky							10 (P)		
sójové bôby				0,2	0,3		20 (P)	10 (P)	
horčicové semená							10 (P)		
semená bavlny							10 (P)		
semená konope									
iné				0,1 (*)	0,1 (*)		0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	
5. **Zemiaky**	0,02 (*) (P)		0,01 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,5 (P)	0,05 (*) (P)	0,05 (*)
skoré zemiaky		0,05 (*)							
konzumné zemiaky		15							
6. **Čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu *Camellia sinensis*)**	0,05 (*) (P)	0,1 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)	0,1 (*)	0,05 (*)	2 (P)	0,05 (*) (P)	0,1 (*)
7. **Chmeľové šištičky (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku**	30 (P)	0,1 (*)	0,05	0,1 (*)	0,1 (*)	2	0,1 (*) (P)	0,05 (*) (P)	10

(*) Označuje dolnú hranicu analytického určenia.
(P) Označuje, že maximálna úroveň rezíduí je stanovená prechodne v súlade s článkom 4 ods. 1 písm. f) smernice 91/414/EHS.“