# VERORDENING (EEG) Nr. 2507/87 VAN DE COMMISSIE

**van 18 augustus 1987**

**houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1908/84 tot vaststelling van de referentiemethoden voor de bepaling van de kwaliteit van granen**

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2727/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1900/87 (2), en met name op de artikelen 7 en 8,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2731/75 van de Raad van 29 oktober 1975 tot vaststelling van de standaardkwaliteit van zachte tarwe, rogge, gerst, maïs, sorgho en durum tarwe (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2094/87 (4), en met name op artikel 6,

Overwegende dat bij Verordening (EEG) nr. 1908/84 van de Commissie (5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2281/86 (6), de verschillende methoden zijn vastgesteld voor de bepaling van de kwaliteit van voor interventie aangeboden graan ; dat die verordening moet worden aangevuld ten aanzien van de bepaling van het gehalte aan korrels van durum tarwe die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

*Artikel 1*

Verordening (EEG) nr. 1908/84 wordt als volgt gewijzigd :

1. In artikel 1 wordt een achtste streepje toegevoegd, luidende :

   „— de referentiemethode voor het bepalen van het gehalte aan korrels van durum tarwe die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren, is de in bijlage V omschreven methode.".

2. Er wordt een bijlage V toegevoegd, overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Zij is van toepassing met ingang van 1 juli 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 18 augustus 1987.

*Voor de Commissie*
Frans ANDRIESSEN
*Vice-Voorzitter*

(1) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 1.
(2) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 40.
(3) PB nr. L 281 van 1. 11. 1975, blz. 22.
(4) PB nr. L 196 van 17. 7. 1987, blz. 1.
(5) PB nr. L 178 van 5. 7. 1984, blz. 22.
(6) PB nr. L 200 van 23. 7. 1986, blz. 7.

*BIJLAGE*

*„BIJLAGE V*

**BEPALING VAN HET GEHALTE AAN KORRELS DIE GEHEEL OF GEDEELTELIJK HUN GLAZIG UITERLIJK HEBBEN VERLOREN, MET GEBRUIKMAKING VAN DE KORRELSNIJDER VAN POHL**

PRINCIPE

Slechts een deel van het monster wordt gebruikt voor de bepaling van het gehalte aan korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren. De korrels worden gesneden met behulp van de korrelsnijder van Pohl.

APPARATUUR

— Korrelsnijder van Pohl.
— Pincetten, scalpel.
— Kom of bakje.

WERKWIJZE

a) Het onderzoek wordt verricht op een monster van 100 gram, waaruit eerst de bestanddelen worden afgezonderd die geen basisgraan zijn van onberispelijke kwaliteit.

b) Het monster wordt overgebracht in een kom en goed gehomogeniseerd.

c) Nadat een plaat in de korrelsnijder is gebracht, wordt een handvol korrels over het rooster uitgespreid. Vervolgens moet zolang worden geklopt tot zich nog slechts één korrel in elk roostervakje bevindt. Het mobiele gedeelte wordt vervolgens neergeklapt om de korrels vast te houden, zodat zij kunnen worden doorgesneden.

d) Deze bereiding van plaatjes moet worden herhaald totdat ten minste 600 korrels zijn doorgesneden.

e) Het aantal korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren, wordt geteld.

f) Vervolgens wordt het percentage berekend van de korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren.

WEERGAVE VAN DE RESULTATEN

I = massa bestanddelen die geen basisgraan van onberispelijke kwaliteit zijn, in gram.

M = percentage korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren ten opzichte van het onderzochte aantal zuivere korrels.

RESULTAAT

Aantal korrels die geheel of gedeeltelijk hun glazig uiterlijk hebben verloren, uitgedrukt als percentage van het monster :

$$\frac{M \times (100 - I)}{100} = \ldots"$$