II

*(Neleģislatīvi akti)*

# DIREKTĪVAS

## KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS DIREKTĪVA (ES) 2020/177

**(2020. gada 11. februāris),**

**ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/401/EEK par lopbarības augu sēklu tirdzniecību ([1]) un jo īpaši tās 21.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1966. gada 14. jūnija Direktīvu 66/402/EEK par graudaugu sēklu tirdzniecību ([2]) un jo īpaši tās 21.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1968. gada 9. aprīļa Direktīvu 68/193/EEK par vīnogulāju veģetatīvās pavairošanas materiāla tirdzniecību ([3]) un jo īpaši tās 17.a pantu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 20. jūlija Direktīvu 98/56/EK par dekoratīvo augu pavairošanas materiāla tirdzniecību ([4]) un jo īpaši tās 5. panta 5. punktu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/55/EK par dārzeņu sēklu tirdzniecību ([5]) un jo īpaši tās 45. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/56/EK par sēklas kartupeļu tirdzniecību ([6]) un jo īpaši tās 18. panta c) punktu un 24. pantu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 13. jūnija Direktīvu 2002/57/EK par eļļas augu un šķiedraugu sēklu tirdzniecību ([7]) un jo īpaši tās 24. pantu,

---

([1]) OV 125, 11.7.1966., 2298. lpp.
([2]) OV 125, 11.7.1966., 2309. lpp.
([3]) OV L 93, 17.4.1968., 15. lpp.
([4]) OV L 226, 13.8.1998., 16. lpp.
([5]) OV L 193, 20.7.2002., 33. lpp.
([6]) OV L 193, 20.7.2002., 60. lpp.
([7]) OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.

ņemot vērā Padomes 2008. gada 15. jūlija Direktīvu 2008/72/EK par tāda dārzeņu pavairošanas un stādāmā materiāla tirdzniecību, kas nav sēklas ([8]), un jo īpaši tās 4. pantu,

ņemot vērā Padomes 2008. gada 29. septembra Direktīvu 2008/90/EK par tirdzniecību ar augļaugu pavairošanas materiālu un augļaugiem, kas paredzēti augļu ražošanai ([9]), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 ([10]) ir jāpiemēro no 2019. gada 14. decembra. Lai tās noteikumi kļūtu pilnībā piemērojami, ir jāpieņem īstenošanas noteikumi, kas reglamentēs kaitīgos organismus, augus, augu produktus un citus objektus, kā arī attiecīgas prasības, kas vajadzīgas, lai aizsargātu Savienības teritoriju no fitosanitāriem riskiem.

(2) Ņemot vērā iepriekš minēto, būtu jāparedz konkrēti noteikumi Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) saraksta izveidei un pasākumi, kas ļautu novērst šādu organismu klātbūtni attiecīgajos stādīšanai paredzētajos augos.

(3) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (*EFSA*) atkārtoti novērtēja kaitīgos organismus, kas norādīti Padomes Direktīvas 2000/29/EK ([11]) I pielikuma A daļā un II pielikuma A daļas I iedaļā, lai izveidotu Savienības karantīnas organismu sarakstu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 5. pantu. Atkārtota novērtēšana bija jāveic, lai atjauninātu šādu kaitīgo organismu fitosanitāro statusu saskaņā ar jaunākajiem tehniskajiem un zinātniskajiem sasniegumiem un novērtētu to atbilstību minētās regulas 3. pantā noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz Savienības teritoriju un tās I pielikuma 1. iedaļā noteiktajiem kritērijiem.

(4) Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācija (*EPPO*) atkārtoti novērtēja kaitīgos organismus, kas norādīti Direktīvas 2000/29/EK II pielikuma A daļas II iedaļā, kultūraugus, kas minēti Direktīvas 66/401/EEK I pielikuma 3. punktā, un kaitīgos organismus, kas minēti tās I pielikuma 6. punktā, kaitīgos organismus, kas minēti Direktīvas 66/402/EEK II pielikuma 3. punktā, Direktīvas 68/193/EEK I pielikumā un II pielikuma 4. punktā, kaitīgos organismus, kuri norādīti aktos, kas pieņemti saskaņā ar Direktīvas 98/56/EK 5. panta 5. punktu, Direktīvas 2002/55/EK II pielikumu, Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu, kā arī kaitīgos organismus, kuri norādīti aktos, kas pieņemti saskaņā ar minētās direktīvas 18. panta c) punktu, Direktīvas 2002/57/EK I pielikuma 4. punktu un II pielikuma I daļas 5. punktu un Direktīvas 2008/72/EK 4. pantu.

(5) Pamatojoties uz šo atkārtoto novērtējumu, attiecīgie RNKO, stādīšanai paredzētie augi un šādos augos esošo RNKO klātbūtnes pieļaujamie līmeņi ir norādīti Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 ([12]). Savukārt RNKO klātbūtnes novēršanas pasākumi ir noteikti minētās īstenošanas regulas V pielikumā.

(6) Direktīvās 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK, 2002/57/EK, 93/49/EEK, 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvās 2014/21/ES un 2014/98/ES var būt norādīti papildu pasākumi attiecībā uz RNKO, kas ir svarīgi to piemērošanas jomā.

(7) Tāpēc minētās direktīvas būtu jāatjaunina, lai pielāgotu vai svītrotu noteikumus par dažiem kaitīgajiem organismiem, kuri klasificēti par RNKO saskaņā ar Regulu (ES) 2016/2031.

---

([8]) OV L 205, 1.8.2008., 28. lpp.
([9]) OV L 267, 8.10.2008., 8. lpp.
([10]) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).
([11]) Padomes 2000. gada 8. maija Direktīva 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp.).
([12]) Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regula (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019, 1. lpp.).

(8) Skaidrības labad un lai pielāgotos jaunajam tiesiskajam regulējumam, minētajās direktīvās būtu jānorāda, ka attiecīgā gadījumā sēklām vai citam augu reproduktīvajam materiālam ir jāatbilst arī prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem, kas noteiktas īstenošanas aktos, kuri pieņemti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 5. panta 2. punktu, 32. panta 3. punktu, 37. panta 2. un 4. punktu, 40. panta 2. punktu, 41. panta 2. punktu, 53. panta 2. punktu, 54. panta 2. punktu, 72. panta 1. punktu, 73. pantu, 79. panta 2. punktu un 80. panta 2. punktu, kā arī pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar minētās regulas 30. panta 1. punktu. Šāda norāde būtu arī jāiekļauj Direktīvā 66/401/EEK, lai gan tajā nav noteiktas sīkākas prasības attiecībā uz konkrētiem RNKO.

(9) Lai veicinātu dažādo lietoto terminu saskaņotību un konsekvenci, minētajās direktīvās būtu jānorāda, ka attiecīgā gadījumā sēklām vai citam augu reproduktīvajam materiālam vajadzētu būt praktiski brīvam no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina šādu sēklu vai augu reproduktīvā materiāla lietderību un pazemina to kvalitāti.

(10) Konkrētāk, lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgo RNKO sarakstu un pieļaujamajiem līmeņiem, ievērojot Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumu, Direktīvas 66/402/EEK I un II pielikumā būtu jāatjaunina atsauces uz kaitīgajiem organismiem un attiecīgajiem pieļaujamajiem līmeņiem.

(11) Direktīva 68/193/EEK būtu jāatjaunina, iekļaujot tajā jaunas prasības, kas pielāgotas zinātnisko atziņu un metožu attīstībai vīnogulāju ražošanas jomā, kā arī tādas jaunas prasības, kuru pamatā ir *EPPO* veiktais RNKO novērtējums. Šādām prasībām būtu jāaizstāj pašreizējās veselības prasības stādaudzētavām un jāietver stādaudzētavām izvirzītās prasības attiecībā uz augsni un audzēšanas apstākļiem, prasības ražošanas vietu daļām, pārbaudēm, RNKO sarakstiem un attiecīgie pasākumi RNKO klātbūtnes novēršanai. Tāpēc minētās direktīvas I un II pielikums būtu attiecīgi jāgroza.

(12) Lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgajiem RNKO, stādīšanai paredzētajiem augiem un šādos augos pieļaujamajiem līmeņiem, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā, Direktīvu 93/49/EEK un 93/61/EEK pielikumos iekļautie RNKO, kaitīgo organismu un augu saraksti būtu jāatjaunina un jāaizstāj ar jauniem sarakstiem.

(13) Minētajās direktīvās būtu arī jānosaka, ka attiecīgajam pavairošanas materiālam vismaz vizuālā pārbaudē ražošanas vietā vajadzētu būt praktiski brīvam no visiem minēto direktīvu attiecīgajos pielikumos norādītajiem kaitīgajiem organismiem attiecībā uz konkrēto pavairošanas materiālu. Tas nepieciešams, lai ražošanas līmenī nodrošinātu pieeju, kas ir mazāk stingra nekā pieeja, ko piemēro tirgojamā pavairošanas materiāla prasībām.

(14) Lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgajiem RNKO, stādīšanai paredzētajiem augiem un šādos augos pieļaujamajiem līmeņiem, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā, kukaiņu saraksts Direktīvas 2002/55/EK II pielikuma 3. punkta b) apakšpunktā būtu jāaizstāj ar jaunu sarakstu.

(15) Lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgajiem RNKO un pieļaujamajiem līmeņiem bāzes sēklas kartupeļos un sertificētas sēklas kartupeļos, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā, Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumā iekļautais kaitīgo organismu saraksts būtu jāaizstāj ar jaunu sarakstu.

(16) Atsauces uz kaitīgajiem organismiem, attiecīgajiem pieļaujamajiem līmeņiem un konkrētiem nosacījumiem attiecīgajiem stādīšanai paredzētajiem augiem Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES pielikumā būtu attiecīgi jāgroza.

(17) Lai nodrošinātu konsekvenci ar attiecīgajiem RNKO, stādīšanai paredzētajiem augiem un šādos augos pieļaujamajiem līmeņiem, kā norādīts Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā, Direktīvas 2002/57/EK I un II pielikumā iekļautais kaitīgo organismu saraksts būtu jāaizstāj ar jaunu sarakstu.

(18) *EPPO* arī secināja, ka divi augsnes kaitīgie organismi, proti, *Phialophora gregata* un *Phytophthora megasperma*, kuri ar augsni varētu tikt pārnesti uz sojas pupu sēklām, nebūtu jāiekļauj sarakstā kā RNKO. Tāpēc inertā viela vairs nerada risku saistībā ar šiem kaitīgajiem organismiem, un prasība par šādu vielu sojas pupu sēklās no minētās direktīvas darbības jomas būtu jāsvītro.

(19) Īstenošanas direktīva 2014/98/ES būtu turpmāk jāatjaunina, iekļaujot tajā jaunas prasības, kas ataino jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas augļu pavairošanas materiāla un augļaugu ražošanas jomā, pamatojoties uz *EPPO* veikto RNKO novērtējumu. Pašreizējās veselības prasības dažādām pavairošanas materiāla kategorijām būtu jāatjaunina un jāiekļauj jauni RNKO kā arī pasākumi saistībā ar šiem RNKO, un jāietver prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam, lai novērstu visu sarakstā iekļauto RNKO klātbūtni attiecīgajos stādīšanai paredzētajos augos.

(20) Laikā, kad tika pieņemta Īstenošanas direktīva 2014/98/ES, nebija skaidra nošķīruma starp materiālu, kas atrodas ražošanas vietas daļās, un pavairošanas materiālu, ko paredzēts tirgot. Saistībā ar Īstenošanas direktīvā 2014/98/ES iekļautajām veselības prasībām dažādām pavairošanas materiāla kategorijām būtu skaidri jānodala veselības prasības mātesaugiem no veselības prasībām pavairošanas materiālam, kas atrodas ražošanas vietas daļās, un no prasībām pavairošanas materiālam, ko paredzēts tirgot. Tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam, to vizuāli apskatot, vajadzētu būt brīvam no visiem attiecīgajai ģintij un sugai raksturīgajiem RNKO, kas norādīti Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā. Šā iemesla dēļ Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā paredzētais pieļaujamais tolerances līmenis visiem RNKO ir nulle. Bāzes kategorijas, sertificētās kategorijas un *Conformitas Agraria Communitatis* (*CAC*) kategorijas mātesaugiem un pavairošanas materiālam, kas atrodas ražošanas vietas daļās, var būt konkrētu RNKO simptomi ar nosacījumu, ka šādiem mātesaugiem un pavairošanas materiālam ir veikti atbilstoši pasākumi. Minētie pasākumi var būt mātesaugu un pavairošanas materiāla nošķiršana atsevišķi no cita tās pašas kategorijas pavairošanas materiāla vai izraušana un attiecīgā gadījumā minētā materiāla iznīcināšana.

(21) Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES 10., 16., 21. pantā un tās I pielikuma B daļā ir norādīti pieļaujamie līmeņi bez precizējuma, uz kura veida materiālu tie attiecas. Skaidrības labad Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 IV pielikumā visiem tirdzniecībai paredzētajā augļaugu pavairošanas materiālā un augļaugos esošo RNKO pieļaujamais tolerances līmenis ir nulle. Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES 10., 16. un 21. pants būtu attiecīgi jāatjaunina atbilstīgi minētajai pieejai, un tās I pielikuma B daļā norādītie RNKO klātbūtnes pieļaujamie līmeņi būtu jāsvītro.

(22) Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES I un II pielikumā būtu jāiekļauj jauni RNKO, bet tās III pielikumā konkrēti augļu sugu nosaukumi būtu jāatjaunina.

(23) Turklāt būtu jāatjaunina Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES IV pielikuma prasības, ņemot vērā *EPPO* veikto novērtējumu.

(24) Šai direktīvai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*, lai kompetentajām iestādēm un profesionālajiem operatoriem būtu pietiekami daudz laika sagatavoties tās transponēšanai un piemērošanai.

(25) Lai kompetentajām iestādēm un profesionālajiem operatoriem dotu pietiekami daudz laika šīs direktīvas noteikumu izpildei, tā būtu jāpiemēro no 2020. gada 1. jūnija.

(26) Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

*1. pants*

**Grozījumi Direktīvā 66/401/EEK**

Direktīvas 66/401/EEK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas I pielikumā.

*2. pants*

**Grozījumi Direktīvā 66/402/EEK**

Direktīvas 66/402/EEK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas II pielikumā.

*3. pants*

**Grozījumi Direktīvā 68/193/EEK**

Direktīvas 68/193/EEK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas III pielikumā.

*4. pants*

**Grozījumi Direktīvā 93/49/EEK**

Direktīvu 93/49/EEK groza šādi:

1) direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu:

*"3. pants*

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls vismaz vizuālā pārbaudē ražošanas vietā ir atzīts par praktiski brīvu no visiem pielikumā norādītajiem kaitīgajiem organismiem attiecībā uz konkrēto dekoratīvo augu pavairošanas materiālu.

Reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) klātbūtne dekoratīvo augu pavairošanas materiālā, kas tiek tirgots, vismaz vizuālā pārbaudē nepārsniedz attiecīgos pielikumā noteiktos pieļaujamos līmeņus.

Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls vismaz vizuālā pārbaudē ir praktiski brīvs no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kas nav kaitīgie organismi, kuri attiecībā uz šādu dekoratīvo augu pavairošanas materiālu ir norādīti pielikumā, un kuri samazina šāda materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti, vai jebkādām šādu organismu pazīmēm vai simptomiem.

Turklāt materiāls atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).";

2) direktīvas 3.a pantu svītro;

3) direktīvas pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas IV pielikuma tekstu.

*5. pants*

**Grozījumi Direktīvā 93/61/EEK**

Direktīvu 93/61/EEK groza šādi:

1) direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu:

*"3. pants*

Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls vismaz vizuālā pārbaudē ražošanas vietā ir atzīts par praktiski brīvu no visiem pielikumā norādītajiem kaitīgajiem organismiem attiecībā uz konkrēto dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu.

Reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) klātbūtne dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā, kas tiek tirgots, vismaz vizuālā pārbaudē nepārsniedz attiecīgos pielikumā noteiktos pieļaujamos līmeņus.

Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls vizuālā pārbaudē ir atzīts par praktiski brīvu no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kas nav kaitīgie organismi, kuri attiecībā uz šādu dārzeņu pavairošanas un stādāmo materiālu ir norādīti pielikumā, un kuri samazina šāda materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Turklāt dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem, kuras paredzētas Regulā (ES) 2016/2031 (*) un īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot minēto regulu, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).";

2) direktīvas pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas V pielikuma tekstu.

*6. pants*

**Grozījumi Direktīvā 2002/55/EK**

Direktīvas 2002/55/EK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas VI pielikumā.

*7. pants*

**Grozījumi Direktīvā 2002/56/EK**

Direktīvas 2002/56/EK I un II pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas VII pielikuma tekstu.

*8. pants*

**Grozījumi Direktīvā 2002/57/EK**

Direktīvas 2002/57/EK I un II pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas VIII pielikumā.

*9. pants*

**Grozījumi Īstenošanas direktīvā 2014/21/ES**

Īstenošanas direktīvu 2014/21/ES groza šādi:

1) direktīvas 2. pantu aizstāj ar šādu:

"*2. pants*

**Minimālie nosacījumi pirmsbāzes sēklas kartupeļiem**

1. Dalībvalstis nodrošina, ka pirmsbāzes sēklas kartupeļi atbilst šādiem minimālajiem nosacījumiem:

a) tie iegūti no mātesaugiem, kuri ir brīvi no šādiem kaitīgajiem organismiem: *Pectobacterium* spp., *Dickeya* spp., *Candidatus* Liberibacter *solanacearum*, *Candidatus* Phytoplasma *solani*, kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds, kartupeļu lapu ritināšanās vīruss, kartupeļu A tipa vīruss, kartupeļu M tipa vīruss, kartupeļu S tipa vīruss, kartupeļu X tipa vīruss un kartupeļu Y tipa vīruss;

b) šķirnei netipisko augu un citu šķirņu augu skaits stādījumā kopā nepārsniedz 0,01 %;

c) uz lauka ir ne vairāk kā četras paaudzes;

d) reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) vai to izraisīto simptomu klātbūtne pirmsbāzes sēklas kartupeļos ir tādā apjomā, kas nepārsniedz tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumos |
|---|---|
| Melnkāja (*Dickeya* Samson *et al*. spp. [1DICKG], *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp. [1PECBG]) | 0 % |
| *Candidatus* Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS] | 0 % |
| *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO] | 0 % |
| Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,<br>un<br>simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00] | 0,1 % |
| Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] | 0 % |

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu ataudzējumā |
|---|---|
| Vīrusu infekciju simptomi | 0,5 % |

2. Dalībvalstis nodrošina, ka pirmsbāzes sēklas kartupeļus var tirgot kā "Savienības kategoriju PBTC" un "Savienības kategoriju PB" saskaņā ar pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

3. Atbilstību šā panta 1. punkta b) un d) apakšpunkta prasībām nosaka, izmantojot oficiālas lauka pārbaudes. Šaubu gadījumā šādas pārbaudes papildina ar oficiālām lapu pārbaudēm.

Ja izmanto mikropavairošanas metodes, atbilstību 1. punkta a) apakšpunktam nosaka, veicot mātesauga oficiālu testēšanu vai šādu testēšanu veicot oficiālā uzraudzībā.

Ja izmanto klonu selekcijas metodes, atbilstību 1. punkta a) apakšpunktam nosaka, veicot klonu oficiālu testēšanu vai šādu testēšanu veicot oficiālā uzraudzībā.";

2) direktīvas 3. pantu aizstāj ar šādu:

*"3. pants*

**Minimālie nosacījumi pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijām**

Dalībvalstis nodrošina, ka pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijas atbilst šādiem minimālajiem nosacījumiem:

a) augsnes un svešķermeņu klātbūtne nepārsniedz 1,0 % no masas;

b) kartupeļi, kurus skārusi puve, kas nav gaišā vai tumšā gredzenpuve, nepārsniedz 0,2 % no masas;

c) kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 % no masas;

d) kartupeļi, kuriem parastais kraupis skāris vairāk nekā trešo daļu no bumbuļu virsmas, nepārsniedz 5,0 % no masas;

e) bumbuļi, kas sačokurojušies pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ, nepārsniedz 0,5 % no masas;

f) pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijas atbilst šādām prasībām par RNKO klātbūtni vai to izraisītām slimībām, kā norādīts tabulā:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās |
|---|---|
| *Candidatus* Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS] | 0 % |
| *Ditylenchus destructor* Thorne [DITYDE] | 0 % |
| Melnais kraupis, ko izraisījis *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas | 1,0 % |
| Irdenais kraupis, ko izraisījis *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas | 1,0 % |

g) kartupeļu kopējais īpatsvars, kā minēts šā punkta b) līdz f) apakšpunktā, nepārsniedz 6,0 % no masas.";

3) direktīvas pielikumu aizstāj atbilstoši šīs direktīvas IX pielikumā noteiktajam.

*10. pants*

**Grozījumi Īstenošanas direktīvā 2014/98/ES**

Īstenošanas direktīvu 2014/98/ES groza šādi:

1) direktīvas 10. pantu aizstāj ar šādu:

"*10. pants*

**Veselības prasības attiecībā uz pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālu**

1. Veicot vizuālo pārbaudi telpās, laukos un partijās, konstatē, ka pirmsbāzes mātesaugs vai pirmsbāzes materiāls ir bez reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kas norādīti I un II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, un uz šādu mātesaugu un materiālu attiecas IV pielikuma prasības. Šādu vizuālo pārbaudi veic atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no pirmsbāzes mātesauga vai pirmsbāzes materiāla un testē tos, lai noteiktu, vai tajos ir RNKO, kas norādīti II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības.

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no attiecīgā pirmsbāzes mātesauga vai pirmsbāzes materiāla un testē tos.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajai paraugu ņemšanai un testēšanai dalībvalstis piemēro *EPPO* noteiktos vai citus starptautiski atzītos protokolus. Ja šādu protokolu nav, atbildīgā oficiālā iestāde piemēro attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Tādā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šādus protokolus dara pieejamus pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs paraugus iesniedz laboratorijām, kuras atbildīgā oficiālā iestāde ir oficiāli atzinusi.

3. Ja testējot attiecīgo ģinti vai sugu, tai tiek atrasts jebkurš no I un II pielikumā norādītajiem RNKO, piegādātājs nošķir invadēto pirmsbāzes mātesaugu vai pirmsbāzes materiālu atsevišķi no citiem pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiāla saskaņā ar 3. panta 3. punktu vai 4. panta 3. punktu vai veic atbilstošus pasākumus saskaņā ar IV pielikumu.

4. Pasākumi attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, ar kuriem nodrošina 1. punktā minēto prasību izpildi, ir noteikti IV pielikumā.

5. Šā panta 1. punktu nepiemēro pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālam krioprezervācijas laikā.";

2) direktīvas 11. panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

"**Augsnes prasības attiecībā uz pirmsbāzes mātesaugiem un pirmsbāzes materiālu**";

3) direktīvas 16. pantu aizstāj ar šādu:

"*16. pants*

**Veselības prasības attiecībā uz bāzes mātesaugiem un bāzes materiālu**

1. Veicot vizuālo pārbaudi telpās, laukos un partijās, konstatē, ka bāzes mātesaugs vai bāzes materiāls ir bez RNKO, kas norādīti I un II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības. Šādu vizuālo pārbaudi veic atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no bāzes mātesauga vai bāzes materiāla un testē tos, lai noteiktu, vai tajos ir RNKO, kas norādīti II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības.

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no attiecīgā bāzes mātesauga vai bāzes materiāla un testē tos.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajai paraugu ņemšanai un testēšanai dalībvalstis piemēro *EPPO* noteiktos vai citus starptautiski atzītos protokolus. Ja šādu protokolu nav, atbildīgā oficiālā iestāde piemēro attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Šajā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šos protokolus dara pieejamus citām dalībvalstīm un Komisijai.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs paraugus iesniedz laboratorijām, kuras atbildīgā oficiālā iestāde ir oficiāli atzinusi.

3. Ja testējot attiecīgo ģinti vai sugu, tai tiek atrasts jebkurš no I un II pielikumā norādītajiem RNKO, piegādātājs nošķir invadēto bāzes mātesaugu vai bāzes materiālu atsevišķi no citiem bāzes mātesaugiem un bāzes materiāla saskaņā ar 15. panta 7. vai 8. punktu vai veic atbilstošus pasākumus saskaņā ar IV pielikumu.

4. Pasākumi attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, ar kuriem nodrošina 1. punktā minēto prasību izpildi, ir noteikti IV pielikumā.

5. Šā panta 1. punktu nepiemēro bāzes mātesaugiem un bāzes materiālam krioprezervācijas laikā.";

4) direktīvas 17. panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

"**Augsnes prasības attiecībā uz bāzes mātesaugiem un bāzes materiālu**";

5) direktīvas 21. pantu aizstāj ar šādu:

"*21. pants*

**Veselības prasības attiecībā uz sertificētiem mātesaugiem un sertificētu materiālu**

1. Veicot vizuālo pārbaudi telpās, laukos un partijās, konstatē, ka sertificēts mātesaugs vai sertificēts materiāls ir bez RNKO, kas norādīti I un II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības. Šādu vizuālo pārbaudi veic atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no sertificētā mātesauga vai sertificētā materiāla un testē tos, lai noteiktu, vai tajos ir RNKO, kas norādīti II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, un uz šādu mātesaugu vai materiālu attiecas IV pielikuma prasības.

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto minēto RNKO klātbūtni, atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs ņem paraugus no attiecīgā sertificētā mātesauga vai sertificētā materiāla un testē tos.

2. Šā panta 1. punktā paredzētajai paraugu ņemšanai un testēšanai dalībvalstis piemēro *EPPO* noteiktos vai citus starptautiski atzītos protokolus. Ja šādu protokolu nav, atbildīgā oficiālā iestāde piemēro attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Šajā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šos protokolus dara pieejamus citām dalībvalstīm un Komisijai.

Atbildīgā oficiālā iestāde un vajadzības gadījumā piegādātājs paraugus iesniedz laboratorijām, kuras atbildīgā oficiālā iestāde ir oficiāli atzinusi.

3. Ja testējot attiecīgo ģinti vai sugu, tai tiek atrasts jebkurš no I un II pielikumā norādītajiem RNKO, piegādātājs nošķir invadēto sertificēto mātesaugu vai sertificēto materiālu atsevišķi no citiem sertificētiem mātesaugiem un sertificētā materiāla saskaņā ar 20. panta 7. vai 8. punktu vai veic atbilstošus pasākumus saskaņā ar IV pielikumu.

4. Pasākumi attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, ar kuriem nodrošina 1. punktā minēto prasību izpildi, ir noteikti IV pielikumā.

5. Šā panta 1. punktu nepiemēro sertificētiem mātesaugiem un sertificētam materiālam krioprezervācijas laikā.";

6) direktīvas 22. panta nosaukumu aizstāj ar šādu:

"**Augsnes prasības attiecībā uz sertificētiem mātesaugiem un sertificētu materiālu**";

7) direktīvas 22. panta 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

"Ja vien nav norādīts citādi, paraugu ņemšanu un testēšanu neveic sertificētiem augļaugiem.";

8) direktīvas 26. pantu aizstāj ar šādu:

"*26. pants*

**Veselības prasības attiecībā uz *CAC* materiālu**

1. Piegādātājam ražošanas posmā veicot *CAC* materiāla vizuālo pārbaudi telpās, laukos un partijās, konstatē, ka *CAC* materiāls ir praktiski bez kaitīgajiem organismiem, kas norādīti I un II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, ja vien IV pielikumā nav noteikts citādi.

Piegādātājs ņem paraugus no identificētā materiālu avota vai *CAC* materiāla un testē tos, lai noteiktu, vai tajos ir RNKO, kas norādīti II pielikumā attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju, un uz šādiem materiāliem attiecas IV pielikuma prasības.

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, piegādātājs ņem paraugus no attiecīgā identificētā materiālu avota vai *CAC* materiāla un testē tos.

Pēc ražošanas posma beigām partijās esošu *CAC* pavairošanas materiālu un *CAC* augļaugus drīkst tirgot tikai tad, ja piegādātāja veiktajā vizuālajā pārbaudē ir konstatēts, ka tie ir brīvi no I un II pielikumā norādīto kaitīgo organismu pazīmēm vai simptomiem.

Piegādātājs attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu un kategoriju veic pasākumus, ar kuriem nodrošina 1. punktā minēto prasību izpildi, saskaņā ar IV pielikumu.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro *CAC* materiālam krioprezervācijas laikā.";

9) direktīvā iekļauj 27.a pantu:

"*27.a pants*

**Prasības attiecībā uz ražošanas vietas daļu, ražošanas vietu vai apgabalu**

Pavairošanas materiālu un augļaugus ražo, ievērojot ne vien 9., 10., 11., 16., 17., 21., 22. un 26. pantā noteiktās veselības un augsnes prasības, bet arī IV pielikuma prasības attiecībā uz ražošanas vietas daļu, ražošanas vietu vai apgabalu, lai ierobežotu minētajā pielikumā norādīto RNKO klātbūtni attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu.";

10) direktīvas I–IV pielikumu aizstāj ar šīs direktīvas X pielikuma tekstu.

*11. pants*

**Transponēšana**

1. Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz 2020. gada 31. maijam. Tās tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2. Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

*12. pants*

**Stāšanās spēkā**

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

*13. pants*

**Adresāti**

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 11. februārī

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

*I PIELIKUMS*

**Grozījumi Direktīvā 66/401/EEK**

Direktīvu 66/401/EEK groza šādi:

1) direktīvas I pielikuma 5. punktu aizstāj ar šādu:

"Kultūra ir praktiski brīva no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina sēklu lietderību un pazemina to kvalitāti.

Kultūra arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne kultūrā un katrā attiecīgajā kultūras kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga) | Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai | Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai |
|---|---|---|---|---|
| *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN] | *Medicago sativa* L. | 0 % | 0 % | 0 % |
| *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | *Medicago sativa* L. | 0 % | 0 % | 0 % |

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).";

2) direktīvas II pielikuma I iedaļas 3. punktu aizstāj ar šādu:

"Sēklas ir praktiski brīvas no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina sēklu lietderību un pazemina to kvalitāti.

Sēklas arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un RNKO, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga) | Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām |
|---|---|---|---|---|
| *Clavibacter michiganensis* ssp. *Insidiosus* (McCulloch 1925) Davis *et al.* [CORBIN] | *Medicago sativa* L. | 0 % | 0 % | 0 % |
| *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | *Medicago sativa* L. | 0 % | 0 % | 0 %". |

*II PIELIKUMS*

**Grozījumi Direktīvā 66/402/EEK**

Direktīvu 66/402/EEK groza šādi:

1) direktīvas I pielikumu groza šādi:

(a) pielikuma 3. punkta A daļu aizstāj ar šādu:

"A. ***Oryza sativa**:*

to augu skaits, kuri atpazīstami kā acīmredzami savvaļas augi vai sarkano graudu augi, nepārsniedz:

— nulli bāzes sēklu ražošanai,

— vienu uz 100 $m^2$ sertificētu pirmās un otrās paaudzes sēklu ražošanai.";

b) pielikuma 6. punktu aizstāj ar šādu:

"6. Kultūraugs ir praktiski brīvs no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina lietderību un pazemina to kvalitāti.

Kultūraugs arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne kultūraugos atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

**Sēnes un oomicētes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga) | Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai | Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai |
|---|---|---|---|---|
| *Gibberella fujikuroi* Sawada [GIBBFU] | *Oryza sativa* L. | Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga stādu reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā divi augi ar simptomiem uz 200 m2. | Piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga stādu reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā divi augi ar simptomiem uz 200 m2. | Pirmās paaudzes sertificētās sēklas (C1):<br><br>piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga stādu reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā četri augi ar simptomiem uz 200 m2.<br><br>Otrās paaudzes sertificētās sēklas (C2):<br><br>piemērotos laikos veiktās lauka pārbaudēs katra kultūrauga stādu reprezentatīvajā paraugā ir atrasti ne vairāk kā astoņi augi ar simptomiem uz 200 m2. |

| **Nematodes** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RNKO vai to izraisītie simptomi | Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga) | Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai | Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai |
| *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] | *Oryza sativa* L. | 0 % | 0 % | 0 % |

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).";

2) direktīvas II pielikumu groza šādi:

(a) pielikuma 3. punktu aizstāj ar šādu:

"3. Sēklas ir praktiski brīvas no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina sēklu lietderību un pazemina to kvalitāti.

Sēklas arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un RNKO, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

| **Nematodes** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RNKO vai to izraisītie simptomi | Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga) | Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām |
| *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] | *Oryza sativa* L. | 0 % | 0 % | 0 % |
| **Sēnes** | | | | |
| *Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU]* | *Oryza sativa* L. | Praktiski brīvs | Praktiski brīvs | Praktiski brīvs", |

(b) pievieno šādu 4. punktu:

"4. Sēņu daļu klātbūtne sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

| Kategorija | Maksimālais sēņu daļu, piemēram, sklerociju vai melno graudu, skaits paraugā, kura svars norādīts III pielikuma 3. ailē |
|---|---|
| Graudaugi, izņemot *Secale cereale* hibrīdus: | |
| — bāzes sēklas | 1 |
| — sertificētas sēklas | 3 |
| *Secale cereale* hibrīdi: | |
| — bāzes sēklas | 1 |
| — sertificētas sēklas | 4 (*) |

(*) Piecu sēņu daļu, piemēram, sklerociju vai to fragmentu vai melno graudu, klātbūtne noteikta svara paraugā ir uzskatāma par standartiem atbilstošu, ja otrā tāda paša svara paraugā ir ne vairāk kā četras sēņu daļas.".

*III PIELIKUMS*

**Grozījumi Direktīvā 68/193/EEK**

Direktīvu 68/193/EEK groza šādi:

1) direktīvas I pielikumu aizstāj ar šādu:

*"I PIELIKUMS*

**NOSACĪJUMI AUGOŠAI KULTŪRAI**

**1. iedaļa. Identitāte, tīrība un audzēšanas apstākļi**

1. |Augošajai kultūrai piemīt šķirnes un – attiecīgā gadījumā – klonējuma identitāte un tīrība.

2. Augošās kultūras audzēšanas apstākļi un attīstības stadija ir tāda, kas ļauj pienācīgi pārbaudīt šādas kultūras šķirnes un – vajadzības gadījumā – klonējuma identitāti un tīrību, kā arī tās veselības stāvokli.

**2. iedaļa. Veselības prasības tām potcelmu stādaudzētavām un tām spraudeņu stādaudzētavām, kuras paredzētas visu kategoriju pavairošanas materiāla ražošanai**

1. Šī iedaļa attiecas uz potcelmu stādaudzētavām, kas paredzētas visu kategoriju pavairošanas materiāla ražošanai, un visu šādu kategoriju spraudeņu stādaudzētavām.

2. Potcelmu stādaudzētavas un spraudeņu stādaudzētavas, vizuāli pārbaudot, ir atzītas par brīvām no 6. un 7. iedaļā minētajiem reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO) attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu.

   Potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās ņem paraugus no konkrētās ģints vai sugas un testē tos, lai konstatētu 7. iedaļā minēto RNKO klātbūtni. Ja rodas šaubas par 6. un 7. iedaļā minēto RNKO klātbūtni attiecībā uz konkrēto ģinti vai sugu, potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās ņem paraugus un testē tos.

3. Vizuālo pārbaudi un vajadzības gadījumā paraugu ņemšanu attiecīgajās potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās un to testēšanu veic saskaņā ar 8. iedaļu.

4. Šīs iedaļas 2. punktā paredzēto paraugu ņemšanu un testēšanu veic gada piemērotākajā periodā, ņemot vērā klimatiskos un vīnogulāju augšanas apstākļus, kā arī vīnogulājiem raksturīgo RNKO bioloģiju.

   Paraugu ņemšanā un testēšanā dalībvalstis izmanto Eiropas un Vidusjūras Augu aizsardzības organizācijas (*EPPO*) protokolus vai citus starptautiski atzītus protokolus. Ja šādu protokolu nav, izmanto attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Tādā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šos protokolus dara pieejamus pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

   Ņemot vīnogulāju paraugus potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla ražošanai, un testējot tos, dalībvalstis izmanto indikatoraugu bioloģisko indeksēšanu, lai novērtētu vīrusu, viroīdu, vīrusveidīgo slimību un fitoplazmu klātbūtni, vai citus līdzvērtīgus starptautiski atzītus protokolus.

**3. iedaļa. Augsnes prasības un ražošanas nosacījumi tām potcelmu stādaudzētavām un tām spraudeņu stādaudzētavām, kuras paredzētas visu kategoriju pavairošanas materiāla ražošanai**

1. Potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās vīnogulājus drīkst stādīt tikai tādā augsnē vai vajadzības gadījumā podos ar augsnes substrātu, kas ir brīvi no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem. To, vai augsne vai augsnes substrāts ir brīvs no šādiem kaitīgajiem organismiem, nosaka, veicot paraugu ņemšanu un testēšanu.

Šādu paraugu ņemšanu un testēšanu veic, ņemot vērā klimatiskos apstākļus un to kaitīgo organismu bioloģiju, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem.

2. Paraugu ņemšanu un testēšanu neveic, ja oficiālā kontroles iestāde oficiālas pārbaudes rezultātā secina, ka augsne ir brīva no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem.

Paraugu ņemšanu un testēšanu neveic arī tad, ja vīnogulāji nav audzēti ražošanas augsnē vismaz piecus gadus un ja ir pilnīga pārliecība par to, ka šādā augsnē nav kaitīgo organismu, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem.

3. Paraugu ņemšanā un testēšanā dalībvalstis izmanto *EPPO* protokolus vai citus starptautiski atzītus protokolus. Ja šādu protokolu nav, dalībvalstis izmanto attiecīgos protokolus, kas izstrādāti valsts līmenī. Tādā gadījumā dalībvalstis pēc pieprasījuma šos protokolus dara pieejamus pārējām dalībvalstīm un Komisijai.

**4. iedaļa. Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam**

1. Potcelmu stādaudzētavas un spraudeņu stādaudzētavas veido atbilstošos apstākļos, lai izvairītos no jebkāda riska, ka tās varētu tikt piesārņotas ar kaitīgajiem organismiem, kuri var kalpot par vektoru 7. iedaļā minētajiem vīrusiem.

2. Spraudeņu stādaudzētavas neveido vīna dārzā vai potcelmu stādaudzētavā. Minimālais attālums līdz vīna dārzam vai potcelmu stādaudzētavai ir trīs metri.

3. Pavairošanas materiālu ražo ne tikai atbilstīgi veselības un augsnes prasībām un 2. un 3. iedaļā minētajiem ražošanas nosacījumiem, bet arī 8. iedaļā minētajām prasībām ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam, lai ierobežotu minētajā iedaļā norādītos kaitīgos organismus.

**5. iedaļa. Oficiālas pārbaudes**

1. Ikgadējās oficiālās kultūru pārbaudēs ir konstatēts, ka potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās ražotais pavairošanas materiāls atbilst 2.–4. iedaļas prasībām.

2. Šīs oficiālās pārbaudes oficiālā kontroles iestāde veic saskaņā ar 8. iedaļu.

3. Papildu oficiālas kultūru pārbaudes veic tad, ja rodas strīdi jautājumos, kurus var izlemt, neietekmējot pavairošanas materiāla kvalitāti.

**6. iedaļa. To RNKO saraksts, kuru klātbūtnes noteikšanai jāveic vizuāla pārbaude un – šaubu gadījumā – paraugu ņemšana un testēšana, kā paredzēts 2. iedaļas 2. punktā**

| Vīnogulāju pavairošanas materiāla, kas nav sēklas, ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| **Nepotēts *Vitis vinifera* L.** | **Kukaiņi un ērces**<br>*Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI] |
| ***Vitis* L., izņemot nepotētu *Vitis vinifera* L.** | **Kukaiņi un ērces**<br>*Viteus vitifoliae* Fitch [VITEVI] |
| ***Vitis* L.** | **Baktērijas**<br>*Xylophilus ampelinus* Willems *et al.* [XANTAM] |
| ***Vitis* L.** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**<br>*Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] |

**7. iedaļa. To RNKO saraksts, kuru klātbūtnes noteikšanai jāveic vizuālā pārbaude un – īpašos gadījumos – paraugu ņemšana un testēšana, kā paredzēts 2. iedaļas 2. punktā un 8. iedaļā**

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| **_Vitis_ L. propagating material other than seeds** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**<br>*Arabis* mozaīkas vīruss [ARMV00]<br>Vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss [GFLV00]<br>Vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 1 [GLRAV1]<br>Vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 3 [GLRAV3] |
| **_Vitis_ spp. un to hibrīdu, izņemot _Vitis vinifera_ L., potcelmi** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**<br>*Arabis* mozaīkas vīruss [ARMV00]<br>Vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss [GFLV00]<br>Vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 1 [GLRAV1]<br>Vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 3 [GLRAV3]<br>Vīnogulāju plankumainības vīruss [GFKV00] |

**8. iedaļa. Prasības pasākumiem, kas veicami _Vitis_ L. potcelmu stādaudzētavās un attiecīgā gadījumā spraudeņu stādaudzētavās sadalījumā pa kategorijām saskaņā ar 2. iedaļas 2. punktu**

**_Vitis_ L.**

1. **Sākotnējais pavairošanas materiāls, bāzes pavairošanas materiāls un sertificētais materiāls**

*Vizuālās pārbaudes*

Oficiālā kontroles iestāde veic vizuālās pārbaudes potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās vismaz vienu reizi audzēšanas sezonā attiecībā uz visiem 6. un 7. iedaļā norādītajiem RNKO.

2. **Sākotnējais pavairošanas materiāls**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No visiem vīnogulājiem potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla ražošanai, ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Arabis* mozaīkas vīrusa, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusa, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3 klātbūtni. Turpmāk šādu paraugu ņemšanu un testēšanu atkārto reizi piecos gados.

Papildus paraugu ņemšanai un testēšanai uz pirmajā ievilkumā minētajiem vīrusiem no potcelmu stādaudzētavām, kas paredzētas potcelmu ražošanai, vienu reizi ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu vīnogulāju plankumainības vīrusa klātbūtni.

Paraugu ņemšanas un testēšanas rezultāti ir pieejami pirms attiecīgo potcelmu stādaudzētavu apstiprināšanas.

3. **Bāzes pavairošanas materiāls**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No visiem vīnogulājiem potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas bāzes pavairošanas materiāla ražošanai, ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Arabis* mozaīkas vīrusa, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusa, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3 klātbūtni.

Pirmo reizi paraugu ņemšanu un testēšanu veic sešus gadus vecās potcelmu stādaudzētavās, bet turpmāk – reizi sešos gados.

Paraugu ņemšanas un testēšanas rezultāti ir pieejami pirms attiecīgo potcelmu stādaudzētavu apstiprināšanas.

4. **Sertificētais materiāls**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No reprezentatīvas vīnogulāju daļas potcelmu stādaudzētavā, kas paredzēta sertificēta materiāla ražošanai, ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Arabis* mozaīkas vīrusa, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusa, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3 klātbūtni.

Paraugu ņemšanu un testēšanu pirmo reizi veic desmit gadus vecās potcelmu stādaudzētavās un turpmāk reizi desmit gados.

Paraugu ņemšanas un testēšanas rezultāti ir pieejami pirms attiecīgo potcelmu stādaudzētavu apstiprināšanas.

5. **Sākotnējais pavairošanas materiāls, bāzes pavairošanas materiāls un sertificētais materiāls**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam atkarībā no attiecīgajiem RNKO*

(a) ***Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.***

(i) Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*, vai

(ii) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā vīnogulājiem nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. simptomi vai

(iii) attiecībā uz *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. klātbūtni ir izpildīti šādi nosacījumi:

— tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla un bāzes pavairošanas materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. ir izrauti un

— tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sertificētā materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. simptomiem vismaz netiek izmantoti pavairošanai un

— tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar *EPPO* protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*.

(b) ***Xylophilus ampelinus* Willems *et al.***

(i) Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, vai

(ii) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā vīnogulājiem nav novēroti *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. simptomi vai

(iii) attiecībā uz *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. klātbūtni ir izpildīti šādi nosacījumi:

— tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla, bāzes pavairošanas materiāla un sertificētā materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. simptomiem ir izrauti, un tiek veikti piemēroti higiēnas pasākumi un

— ražošanas vietas daļā vīnogulājus ar *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. simptomiem pēc apgriešanas apstrādā ar baktericīdu, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no *Xylophilus ampelinus* Willems *et al.*, un

— tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar *EPPO* protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*.

(c) ***Arabis* mozaīkas vīruss, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss, vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 3**

(i) Attiecībā uz *Arabis* mozaīkas vīrusu, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusu, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusu 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusu 3 ir izpildīti šādi nosacījumi:

— vīnogulājiem potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla un bāzes pavairošanas materiāla ražošanai, nav novēroti neviena minētā vīrusa simptomi un

— potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sertificētā materiāla ražošanai, minēto vīrusu simptomi ir novēroti ne vairāk kā 5 % vīnogulāju, un šie vīnogulāji ir izrauti un iznīcināti vai

(ii) visi vīnogulāji potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla ražošanai, un sākotnējais pavairošanas materiāls tiek turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, lai nodrošinātu, ka šādos vīnogulājos un šādā pavairošanas materiālā nav vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3.

(d) ***Viteus vitifoliae* Fitch**

(i) Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Viteus vitifoliae* Fitch, vai

(ii) vīnogulājus potē uz potcelmiem, kas ir izturīgi pret *Viteus vitifoliae* Fitch, vai

— visi vīnogulāji potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas sākotnējā pavairošanas materiāla ražošanai, un viss sākotnējais pavairošanas materiāls tiek turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, un pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā šiem vīnogulājiem nav novēroti *Viteus vitifoliae* Fitch simptomi un

— tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir *Viteus vitifoliae* Fitch simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj fumigācijai, apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar *EPPO* protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka šāds pavairošanas materiāls ir brīvs no *Viteus vitifoliae* Fitch.

6. **Standarta materiāls**

*Vizuālās pārbaudes*

Oficiālā kontroles iestāde veic vizuālās pārbaudes potcelmu stādaudzētavās un spraudeņu stādaudzētavās vismaz vienu reizi audzēšanas sezonā attiecībā uz visiem 6. un 7. iedaļā norādītajiem RNKO.

*Prasības attiecībā uz ražošanas vietas daļu, ražošanas vietu vai apgabalu atkarībā no attiecīgajiem RNKO*

(a) ***Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.***

(i) Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*., vai

(ii) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā vīnogulājiem nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. simptomi vai

(iii) — tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas standarta materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. simptomiem vismaz netiek izmantoti pavairošanai un

— tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir *Candidatus* Phytoplasma *solani Quaglino et al*. simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar *EPPO* protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al*.

(b) ***Xylophilus ampelinus* Willems *et al.***

(i) Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*., vai

(ii) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā vīnogulājiem nav novēroti *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. simptomi vai

(iii) attiecībā uz *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. klātbūtni ir izpildīti šādi nosacījumi:

— tajās potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas standarta materiāla ražošanai, visi vīnogulāji ar *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. simptomiem ir izrauti, un tiek veikti piemēroti higiēnas pasākumi, un

— ražošanas vietas daļā vīnogulājus ar *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. simptomiem pēc apgriešanas apstrādā ar baktericīdu, lai nodrošinātu, ka tie ir brīvi no *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*., un

— tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*. simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar *EPPO* protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka tas ir brīvs no *Xylophilus ampelinus* Willems *et al*.

(c) ***Arabis* mozaīkas vīruss, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīruss, vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīruss 3**

Visu vīrusu (*Arabis* mozaīkas vīrusa, vīnogulāju vēdekļveida lapu vīrusa, vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 1 un vīnogulāju lapu ritināšanās vīrusa 3) simptomi ir novēroti ne vairāk kā 10 % vīnogulāju potcelmu stādaudzētavās, kas paredzētas standarta materiāla ražošanai, un šie vīnogulāji netiek izmantoti pavairošanai.

(d) ***Viteus vitifoliae* Fitch**

(i) Vīnogulājus audzē apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Viteus vitifoliae* Fitch, vai

(ii) vīnogulājus potē uz potcelmiem, kas ir izturīgi pret *Viteus vitifoliae* Fitch, vai

(iii) tad, ja tirdzniecībai paredzētajam pavairošanas materiālam ir *Viteus vitifoliae* Fitch simptomi, visu šāda materiāla partiju pakļauj fumigācijai, apstrādei ar karstu ūdeni vai citai piemērotai apstrādei saskaņā ar *EPPO* protokoliem vai citiem starptautiski atzītiem protokoliem, lai nodrošinātu, ka šāds materiāls ir brīvs no *Viteus vitifoliae* Fitch.";

2) direktīvas II pielikumā I iedaļas 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Pavairošanas materiāls ir praktiski brīvs no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina šāda materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Pavairošanas materiāls atbilst arī prasībām par Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, un pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās Regulas 30. panta 1. punktu."

*IV PIELIKUMS*

**Grozījumi Direktīvā 93/49/EEK**

Direktīvas 93/49/EEK pielikumu aizstāj ar šādu:

*"PIELIKUMS*

**Baktērijas**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvā auga pavairošanas materiālā |
|---|---|---|
| *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br>*Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobtrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. | 0 % |
| *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br>*Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* Lindl. | 0 % |
| *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br>*Citrus* L., *Citrus* L. hibrīdi, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibrīdi, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. hibrīdi | 0 % |
| *Xanthomonas arboricola pv. pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br>*Prunus* L. | 0 % |
| *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas gardneri (ex Šutič) Jones et al.* [XANTGA] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |

**Sēnes un oomicētes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvo augu pavairošanas materiālā |
|---|---|---|
| *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr [ENDOPA] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br>*Castanea* L. | 0 % |
| *Dothistroma pini* Hulbary [DOTSPI] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br>*Pinus* L. | 0 % |

**Sēnes un oomicētes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvo augu pavairošanas materiālā |
|---|---|---|
| *Dothistroma septosporum* (Dorogin) Morelet [SCIRPI] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Pinus* L. | 0 % |
| *Lecanosticta acicola* (von Thümen) Sydow [SCIRAC] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Pinus* L. | 0 % |
| *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | Sēklas<br><br>*Helianthus annuus* L. | 0 % |
| *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Citrus* L., *Citrus* L. hibrīdi, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibrīdi, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. hibrīdi | 0 % |
| *Puccinia horiana* P. Hennings [PUCCHN] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Chrysanthemum* L. | 0 % |

**Kukaiņi un ērces**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvo augu pavairošanas materiālā |
|---|---|---|
| *Aculops fuchsiae* Keifer [ACUPFU] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Fuchsia* L. | 0 % |
| *Opogona sacchari* Bojer [OPOGSC] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Beaucarnea* Lem., *Bougainvillea* Comm. ex Juss., *Crassula* L., *Crinum* L., *Dracaena* Vand. ex L., *Ficus* L., *Musa* L., *Pachira* Aubl., *Palmae, Sansevieria* Thunb., *Yucca* L. | 0 % |
| *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) [RHYCFE] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot *Palmae* sēklas, attiecībā uz šādām ģintīm un sugām:<br><br>*Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea armata* S. Watson, *Brahea edulis* H.Wendl., *Butia capitata* (Mart.) Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota maxima* Blume, *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Chamaerops humilis* L., *Cocos nucifera* L., *Corypha utan* Lam., *Copernicia* Mart., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea chilensis* (Molina) Baill., *Livistona australis* C. Martius, *Livistona decora* (W. Bull) Dowe, *Livistona rotundifolia* (Lam.) Mart., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix canariensis* Chabaud, *Phoenix dactylifera* L., *Phoenix reclinata* Jacq., *Phoenix roebelenii* O'Brien, *Phoenix sylvestris* (L.) Roxb., *Phoenix theophrasti* Greuter, *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O.F. Cook, *Sabal palmetto* (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., *Syagrus romanzoffiana* (Cham.) Glassman, *Trachycarpus fortunei* (Hook.) H. Wendl., *Washingtonia* H. Wendl. | 0 % |

**Nematodes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvā auga pavairošanas materiālā |
|---|---|---|
| *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]* | *Allium* L. | 0 % |
| *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev *[DITYDI]* | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston, *Galanthus* L., *Hyacinthus* Tourn. ex L, *Hymenocallis* Salisb., *Muscari* Mill., *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Sternbergia* Waldst. & Kit., *Tulipa* L. | 0 % |

**Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvā auga pavairošanas materiālā |
|---|---|---|
| *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Malus* Mill. | 0 % |
| *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Prunus* L. | 0 % |
| *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Pyrus* L. | 0 % |
| *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Lavandula* L. | 0 % |
| Krizantēmu pundurainības viroīds [CSVD00] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Argyranthemum* Webb ex Sch. Bip., *Chrysanthemum* L. | 0 % |
| *Citrus exocortis* viroīds [CEVD00] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Citrus* L. | 0 % |
| *Citrus tristeza* vīruss [CTV000] (izolāti, kas sastopami ES) | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Citrus* L., *Citrus* L. hibrīdi, *Fortunella* Swingle, *Fortunella* Swingle hibrīdi, *Poncirus* Raf., *Poncirus* Raf. hibrīdi | 0 % |
| *Impatiens* nekrotisko plankumu tospovīruss [INSV00] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br><br>*Begonia x hiemalis*<br><br>Fotsch, *Impatiens* L. Jaungvinejas hibrīdi | 0 % |

| **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** | | |
|---|---|---|
| Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāla ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dekoratīvā auga pavairošanas materiālā |
| Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] | *Capsicum annuum* L. | 0 % |
| Plūmju virālo baku vīruss [PPV000] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br>*Prunus armeniaca* L., *Prunus blireiana* Andre, *Prunus brigantina* Vill., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cistena* Hansen, *Prunus curdica* Fenzl and Fritsch., *Prunus domestica* L., *Prunus domestica* ssp. *insititia* (L.) C.K. Schneid, *Prunus domestica* ssp. *italica* (Borkh.) Hegi., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus glandulosa* Thunb., *Prunus holosericea* Batal., *Prunus hortulana* Bailey, *Prunus japonica* Thunb., *Prunus mandshurica* (Maxim.) Koehne, *Prunus maritima* Marsh., *Prunus mume* Sieb. and Zucc., *Prunus nigra* Ait., *Prunus persica* (L.) Batsch, *Prunus salicina* L., *Prunus sibirica* L., *Prunus simonii* Carr., *Prunus spinosa* L., *Prunus tomentosa* Thunb., *Prunus triloba* Lindl.<br>— citas pret plūmju virālo baku vīrusu uzņēmīgas *Prunus* L. sugas | 0 % |
| Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00] | Dekoratīvo augu pavairošanas materiāls, izņemot sēklas<br>*Begonia x hiemalis*<br>Fotsch, *Capsicum annuum* L., *Chrysanthemum* L., *Gerbera* L., *Impatiens* L. Jaungvinejas hibrīdi, *Pelargonium* L. | 0 %". |

*V PIELIKUMS*

**Grozījumi Direktīvā 93/61/EEK**

Direktīvas 93/61/EEK pielikumu aizstāj ar šādu:

*"PIELIKUMS*

**RNKO dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā**

**Baktērijas**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls (ģints vai suga) | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā |
|---|---|---|
| *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI] | *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič 1957) Jones *et al.* [XANTGA] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |

**Sēnes un oomicētes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls (ģints vai suga) | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā |
|---|---|---|
| *Fusarium* Link (anamorfiska ģints) [1FUSAG], izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] | *Asparagus officinalis* L. | 0 % |
| *Helicobasidium brebissonii* (Desm.) Donk [HLCBBR] | *Asparagus officinalis* L. | 0 % |
| *Stromatinia cepivora* Berk. [SCLOCE] | *Allium cepa* L., *Allium fistulosum* L., *Allium porrum* L., *Allium sativum* L. | 0 % |
| *Verticillium dahliae* Kleb. [VERTDA] | *Cynara cardunculus* L. | 0 % |

**Nematodes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls (ģints vai suga) | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā |
|---|---|---|
| *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] | *Allium cepa* L., *Allium sativum* L. | 0 % |

**Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dārzeņu pavairošanas un stādāmais materiāls (ģints vai suga) | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis dārzeņu pavairošanas un stādāmajā materiālā |
|---|---|---|
| Puravu dzeltenās svītrainības vīruss [LYSV00] | *Allium sativum* L. | 1 % |
| Sīpolu dzeltenās pundurainības vīruss [OYDV00] | *Allium cepa* L., *Allium sativum* L. | 1 % |
| Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| Tomātu plankumainības tospovīruss [TSWV00] | *Capsicum annuum* L., *Lactuca sativa* L., *Solanum lycopersicum* L., *Solanum melongena* L. | 0 % |
| Tomātu lapu dzeltenčokurošanās vīruss [TYLCV0] | *Solanum lycopersicum* L. | 0 %". |

*VI PIELIKUMS*

**Grozījumi Direktīvas 2002/55/EK I un II pielikumā**

Direktīvu 2002/55/EK groza šādi:

1) direktīvas I pielikuma 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Kultūraugi ir praktiski brīvi no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Kultūraugi arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).";

2) direktīvas II pielikumu groza šādi:

a) pielikuma 2. punktu aizstāj ar šādu:

"2. Sēklas ir praktiski brīvas no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Sēklas arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un RNKO, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.";

b) pielikuma 3. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

"b) Reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) klātbūtne dārzeņu sēklās vismaz vizuālā pārbaudē nepārsniedz attiecīgos tabulā norādītos pieļaujamos līmeņus:

**Baktērijas**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dārzeņu sēklu ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis uz dārzeņu sēklām |
|---|---|---|
| *Clavibacter michiganensis* ssp. *michiganensis* (Smith) Davis *et al.* [CORBMI] | *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas axonopodis* pv. *phaseoli* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPH] | *Phaseolus vulgaris* L. | 0 % |
| *Xanthomonas euvesicatoria* Jones *et al.* [XANTEU] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas fuscans subsp. fuscans* Schaad *et al.* [XANTFF] | *Phaseolus vulgaris* L. | 0 % |
| *Xanthomonas gardneri* (ex Šutič 1957) Jones *et al* [XANTGA] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas perforans* Jones *et al.* [XANTPF] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| *Xanthomonas vesicatoria* (ex Doidge) Vauterin *et al.* [XANTVE] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |

**Kukaiņi un ērces**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dārzeņu sēklu ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis uz dārzeņu sēklām |
|---|---|---|
| *Acanthoscelides obtectus* (Say) [ACANOB] | *Phaseolus coccineus* L., *Phaseolus vulgaris* L. | 0 % |
| *Bruchus pisorum* (Linnaeus) [BRCHPI] | *Pisum sativum* L. | 0 % |
| *Bruchus rufimanus* Boheman [BRCHRU] | *Vicia faba* L. | 0 % |

**Nematodes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dārzeņu sēklu ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis uz dārzeņu sēklām |
|---|---|---|
| *Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev* [DITYDI] | *Allium cepa* L., *Allium porrum* L. | 0 % |

**Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Dārzeņu sēklu ģints vai suga | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis uz dārzeņu sēklām |
|---|---|---|
| Pepino mozaīkas vīruss [PEPMV0] | *Solanum lycopersicum* L. | 0 % |
| Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] | *Capsicum annuum* L., *Solanum lycopersicum* L. | 0 %". |

*VII PIELIKUMS*

**Grozījumi Direktīvā 2002/56/EK**

Direktīvu 2002/56/EK groza šādi:

1) direktīvas I pielikumu aizstāj ar šādu:

*"I PIELIKUMS*

**SĒKLAS KARTUPEĻU KVALITĀTES MINIMĀLĀS PRASĪBAS**

1. Bāzes sēklas kartupeļiem šķirnei netipisko augu un citu šķirņu augu skaits stādījumā kopā nepārsniedz 0,1 %, bet ataudzējumā tie kopā nepārsniedz 0,25 %.

2. Sertificētas sēklas kartupeļu gadījumā šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu piejaukums kopā nepārsniedz 0,5 %, bet ataudzējumā tie kopā nepārsniedz 0,5 %.

3. Sēklas kartupeļi atbilst šādām prasībām par reglamentēto nekarantīnas organismu (RNKO) vai to izraisīto slimību klātbūtni un attiecīgajām kategorijām, kā norādīts tabulā turpmāk:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu stādījumos | Pieļaujamais līmenis sertificētas sēklas kartupeļu stādījumos |
|---|---|---|
| Melnkāja (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG], *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG]) | 1,0 % | 4,0 % |
| *Candidatus* Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS] | 0 % | 0 % |
| *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] | 0 % | 0 % |
| Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,<br>un<br>simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00] | 0,8 % | 6,0 % |
| Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] | 0 % | 0 % |

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļu ataudzējumā | Pieļaujamais līmenis sertificētas sēklas kartupeļu ataudzējumā |
|---|---|---|
| Vīrusu infekciju simptomi | 4,0 % | 10,0 % |

4. Bāzes sēklas kartupeļu ataudzējumu maksimālais skaits ir četri, bet uz lauka esošo pirmsbāzes sēklas kartupeļu un bāzes sēklas kartupeļu ataudzējumu kopējais skaits ir septiņi.

Sertificētas sēklas kartupeļu ataudzējumu maksimālais skaits ir divi.

Ja uz oficiālās etiķetes ataudzējums nav norādīts, uzskata, ka attiecīgie sēklas kartupeļi pieder maksimālajam konkrētajā kategorijā atļautajam ataudzējumam.";

2) direktīvas II pielikumu aizstāj ar šādu:

*"II PIELIKUMS*

**SĒKLAS KARTUPEĻU PARTIJĀM NOTEIKTĀS MINIMĀLĀS KVALITĀTES PRASĪBAS**

Sēklas kartupeļiem ir atļauti šādi piemaisījumu, bojājumu un RNKO vai to izraisīto simptomu tolerances līmeņi:

1) augsnes un svešķermeņu klātbūtne bāzes sēklas kartupeļiem – 1,0 % no masas un sertificētas sēklas kartupeļiem – 2,0 % no masas;

2) sausā puve un slapjā puve kopā, izņemot gadījumus, kad to izraisījis *Synchytrium endobioticum*, *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* vai *Ralstonia solanacearum* – 0,5 % no masas, no kuriem slapjā puve 0,2 % no masas;

3) ārēji bojājumi, piemēram, nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi – 3,0 % no masas;

4) parastais kraupis, kas skāris vairāk nekā vienu trešdaļu no bumbuļu virsmas – 5,0 % no masas;

5) bumbuļi, kas sačokurojušies pārmērīgas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ – 1,0 % no masas;

6) RNKO vai to izraisītie simptomi sēklas kartupeļu partijās:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis bāzes sēklas kartupeļos (% no masas) | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis sertificētas sēklas kartupeļos (% no masas) |
|---|---|---|
| *Candidatus* Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* | 0 % | 0 % |
| *Ditylenchus destructor* Thorne [DITYDE] | 0 % | 0 % |
| Melnais kraupis, ko izraisījis *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas | 5,0 % | 5,0 % |
| Irdenais kraupis, ko izraisījis *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas | 3,0 % | 3,0 %; |

7) kopējais tolerances līmenis 2. līdz 6. punktam: bāzes sēklas kartupeļiem – 6,0 % no masas, sertificētas sēklas kartupeļiem – 8,0 % no masas."

*VIII PIELIKUMS*

**Grozījumi Direktīvā 2002/57/EK**

Direktīvu 2002/57/EK groza šādi:

1) direktīvas I pielikuma 4. punktu aizstāj ar šādu:

"4. Kultūraugs ir praktiski brīvs no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti. Kultūraugs arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un reglamentētajiem nekarantīnas organismiem (RNKO), kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031 (*), kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne kultūraugos atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

**Sēnes un oomicētes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga) | Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklu ražošanai | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklu ražošanai | Pieļaujamais līmenis sertificētu sēklu ražošanai |
|---|---|---|---|---|
| *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | *Helianthus annuus* L. | 0 % | 0 % | 0 % |

(*) Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regula (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.).";

2) direktīvas II pielikumā I iedaļas 5. punktu aizstāj ar šādu:

"5. Sēklas ir praktiski brīvas no jebkādiem kaitīgajiem organismiem, kuri samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

Sēklas arī atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un RNKO, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

RNKO klātbūtne sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst šādām prasībām, kā norādīts tabulā:

**Sēnes un oomicētes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga) | Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām |
|---|---|---|---|---|
| *Alternaria linicola* Groves & Skolko [ALTELI] | *Linum usitatissimum* L. | 5 %<br><br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 5 %<br><br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 5 %<br><br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. |

**Sēnes un oomicētes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga) | Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām |
|---|---|---|---|---|
| *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] | *Linum usitatissimum* L. – šķiedras lini | 1 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 1 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 1 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. |
| *Boeremia exigua* var. *linicola* (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] | *Linum usitatissimum* L. – eļļas lini | 5 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 5 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 5 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. |
| *Botrytis cinerea* de Bary [BOTRCI] | *Helianthus annuus* L., *Linum usitatissimum* L. | 5 % | 5 % | 5 % |
| *Colletotrichum lini* Westerdijk [COLLLI] | *Linum usitatissimum* L. | 5 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 5 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 5 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. |
| *Diaporthe caulivora* (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]<br>*Diaporthe phaseolorum* var. *sojae* Lehman [DIAPPS] | *Glycine max* (L.) Merr | 15 %, ja inficētas ar *Phomopsis complex* | 15 %, ja inficētas ar Phomopsis complex | 15 %, ja inficētas ar Phomopsis complex |
| *Fusarium* (anamorfiska ģints) Link [1FUSAG],<br>izņemot *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] | *Linum usitatissimum* L. | 5 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 5 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. | 5 %<br>5 %, ko skārusi *Alternaria linicola, Boeremia exigua* var. *linicola, Colletotrichium lini* un *Fusarium* spp. |
| *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] | *Helianthus annuus* L. | 0 % | 0 % | 0 % |
| *Sclerotinia sclerotiorum* (Libert) de Bary [SCLESC] | *Brassica rapa* L. var. silvestris (Lam.) Briggs | Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē | Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē | Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē |

**Sēnes un oomicētes**

| RNKO vai to izraisītie simptomi | Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga) | Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām | Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām |
|---|---|---|---|---|
| *Sclerotinia sclerotiorum* (Libert) de Bary [SCLESC] | *Brassica napus* L. *(partim)*, *Helianthus annuus* L. | Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīva parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē | Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīva parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē | Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīva parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē |
| *Sclerotinia sclerotiorum* (Libert) de Bary [SCLESC] | *Sinapis alba* L. | Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tādu katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē | Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē | Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot tāda katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru, kāds norādīts Direktīvas 2002/57/EK III pielikuma 4. ailē”. |

*IX PIELIKUMS*

**Grozījumi Īstenošanas direktīvā 2014/21/ES**

Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES pielikumu aizstāj ar šādu:

*"PIELIKUMS*

**Nosacījumi pirmsbāzes sēklas kartupeļu ar marķējumu "Savienības kategorija PBTC" un "Savienības kategorija PB" laišanai tirgū**

1) "Savienības kategorijas PBTC" pirmsbāzes sēklas kartupeļi atbilst šādiem nosacījumiem:

a) nosacījumi sēklas kartupeļiem:

i) sēklas kartupeļu laukā nav šķirnei netipisku augu un citu šķirņu piejaukuma,

ii) augus, tostarp bumbuļus, audzē, izmantojot mikropavairošanas metodi,

iii) augus, tostarp bumbuļus, audzē aizsargātā objektā un tādā augsnes substrātā, kas ir brīvs no kaitīgajiem organismiem,

iv) bumbuļus pavairo tikai līdz pirmajai paaudzei,

v) augos RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne atbilst šādiem tabulā norādītajiem pieļaujamajiem līmeņiem:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis "Savienības kategorijas PBTC" pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumos |
|---|---|
| Melnkāja (*Dickeya* Samson *et al.* spp. [1DICKG], *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al.* spp. [1PECBG]) | 0 % |
| *Candidatus* Liberibacter *solanacearum* Liefting *et al.* [LIBEPS] | 0 % |
| *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] | 0 % |
| Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,<br>un<br>simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00] | 0 % |
| Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] | 0 % |

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis "Savienības kategorijas PBTC" pirmsbāzes sēklas kartupeļu ataudzējumā |
|---|---|
| Vīrusu infekciju simptomi | 0 % |

b) nosacījumi sēklas kartupeļu partijām:

i) tajās nav sēklas kartupeļu, ko skārusi puve,

ii) tajās nav sēklas kartupeļu, ko skāris parastais kraupis,

iii) tajās nav sēklas kartupeļu, kas pārmērīgi sačokurojušies dehidrācijas dēļ,

iv) tajās nav sēklas kartupeļu ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai mehāniski bojātu bumbuļu,

v) pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne atbilst šādiem tabulā norādītajiem pieļaujamajiem līmeņiem:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis "Savienības kategorijas PBTC" pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās (% no masas) |
|---|---|
| *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al*. [LIBEPS] | 0 % |
| *Ditylenchus destructor* Thorne [DITYDE] | 0 % |
| Melnais kraupis, ko izraisījis *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] | 0 % |
| Irdenais kraupis, ko izraisījis *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] | 0 %. |

2) "Savienības kategorijas PB" pirmsbāzes sēklas kartupeļi atbilst šādiem nosacījumiem:

a) nosacījumi sēklas kartupeļiem:

i) šķirnei netipisko augu skaits un citu šķirņu piejaukums kopā nepārsniedz 0,01 %;

ii) augos RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne atbilst šādiem tabulā norādītajiem pieļaujamajiem līmeņiem:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis "Savienības kategorijas PB" pirmsbāzes sēklas kartupeļu stādījumos |
|---|---|
| Melnkāja (*Dickeya* Samson *et al*. *spp*. [1DICKG], *Pectobacterium* Waldee emend. Hauben *et al*. spp. [1PECBG]) | 0 % |
| *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al*. [LIBEPS] | 0 % |
| *Candidatus* phytoplasma *solani* Quaglino *et al*. [PHYPSO] | 0 % |
| Simptomi, ko izraisījis kartupeļu mozaīkas vīruss,<br>un<br>simptomi, ko izraisījis kartupeļu lapu ritināšanās vīruss [PLRV00] | 0,1 % |
| Kartupeļu vārpstveida bumbuļu viroīds [PSTVD0] | 0 % |

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis "Savienības kategorijas PB" pirmsbāzes sēklas kartupeļu ataudzējumā |
|---|---|
| Vīrusu infekciju simptomi | 0,5 %; |

b) partijām piemērojamie piemaisījumu, bojājumu un slimību tolerances līmeņi:

i) sēklas kartupeļi, kurus skārusi puve, kas nav gaišā vai tumšā gredzenpuve, nepārsniedz 0,2 % no masas,

ii) sēklas kartupeļi, kurus skāris parastais kraupis, kas sedz vairāk nekā vienu trešdaļu no to virsmas, nepārsniedz 5,0 % no masas,

iii) bumbuļi, kas sačokurojušies pārliekas dehidrācijas vai sudrabotā kraupja izraisītas dehidrācijas dēļ, nepārsniedz 0,5 % no masas,

iv) sēklas kartupeļi ar ārējiem bojājumiem, tostarp nepareizas formas vai mehāniski bojāti bumbuļi, nepārsniedz 3,0 % no masas,

v) augsnes un svešķermeņu klātbūtne nepārsniedz 1,0 % no masas,

vi) pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās RNKO vai to izraisīto simptomu klātbūtne atbilst šādiem pieļaujamajiem līmeņiem, kā norādīts tabulā:

| RNKO vai to izraisītie simptomi | RNKO klātbūtnes pieļaujamais līmenis "Savienības kategorijas PB" pirmsbāzes sēklas kartupeļu partijās (% no masas) |
|---|---|
| *Candidatus* Liberibacter solanacearum Liefting *et al*. [LIBEPS] | 0 % |
| *Ditylenchus destructor* Thorne [DITYDE] | 0 % |
| Melnais kraupis, ko izraisījis *Thanatephorus cucumeris* (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas | 1,0 % |
| Irdenais kraupis, ko izraisījis *Spongospora subterranea* (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] un kas skāris vairāk nekā 10 % no bumbuļu virsmas | 1,0 %, |

vii) kopējais to sēklas kartupeļu procentuālais daudzums, uz kuriem attiecas i) līdz iv) un vi) punktā minētie tolerances līmeņi, nepārsniedz 6,0 % no masas."

*X PIELIKUMS*

**Grozījumi Īstenošanas direktīvā 2014/98/ES**

Īstenošanas direktīvas 2014/98/ES pielikumu aizstāj ar šādu:

*"I PIELIKUMS*

**To reglamentēto nekarantīnas organismu saraksts, kuru klātbūtnes noteikšanai jāveic vizuālā pārbaude un – šaubu gadījumā – paraugu ņemšana un testēšana, ievērojot 9. panta 1. punktu, 10. panta 1. punktu, 16. panta 1. punktu, 21. panta 1. punktu un 26. panta 1. punktu**

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| ***Castanea sativa* Mill.** | **Sēnes un oomicētes**<br>*Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr [ENDOPA]<br>*Mycosphaerella punctiformis* Verkley & U. Braun [RAMUEN]<br>*Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM]<br>*Phytophthora cinnamomi* Rands [PHYTCN]<br>**Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**<br>Kastaņu mozaīkas izraisītājs |
| ***Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf.** | **Sēnes un oomicētes**<br>*Phytophthora citrophthora* (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO ]<br>*Phytophthora nicotianae* var. *parasitica* (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]<br>**Kukaiņi un ērces**<br>*Aleurothrixus floccosus* Maskell [ALTHFL]<br>*Parabemisia myricae* Kuwana [PRABMY]<br>**Nematodes**<br>*Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU]<br>*Tylenchulus semipenetrans* Cobb [TYLESE] |
| ***Corylus avellana* L.** | **Baktērijas**<br>*Pseudomonas avellanae* Janse *et al.* [PSDMAL]<br>*Xanthomonas arboricola* pv. *Corylina* (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]<br>**Sēnes un oomicētes**<br>*Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME]<br>*Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA]<br>*Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA]<br>**Kukaiņi un ērces**<br>*Phytoptus avellanae* Nalepa [ERPHAV] |
| ***Cydonia oblonga* Mill. un *Pyrus* L.** | **Baktērijas**<br>*Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]<br>*Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM]<br>*Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY] |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] |
| | *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] |
| | *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] |
| | *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] |
| | *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] |
| | *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] |
| | *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] |
| | *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] |
| | *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] |
| | *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA] |
| | *Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG] |
| | **Nematodes** |
| | *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] |
| | *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] |
| | *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| ***Ficus carica* L.** | **Baktērijas** |
| | *Xanthomonas campestris* pv. *fici* (Cavara) Dye [XANTFI] |
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Ceroplastes rusci* Linnaeus [CERPRU] |
| | **Nematodes** |
| | *Heterodera fici* Kirjanova [HETDFI] |
| | *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] |
| | *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] |
| | *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] |
| | *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Vīģu mozaīkas izraisītājs [FGM000] |
| ***Fragaria* L.** | **Baktērijas** |
| | *Candidatus* Phlomobacter *fragariae* Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR] |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP] |
| | *Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR] |
| | *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] |
| | *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell [CHTSFR] |
| | *Phytonemus pallidus* Banks [TARSPA] |
| | **Nematodes** |
| | *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] |
| | *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | *Candidatus* Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *australiense* Davis *et al.* [PHYPAU] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPFG] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *pruni* [PHYPPN] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] |
| | *Clover phyllody* fitoplazma [PHYP03] |
| | Zemenāju pavairošanas slimības fitoplazma [PHYP75] |
| ***Juglans regia* L.** | **Baktērijas** |
| | *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] |
| | *Xanthomonas arboricola* pv. *Juglandi* (Pierce) Vauterin *et al.* [XANTJU] |
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] |
| | *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] |
| | *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] |
| | *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Epidiaspis leperii* Signoret [EPIDBE] |
| | *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] |
| | *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] |
| ***Malus* Mill.** | **Baktērijas** |
| | *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] |
| | *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* [ERWIAM] |
| | *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY] |
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Armillariella mellea* (Vahl) Kummer [ARMIME] |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| | *Chondrostereum purpureum* Pouzar [STERPU] |
| | *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI] |
| | *Neofabraea alba* Desmazières [PEZIAL] |
| | *Neofabraea malicorticis* Jackson [PEZIMA] |
| | *Neonectria ditissima* (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA] |
| | *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] |
| | *Sclerophora pallida* Yao & Spooner [SKLPPA] |
| | *Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold [VERTAA] |
| | *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Eriosoma lanigerum* Hausmann [ERISLA] *Psylla* spp. Geoffroy [1PSYLG] |
| | **Nematodes** |
| | *Meloidogyne hapla* Chitwood [MELGHA] |
| | *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] |
| | *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| ***Olea europaea* L.** | **Baktērijas** |
| | *Pseudomonas savastanoi* pv. *savastanoi* (Smith) Gardan *et al.* [PSDMSA] |
| | **Nematodes** |
| | *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] |
| | *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] |
| | *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Olīvu lapu dzeltēšanas vīruss [OLYAV0] |
| | Olīvu lapu dzīslu dzeltēšanas vīruss [OVYAV0] |
| | Olīvu dzeltenplankumainības un samazināšanās vīruss [OYMDAV] |
| ***Pistacia vera* L.** | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Phytophthora cambivora* (Petri) Buisman [PHYTCM] |
| | *Phytophthora cryptogea* Pethybridge & Lafferty [PHYTCR] |
| | *Rosellinia necatrix* Prillieux [ROSLNE] |
| | *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] |
| | **Nematodes** |
| | *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| ***Prunus domestica* L. un Prunus dulcis (Miller) Webb** | **Baktērijas** |
| | *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] |
| | *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] |
| | *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] |
| | *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] |
| | **Nematodes** |
| | *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] |
| | *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] |
| | *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] |
| | *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| ***Prunus armeniaca* L.** | **Baktērijas** |
| | *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] |
| | *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] |
| | *Pseudomonas syringae* pv. *Syringae* van Hall [PSDMSY] |
| | *Pseudomonas viridiflava* (Burkholder) Dowson [PSDMVF] |
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] |
| | *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] |
| | *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] |
| | **Nematodes** |
| | *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] |
| | *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] |
| | *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] |
| | *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| ***Prunus avium* L. un *Prunus cerasus* L.** | **Baktērijas** |
| | *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] |
| | *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] |
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| | **Nematodes** |
| | *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] |
| | *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] |
| | *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] |
| | *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| ***Prunus persica* (L.) Batsch un *Prunus salicina* Lindley** | **Baktērijas** |
| | *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU] |
| | *Pseudomonas syringae* pv. *morsprunorum* (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP] |
| | *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE] |
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] |
| | *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] |
| | *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] |
| | **Nematodes** |
| | *Meloidogyne arenaria* Chitwood [MELGAR] |
| | *Meloidogyne incognita* (Kofold & White) Chitwood [MELGIN] |
| | *Meloidogyne javanica* Chitwood [MELGJA] |
| | *Pratylenchus penetrans* (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE] |
| | *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen [PRATVU] |
| ***Ribes* L.** | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Diaporthe strumella* (Fries) Fuckel [DIAPST] |
| | *Microsphaera grossulariae* (Wallroth) Léveillé [MCRSGR] |
| | *Podosphaera mors-uvae* (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU] |
| | **Kukaiņi un ērces** |
| | *Cecidophyopsis ribis* Westwood [ERPHRI] |
| | *Dasineura tetensi* Rübsaamen [DASYTE] |
| | *Pseudaulacaspis pentagona* Targioni-Tozzetti [PSEAPE] |
| | *Quadraspidiotus perniciosus* Comstock [QUADPE] |
| | *Tetranychus urticae* Koch [TETRUR] |
| | **Nematodes** |
| | *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] |
| | *Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev [DITYDI] |
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Aukubas mozaīkas izraisītāja un upeņu dzeltēšanas izraisītāja apvienojums |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| ***Rubus* L.** | **Baktērijas**<br>*Agrobacterium* spp. Conn [1AGRBG]<br>*Rhodococcus fascians* Tilford [CORBFA]<br>**Sēnes un oomicētes**<br>*Peronospora rubi* Rabenhorst [PERORU]<br>**Kukaiņi un ērces**<br>*Resseliella theobaldi* Barnes [THOMTE] |
| ***Vaccinium* L.** | **Baktērijas**<br>*Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]<br>**Sēnes un oomicētes**<br>*Diaporthe vaccinii* Shear [DIAPVA]<br>*Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin [EXOBVA]<br>*Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck [GODRCA] |

*II PIELIKUMS*

**To reglamentēto nekarantīnas organismu saraksts, kuru klātbūtnes noteikšanai jāveic vizuālā pārbaude un – vajadzības gadījumā – paraugu ņemšana un testēšana, ievērojot 9. panta 2. un 4. punktu, 10. panta 1. punktu, 16. panta 1. punktu, 21. panta 1. punktu, 26. panta 1. punktu un IV pielikumu**

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| ***Citrus* L., *Fortunella* Swingle un *Poncirus* Raf.** | **Baktērijas** |
| | *Spiroplasma citri* Saglio *et al.* [SPIRCI] |
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR] |
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | *Citrus cristacortis* izraisītājs [CSCC00] |
| | *Citrus exocortis* viroīds [CEVD00] |
| | *Citrus impietratura* izraisītājs [CSI000] |
| | Citrusaugu lapu plankumainības vīruss [CLBV00] |
| | *Citrus psorosis* vīruss [CPSV00] |
| | *Citrus tristeza* vīruss (izolāti, kas sastopami ES) [CTV000] |
| | Citrusaugu raiblapainības vīruss [CVV000] |
| | Apiņu pundurainības viroīds [HSVD00] |
| ***Corylus avellana* L.** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00] |
| ***Cydonia oblonga* Mill.** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0] |
| | Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000] |
| | Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00] |
| | Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00] |
| | Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00] |
| | Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00] |
| | Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0] |
| | Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00] |
| | Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000] |
| ***Fragaria* L.** | **Baktērijas** |
| | *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King [XANTFR] |
| | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Colletotrichum acutatum* Simmonds [COLLAC] |
| | *Phytophthora cactorum* (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC] |
| | *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman [PHYTFR] |
| | **Nematodes** |
| | *Aphelenchoides besseyi* Christie [APLOBE] |
| | *Aphelenchoides blastophthorus* Franklin [APLOBL] |
| | *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie [APLOFR] |
| | *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI] |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | *Arabis* mozaīkas vīruss [ARMV00] |
| | Avenāju gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0] |
| | Zemenāju lapu čokurošanās vīruss [SCRV00] |
| | Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0] |
| | Zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīruss [SMYEV0] |
| | Zemenāju plankumainības vīruss [SMOV00] |
| | Zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīruss [SVBV00] |
| | Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00] |
| ***Juglans regia* L.** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00] |
| ***Malus* Mill.** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0] |
| | Ābolu bedrainības viroīds [ADFVD0] |
| | Ābeļu plakanzarainības izraisītājs [AFL000] |
| | Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00] |
| | Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000] |
| | Ābolu mizas rētainības viroīds [ASSVD0] |
| | Ābeļu zvaigžņveida plaisāšanas izraisītājs [APHW00] |
| | Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00] |
| | Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *mali* Seemüller & Schneider [PHYPMA] |
| | Augļu slimības: sīki augļi [APCF00], sačokurojušies negatavi augļi [APGC00], bedraini augļi (*Ben Davis*), raupja miza [APRSK0], zvaigžņveida plaisāšana, rūsveida gredzenplankumainība [APLP00], rūsgani izaugumi |
| ***Olea europaea* L.** | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Verticillium dahliae* Kleb [VERTDA] |
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | *Arabis* mozaīkas vīruss [ARMV00] |
| | Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00] |
| | Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0] |
| ***Prunus dulcis* (Miller) Webb** | **Baktērijas** |
| | *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR] |
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0] |
| | Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] |
| | Plūmju virālo baku vīruss [PPV000] |
| | Plūmju pundurainības vīruss [PDV000] |
| | Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0] |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| ***Prunus armeniaca* L.** | **Baktērijas**<br>*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR]<br>**Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**<br>Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]<br>Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]<br>Aprikožu latentais vīruss [ALV000]<br>*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]<br>Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]<br>Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]<br>Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0] |
| ***Prunus avium* L. un *Prunus cerasus* L.** | **Baktērijas**<br>*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR]<br>**Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**<br>Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]<br>Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]<br>*Arabis* mozaīkas vīruss [ARMV00]<br>*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]<br>Ķiršu zaļās gredzenplankumainības vīruss [CGRMV0]<br>Ķiršu lapu ritināšanās vīruss [CLRV00]<br>Ķiršu lapu plankumainības vīruss [CMLV00]<br>Ķiršu nekrotiskās rūsveida plankumainības vīruss [CRNRM0]<br>Sīko ķiršu vīruss 1 [LCHV10] un sīko ķiršu vīruss 2 [LCHV20]<br>Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]<br>Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]<br>Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0]<br>Avenāju gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0]<br>Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0]<br>Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00] |
| ***Prunus* L. hibrīdu gadījumā – *Prunus domestica* L., *Prunus salicina* Lindley un citas pret plūmju virālo baku vīrusu uzņēmīgas *Prunus* L. sugas** | **Baktērijas**<br>*Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. [XANTPR]<br>**Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas**<br>Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0]<br>Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00]<br>*Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR]<br>Mirabeļu latentās gredzenplankumainības vīruss [MLRSV0]<br>Plūmju virālo baku vīruss [PPV000]<br>Plūmju pundurainības vīruss [PDV000]<br>Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0] |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| ***Prunus persica* (L.) Batsch** | **Baktērijas** |
| | *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* [XANTPR] |
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0] |
| | Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00] |
| | Aprikožu latentais vīruss [ALV000] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider [PHYPPR] |
| | Persiku latentās mozaīkas viroīds [PLMVD0] |
| | Plūmju virālo baku vīruss [PPV000] |
| | Plūmju pundurainības vīruss [PDV000] |
| | Plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss [PNRSV0] |
| | Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0] |
| ***Pyrus* L.** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Ābeļu hlorotiskās lapu plankumainības vīruss [ACLSV0] |
| | Gumijotas ābeļu koksnes izraisītājs [ARW000] |
| | Ābeļu stumbra rievainības vīruss [ASGV00] |
| | Ābeļu stumbra bedrainības vīruss [ASPV00] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider [PHYPPY] |
| | Bumbieru mizas nekrozes izraisītājs [PRBN00] |
| | Bumbieru mizas plaisāšanas izraisītājs [PRBS00] |
| | Bumbieru čūlveida vēža viroīds [PBCVD0] |
| | Raupjas bumbieru mizas izraisītājs [PRRB00] |
| | Cidoniju dzeltenplankumainības izraisītājs [ARW000] |
| ***Ribes* L.** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | *Arabis* mozaīkas vīruss [ARMV00] |
| | Upeņu pilnziedainības vīruss [BRAV00] |
| | Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000] |
| | Ērkšķogu lapu dzīslu bālēšanas vīruss [GOVB00] |
| | Avenāju gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0] |
| | Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0] |
| ***Rubus* L.** | **Sēnes un oomicētes** |
| | *Phytophthora* spp. de Bary [1PHYTG] |
| | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās slimības un fitoplazmas** |
| | Ābeļu mozaīkas vīruss [APMV00] |
| | *Arabis* mozaīkas vīruss [ARMV00] |
| | Kazenāju nekrozes vīruss [BRNV00] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *rubi* Malembic-Maher *et al.* [PHYPRU] |
| | Gurķu mozaīkas vīruss [CMV000] |
| | Avenāju pundurainības vīruss [RBDV00] |

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| | Avenāju lapu plankumainības vīruss [RLMV00] |
| | Avenāju gredzenplankumainības vīruss [RPRSV0] |
| | Avenāju dzīslu hlorozes vīruss [RVCV00] |
| | Avenāju dzeltenplankumainības izraisītājs [RYS000] |
| | Kazenāju un avenāju dzeltenā tīklojuma vīruss [RYNV00] |
| | Zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss [SLRSV0] |
| | Tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss [TBRV00] |
| ***Vaccinium* L.** | **Vīrusi, viroīdi, vīrusveidīgās ssssslimības un fitoplazmas** |
| | Mellenāju mozaīkas ofiovīruss [BLMAV0] |
| | Mellenāju sarkanās gredzenplankumainības vīruss [BRRV00] |
| | Mellenāju iedegas vīruss [BLSCV0] |
| | Mellenāju šoka vīruss [BLSHV0] |
| | Mellenāju šaurlapainības vīruss [BSSV00] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *asteris* Lee *et al.* [PHYPAS] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *pruni* [PHYPPN] |
| | *Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.* [PHYPSO] |
| | Dzērvenāju viltus ziedu fitoplazma [PHYPFB] |

*III PIELIKUMS*

**To reglamentēto nekarantīnas organismu saraksts, kuru klātbūtni augsnē reglamentē 11. panta 1. un 2. punkts, 17. panta 1. un 2. punkts un 22. panta 1. un 2. punkts**

| Ģints vai suga | RNKO |
|---|---|
| ***Fragaria* L.** | **Nematodes**<br>*Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT]<br>*Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]<br>*Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA]<br>*Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |
| ***Juglans regia* L.** | **Nematodes**<br>*Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |
| ***Olea europaea* L.** | **Nematodes**<br>*Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |
| ***Pistacia vera* L.** | **Nematodes**<br>*Xiphinema index* Thorne & Allen [XIPHIN] |
| ***Prunus avium* L. un *Prunus cerasus* L.** | **Nematodes**<br>*Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT]<br>*Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]<br>*Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA]<br>*Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |
| ***Prunus domestica* L., *Prunus persica* (L.) Batsch un *Prunus salicina* Lindley** | **Nematodes**<br>*Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT]<br>*Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]<br>*Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |
| ***Ribes* L.** | **Nematodes**<br>*Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]<br>*Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA]<br>*Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |
| ***Rubus* L.** | **Nematodes**<br>*Longidorus attenuatus* Hooper [LONGAT]<br>*Longidorus elongatus* (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]<br>*Longidorus macrosoma* Hooper [LONGMA]<br>*Xiphinema diversicaudatum* (Mikoletzky) Thorne [XIPHDI] |

*IV PIELIKUMS*

**Prasības attiecībā uz pasākumiem atkarībā no ģints vai sugas un kategorijas, ievērojot 10. panta 4. punktu, 16. panta 4. punktu, 21. panta 4. punktu un 26. panta 2. punktu**

Pavairošanas materiāls atbilst prasībām par Savienības karantīnas organismiem un aizsargājamās zonas karantīnas organismiem, kuras paredzētas īstenošanas aktos, kas pieņemti, ievērojot Regulu (ES) 2016/2031, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

Turklāt tas atkarībā no attiecīgās ģints vai sugas un kategorijas atbilst šādām prasībām:

1. ***Castanea sativa* Mill.**

(a) **Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

(b) **Pirmsbāzes kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

Ja izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu drīkst ražot laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, kā noteikts Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/925 ([1]), attiecībā uz *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr piemēro šādas prasības:

i) pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, vai

ii) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr simptomi.

(c) **Bāzes kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) bāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, vai

ii) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr simptomi.

d) **Sertificētā kategorija un *CAC* kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) sertificētās kategorijas un *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr, vai

ii) kopš pēdējā pilnā veģetācijas perioda sākuma ražošanas vietas daļā uz sertificētās kategorijas un *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr simptomi vai

([1]) Komisijas 2017. gada 29. maija Īstenošanas lēmums (ES) 2017/925, ar ko uz laiku atļauj dažām dalībvalstīm sertificēt konkrētu augļaugu sugu pirmsbāzes materiālu, kas ražots laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, un atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/167 (OV L 140, 31.5.2017., 7. lpp.).

iii) sertificētās kategorijas un *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Cryphonectria parasitica* (Murrill) Barr simptomiem ir izrauti, bet pārējo pavairošanas materiālu un augļaugus pārbauda reizi nedēļā un vismaz trīs nedēļas pirms to nosūtīšanas ražošanas vietas daļā nav novēroti minētā kaitīgā organisma simptomi.

2. ***Citrus* L., *Fortunella* Swingle un *Poncirus* Raf.**

a) **Pirmsbāzes kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra pirmsbāzes mātesauga reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. klātbūtni. No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un tos testē trīs gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk – reizi trijos gados, lai noteiktu *Citrus tristeza* vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtni.

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos sešus gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk – reizi sešos gados, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Citrus tristeza* vīruss (izolāti, kas sastopami ES) un *Spiroplasma citri* Saglio *et al*., bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

b) **Bāzes kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi *Citrus tristeza* vīrusa (izolātu, kas sastopami ES), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. un *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley klātbūtnes noteikšanai veic divas reizes gadā. Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā visu to I un II pielikumā norādīto RNKO noteikšanai, kas nav *Citrus tristeza* vīruss (izolāti, kas sastopami ES), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. un *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja bāzes mātesaugi ir turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi trīs gados no katra bāzes mātesauga ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Citrus tristeza* vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtni. No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. klātbūtni.

Ja bāzes mātesaugi nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, katru gadu no reprezentatīvas šādu augu daļas ņem paraugus un tos testē *Citrus tristeza* vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) un *Spiroplasma citri Saglio et al*. klātbūtnes noteikšanai, lai panāktu, ka visi mātesaugi tiek testēti reizi divos gados. Ja testēšanas rezultātā tiek atklāts *Citrus tristeza* vīruss (izolāti, kas sastopami ES), no visiem bāzes mātesaugiem ražošanas vietas daļā ņem paraugus un testē tos. No reprezentatīvas tādu bāzes mātesaugu daļas, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi sešos gados ņem paraugus un testē tos, pamatojoties uz šādu augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu tādu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Citrus tristeza* vīruss (izolāti, kas sastopami ES) un *Spiroplasma citri* Saglio *et al*.

c) **Sertificētā kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi divas reizes gadā veic attiecībā uz *Citrus tristeza* vīrusu (izolātiem, kas sastopami ES), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. un *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley. Vizuālo pārbaudi reizi gadā veic visu to I un II pielikumā norādīto RNKO noteikšanai, kas nav *Citrus tristeza* vīruss (izolāti, kas sastopami ES), *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. un *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley .

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja sertificēti mātesaugi ir turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi četros gados no reprezentatīvas šādu augu daļas ņem paraugus un tos testē *Citrus tristeza* vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtnes noteikšanai, lai panāktu, ka visi mātesaugi ir testēti reizi astoņos gados.

Ja sertificēti mātesaugi nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi gadā no reprezentatīvas šādu mātesaugu daļas ņem paraugus un tos testē *Citrus tristeza* vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtnes noteikšanai, lai panāktu, ka visi mātesaugi ir testēti reizi trīs gados. No reprezentatīvas sertificētu mātesaugu daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, ņem paraugus un testē tos, ja rodas šaubas par to I un II pielikumā minēto kaitīgo organismu klātbūtni, kas nav *Citrus tristeza* vīruss (izolāti, kas sastopami ES).

Ja testēšanas rezultāti attiecībā uz *Citrus tristeza* vīrusu (izolātiem, kas sastopami ES) ir pozitīvi, no visiem sertificētiem mātesaugiem ražošanas vietas daļā ņem paraugus un testē tos.

d) **Bāzes kategorija un sertificētā kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *CAC* pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Citrus tristeza* vīrusa (izolātiem, kas sastopami ES) un *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. un *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley, vai

ii) tāda bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā uz šāda pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. vai *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi, un pirms tirdzniecības šāds materiāls un augļaugi ir pakļauti pēc nejaušības principa veiktai paraugu ņemšanai un testēšanai, lai noteiktu *Citrus tristeza* vīrusu (izolātus, kas sastopami ES), vai

iii) tāda sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas nav audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā šādam pavairošanas materiālam un augļaugiem nav novēroti *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. vai *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi, un pirms tirdzniecības no reprezentatīvas materiāla daļas ir paņemti paraugi un veikta to testēšana, lai noteiktu *Citrus tristeza* vīrusu (izolātus, kas sastopami ES), vai

iv) tāda sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas nav audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās:

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley vai *Spiroplasma citri*Saglio *et al*. simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā no reprezentatīvas sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu daļas pirms tirdzniecības ir ņemti paraugi un veikti testi attiecībā uz *Citrus tristeza* vīrusu (izolātiem, kas sastopami ES), un ražošanas vietas daļā minētais vīruss ir konstatēts ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu. Šāds pavairošanas materiāls un augļaugi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti. Tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ir pakļauti pēc nejaušības principa veiktai paraugu ņemšanai un testēšanai, un viss šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kuros tika atrasts minētais vīruss, ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

e) ***CAC* kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

*CAC* kategorijas pavairošanas materiālu un augļaugus iegūst no identificēta materiālu avota, kas, pamatojoties uz vizuālo pārbaudi, paraugu ņemšanu un testēšanu, ir atzīts par brīvu no II pielikumā minētajiem RNKO.

Ja identificētais materiālu avots ir turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas šāda materiāla daļas reizi astoņos gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Citrus tristeza* vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtni.

Ja identificētais materiālu avots nav turēts no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas šāda materiāla daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Citrus tristeza* vīrusa (izolātu, kas sastopami ES) klātbūtni.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *CAC* pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Citrus tristeza* vīrusa (izolātiem, kas sastopami ES) un *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. un *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley vai

ii) tāda *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz minētā pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. vai *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi, un pirms tirdzniecības šāds materiāls un augļaugi ir pakļauti pēc nejaušības principa veiktai paraugu ņemšanai un testēšanai, lai noteiktu *Citrus tristeza* vīrusu (izolātus, kas sastopami ES), vai

iii) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. or *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pirms tirdzniecības no reprezentatīvas materiāla daļas ir paņemti paraugi un veikta to testēšana, lai noteiktu *Citrus tristeza* vīrusu (izolātus, kas sastopami ES), vai

iv) tāda *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu gadījumā, kas nav audzēti no kukaiņiem aizsargātās telpās:

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Spiroplasma citri* Saglio *et al*. or *Plenodomus tracheiphilus* (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šis pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un

— pirms tirdzniecības pēdējā pilnajā veģetācijas periodā ražošanas vietas daļā no reprezentatīvas *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu daļas ir ņemti paraugi un testēti attiecībā uz *Citrus tristeza* vīrusu (izolāti, kas sastopami ES), un testēšanas rezultātā minētais vīruss ir konstatēts ne vairāk kā 2 % *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu. Šāds pavairošanas materiāls un augļaugi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti. Tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ir pakļauti ēc nejaušības principa veiktai paraugu ņemšanai un testēšanai, un viss šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kuros tika atrasts minētais vīruss, ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

3. ***Corylus avellana* L.**

**Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

4. ***Cydonia oblonga* Mill.**

a) **Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā veic vizuālas pārbaudes *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* noteikšanai. Lai noteiktu visus tos RNKO, kas nav *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, vizuālās pārbaudes veic reizi gadā.

b) **Pirmsbāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos piecpadsmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecpadsmit gados, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

Ja saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/925 izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu atļauts ražot laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, attiecībā uz *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* piemēro šādas prasības:

i) pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, vai

ii) pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.* simptomiem un visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

c) **Bāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un testē tos, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

d) **Sertificētā kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus un testē tos.

e) **Bāzes kategorija un sertificētā kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) Bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, vai

ii) bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

f) ***CAC* kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., vai

ii) pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

5. ***Ficus carica* L.**

**Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

6. ***Fragaria* L.**

a) **Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā audzēšanas sezonā. Vizuāli pārbauda *Fragaria* L. lapotni, lai noteiktu *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman klātbūtni.

Ja pavairošanas materiāls un augļaugi iegūti, izmantojot mikropavairošanas metodi, un turēti mazāk par trim mēnešiem, šajā laikposmā vizuālā pārbaude jāveic tikai vienu reizi.

b) **Pirmsbāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos vienu gadu pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk vienu reizi audzēšanas sezonā, lai noteiktu II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

c) **Bāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No reprezentatīva sakņu parauga ņem paraugus un veic to testēšanu, ja lapotnē ir *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman simptomi. Ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi, veic paraugu ņemšanu un testēšanu. Ja rodas šaubas par to I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Arabis* mozaīkas vīruss, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss, zemenāju lapu čokurošanās vīruss, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīruss, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— Bāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu lapotnē nav novēroti *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman simptomi, un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī vismaz 5 m rādiusā esošie inficētie augi ir atzīmēti, nav vākti un tirgoti un pēc neinficētā pavairošanas materiāla un augļaugu novākšanas ir iznīcināti,

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— Bāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— Laikposms, kurā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, ir vismaz desmit gadi no *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman konstatēšanas līdz nākamajai stādīšanai vai

— ražošanas vietas daļā ir vesta lauku augsekas maiņas un augsnes slimību vēsture.

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— Laikposms, kurā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, ir vismaz viens gads no *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King konstatēšanas līdz nākamajai stādīšanai.

iii) Prasības attiecībā uz tiem RNKO, kas nav *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King un *Phytophthora fragariae*C.J. C.J. Hickman un kas nav vīrusi:

— Pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu procentuālais daudzums, kuriem ir katra turpmāk minētā RNKO simptomi, nepārsniedz:

— 0,05 % *Aphelenchoides besseyi* gadījumā,

— 0,1 % zemenāju pavairošanas slimības fitoplazmas gadījumā,

— 0,2 %

*Candidatus* Phytoplasma *asteris* Lee *et al.*,

*Candidatus* Phytoplasma *pruni*,

*Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*,

*Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,

*Verticillium dahliae* Kleb gadījumā,

— 0,5 %

*Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,

*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev,

*Meloidogyne hapla* Chitwood,

*Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu gadījumā,

— 1 % *Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen gadījumā, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti un

— ja testēšanas rezultātā bāzes kategorijas pavairošanas materiālam un augļaugiem konstatē *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomus, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

iv) Prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā visu I un II pielikumā minēto vīrusu simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

d) **Sertificētā kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No reprezentatīva sakņu parauga ņem paraugus un veic to testēšanu, ja lapotnē ir *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman simptomi. Ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi, veic paraugu ņemšanu un testēšanu. Ja rodas šaubas par to I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Arabis* mozaīkas vīruss, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss, zemenāju lapu čokurošanās vīruss, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīruss, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— Sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā sertificētā pavairošanas materiāla un augļaugu lapotnē nav novēroti *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman simptomi, un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī vismaz 5 m rādiusā esošie inficētie augi apkārtnē ir atzīmēti, nav vākti un tirgoti un pēc neinficēto augu novākšanas ir iznīcināti,

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

ii) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— Laikposms, kurā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, ir vismaz desmit gadi no *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman konstatēšanas līdz nākamajai stādīšanai vai

— ražošanas vietas daļā ir vesta lauku augsekas maiņas un augsnes slimību vēsture.

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— Laikposms, kurā attiecīgais pavairošanas materiāls un augļaugi netiek audzēti, ir vismaz viens gads no *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King konstatēšanas līdz nākamajai stādīšanai.

iii) Prasības attiecībā uz tiem RNKO, kas nav *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King un *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman un kas nav vīrusi:

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu procentuālais daudzums, kuriem ir katra turpmāk minētā RNKO simptomi, nepārsniedz:

— 0,1 % *Phytonemus pallidus* Banks gadījumā,

— 0,5 %

*Aphelenchoides besseyi* Christie,

zemenāju pavairošanas slimības fitoplazmas gadījumā,

— 1 %

*Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos) Christie,

*Candidatus Phlomobacter fragariae* Zreik, Bové & Garnier,

*Candidatus* Phytoplasma *asteris* Lee *et al.*,

*Candidatus Phytoplasma australiense* Davis *et al.*,

*Candidatus Phytoplasma fragariae* Valiunas, Staniulis & Davis,

*Candidatus* Phytoplasma *pruni*,

*Candidatus* Phytoplasma *solani* Quaglino *et al.*,

*Chaetosiphon fragaefolii* Cockerell,

*Clover phyllody* fitoplazma,

*Ditylenchus dipsaci* (Kuehn) Filipjev,

*Meloidogyne hapla* Chitwood Chitwood,

*Podosphaera aphanis* (Wallroth) Braun & Takamatsu,

*Pratylenchus vulnus* Allen & Jensen,

*Rhizoctonia fragariae* Hussain & W.E.McKeen gadījumā,

— 2 %:

*Verticillium albo-atrum* Reinke & Berthold,

*Verticillium dahliae* Kleb gadījumā, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti, un

— ja testējot tiek atklāts sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

iv) Prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā visu I un II pielikumā minēto vīrusu simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

e) ***CAC* kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No reprezentatīva sakņu parauga ņem paraugus un veic to testēšanu, ja lapotnē ir *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman simptomi. Ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi, veic paraugu ņemšanu un testēšanu. Ja rodas šaubas par tādu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Arabis* mozaīkas vīruss, *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss, zemenāju lapu čokurošanās vīruss, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīruss, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) — *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu lapotnē nav novēroti *Phytophthora fragariae* C.J. Hickman simptomi, un viss inficētais pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī vismaz 5 m rādiusā esošie inficētie augi ir atzīmēti, nav vākti un tirgoti un pēc neinficētā pavairošanas materiāla un augļaugu novākšanas ir iznīcināti,

— *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Xanthomonas fragariae* Kennedy & King simptomi ir novēroti ne vairāk kā 5 % *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

ii) Prasības attiecībā uz vīrusiem:

ja testēšanas rezultātā tiek atklāts *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju lapu čokurošanās vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju vieglās lapmalu dzeltēšanas vīrusa, zemenāju lapu dzīslu bālēšanas vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

7. ***Juglans regia* L.**

a) **Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

b) **Pirmsbāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un tos testē vienu gadu pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi gadā, lai noteiktu II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, bet – šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

c) **Bāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi gadā ņem paraugus un testē tos, lai noteiktu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

d) **Sertificētā kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos reizi trīs gados, lai noteiktu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus un veic to testēšanu.

e) ***CAC* kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

8. ***Malus* Mill.**

a) **Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

b) **Pirmsbāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos piecpadsmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecpadsmit gados, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

Ja saskaņā ar Komisijas Īstenošanas lēmumu (ES) 2017/925 izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu atļauts ražot laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, attiecībā uz *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider un *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* piemēro šādas prasības:

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, vai

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.* simptomiem un visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

c) **Bāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Tādu bāzes mātesaugu gadījumā, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider klātbūtni.

Tādu bāzes mātesaugu gadījumā, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider klātbūtni. No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un veic to testēšanu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider un citas vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

d) **Sertificētā kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Tādu sertificētu mātesaugu gadījumā, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un veic to testēšanu reizi piecpadsmit gados, lai noteiktu *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider klātbūtni.

Tādu sertificētu mātesaugu gadījumā, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas šādu mātesaugu daļas ņem paraugus un tos testē reizi piecos gados, lai noteiktu *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider klātbūtni. No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider un citas vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus un testē tos.

e) **Bāzes kategorija un sertificētā kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % CAC kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., vai

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

f) ***CAC* kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no *Candidatus Phytoplasma mali* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*.

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*., vai

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al*. simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

9. ***Olea europaea* L.**

a) **Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

b) **Pirmsbāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos desmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi desmit gados, lai noteiktu II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, bet – šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

c) **Bāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas ņem paraugus, lai panāktu, ka visi augi reizi trīsdesmit gados ir testēti uz I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šādu augu inficēšanās riska novērtējumu.

d) **Sertificētā kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja mātesaugus izmanto sēklu ("sēklas mātesaugu") ražošanai, no reprezentatīvas šādu sēklas mātesaugu daļas ņem paraugus, pamatojoties uz šādu augu inficēšanās riska novērtējumu, lai panāktu, ka visi augi reizi četrdesmit gados ir testēti uz I un II pielikumā norādīto RNKO klātbūtni. Ja izmanto mātesaugus, kas nav sēklas mātesaugi, no reprezentatīvas šādu augu daļas ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šādu augu inficēšanās riska novērtējumu, lai panāktu, ka visi augi ir testēti reizi trīsdesmit gados.

e) ***CAC* kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

10. ***Pistacia vera* L.**

**Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

11. ***Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasifera* Ehrh., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L., *Prunus dulcis* (Miller) Webb, *Prunus persica* (L.) Batsch un *Prunus salicina* Lindley**

a) **Pirmsbāzes kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi divas reizes gadā veic attiecībā uz *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, plūmju virālo baku vīrusu, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie (*Prunus persica* (L.) Batsch un *Prunus salicina* Lindley). Vizuālo pārbaudi reizi gadā veic visu to I un II pielikumā minēto RNKO noteikšanai, kas nav *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneide, plūmju virālo baku vīruss, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. un *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

*Prunus armeniaca* L., *Prunus avium* L., *Prunus cerasus* L., *Prunus domestica* L. un *Prunus dulcis* (Miller) Webb pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiālu un augļaugus iegūst no mātesaugiem, kuri iepriekšējā audzēšanas sezonā ir testēti un atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa.

*Prunus cerasifera* Ehrh. un *Prunus domestica* L. pirmsbāzes potcelmus iegūst no mātesaugiem, kuri iepriekšējā audzēšanas sezonā ir testēti un atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa. *Prunus cerasifera* Ehrh. un *Prunus domestica* L. pirmsbāzes potcelmus iegūst no mātesaugiem, kuri iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās ir testēti un atzīti par brīviem no *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider.

No katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga vienu gadu pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi gadā ņem paraugus un testē tos, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni. *Prunus persica* gadījumā no katra ziedoša pirmsbāzes mātesauga vienu gadu pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu persiku latentās mozaīkas viroīdu. No īpaši apputeksnēšanai iestādītu koku reprezentatīvas daļas un vajadzības gadījumā no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusu un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusu.

No katra pirmsbāzes mātesauga piecus gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecos gados ņem paraugus un testē tos, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusu. No katra pirmsbāzes mātesauga desmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi desmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav plūmju pundurainības vīruss, plūmju virālo baku vīruss un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni. Ja rodas šaubas par *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. klātbūtni, no reprezentatīvas pirmsbāzes mātesaugu daļas ņem paraugus un veic to testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

Ja izņēmuma kārtā pirmsbāzes materiālu atļauts ražot laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, kā noteikts Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2017/925, attiecībā uz *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, plūmju virālo baku vīrusu, *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. un *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie piemēro šādas prasības:

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā ir atdalīti no citiem saimniekaugiem. Atdalītās ražošanas vietas daļas attālums ir atkarīgs no reģionālajiem apstākļiem, pavairošanas materiāla veida, *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider klātbūtnes attiecīgajā apgabalā, kā arī attiecīgajiem riskiem, ko pārbaudē noteikušas kompetentās iestādes;

ii) plūmju virālo baku vīruss

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir audzēti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā ir atdalīti no citiem saimniekaugiem. Atdalītās ražošanas vietas daļas attālums ir atkarīgs no reģionālajiem apstākļiem, pavairošanas materiāla veida, plūmju virālo baku vīrusa klātbūtnes attiecīgajā apgabalā un attiecīgajiem riskiem, ko pārbaudē noteikušas kompetentās iestādes;

iii) *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*.

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*., vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

b) **Bāzes kategorija, sertificētā kategorija un *CAC* kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

c) **Bāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

(i) Mātesaugi, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās

No reprezentīvas bāzes mātesaugu daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni. No reprezentīvas bāzes mātesaugu daļas reizi desmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider klātbūtni.

(ii) Mātesaugi, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās

No reprezentatīvas tādu bāzes mātesaugu daļas, kuri nav paredzēti potcelmu ražošanai, reizi gadā ņem paraugus un tos testē uz plūmju virālo baku vīrusu, lai panāktu, ka visi augi ir testēti reizi desmit gados.

No reprezentatīvas potcelmu ražošanai paredzētu bāzes mātesaugu daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, un šajos testos konstatē, ka tie ir brīvi no minētā RNKO. No reprezentatīvas potcelmu ražošanai paredzētu *Prunus domestica* L. bāzes mātesaugu daļas iepriekšējās piecās audzēšanas sezonās ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider klātbūtni, un šajos testos konstatē, ka tie ir brīvi no minētā RNKO.

Ja rodas šaubas par *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. klātbūtni, no reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos. No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi desmit gados ņem paraugus un testē tos, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīruss, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss un plūmju virālo baku vīruss, bet šaubu gadījumā – I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

— Ziedoši mātesaugi

No reprezentatīvas ziedošu bāzes mātesaugu daļas reizi gadā ņem paraugus tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

*Prunus persica* (L.) Batsch gadījumā no ziedošu bāzes mātesaugu reprezentatīvas daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu persiku latentās mozaīkas viroīdu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu. No īpaši apputeksnēšanai iestādītu koku reprezentatīvas daļas un vajadzības gadījumā no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

— Neziedoši mātesaugi

No tādu neziedošu bāzes mātesaugu reprezentatīvas daļas, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

d) **Sertificētā kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

i) Mātesaugi, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās

No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa un plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, nolūkā panākt, ka visi augi ir testēti reizi piecpadsmit gados. No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider klātbūtni.

ii) Mātesaugi, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās

No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, nolūkā panākt, ka visi augi ir testēti reizi piecpadsmit gados.

No potcelmu ražošanai paredzētu sertificēto mātesaugu reprezentatīvas daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju virālo baku vīrusa klātbūtni, un šajos testos nekonstatē minētā RNKO klātbūtni. No potcelmu ražošanai paredzētu sertificēto *Prunus cerasifera* Ehrh. un *Prunus domestica* L. mātesaugu reprezentatīvas daļas pēdējās piecās audzēšanas sezonās ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider klātbūtni, un šajos testos nekonstatē RNKO klātbūtni.

Ja rodas šaubas par *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. klātbūtni, no reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos. No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un testē tos, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Candidatus* Phytoplasma *prunorum*Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīruss, plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīruss un plūmju virālo baku vīruss, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

— Ziedoši mātesaugi

No reprezentatīvas ziedošu sertificēto mātesaugu daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu. *Prunus persica* (L.) Batsch gadījumā no ziedošu sertificētu mātesaugu reprezentatīvas daļas reizi gadā ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu persiku latentās mozaīkas viroīdu, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu. No īpaši apputeksnēšanai iestādītu koku reprezentatīvas daļas un vajadzības gadījumā no lielākajiem apputeksnētājkokiem apkārtējā vidē ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

— Neziedoši mātesaugi

No tādu neziedošu sertificētu mātesaugu reprezentatīvas daļas, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum*, plūmju pundurainības vīrusa un plūmju nekrotiskās gredzenplankumainības vīrusa klātbūtni, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu.

e) **Bāzes kategorija un sertificētā kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un reprezentatīvs pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts, ka tas ir brīvs no *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider;

ii) plūmju virālo baku vīruss

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un reprezentatīvs pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no plūmju virālo baku vīrusa;

iii) *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilki simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilki simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2% sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un viss tuvākajā apkārtnē esošais pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

f) **CAC kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

*CAC* kategorijas pavairošanas materiālu un augļaugus iegūst no identificēta materiālu avota, no kura reprezentatīvas daļas trīs iepriekšējās audzēšanas sezonās ir ņemti paraugi un veikta to testēšana, un tie atzīti par brīviem no plūmju virālo baku vīrusa.

*Prunus cerasifera* Ehrh. un *Prunus domestica* L. *CAC* kategorijas potcelmi ir iegūti no identificēta materiālu avota, no kura reprezentatīvas daļas iepriekšējos piecos gados ir ņemti paraugi un veikta to testēšana, un tie atzīti par brīviem no *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīrusa.

Ja rodas šaubas par *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. klātbūtni, no reprezentatīvas *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu daļas ņem paraugus un testē tos.

No reprezentatīvas tādu *CAC* kategorijas augļaugu daļas, uz kuriem vizuālajās pārbaudēs nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu minētā RNKO klātbūtni, pamatojoties uz šo augļaugu inficēšanās riska novērtējumu, kā arī tad, ja tuvākajā apkārtnē ir augi ar minētā vīrusa simptomiem.

Ja vizuālā pārbaudē ražošanas vietas daļā ir konstatēts *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider simptomiem, no pārējā *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem bez simptomiem reprezentatīvas daļas partijās, kurās tika konstatēts pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem, ņem paraugus un testē tos, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider klātbūtni.

Ja rodas šaubas par to I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider un plūmju virālo baku vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider; vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *CAC* kategorijas pavairošanas materiālā un augļaugos nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma *prunorum* Seemüller & Schneider vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Pseudomonas syringae pv. persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie un *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al*. simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2% *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

ii) plūmju virālo baku vīruss

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no plūmju virālo baku vīrusa, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti plūmju virālo baku vīrusa simptomi, un jebkuri tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā plūmju virālo baku vīrusa simptomi ir novēroti ne vairāk kā 1 % *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un ir veikta pārējo augu bez simptomiem reprezentatīva parauga pārbaude partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, un ir atzīts, ka tas ir brīvs no plūmju virālo baku vīrusa;

iii) *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi nav novēroti *CAC* kategorijas pavairošanas materiālā un augļaugos, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Pseudomonas syringae* pv. *persicae* (Prunier, Luisetti &. Gardan) Young, Dye & Wilkie simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

iv) *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.*, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā uz *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem nav novēroti *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augu ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Xanthomonas arboricola* pv. *pruni* (Smith) Vauterin *et al.* simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2% *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

12. ***Pyrus* L.**

a) **Visas kategorijas**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

b) **Pirmsbāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos piecpadsmit gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk – reizi piecpadsmit gados, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

Ja izņēmuma kārtā ir atļauts ražot pirmsbāzes materiālu laukā, kur nav nodrošināta aizsardzība pret kukaiņiem, kā to paredz Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2017/925, attiecībā uz *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider un *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* piemēro šādas prasības:

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, vai

— pirmsbāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā ir pārbaudīti pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

c) **Bāzes kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Tādu bāzes mātesaugu gadījumā, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider klātbūtni.

Tādu bāzes mātesaugu gadījumā, kuri nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi trīs gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider klātbūtni. No reprezentatīvas bāzes mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un tos testē, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider un citas vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

d) **Sertificētā kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Tādu sertificēto mātesaugu gadījumā, kas turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas reizi piecpadsmit gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider klātbūtni.

Tādu sertificēto mātesaugu gadījumā, kas nav turēti no kukaiņiem aizsargātās telpās, no reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas reizi piecos gados ņem paraugus un tos testē, lai noteiktu *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider klātbūtni. No reprezentatīvas sertificēto mātesaugu daļas ņem paraugus un testē tos reizi piecpadsmit gados, pamatojoties uz šo augu inficēšanās riska novērtējumu, lai noteiktu to II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider un citas vīrusveidīgās slimības un viroīdi, bet šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, no sertificētiem augļaugiem ņem paraugus un testē tos.

e) **Bāzes kategorija un sertificētā kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās tika konstatēts pavairošanas materiāls un augļaugi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, vai

— bāzes kategorijas un sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

f) ***CAC* kategorija**

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no Candidatus Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider simptomi, un visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider simptomi ir novēroti ne vairāk kā 2 % *CAC* kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti, un pārējā pavairošanas materiāla un augļaugu bez simptomiem reprezentatīvs paraugs partijās, kurās tika konstatēti augi ar simptomiem, ir testēts un atzīts par brīvu no *Candidatus* Phytoplasma *pyri* Seemüller & Schneider;

ii) *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.*, vai

— *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ražošanas vietas daļā pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ir pārbaudīti, un viss pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow *et al.* simptomiem, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir nekavējoties izrauti un iznīcināti.

13. ***Ribes* L.**

a) **Pirmsbāzes kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos četrus gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi četros gados, lai noteiktu II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, bet – šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

b) **Bāzes kategorija, sertificētā kategorija un *CAC* kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā norādīto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

c) **Bāzes kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

Pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu ar *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer simptomiem procentuālais daudzums nepārsniedz 0,05 %, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti.

d) **Sertificētā kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

Pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu ar *Aphelenchoides ritzemabosi* (Schwartz) Steiner & Buhrer simptomiem procentuālais daudzums nepārsniedz 0,05 %, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti.

14. ***Rubus* L.**

a) **Pirmsbāzes kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos divus gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi divos gados, lai noteiktu II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, bet – šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

b) **Bāzes kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Ja pavairošanas materiāls un augļaugi ir audzēti uz lauka vai podos, vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā.

Ja pavairošanas materiāls un augļaugi ražoti, izmantojot mikropavairošanas metodi, un tie turēti laikposmu, kas mazāks par trim mēnešiem, šajā laikposmā jāveic tikai viena vizuāla pārbaude.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi, veic paraugu ņemšanu un testēšanu. Ja rodas šaubas par tādu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Arabis* mozaīkas vīruss, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) Ja bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu testēšanas rezultātā tiek atrasts *Arabis* mozaīkas vīruss, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss vai tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina;

ii) Prasības attiecībā uz tiem RNKO, kas nav *Arabis* mozaīkas vīruss, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu procentuālais daudzums, kuriem ir katra turpmāk minētā RNKO simptomi, nepārsniedz:

— 0,1 %:

*Agrobacterium* spp. Conn.,

*Rhodococcus fascians* Tilford gadījumā, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti, un

iii) prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā visu I un II pielikumā minēto vīrusu simptomi ir novēroti ne vairāk kā 0,25 % bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugiem, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

c) **Sertificētā kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi, veic paraugu ņemšanu un testēšanu. Ja rodas šaubas par tādu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Arabis* mozaīkas vīruss, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) Ja testējot tiek atrasts sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa vai tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

ii) Prasības attiecībā uz tiem RNKO, kas nav *Arabis* mozaīkas vīruss, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu procentuālais daudzums, kuriem ir katra turpmāk minētā RNKO simptomi, nepārsniedz:

— 0,5 % *Resseliella theobaldi* Barnes gadījumā,

— 1 %:

*Agrobacterium* spp. Conn.,

*Rhodococcus fascians* Tilford gadījumā, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti,

iii) Prasības attiecībā uz visiem vīrusiem:

pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā visu I un II pielikumā minēto vīrusu simptomi ir novēroti ne vairāk kā 0,5 % sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi tuvākajā apkārtnē esošie augi ar simptomiem ir izrauti un nekavējoties iznīcināti.

d) ***CAC* kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja vizuālajā pārbaudē ir novēroti neskaidri *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa un tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomi, veic paraugu ņemšanu un testēšanu. Ja rodas šaubas par tādu I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, kas nav *Arabis* mozaīkas vīruss, avenāju gredzenplankumainības vīruss, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīruss un tomātu melnās gredzenplankumainības vīruss, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

Ja testējot tiek atrasts *CAC* kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ar *Arabis* mozaīkas vīrusa, avenāju gredzenplankumainības vīrusa, zemenāju latentās gredzenplankumainības vīrusa vai tomātu melnās gredzenplankumainības vīrusa simptomiem, attiecīgo pavairošanas materiālu un augļaugus izrauj un nekavējoties iznīcina.

15. ***Vaccinium* L.**

a) **Pirmsbāzes kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

No katra pirmsbāzes mātesauga ņem paraugus un testē tos piecus gadus pēc tā apstiprināšanas par pirmsbāzes mātesaugu un turpmāk reizi piecus gados, lai noteiktu II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, bet – šaubu gadījumā – arī I pielikumā minēto RNKO klātbūtni.

b) **Bāzes kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic divas reizes gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn simptomi;

ii) *Diaporthe vaccinii* Shear

— bāzes kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Diaporthe vaccinii* Shear, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti *Diaporthe vaccinii* Shear simptomi;

iii) *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin un*Godronia cassandrae* (anamorfā forma *Topospora myrtilli*) Peck

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā bāzes kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu procentuālais daudzums, kuriem ir katra turpmāk minētā RNKO simptomi, nepārsniedz:

— 0,1 % *Godronia cassandrae* (anamorfās formas *Topospora myrtilli*) Peck gadījumā,

— 0,5 % *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin gadījumā, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti.

c) **Sertificētā kategorija un *CAC* kategorija**

*Vizuālā pārbaude*

Vizuālo pārbaudi veic reizi gadā.

*Paraugu ņemšana un testēšana*

Ja rodas šaubas par I un II pielikumā minēto RNKO klātbūtni, veic paraugu ņemšanu un testēšanu.

d) **Sertificētā kategorija**

*Prasības ražošanas vietas daļai, ražošanas vietai vai apgabalam*

i) *Diaporthe vaccinii* Shear:

— sertificētās kategorijas pavairošanas materiāls un augļaugi ir ražoti apgabalos, par kuriem zināms, ka tie ir brīvi no *Diaporthe vaccinii* Shear, vai

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā nav novēroti *Diaporthe vaccinii* Shear simptomi;

ii) *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn, *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin un *Godronia cassandrae* (anamorfa forma *Topospora myrtilli*) Peck

— pēdējā pilnajā audzēšanas sezonā ražošanas vietas daļā tā sertificētās kategorijas pavairošanas materiāla un augļaugu procentuālais daudzums, kuriem ir katra turpmāk minētā RNKO simptomi, nepārsniedz:

— 0,5 %:

*Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn,

*Godronia cassandrae* (anamorph Topospora myrtilli) Peck gadījumā,

— 1 % *Exobasidium vaccinii* (Fuckel) Woronin gadījumā, un šāds pavairošanas materiāls un augļaugi, kā arī visi apkārt esošie saimniekaugi ir izrauti un iznīcināti.”