31994L0014

KOMISJONI DIREKTIIV 94/14/EÜ,

29. märts 1994,

millega muudetakse seitsmendat direktiivi 76/372/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse analüüsimeetodid söötade ametlikuks kontrollimiseks

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 20. juuli 1970. aasta direktiivi 70/373/EMÜ söötade ametlikuks kontrollimiseks ettenähtud ühenduse proovivõtu- ja analüüsimeetodite kehtestamise kohta, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 3768/85, [2] eriti selle artiklit 2,

ning arvestades, et:

seitsmenda komisjoni direktiiviga 76/372/EMÜ, [3] viimati muudetud direktiiviga 92/95/EMÜ, [4] nähakse ette aflatoksiin B_1 määramiseks kasutatavad meetodid;

järjekordselt on vaja muuta praegu kasutatavat doseerimismeetodit, et täpselt sõnastada proovi ettevalmistamise käik ja määratleda tulemuste väljendamise eeskirjad;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 76/372/EMÜ lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale,

Artikkel 2

Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt ühe aasta möödumisel direktiivi jõustumisest. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 3

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Ühenduste Teatajas*.

Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. märts 1994

Komisjoni nimel

komisjoni liige

René STEICHEN

---

(1) EÜT L 170, 3.8.1970, lk 2.
(2) EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8.
(3) EÜT L 102, 15.4.1976, lk 8.
(4) EÜT L 327, 13.11.1992, lk 54.

LISA

Direktiivi 76/372/EMÜ lisa C osa asendatakse järgmisega:

“C. Märkused meetodite A ja B kohta

1. Rasvatustamine

Üle 5 % rasva sisaldavad proovid tuleb pärast punktis 5.1. osutatud ettevalmistusi petrooleetriga (bp 40-60 °C) rasvatustada.

Sellistel juhtudel tuleb analüüsitulemusi väljendada rasvatustamata proovi kaalu põhjal.

2. Tulemuste reprodutseeritavus meetodi A puhul

Tulemuste reprodutseeritavus, st kahe või enama laboratooriumi poolt saadud proovi tulemuste erinevus on:

± 50 % 10—20 µg/kg aflatoksiin B keskväärtuste keskväärtusest;

± 10 µg/kg keskväärtuste keskväärtusest, mis on 20—50 µg/kg;

± 20 % keskväärtustest üle 50 µg/kg olevate keskväärtuste puhul.”