31994L0014

DIREKTIVA KOMISIJE 94/14/ES
z dne 29. marca 1994
o spremembi Sedme direktive 76/372/EGS o uvedbi analitskih metod Skupnosti za uradni nadzor krme

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/373/EGS z dne 20. julija 1970 o uvedbi metod vzorčenja in analiz Skupnosti za uradni nadzor krme [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (HES) 3768/85 [2], in zlasti člena 2 Direktive,

ker Sedma direktiva Komisije 76/372/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/95/EGS [4], predpisuje metode za določanje aflatoksina B_1;

ker je treba še enkrat revidirati trenutno uporabljano metodo odmerjanja, da bi natančno navedli delovni postopek za pripravo vzorca, in določiti pravila za izražanje rezultatov;

ker so ukrepi, predvideni s to direktivo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga k Direktivi 76/372/EGS se spremeni, kakor je prikazano v Prilogi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje leto dni po začetku veljave te direktive. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. marca 1994

Za Komisijo

René STEICHEN

Član Komisije

(1) UL L 170, 3.8.1970, str. 2.
(2) UL L 362, 31.12.1985, str. 8.
(3) UL L 102, 15.4.1976, str. 8.
(4) UL L 327, 13.11.1992, str. 54.

PRILOGA

Del C Priloge k Direktivi 76/372/EGS se nadomesti z naslednjim:

„C. Opombe v zvezi z metodama A in B

1. Razmastitev

Vzorce, ki vsebujejo več kakor 5 % maščob, moramo razmastiti s petroletrom (vrelišče 40 do 60 °C) po pripravah, navedenih v 5.1.

V takih primerih morajo biti rezultati analize izraženi glede na maso nerazmaščenega vzorca.

2. Obnovljivost rezultatov za metodo A

Obnovljivost rezultatov, tj. odstopanje med rezultati, dobljenimi v dveh ali več laboratorijih na istem vzorcu, je bila ocenjena pri:

± 50 % glede na srednjo vrednost za srednje vrednosti aflatoksina B od 10 do 20 μg/kg;

± 10 μg/kg k srednji vrednosti za srednje vrednosti, večje od 20 in do 50 μg/kg;

± 20 % glede na srednjo vrednost za srednje vrednosti nad 50 μg/kg.“