2024/2419

16.9.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/2419,

13. september 2024,

millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „Soft Care Med H5“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) 29. märtsil 2019 esitas Diversey Europe Operations B.V. Euroopa Kemikaaliametile (edaspidi „kemikaaliamet“) määruse (EL) nr 528/2012 artikli 43 lõike 1 kohase taotluse liidu loa saamiseks üksikule biotsiidile, mille nimi on „Soft Care Med H5“ ja mis kuulub kõnealuse määruse V lisas kirjeldatud tooteliiki 1, ning lisas kirjaliku kinnituse selle kohta, et Madalmaade pädev asutus on nõustunud taotlust hindama. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-MF050448-40.

(2) „Soft Care Med H5“ sisaldab toimeainena propaan-1-ooli ja propaan-2-ooli, mis on lisatud määruse (EL) nr 528/2012 artikli 9 lõikes 2 osutatud liidu heakskiidetud toimeainete nimekirja ja mida on lubatud kasutada tooteliigis 1.

(3) 17. juulil 2023 esitas hindav pädev asutus määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõike 1 kohaselt kemikaaliametile hindamisaruande ja oma järeldused.

(4) 14. detsembril 2023 esitas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 3 komisjonile üksiku biotsiidi „Soft Care Med H5“ kohta oma arvamuse, ([2]) biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi ja lõpliku hindamisaruande.

(5) Selles arvamuses on jõutud järeldusele, et „Soft Care Med H5“ vastab määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 1 punktis r sätestatud üksiku biotsiidi määratlusele, et sellele võib vastavalt kõnealuse määruse artikli 42 lõikele 1 taotleda liidu luba ning et biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kohaselt vastab biotsiid kõnealuse määruse artikli 19 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(6) 3. jaanuaril 2024 edastas kemikaaliamet kooskõlas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 44 lõikega 4 komisjonile biotsiidi omaduste kokkuvõtte kavandi kõigis liidu ametlikes keeltes.

(7) Komisjon on kemikaaliametiga samal arvamusel ning leiab seega, et on asjakohane anda biotsiidile „Soft Care Med H5“ liidu luba.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega,

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Euroopa Kemikaaliameti 22. novembri 2023. aasta arvamus üksikule biotsiidile „Soft Care Med H5“ liidu loa andmise kohta (ECHA/BPC/401/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ettevõtjale Diversey Europe Operations B.V. antakse liidu luba number EU-0032018-0000 üksiku biotsiidi „Soft Care Med H5“ turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks vastavalt lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Kõnealune liidu luba kehtib alates 6. oktoobrist 2024 kuni 30. septembrini 2034.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. september 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Soft Care Med H5

Biotsiidi liik (liigid)

PT01: Inimeste hügieen

Loa number: EU-0032018-0000

R4BP registrinumber: EU-0032018-0000

Peatükk 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Soft Care Med H5 Soft Care Med DivoCare Alco P VR203 DivoCare Alco P Soft Care Alcoplus Soft Care Impact Med PrimeSource MED Soft Care Alcogel PrimeSource Alcoplus PrimeSource Alcogel PrimeSource Hand Sanitizer STAPLES Med STAPLES Alcogel STAPLES Alcoplus STAPLES Hand Sanitizer Optimax Hand Sanitizer Optimax Med Optimax Alcogel Optimax Alcoplus Trust MED

1.2. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Diversey Europe Operations B.V.
	Aadress	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Loa number	EU-0032018-0000	
R4BP registrinumber	EU-0032018-0000	
Loa andmise kuupäev	6. oktoober 2024	
Loa kehtivusaja lõpp	30. september 2034	

1.3. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Diversey Europe Operations B.V.

Tootja aadress	Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itaalia Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Madalmaad Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes, Alfreton Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro, Madrid Hispaania Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Saksamaa

Tootja nimi	Multifill B.V.
Tootja aadress	Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 Mijdrecht Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 AJ Mijdrecht Madalmaad

1.4. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Propan-1-ol
Tootja nimi	BASF SE
Tootja aadress	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Saksamaa

Toimeaine	Propan-1-ol
Tootja nimi	OXEA Corporation
Tootja aadress	2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	OXEA Corporation site 1 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Ameerika Ühendriigid

Toimeaine	Propan-2-ol
Tootja nimi	SASOL Solvents Germany GmbH
Tootja aadress	Anckelmannsplatz D-20537 Hamburg Saksamaa

Tootmiskohtade asukoht	SASOL Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Saksamaa SASOL Solvents Germany GmbH site 2 Römerstr. 733 D-47443 Moers Saksamaa

Toimeaine	Propan-2-ol
Tootja nimi	Shell Chemicals Europe B.V.
Tootja aadress	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Madalmaad

Toimeaine	Propan-2-ol
Tootja nimi	Exxon Mobil Chemicals
Tootja aadress	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Exxon Mobil Chemicals site 1 ExxonMobil's Baton Rouge Refinery and Chemical Plant, 4045 Scenic Hwy LA 70805 Baton Rouge Ameerika Ühendriigid Exxon Mobil Chemicals site 2 Esso Refinery Fawley SO45 1TX Southampton Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Toimeaine	Propan-2-ol
Tootja nimi	Novapex
Tootja aadress	21 Chemin de la Sauvegarde - 21 Ecully Parc - CS 33167 69134 Écully Cedex Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Novapex site 1 Novapex SAS Usine de Rousillon, Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Prantsusmaa

Peatükk 2. **BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK**

2.1. Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propan-1-ol		toimeaine	71-23-8	200-746-9	2,96 massiprotsent
Propan-2-ol		toimeaine	67-63-0	200-661-7	70 massiprotsent

2.2. Olek (olekud)

AL Muu vedelik

Peatükk 3. **OHU- JA HOIATUSLAUSED**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	P101: Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas. P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P261: Vältida auru sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks vett. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P405: Hoida luku taga. P501: Sisu kemikaalijäätmetesse kõrvaldada P103: Lugeda tähelepanelikult ja järgida kõiki juhiseid.

Peatükk 4. **LUBATUD KASUTUSE(D)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

PT01 – Hügieeniline käte desinfitseerimisvahend

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Ümbrisega viirused Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Limiteeritud spektriga viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Tuberkuloosi bakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes kasutamine välitingimustes Kasutusvalmis käte desinfitseerimisvahend kasutamiseks haiglates ja muudes meditsiinivaldkondades, asutustes ja tööstuspiirkondades, restoranides ja suuremahulistes sööklaköökides ning puhkealades. Mitte koduseks kasutamiseks.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: muu: Dosaator Üksikasjalik kirjeldus: Pumba või pumbaga koti jaoks: Doseerida kasutusvalmis desinfitseerimisvahend, kandes toodet kätele. Hõõruda, et katta puhtad käed täielikult. Lahtiklõpsatava või korgiga pudeli jaoks: Valada kasutusvalmis vedelik ühe käe kumerale peopesale. Hõõruda, et katta puhtad käed täielikult.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: - Täiskasvanu: 3 ml (vedeliku kogus peaks sarnanema suure mündi suurusega) võrdub doseerimissüsteemi 3 pumpamisega - Alla 12-aastane laps: 2 ml võrdub doseerimissüsteemi 2 pumpamisega - Alla 6-aastane laps: 1 ml võrdub doseerimissüsteemi 1 pumpamisega Lahjendus (%): Kasutusvalmis Kasutamise arv ja ajastus: Kutseline ja tööstuskasutaja: kuni 25 pealekandmist päevas Mittekutseline kasutaja: — Täiskasvanud: kuni 11 pealekandmist päevas — Lapsed: kuni 3 pealekandmist päevas
Kasutajarühm(ad)	tööstuskasutus ; kutselised kasutajad ; elanikkond (mittekutseline)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Kutseline ja tööstuskasutaja: Jäik konteiner (lahtiklõpsatav) kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml Jäik konteiner (pump või kork) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 900, 950, 1000 liitrit Painduv konteiner (pumba või korgiga kott) madaltihedusega polüetüleen (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 liitrit Mittekutseline kasutaja: Jäik konteiner (lahtiklõpsatav) (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml Jäik konteiner (pump või kork) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5 liitrit Painduv konteiner (pumba või korgiga kott) (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 liitrit

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Järgida kasutusjuhiseid.

Toodet tuleb kasutada nähtavalt puhastel kätel.

1. samm: kanda järgmine kogus desinfitseerimisvahendit:

— Täiskasvanu: 3 ml võrdub doseerimissüsteemi 3 pumpamisega

— Alla 12-aastane laps: 2 ml võrdub doseerimissüsteemi 2 pumpamisega

— Alla 6-aastane laps: 1 ml võrdub doseerimissüsteemi 1 pumpamisega

Hõõruda peopessa. Hõõruda peopesi vastamisi, et jaotada desinfitseerimisvahend kogu kätele ja sõrmedele.

2. samm: hõõruda parema käe peopesaga vasaku käe selga. Vahetada käsi ja korrata tegevust.

3. samm: harali sõrmedega hõõruda sõrmevahed. Vahetada käsi ja korrata tegevust.

4. samm: hõõruda peopesades sõrmede pealispindu (5 korda).

5. samm: hõõruda mõlema käe pöialt tehes ringjaid liigutusi.

6. samm: hõõruda ringjate liigutustega sõrmeotsi vastas käe peopesas. Hõõruda randmed mõlema käega. Lasta kätel täielikult kuivada.

Hoida märjana 30 sekundit bakterite, pärmseente, tuberkuloosi bakterite ja ümbrisega viiruste vastu või 2 minutit limiteeritud spektriga viiruste vastu.

Mitte loputada.

Korrata, kui on vaja uuesti käsi desinfitseerida.

Laste ja väikelaste käte desinfitseerimine peab toimuma ainult täiskasvanu järelevalve all: kanda kõigepealt laste/väikelaste käte jaoks ettenähtud kogus enda käele ja hõõruda toodet lapse/väikelapse käele, kuni mõlemad käed on täielikult kuivanud (vaadata 6 sammu juhiseid). Veenduda, et laps/väikelaps ei puuduta silmi ega suud enne, kui toode on kuivanud.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Lapsed kasutavad ainult täiskasvanu järelevalve all.

Mitte kasutada alla 1-aastastel lastel.

Veenduda, et kasutaja kasutaks toodet kohas, kus inimesed ei viibi pikemat aega.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Hoida lastele ja mittesihtloomadele/lemmikloomadele kättesaamatus kohas.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

PT01 – Kirurgiline käte desinfitseerimisvahend

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Limiteeritud spektriga viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: muu: Tuberkuloosi bakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes Kasutusvalmis käte ja käsivarte kirurgiline desinfitseerimisvahend kasutamiseks haiglates ja muudes meditsiinivaldkondades.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: muu: Dosaator Üksikasjalik kirjeldus: Doseerida kasutusvalmis desinfitseerimisvahend, pumbates vähemalt 3 korda (1 ml pumpamise kohta) kätele (pump või pumbaga kott) ja hõõruda, et katta puhtad käed ja käsivarred täielikult. VÕI Valada kasutusvalmis vedelik ühe käe kumerale peopesale (lahtiklõpsatav või korgiga pudel), kandes piisavalt, et katta puhtad käed ja käsivarred täielikult.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Portsjonid 3 ml kuni 12 ml kokku Lahjendus (%): Kasutusvalmis Kasutamise arv ja ajastus: Kuni 4 pealekandmist päevas.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Jäik konteiner (lahtiklõpsatav) kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml Jäik konteiner (pump või kork) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 liitrit Painduv konteiner (pumba või korgiga kott) madaltihedusega polüetüleen (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 liitrit

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toodet tuleb kasutada nähtavalt puhastel kätel ja käsivartel.

Mitte täita ega dekanteerida tooteid, mida kasutatakse kirurgiliseks käte desinfitseerimisvahendiks.

Pumba või pumbaga koti jaoks:

Doseerida, pumbates vähemalt 3 korda (1 ml pumpamise kohta) kätele ja hõõruda, et täielikult katta puhtad käed ja käsivarred kuni küünarnukini. Korrata protseduuri ja kasutada mitut 3 ml portsjonit, et hoida käed ja käsivarred märjad 2 minuti jooksul.

Hoida märjana 2 minutit bakterite, pärmseente, tuberkuloosi bakterite ja limiteeritud spektriga viiruste vastu.

Mitte loputada.

Korrata, kui on vaja uuesti käsi desinfitseerida (kuni 4 pealekandmist päevas).

Lahtiklõpsatava või korgiga pudeli jaoks:

Valada vedelik ühe käe kumerale peopesale, kandes piisavalt, et täielikult katta puhtad käed ja käsivarred kuni küünarnukini. Korrata protseduuri ja kasutada mitut 3 ml portsjonit, et hoida käed ja käsivarred märjad 2 minuti jooksul.

Hoida märjana 2 minutit bakterite, pärmseente, tuberkuloosi bakterite ja limiteeritud spektriga viiruste vastu.

Mitte loputada.

Korrata, kui on vaja uuesti käsi desinfitseerida (kuni 4 pealekandmist päevas).

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **ÜLDISED KASUTUSJUHISED** ([1])

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismeetmed**

Vältida kokkupuudet silmadega.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Sissehingamine: Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Sattumine nahale: Puuduvad teadaolevad mõjud ja nähud tavakasutusel.

Silma sattumisel: Põhjustab tugevat ärritust

Allaneelamine: Allaneelamine võib põhjustada iiveldust ja oksendamist paikse ärrituse ja süsteemse toime tõttu, nagu joobumus, unisus, mõnikord teadvusetus ja madal veresuhkru tase (eriti lastel).

([1]) Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. Sümptomite ilmnemisel helistada 112 arstiabi saamiseks. Kui sümptomeid ei esine võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Teave meditsiinitöötajale/arstile: vajadusel alustada elupäästmismeetmetega, seejärel võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: ärrituse ilmnemisel pesta veega ja pöörduda arsti poole. Tahtmatu nahaga kokkupuutumise korral: pesta veega.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

Keskkonnakaitse meetmed:

Vältida (lahjendamata toote) (otsest) sattumist keskkonda/kanalisatsioonisüsteemi.

Lahjendada mahavoolanud toode veega ja puhastada mopiga.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kõrvaldada vastavalt riiklikele või kohalikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Hoida temperatuuril alla 30 °C.

Hoida eemal kuumusest ja otsesest päikesevalgusest.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**