2024/2419

16.9.2024.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2419

od 13. rujna 2024.

o izdavanju odobrenja Unije za pojedinačni biocidni proizvod „Soft Care Med H5” u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 44. stavak 5.,

budući da:

(1) Društvo Diversey Europe Operations B.V. podnijelo je 29. ožujka 2019. Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) zahtjev u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 za odobrenje Unije za pojedinačni biocidni proizvod pod nazivom „Soft Care Med H5”, koji pripada vrsti proizvoda 1 kako je opisana u Prilogu V. toj uredbi, uz pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Nizozemske pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran u registru biocidnih proizvoda pod brojem predmeta BC-MF050448-40.

(2) „Soft Care Med H5” kao aktivne tvari sadržava propan-1-ol i propan-2-ol, oba uvrštena na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za vrstu proizvoda 1.

(3) Nadležno ocjenjivačko tijelo Agenciji je 17. srpnja 2023., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, podnijelo izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja.

(4) Agencija je 14. prosinca 2023. Komisiji dostavila mišljenje ([2]), nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za „Soft Care Med H5” i konačno izvješće o ocjenjivanju pojedinačnog biocidnog proizvoda, u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(5) U mišljenju se zaključuje da je „Soft Care Med H5” pojedinačni biocidni proizvod u smislu članka 3. stavka 1. točke (r) Uredbe (EU) br. 528/2012, da ispunjava uvjete za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavku 1. te uredbe.

(6) Agencija je 3. siječnja 2024. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(7) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije i stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za biocidni proizvod „Soft Care Med H5”.

(8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Mišljenje ECHA-e od 22. studenog 2023. o odobrenju Unije za pojedinačni biocidni proizvod „Soft Care Med H5” (ECHA/BPC/401/2023), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Društvu Diversey Europe Operations B.V. izdaje se odobrenje Unije za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu pojedinačnog biocidnog proizvoda pod nazivom „Soft Care Med H5” s brojem odobrenja EU-0032018-0000 u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda navedenim u Prilogu.

Odobrenje Unije valjano je od 6. listopada 2024. do 30. rujna 2034.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. rujna 2024.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Soft Care Med H5

Vrsta(e) proizvoda

PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi

Broj autorizacije: EU-0032018-0000

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): EU-0032018-0000

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Trgovački naziv(i) proizvoda**

Trgovački naziv(i)	Soft Care Med H5 Soft Care Med DivoCare Alco P VR203 DivoCare Alco P Soft Care Alcoplus Soft Care Impact Med PrimeSource MED Soft Care Alcogel PrimeSource Alcoplus PrimeSource Alcogel PrimeSource Hand Sanitizer STAPLES Med STAPLES Alcogel STAPLES Alcoplus STAPLES Hand Sanitizer Optimax Hand Sanitizer Optimax Med Optimax Alcogel Optimax Alcoplus Trust MED

1.2. **Nositelj autorizacije**

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Broj autorizacije	EU-0032018-0000	
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	EU-0032018-0000	
Datum autorizacije	6. listopada 2024.	
Datum isteka autorizacije	30. rujna 2034.	

1.3. **Proizvođač(i) proizvoda**

Naziv proizvođača	Diversey Europe Operations B.V.

Adresa proizvođača	Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italija Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nizozemska Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes, Alfreton Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske Diversey Europe Operations B.V. site 4 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9, Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro, Madrid Španjolska Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Njemačka

Naziv proizvođača	Multifill B.V.
Adresa proizvođača	Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 Mijdrecht Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Multifill B.V. site 1 Constructieweg 25a, P.O. Box 367 3640 AJ Mijdrecht Nizozemska

1.4. **Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari**

Aktivna tvar	Propan-1-ol
Naziv proizvođača	BASF SE
Adresa proizvođača	Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	BASF SE site 1 Carl-Bosch-Str. 38 67056 Ludwigshafen Njemačka

Aktivna tvar	Propan-1-ol
Naziv proizvođača	OXEA Corporation
Adresa proizvođača	2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	OXEA Corporation site 1 2001 FM 3057 TX 77414 Bay City Sjedinjene Američke Države

Aktivna tvar	Propan-2-ol
Naziv proizvođača	SASOL Solvents Germany GmbH
Adresa proizvođača	Anckelmannsplatz D-20537 Hamburg Njemačka

Lokacija proizvodnih pogona	SASOL Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Njemačka SASOL Solvents Germany GmbH site 2 Römerstr. 733 D-47443 Moers Njemačka

Aktivna tvar	Propan-2-ol
Naziv proizvođača	Shell Chemicals Europe B.V.
Adresa proizvođača	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Nizozemska
Lokacija proizvodnih pogona	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Shell Nederland Chemie BV/Shell Nederland Raffinaderij B.V., Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Nizozemska

Aktivna tvar	Propan-2-ol
Naziv proizvođača	Exxon Mobil Chemicals
Adresa proizvođača	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Exxon Mobil Chemicals site 1 ExxonMobil's Baton Rouge Refinery and Chemical Plant, 4045 Scenic Hwy LA 70805 Baton Rouge Sjedinjene Američke Države Exxon Mobil Chemicals site 2 Esso Refinery Fawley SO45 1TX Southampton Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Aktivna tvar	Propan-2-ol
Naziv proizvođača	Novapex
Adresa proizvođača	21 Chemin de la Sauvegarde - 21 Ecully Parc - CS 33167 69134 Écully Cedex Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	Novapex site 1 Novapex SAS Usine de Rousillon, Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Francuska

2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
Propan-1-ol		aktivna tvar	71-23-8	200-746-9	2,96 % (w/w)
Propan-2-ol		aktivna tvar	67-63-0	200-661-7	70 % (w/w)

2.2. Vrsta(e) formulacija

AL Svaka druga tekućina

3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI**

Oznake upozorenja	H225: Lako zapaljiva tekućina i para. H336: Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Oznake obavijesti	P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P233: Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. P261: Izbjegavati udisanje pare. P271: Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. P304 + P340: AKO SE UDIŠE: Premjestiti unesrećenog na svježi zrak i postaviti u položaj koji olakšava disanje. P312: U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P337 + P313: Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet. P303 + P361 + P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom [ili tuširanjem]. P370 + P378: U slučaju požara: za gašenje vodu rabiti P403 + P235: Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Održavati hladnim. P405: Skladištiti pod ključem. P501: Odložiti sadržaj u/na kemijski otpad. P103: Pažljivo pročitati i slijediti sve upute.

4. **AUTORIZIRANA UPORABA**

4.1. **Opis uporabe**

Tablica 1.

PT01 - Higijensko sredstvo za dezinfekciju ruku

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Viruse s ovojnicom Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Ograničeni spektar virusa Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacili tuberkuloze Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome upotreba na otvorenome Dezinfekcijsko sredstvo za utrljavanje na ruke, odmah spremno za primjenu, za uporabu u bolnicama i drugim medicinskim prostorima, institucionalnim i industrijskim područjima, restoranima, velikim kuhinjama i prostorima za rekreaciju. Nije za kućnu uporabu.
Način(i) primjene	Metoda: Nanošenje Detaljan opis: Za pumpicu ili vrećicu s pumpicom: Pomoću pumpice nanijeti proizvod spreman za uporabu na ruke. Utrljati i potpuno prekriti čiste ruke. Za bocu s preklopnim ili običnim čepom: Izliti tekućinu spremnu za uporabu u dlan jedne ruke. Utrljati i potpuno prekriti čiste ruke.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Odrasli: 3 ml (količina tekućine približno izgleda kao jedna veća kovanica) jednako kao 3 istiska iz dozatora -Djeca mlađa od 12 godina: 2 ml jednako kao 2 istiska iz dozatora -Djeca mlađa od 6 godina: 1 ml jednako kao 1 istisak iz dozatora Razrjeđenje (%): Odmah spremno za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Profesionalni i industrijski korisnici: do 25 nanošenja dnevno Ostali korisnici (neprofesionalni): — Odrasli: do 11 nanošenja dnevno — Djeca: do 3 nanošenja dnevno
Kategorija(e) korisnika	industrijski ; profesionalac ; opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Profesionalno i industrijsko: Kruti spremnik (preklopni čep) od polietilena visoke gustoće (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml Kruti spremnik (pumpica/čep) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 900, 950, 1000 litara Fleksibilni spremnik (vrećica s pumpicom/čepom) od polietilena niske gustoće (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litre Ostalo (neprofesionalno): Kruti spremnik (preklopni čep) (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml Kruti spremnik (pumpica/čep) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5 litre Fleksibilni spremnik (vrećica s pumpicom/čepom) (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litre

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Pridržavati se uputa za uporabu.

Proizvod treba koristiti na vidljivo čistim rukama.

1. korak: Nanijeti sljedeću količinu dezinficijensa:

— Odrasli: 3 ml (količina tekućine približno izgleda kao jedna veća kovanica) jednako kao 3 istiska iz dozatora

— Djeca mlađa od 12 godina: 2 ml jednako kao 2 istiska iz dozatora

— Djeca mlađa od 6 godina: 1 ml jednako kao 1 istisak iz dozatora

Utljati u dlan ruke. Trljati dlan o dlan i tako raširiti dezinficijens po cijelim rukama i prstima.

2. korak: Trljati gornju stranu lijeve ruke dlanom desne ruke. Zamijeniti ruke i ponoviti.

3. korak: Raširiti prste i istrljati ih s gornje strane između prstiju. Zamijeniti ruke i ponoviti.

4. korak: Trljati dlan o dlan s isprepletenim prstima (5 puta).

5. korak: Istrljati palac na svakoj ruci rotirajućim pokretima.

6. korak: Kružnim pokretima trljati vrhove prstiju o dlan suprotne ruke. Istrljati zapešća na obje ruke. Ostaviti ruke da se potpuno osuše.

Održavati mokrim 30 sekundi za djelovanje protiv bakterija, kvasaca, bacila tuberkuloze i virusa s ovojnicom ILI 2 minute protiv ograničenog spektra virusa.

Ne ispirati.

Ponoviti ukoliko je potrebna ponovna dezinfekcija ruku.

Djeca provode dezinfekciju ruku isključivo pod nadzorom odrasle osobe: nanijeti količinu sredstva prikladnu za dijete prvo na svoj dlan, a zatim utrljati djetetu na ruke dok obje ruke nisu suhe (vidi upute od 6 koraka). Osigurati da dijete ne dotiče oči ili usta dok se ruke ne osuše.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

Djeca koriste isključivo pod nadzorom odrasle osobe.

Ne koristiti za djecu mlađu od 1 godine.

Osigurati da korisnik primjenjuje sredstvo u prostoru gdje duže vrijeme neće biti prisutni ljudi.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Držati podalje od dohvata djece i neciljanih životinja/kućnih ljubimaca.

4.2. **Opis uporabe**

Tablica 2.

PT01 - Kirurška dezinfekcija ruku

Vrsta proizvoda	PT01: Biocidni proizvodi za osobnu higijenu ljudi
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Kvasci Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Ograničeni spektar virusa Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: Bacili tuberkuloze Stadij razvoja: nema podataka
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome Kirurško sredstvo za dezinfekciju ruku i podlaktica, odmah spremno za primjenu, za uporabu u bolnicama i drugim medicinskim prostorima.
Način(i) primjene	Metoda: Nanošenje Detaljan opis: Nanijeti sredstvo spremno za uporabu pomoću pumpice (pumpica/vrećica s pumpicom) na ruke, najmanje 3 istiska (1 ml po istisku), trljati i potpuno prekriti čiste šake i ruke. ILI Izliti sredstvo spremno za uporabu u dlan (boca s preklopnim ili običnim čepom), nanijeti dovoljno da potpuno prekrije čiste šake i ruke.
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: Doze od 3 ml do 12 ml ukupno Razrjeđenje (%): Odmah spremno za uporabu Broj i vremenski raspored primjene: Do 4 primjene dnevno.
Kategorija(e) korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Kruti spremnik (preklopni čep) od polietilena visoke gustoće (HDPE): 100, 150, 200, 500 ml Kruti spremnik (pumpica/čep) (HDPE): 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8, 0,9, 1, 1,3, 1,5, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 200 ml Fleksibilni spremnik (vrećica s pumpicom/čepom) od polietilena niske gustoće (LDPE): 0,8, 1,3, 2,5 litre

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Proizvod treba koristiti na vidljivo čistim rukama.

Nemojte ponovno puniti ili dekantirati proizvode koji se koriste kao kirurško sredstvo za trljanje ruku.

Za pumpicu/vrećicu s pumpicom:

Nanijeti pomoću pumpice najmanje 3 istiska (1 ml po istisku) u dlan i trljajući prekriti čiste šake i ruke do lakta. Ponoviti proceduru i nanijeti više puta po 3 ml sredstva održavajući tako šake i ruke mokrima kroz 2 minute.

Držati mokrim 2 minute za djelovanje protiv bakterija, kvasca, bacila tuberkuloze i ograničenog spektra virusa.

Ne ispirati.

Ponoviti ukoliko je potrebna ponovna dezinfekcija ruku. (Do 4 primjene dnevno).

Za bocu s preklopnim/običnim čepom:

Izliti tekućinu u dlan jedne ruke, nanijeti dovoljno sredstva da potpuno prekrije šake i ruke do lakta. Ponoviti proceduru i nanijeti više puta po 3 ml sredstva održavajući tako šake i ruke mokrima kroz 2 minute.

Držati mokrim 2 minute za djelovanje protiv bakterija, kvasca, bacila tuberkuloze i ograničenog spektra virusa.

Ne ispirati.

Ponoviti ukoliko je potrebna ponovna dezinfekcija ruku. (Do 4 primjene dnevno).

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Pogledajte opće smjernice za uporabu.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Pogledaj

5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU** ([1])

5.1. **Upute za uporabu**

Vidi specifične upute za uporabu za posebne slučajeve.

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Izbjegavati dodir s očima.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Udisanje: Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.

Dodir s kožom: Nisu poznati nikakvi učinci ili simptomi prilikom pravilne uporabe.

Dodir s očima: Jako nadražujuće djelovanje.

Gutanje: Gutanje može uzrokovati mučninu i povraćanje zbog lokalnog nadraživanja i sistemskih učinaka poput opijenosti, pospanosti, ponekad gubitka svijesti i niskog šećera u krvi (posebno kod djece).

([1]) Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i umiriti je u položaju koji olakšava disanje. Nazovite CENTRAL ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

AKO SE PROGUTA: Isprati usta. U slučaju pojave simptoma: nazvati 112/hitnu pomoć za liječničku intervenciju. Ukoliko nema simptoma: Nazovite CENTRAL ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. Informacije za medicinsko osoblje/liječnika: Započeti mjere održavanja života ukoliko je potrebno, a zatim nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: U slučaju pojave nadražaja oprati vodom i potražiti medicinski savjet. U slučaju nenamjernog kontakta s kožom: oprati vodom.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: ispirati vodom. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati 5 minuta. Nazovite CENTRAL ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Mjere opreza za zaštitu okoliša:

Izbjegavati (direktno) ispuštanje (nerazrijeđenog proizvoda) u okoliš/kanalizaciju.

Razrijediti proliveno vodom i pokupiti mopom.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Odložiti sukladno nacionalnim ili lokalnim propisima.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Vijek trajanja 24 mjeseca.

Skladištiti pri temperaturi nižoj od 30°C.

Skladištiti podalje od vrućine i direktnog sunčevog svjetla.

Poglavlje 6. **OSTALE INFORMACIJE**