KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1284/2006

(2006. gada 29. augusts)

par pastāvīgu atļauju izmantot dažas dzīvnieku barības piedevas

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1], un jo īpaši tās 3. pantu un 9.d panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku barības piedevām [2], un jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1) Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 reglamentē atļaujas dzīvnieku barības piedevu izmantošanai.

(2) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā ir paredzēti pārejas pasākumi attiecībā uz dzīvnieku barības piedevu izmantošanas atļaujas pieteikumiem, kas iesniegti atbilstīgi Direktīvai 70/524/EEK pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(3) Pieteikumus šīs regulas pielikumos minēto piedevu izmantošanas atļaujas piešķiršanai iesniedza pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(4) Atbilstīgi Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktam sākotnējās atsauksmes par šiem pieteikumiem Komisijai nosūtīja pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas. Tādēļ minētie pieteikumi jāizskata saskaņā ar 4. pantu Direktīvā 70/524/EEK.

(5) Pagaidu atļauja no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūtas alfa-amilāzes fermentu preparāta izmantošanai atšķirtu sivēnu barībā pirmoreiz piešķirta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2690/1999 [3]. Pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētā fermentu preparāta izmantošanai, iesniedza jaunus datus. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādejādi minēto fermentu preparātu, kas noteikts šīs regulas I pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(6) Pagaidu atļauja no *Aspergillus aculeatus* (CBS 589,94) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, no *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592,94) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes, no *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūtas alfa-amilāzes, un no *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) iegūta endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparāta izmantošanai tītaru nobarošanā pirmoreiz piešķirta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 2013/2001 [4]. Pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētā fermentu preparāta izmantošanai, iesniedza jaunus datus. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādejādi minēto fermentu preparātu, kas noteikts šīs regulas II pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(7) Pagaidu atļauja no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūtu endo-1,4-beta-ksilanāzes fermentu preparātu izmantot cūku nobarošanā pirmoreiz piešķirta ar Komisijas (EK) Regulu Nr. 1411/1999 [5]. Pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētā fermentu preparāta izmantošanai, iesniedza jaunus datus. Datu novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Tādejādi minēto fermentu preparātu, kas noteikts šīs regulas III pielikumā, jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

---

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).

[2] OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

[3] OV L 326, 18.12.1999., 33. lpp.

[4] OV L 272, 13.10.2001., 24. lpp.

[5] OV L 164, 30.6.1999., 56. lpp.

(8) Minēto pieteikumu novērtējums liecina, ka ir vajadzīgas konkrētas procedūras, lai aizsargātu darbiniekus no pielikumos norādīto piedevu kaitīgās iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas jāievieš, lai uzlabotu darba ņēmēju drošumu un veselības aizsardzību darbā [1].

(9) Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Fermentu grupas preparātu, kas norādīts I pielikumā, pastāvīgi bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

2. pants

Fermentu grupas preparātu, kas norādīts II pielikumā, pastāvīgi bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

3. pants

Fermentu grupas preparātu, kas norādīts III pielikumā, pastāvīgi bez termiņa ierobežojuma atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot minētajā pielikumā paredzētos nosacījumus.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 29. augustā

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Markos KYPRIANOU

[1] OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

I PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs / Maksimālais saturs (Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības)		Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
Fermenti								
E 1638	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1	No *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūtas alfa-amilāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U ([1])/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U ([2])/g alfa-amilāze: 1 000 U ([3])/g	Sivēni (atšķirti)	—	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U Alfa-amilāze: 1 000 U	— — —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz 1 kg barības maisījuma: — endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 250 U — endo-1,4-beta-ksilanāze: 400 U — alfa-amilāze: 1 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas satur graudaugus ar augstu cietes un polisaharīdu saturu, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāni un beta-glikāni), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu. 4. Izmantošanai atšķirtu sivēnu barībā, kuru dzīvsvars nepārsniedz aptuveni 35 kg.	Bez termiņa ierobežojuma

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus) no miežu beta-glikāna pie pH 5,0 un 30 °C.
([2]) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus) auzu pelavu ksilāna pie pH 5,3 un 50 °C.
([3]) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē hidrolizē 1 mikromolu glikozīdu savienojumu no ūdenī nešķīstoša piesaistīta cietes polimēra substrāta pie pH 6,5 un 37 °C.

II PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs / Maksimālais saturs (Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības)		Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
Fermenti								
E 1621	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4 Alfa-amilāze EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-ksilanāze E.C. 3.2.1.8	No *Aspergillus aculeatus* (CBS 589,94) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, no *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592,94) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes, no *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) iegūtas alfa-amilāzes un no *Trichoderma viride* (NIBH PERM BP 4842) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 10 000 U (1)/g endo-1,4-beta-glikanāze: 120 000 U (2)/g alfa-amilāze: 400 U (3)/g endo-1,4-beta-ksilanāze: 210 000 U (4)/g	Nobarojamie tītari	—	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U Endo-1,4-beta-glikanāze: 6 000 U Alfa-amilāze: 20 U Endo-1,4-beta-ksilanāze: 10 500 U	— — — —	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz 1 kg barības maisījuma: — endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 1 000–1 500 U — Endo-1,4-beta-glikanāze: 12 000–18 000 U — Alfa-amilāze: 40–60 U — endo-1,4-beta-ksilanāze: 21 000–31 500 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % kviešu.	Bez termiņa ierobežojuma

(1) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē atbrīvo 0,0056 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus) no miežu beta-glikāna pie pH 7,5 un 30 °C.
(2) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē atbrīvo 0,0056 mikromolus reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus) no karboksimetilcelulozes pie pH 4,8 un 50 °C.
(3) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē atbrīvo 1 mikromolu glikozes no piesaistīta cietes polimēra pie pH 7,5 un 37 °C.
(4) 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē atbrīvo 0,0067 mikromolus reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus) no bērza koksnes ksilāna pie pH 5,3 un 50 °C.

III PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1628	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	No *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: pulverveida: endo-1,4-beta-ksilanāze: 8 000 U [1]/g šķidrā veidā: endo-1,4-beta-ksilanāze: 8 000 U/ml	Nobarojamās cūkas	—	endo-1,4-beta-ksilanāzes: 1 000 U	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz 1 kg barības maisījuma: — endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 000-4 000 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk nekā 35 % kviešu.	Bez termiņa ierobežojuma

[1] 1 U ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus) no auzu pelavu ksilāna pie pH 5,3 un 50 °C.