Euroopa Liidu
Teataja

ET
C-seeria

C/2025/6343

21.11.2025

Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavad märkused

(C/2025/6343)

Vastavalt nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 ([1]) artikli 9 lõike 1 punktile a muudetakse Euroopa Liidu kombineeritud nomenklatuuri selgitavaid märkusi ([2]) järgmiselt.

Leheküljel 108 asendatakse CNi rubriigi ***„2309 Loomasöötades kasutatavad valmistised“*** *selgitava märkuse neljanda ja viienda lõigu tekst järgmisega:*

„Tärklise, glükoosi ja maltodekstriini suhtes kohaldatakse järgmist.

— Kui ei ole selge, kas tootes on tärklist, võib selle kontrollimiseks kasutada kvalitatiivset mikroskoopmeetodit või kvalitatiivset värvuskatset joodilahusega.

— Tärklise-, glükoosi- ja maltodekstriinisisalduse määramiseks mõõdetakse glükoosi üldsisaldust. Glükoosi üldsisaldust määratletakse kui kogu proovis sisalduva glükoosi, sh nii algselt olemas olnud vaba glükoosi kui ka proovis tärklise või maltodekstriini ensümaatilisel hüdrolüüsil tekkinud glükoosi summat väljendatuna glükoosina. Glükoosi üldsisalduse määramiseks kasutatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 121/2008 (ELT L 37, 12.2.2008, lk 3) lisas kirjeldatud ensümaatilise analüüsimeetodi muudetud versiooni. Muudatus seisneb 40 % etanooliga pesemise etapi väljajätmises proovi ettevalmistamise ajal ja ainult kõrgefektiivse vedelikkromatograafia (HPLC) tulemuste arvutamises glükoosisisalduse määramisel (massiprotsentides, vt komisjoni määrus (EÜ) nr 121/2008 (ELT L 37, 12.2.2008, lk 3, punkt 7.1), mis vastab eespool määratletud glükoosi üldsisaldusele.

Tooteid, mille glükoosi üldsisaldus on alla 0,5 massiprotsendi, ei tuleks pidada tärklist, glükoosi ega maltodekstriini sisaldavateks.

— Kui glükoosi üldsisaldus on üle 9 massiprotsendi või kui on teada, et toode sisaldab 10 massiprotsenti või rohkem tärklist, määratakse tegelik tärklisesisaldus komisjoni määruse (EÜ) nr 152/2009 (ELT L 54, 26.2.2009, lk 1) III lisa K osas esitatud polarimeetrilist meetodit (tuntud ka kui modifitseeritud Ewersi meetod) kasutades.

Kui polarimeetrilist meetodit ei saa kohaldada näiteks seetõttu, et toodetes on märkimisväärses koguses allpool loetletud aineid, tuleb tärklisesisalduse määramiseks kasutada komisjoni määruse (EÜ) nr 121/2008 (ELT L 37, 12.2.2008, lk 3) lisas esitatud ensümaatilist analüüsimeetodit.

Teadaolevalt võivad tärklisesisalduse määramisel polarimeetrilise meetodiga kutsuda esile häireid järgmised ained:

a) (suhkru)peedisaadused, näiteks (suhkru)peedipulp, (suhkru)peedimelass, melasseeritud (suhkru)peedipulp, (suhkru) peedimelassi raba, (peedi)suhkur;

b) tsitruspulp;

c) linaseemned; linakook; linasrott;

d) rapsiseemned; rapsikook; rapsisrott; rapsiseemnekestad;

e) päevalilleseemned; päevalillesrott; osaliselt kooritud päevalillesrott;

f) koprakook; koprasrott;

g) kartulipulp;

([1]) Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj).

([2]) ELT C 119, 29.3.2019, lk 1.

h) kuivpärm;

i) inuliinirikkad tooted (nt maapirniliistakud ja -jahu);

j) kõrned;

k) sojatooted.“