II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1423

z 22. júla 2022,

ktorým sa udeľuje autorizácia Únie pre skupinu biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní ([1]), a najmä na jeho článok 44 ods. 5 prvý pododsek,

keďže:

(1) Spoločnosť Ecolab Deutschland GmbH predložila 19. januára 2017 v súlade s článkom 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 žiadosť o autorizáciu skupiny biocídnych výrobkov s názvom „Hydrogen Peroxide Family 1“, ktoré patria medzi typy výrobkov 1, 2, 3 a 4 opísané v prílohe V k uvedenému nariadeniu, a poskytla písomné potvrdenie o ochote príslušného orgánu Lotyšska túto žiadosť vyhodnotiť. Žiadosť bola zaregistrovaná v registri pre biocídne výrobky pod číslom BC-DY029028-18.

(2) „Hydrogen Peroxide Family 1“ obsahuje peroxid vodíka ako účinnú látku, ktorá je zaradená do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012, v typoch výrobkov 1, 2, 3 a 4.

(3) Hodnotiaci príslušný orgán predložil 5. októbra 2018 v súlade s článkom 44 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 528/2012 hodnotiacu správu a závery svojho hodnotenia Európskej chemickej agentúre (ďalej len „agentúra“).

(4) Agentúra predložila Komisii 2. júla 2020 stanovisko ([2]), návrh zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov (SPC) patriacich do skupiny biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“ a záverečnú hodnotiacu správu o tejto skupine v súlade s článkom 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

(5) Agentúra vo svojom stanovisku dospela k záveru, že „Hydrogen Peroxide Family 1“ je skupina biocídnych výrobkov v zmysle článku 3 ods. 1 písm. s) nariadenia (EÚ) č. 528/2012, pre ktorú možno udeliť autorizáciu Únie podľa článku 42 ods. 1 uvedeného nariadenia, a že pri súlade s SPC spĺňa podmienky uvedené v článku 19 ods. 1 a 6 uvedeného nariadenia.

(6) Agentúra predložila Komisii 15. júla 2020 návrh zhrnutia charakteristík biocídnych výrobkov vo všetkých úradných jazykoch Únie v súlade s článkom 44 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

([1]) Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

([2]) ECHA opinion of 18 June 2020 on the Union authorisation of the biocidal product family „Hydrogen Peroxide Family 1“ (ECHA/BPC/264/2020) [Stanovisko agentúry ECHA z 18. júna 2020 k autorizácii Únie pre „Hydrogen Peroxide Family 1“ (ECHA/BPC/264/2020)], https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

(7) Komisia súhlasí so stanoviskom agentúry, a preto sa domnieva, že je vhodné udeliť autorizáciu Únie pre „Hydrogen Peroxide Family 1“.

(8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre biocídne výrobky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Spoločnosti Ecolab Deutschland GmbH sa udeľuje autorizácia Únie s autorizačným číslom EU-0024303-0000 na sprístupnenie skupiny biocídnych výrobkov „Hydrogen Peroxide Family 1“ na trhu a jej používanie v súlade so zhrnutím charakteristík biocídnych výrobkov stanoveným v prílohe.

Autorizácia Únie je platná od 15. septembra 2022 do 31. augusta 2032.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA

Zhrnutie charakteristík skupiny biocídnych výrobkov

Hydrogen Peroxide Family 1

Výrobky typu 1 – Osobná hygiena človeka (dezinfekčné prostriedky)

Výrobky typu 2 – Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá (dezinfekčné prostriedky)

Výrobky typu 3 – Veterinárna hygiena (dezinfekčné prostriedky)

Výrobky typu 4 – Oblasť potravín a krmív (dezinfekčné prostriedky)

Číslo autorizácie: EU-0024303-0000

Číslo položky v R4BP: EU-0024303-0000

ČASŤ I

PRVÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. **Názov skupiny výrobkov**

Názov	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 01 - Osobná hygiena človeka Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

1.3. **Držiteľ autorizácie**

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Ecolab Deutschland GmbH
	Adresa	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Nemecko
Číslo autorizácie	EU-0024303-0000	
Číslo položky v R4BP	EU-0024303-0000	
Dátum autorizácie	15. September 2022	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	31. august 2032	

1.4. **Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov**

Názov výrobcu	Ecolab Europe GmbH
Adresa výrobcu	Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Nemecko ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Bilbao. Bizkaia Španielsko ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 50410 Zaragoza Španielsko ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Belvedere, Kent Spojené kráľovstvo Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19, D-67292 Krichheimbolanden Nemecko AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs., 2800 Kgs Lyngby Dánsko Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Ljubljana Slovinsko BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1, 105005 Moskva Ruská federácia BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX, RH159LH Burgess Hill Spojené kráľovstvo BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072, 71103 Chalon sur Saöne Cedex Francúzsko Bores Srl Via Pioppa, 179, 44020 Pontegradella Taliansko BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090, FR-08090 Cliron Francúzsko BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13, A-2353 Guntramsdorf Rakúsko BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Nemecko BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Nemecko BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Nemecko BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Dánsko Brenntag Nordic, Strandgade 35, 7100 Vejle Dánsko BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710, 76710 Montville Francúzsko BRENNTAG PL - Zgierz ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Poľsko Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg n^{o} 22,. Poligono Industrial El Lomo, 28906 Madrid Španielsko BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231, CH-4056 Bazilej Švajčiarsko Budich International GmbH Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhause Nemecko Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co. Kg Am Karlshof 10 D, 40231 Düsseldorf Nemecko

	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy, P43 R772 County Cork Írsko
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Nemecko
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. „COFARCAS“ Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS, 09080 Burgos Španielsko
	COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA), 08700 BARCELONA Španielsko
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy, 27730 BUEIL Francúzsko
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone, 30600 Akiva Industrial Zone Izrael
	Denteck BV Heliumstraat 8, 2718 SL ZOETERMEER Holandsko
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester, 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španielsko
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Nemecko
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra, 17460 Girona Španielsko
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francúzsko
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Taliansko
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Spojené kráľovstvo
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY, LS25 2JY Leeds Spojené kráľovstvo
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600, GR 19600 ATÉNY Grécko
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor, SI-2001 Maribor Slovinsko
	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD, 7051 HR VARSSEVELD Holandsko
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA, MST 3000 MOSTA Malta
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co., Westmeath Westmeath Írsko
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN, 3432 NZ NIEUWEGEIN Holandsko
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Taliansko
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI, 20089 Rozzano Taliansko
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki, 07955 Tesjoki Fínsko
	ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4, 3980 Tessenderlo Belgicko
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester, CW8 4EE Northwich Spojené kráľovstvo

	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Port Talbot Spojené kráľovstvo
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré, 17000 La Rochelle Francúzsko
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24, 48356 Nordwalde Nemecko
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet, 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francúzsko
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Spojené kráľovstvo
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španielsko
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Holandsko
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt Stroi, 413116 Engels Ruská federácia
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Nemecko
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1, 187000 Tosno - Leningradská oblasť Ruská federácia
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima, 2050 Aveiras de Cima Portugalsko
	Kleinmann GmbH Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Nemecko
	Kompak Nederland B.V., Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavel Holandsko
	La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58, 41500 Sevilla Španielsko
	LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Francúzsko
	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Francúzsko
	LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Nemecko
	Lonza GmbH Morianstr.32, 42103 Wuppertal Nemecko
	McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22, 08650 Sallent Španielsko
	Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht, 3641 Mijdrecht Holandsko
	NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Dánsko
	PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby, Leicester Leicester Spojené kráľovstvo
	Planol GmbH Maybachstr. 17, 63456 Hanau Nemecko
	Plum A/S Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Dánsko
	PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá, 46612 Valencia Španielsko
	THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Spojené kráľovstvo

	QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal, 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španielsko RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123, Segade, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao (Portugal) Portugalsko ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Francúzsko RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD, RG16 7TJ LAMBOURN BERKS Spojené kráľovstvo SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Olerdola Barcelona Španielsko Staub & Co. – Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Nemecko Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Eilenburg Nemecko SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5, 6827 ARNHEM Holandsko Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Spojené kráľovstvo Univar SPA Via Caldera 21, 20-153 Milano Taliansko van Dam Bodegraven B.V Postbus 48, NL 2410 AA Bodegraven Holandsko Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory, F-77290 Mitry Mory Francúzsko Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Rousset Francúzsko INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Nemecko

1.5. **Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)**

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adresa výrobcu	Tijsmanstunnel West, 2040 Antverpy Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Tijsmanstunnel West, 2040 Antverpy Belgicko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Degussa GmbH
Adresa výrobcu	Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Nemecko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Peroxid GmbH
Adresa výrobcu	Industriestraβe 1, 9721 Weiβenstein Rakúsko
Miesto výrobných priestorov	Industriestraβe 1, 9721 Weiβenstein Rakúsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adresa výrobcu	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Holandsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Belinka Perkemija D.O.O
Adresa výrobcu	Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko
Miesto výrobných priestorov	Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Chemie SA
Adresa výrobcu	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgicko
Miesto výrobných priestorov	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgicko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adresa výrobcu	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Taliansko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Chemicals GmbH
Adresa výrobcu	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Nemecko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Interox Limited
Adresa výrobcu	Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Spojené kráľovstvo
Miesto výrobných priestorov	Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Spojené kráľovstvo

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Chemicals Finland OY
Adresa výrobcu	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Fínsko
Miesto výrobných priestorov	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Fínsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Adresa výrobcu	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalsko
Miesto výrobných priestorov	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Kemira Rotterdam BV
Adresa výrobcu	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Holandsko
Miesto výrobných priestorov	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Holandsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Kemira Chemical Oy
Adresa výrobcu	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Fínsko
Miesto výrobných priestorov	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Fínsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Kemira Kemi AB
Adresa výrobcu	Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Švédsko
Miesto výrobných priestorov	Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Švédsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adresa výrobcu	Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Francúzsko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adresa výrobcu	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Nemecko

Účinná látka	peroxid vodíka
Názov výrobcu	Ecolab Europe GmbH
Adresa výrobcu	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Nemecko
Miesto výrobných priestorov	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Nemecko

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA SKUPINY VÝROBKOV

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení skupiny**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,0	36,75
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	0,0	17,5
Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,0	0,9
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0,0	0,9
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	0,0	3,88
Kyselina L-glutámová, N-kokoacylderiváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	0,0	2,0
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	0,0	1,12
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	0,0	1,5

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	0,0	3,71
Alkohol EO fosfátester	Poly(oxy-1,2-etándiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkyléter, fosfáty	Iná ako účinná látka	68130-47-2		0,0	14,625
Alkylpolyglykozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymetyl) oxán-3,4,5-triol	Iná ako účinná látka	68515-73-1	500-220-1	0,0	6,35
Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované	Iná ako účinná látka	69227-22-1		0,0	3,0
Kyselina capryleth-9 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy-1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(oktyloxy) - (4-11 EO)	Iná ako účinná látka	53563-70-5		0,0	2,15
Kyselina hexeth-4 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy-1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Iná ako účinná látka	105391-15-9		0,0	0,62

2.2. **Typ(y) úpravy**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny
	GW - Vo vode rozpustný gél
	SL - Rozpustný koncentrát

ČASŤ II

DRUHÁ INFORMAČNÁ ÚROVEŇ – META SPC

META SPC 1

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 1

1.1. **Identifikátor meta SPC 1**

Identifikátor	META SPC 1

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-1

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá

2. ZLOŽENIE META SPC 1

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 1**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	6,0	6,6

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 1**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 1

Výstražné upozornenia	Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	Po manipulácii starostlivo umyte ruky Noste ochranné okuliare. Noste ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte starostlivosť.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 1

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 1

Použiť # 1 – Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences (vied o živej prírode) sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: Žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje

	Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch pre life sciences, klasifikovaných ako stupeň A až D podľa klasifikácie Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice - GMP) EÚ, a podporných prostredí. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 15 min pre baktérie a huby; — 5 min pre kvasinky; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): Výrobok pripravený na použitie (RTU výrobok) Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná 1 - 5 l fľaša z polyetylénu s vysokou hustotou (HDPE) Svetlo nepriepustná rozprašovacia fľaša 1 - 5 l z polypropylénu a polyetylénu (PP+PE)

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 2

Použiť # 2 – Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences mopovaním pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch pre life sciences, klasifikovaných ako stupeň A až D podľa klasifikácie Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice – GMP) EÚ, a podporných prostredí. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť

Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Aplikujte na povrchy mopovaním a nechajte vyschnúť na vzduchu.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

Používanie prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (respiratory protective equipment - RPE) s ochranným faktorom 10 je povinné pre profesionálnych pracovníkov, ktorí výrobok aplikujú, a pre ostatných profesionálnych pracovníkov, ktorí sa nachádzajú v ošetrovanom priestore. Vyžaduje sa aspoň respirátor na čistenie vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polovičná/úplná maska s kombinovaným filtrom plyn/P2 (typ filtra (kódové písmeno, farba), ktoré musia byť uvedené držiteľom povolenia v informácii o výrobku). Pri opakovanej aplikácii alebo opätovnom vstupe do miestnosti musí profesionálny pracovník dodržiavať rovnaké opatrenia na zníženie rizika, ako pri prvej aplikácii v miestnosti.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 3

Použiť # 3 – Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje

	Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch pre life sciences, klasifikovaných ako stupeň A až D podľa klasifikácie Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice – GMP) EÚ, a podporných prostredí. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (zodpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné HDPE vedro so 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustné PP puzdro s 10 až 100 impregnovaným utierkami zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 200 × 200 mm).

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Po použití výrobkov nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 4

Použiť # 4 – Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences mopovaním pomocou impregnovaných RTU utierok k mopu

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou impregnovaných RTU utierok k mopu Detailný opis: Dezinfekcia dlážky v čistých priestoroch pre life sciences, klasifikovaných ako stupeň A až D podľa klasifikácie Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice - GMP) EÚ, a podporných prostredí. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (zodpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné HDPE vedro so 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 420 × 250 mm). Svetlo nepriepustné PP puzdro s 10 až 100 impregnovaným utierkami zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 420 × 250mm).

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Po použití výrobkov nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

Používanie prostriedkov na ochranu dýchacích ciest (respiratory protective equipment - RPE) s ochranným faktorom 10 je povinné pre profesionálnych pracovníkov, ktorí výrobok aplikujú, a pre ostatných profesionálnych pracovníkov, ktorí sa nachádzajú v ošetrovanom priestore. Vyžaduje sa aspoň respirátor na čistenie vzduchu s prilbou/kapucňou/maskou (TH1/TM1) alebo polovičná/úplná maska s kombinovaným filtrom plyn/P2 (typ filtra (kódové písmeno, farba), ktoré musia byť uvedené držiteľom povolenia v informácii o výrobku). Pri opakovanej aplikácii alebo opätovnom vstupe do miestnosti musí profesionálny pracovník dodržiavať rovnaké opatrenia na zníženie rizika, ako pri prvej aplikácii v miestnosti.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1 (meta SPC 1).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 1.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ([1]) META SPC 1

5.1. **Pokyny na používanie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Výrobok by sa mal nanášať na čistý a suchý povrch. Povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Pozrite opatrenia meta-SPC 1 na zníženie rizika špecifické pre použitie.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

([1]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 1.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0 – 35 °C

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

6. Ďalšie informácie

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 1

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Oblasť trhu: EU			
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Oblasť trhu: EU			
	ANIOS H_2O_2 6 % IP STERILE	Oblasť trhu: EU			
Číslo autorizácie	EU-0024303-0001 1-1				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	6,0

META SPC 2

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 2

1.1. **Identifikátor meta SPC 2**

Identifikátor	META SPC 2

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-2

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. ZLOŽENIE META SPC 2

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 2**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 2**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 2

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 2

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 5

Použiť # 1 – Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov v priemysle (napr. priestorov jedální, WC) sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky a/alebo mopovaním pomocou plochého mopu a vedra.

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje

	Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v priemysle. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie. Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Dezinfekcia veľkých povrchov v priemysle. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie. Spôsob: Sprejovanie pomocou rozprašovača a suchej utierky a mopovanie pomocou mopu a vedra. Detailný opis: Dezinfekcia malých a veľkých povrchov v priemysle. Doby kontaktu pre sprejovanie a mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre sprejovanie s postrekovačmi s dýzami: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre mopovanie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť

	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m^2; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombináciu sprejovania s rozprašovačom a mopovania: raz za deň na jednu miestnosť.
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 – 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l Svetlo nepriepustná HDPE stredne veľká nádoba (IBC), 600 – 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE; PE fľaša s rozprašovačom, 0,5 - 1 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Sprejovanie: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na povrch, počkajte 5 minút a následne utrite povrch čistou suchou utierkou alebo nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Mopovanie: Prebytočnú vodu odstráňte suchým mopom na podlahu. Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie a rozotrite ho po podlahe pomocou plochého mopu. Počkajte 5 minút a potom povrch utrite čistým, suchým mopom alebo ho nechajte uschnúť na vzduchu.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pri sprejovaní veľkých plôch platí nasledovné: Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

Pre sprejovanie malých plôch sa uvedené špecifické opatrenie na zmiernenie rizika neuplatňuje.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 6

Použiť # 2 – Dezinfekcia malých povrchov (podláh) v priemysle [(napr. priestorov jedální, WC)] mopovaním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov (podláh) v priemyselných podnikoch Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 – 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 – 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie (RTU výrobok) a naneste na celú podlahu pomocou plochého mopu a následne utrite povrch čistým suchým mopom alebo ho nechajte vyschnúť na vzduchu.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Žiadne

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 7

Použiť # 3 – Dezinfekcia malých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky.

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v závodoch na spracovanie potravín. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky;

	— 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 – 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 – 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE; PE fľaša s rozprašovačom, 0,5 – 1 l

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na povrch, nechajte pôsobiť počas požadovanej doby kontaktu a potom odstráňte prebytočnú tekutinu suchou utierkou alebo nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 8

Použiť # 4 – Dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle sprejovaním pomocou zabudovaného rozprašovača

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Pevne nainštalované sprejovanie Detailný opis: Automatická dezinfekčná aplikácia v priemyselných spracovateľských zariadeniach. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: Maximálne 300 l na aplikáciu Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: raz za týždeň
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 – 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 – 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Používajte mimo času určeného pre výrobu potravín, raz za týždeň.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Aplikácia len po pracovnej smene/cez noc.

Počas aplikácie sprejovaním nesmie byť prítomná žiadna osoba.

Na stanovenie vhodného času pre opätovný vstup po aplikácii výrobku sa postupuje podľa merania uvoľňovania na pracovisku (workplace release measurements) pomocou vhodného meracieho zariadenia po zavedení pevne nainštalovaného sprejovania v pravidelných intervaloch (odporúča sa ročný interval) a po každej zmene príslušných hraničných podmienok. Musia sa dodržiavať národné predpisy pre merania na pracovisku. V prípade neplánovaných údržbových úloh počas nanášania sprejovaním je povinné používať ochranné prostriedky dýchacích orgánov (RPE) s ochranným faktorom 10.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2 (meta SPC 2).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 2.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE [2] META SPC 2

5.1. **Pokyny na používanie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Celý povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Pozrite opatrenia meta-SPC 2 na zníženie rizika špecifické pre použitie.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-35 °C

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

[2] Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 2.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 2

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	DrySan Oxy	Oblasť trhu: EU
Číslo autorizácie	EU-0024303-0002 1-2	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,0

META SPC 3

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 3

1.1. **Identifikátor meta SPC 3**

Identifikátor	META SPC 3

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-3

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. ZLOŽENIE META SPC 3

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 3**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	35,0	36,75

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 3**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 3

Výstražné upozornenia	Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidačné činidlo. Škodlivý po požití. Dráždi kožu. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné upozornenia	Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Uchovávajte mimo odevov a iných horľavých materiálov. Zabráňte vdychovaniu pár. Zabráňte vdychovaniu aerosólov. Po manipulácii starostlivo umyte ruky Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné okuliare. Noste ochranu tváre. Noste ochranné rukavice. PO POŽITÍ: Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Vypláchnite ústa. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc. Ak sa prejaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte starostlivosť. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Okamžite volajte lekára. Odborné ošetrenie (pozri pokyny prvej pomoci na etikete). Kontaminovaný odev vyzlečte.A pred ďalším použitím vyperte. V prípade požiaru: Na hasenie použite vodu Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 3

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 9

Použiť # 1 – Dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle automatickým ponorením alebo sprejovaním v uzavretom systéme

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Automatické ponorenie alebo sprejovanie v uzavretom systéme Detailný opis: Dezinfekcia obalov (sterilné plnenie) pomocou plne automatizovaného máčania a sprejovania (uzavretý proces). Dezinfekcia obalových materiálov pri výrobe potravín, nápojov a krmív (namáčanie a sprejovanie). Doba kontaktu pre ponorenie a sprejovanie pri 60 °C v čistých podmienkach: — 1 min pre baktérie, kvasinky, huby a bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: konštantné automatické dávkovanie Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: konštantné automatické dávkovanie
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustný HDPE veľkoobjemový prepravný kontajner, > 1l – veľkoobjemový Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l

	Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 – 1 000 l
	Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l
	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l.

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Dezinfekcia obalov pri výrobe potravín, nápojov a krmív (sprejovanie alebo máčanie):

— Dávkovanie výrobku priamo do obalu na dezinfekciu alebo aplikovanie do dodatočnej pary

— Nepretržité používanie výrobku

— Aplikačná teplota: 60 °C

— Aplikácia prebieha v uzavretom a vetranom systéme.

Po použití neoplachujte. Po sterilizácii obal vysušte horúcim sterilným vzduchom.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Počas prevádzky zabezpečte dostatočné vetranie popri lokálnom odsávaní (local exhaust ventilation – LEV) pri strojoch a v priemyselných halách (technické vetranie).

Pri manuálnej údržbe zabezpečte pred otvorením dverí v sterilnom priestore dostatočné vetranie vo vnútri stroja (LEV).

1. Výrobok sa môže prepravovať v uzavretých potrubiach až po zmiešaní a naplnení. Otvorené prietoky výrobku a odpadovej vody nie sú povolené.

2. Merania uvoľňovania na pracovisku (workplace release measurements) pomocou vhodného meracieho zariadenia sa vykonávajú po zavedení zariadenia na sterilné balenie, a potom v pravidelných intervaloch (odporúčajú sa ročné intervaly) a po každej zmene príslušných hraničných podmienok. Musia sa dodržiavať národné predpisy pre merania na pracovisku.

3. V prípade údržby zariadenia na sterilné balenie (napr. ručného čistenia, technickej nehody alebo opravy) sa vyžadujú vhodné OOP (vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest, chemických ochranných rukavíc, chemického ochranného odevu, ochrany očí). Typ prostriedkov na ochranu dýchacích ciest a typ filtra (kódové písmeno, farba) a materiálu rukavíc musí držiteľ schválenia uviesť v informáciách o výrobku.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3 (meta SPC 3).

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 10

Použiť # 2 – Dezinfekcia povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle prostredníctvom metódy Clean-in-place (CIP).

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: CIP Detailný opis: Dezinfekcia v potravinárskom a nápojovom priemysle (kontakt s potravinami). Doby kontaktu pre uzavreté systémy pri 60 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky; — 15 min pre huby.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: Automatické dávkovanie Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: raz za deň
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustný HDPE veľkoobjemový prepravný kontajner, > 1l – veľkoobjemový Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 – 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l.

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pred dezinfekciou je potrebné systém umyť. Dezinfekcia cisterien CIP, čerpadiel CIP, potrubných rozvodov a vnútorného systému zariadení na spracovanie potravín, nápojov a krmív, vrátane hygieny dojacích strojov (milking machine hygiene - MMH) (uzavreté systémy). Po ošetrení opláchnite vodou.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho opláchnutia vodou.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3 (meta SPC 3).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 3.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ([3]) META SPC 3

5.1. **Pokyny na používanie**

Prečítajte si špecifické pokyny pre používanie meta-SPC 3.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

Proces riedenia sa musí vykonať s použitím automatického dávkovacieho systému.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody minimálne 15 minút. Ak je to možné, použite jemné mydlo. Ak vznikne a pretrváva podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

([3]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 3.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0 - 35 °C

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 3

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	Oxypak D		Oblasť trhu: EU		
	Oxypak S		Oblasť trhu: EU		
	Oxypak S10		Oblasť trhu: EU		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0003 1-3				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	35,0

META SPC 4

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 4

1.1. **Identifikátor meta SPC 4**

Identifikátor	META SPC 4

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-4

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

2. ZLOŽENIE META SPC 4

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 4**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
Kyselina L-glutámová, N-kokoacylderiváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 4**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 4

Výstražné upozornenia	Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Po manipulácii starostlivo umyte ruky Noste ochranné okuliare. Noste ochranu tváre. Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii nádobe s odolnou vnútornou vrstvou.

	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 4

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 11

Použiť # 1 – Ponory strukov pre dezinfekciu pred dojením

Typ výrobku	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Ručné ponorenie pomocou ponorného/penového pohárika (dezinfekcia pred dojením) Detailný opis: Dezinfekcia strukov pred dojením ručným ponorením pomocou ponorného/napeňovacieho pohárika. Doba kontaktu pre ponorenie pri 30 °C v čistých podmienkach: — 60 sekúnd pre baktérie a kvasinky.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 4 ml výrobku na aplikáciu (t. j. 1 ml na struk, teda 4 ml výrobku pre zvieratá so štyrmi strukmi) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: maximálne 2-krát za deň
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné HDPE baňaté fľaše, 1 – 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 – 1 000 l

	Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l
	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l
	Svetlo nepriepustné HDPE, PE puzdro, 0,5 – 100 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4 (meta SPC 4).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 4.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE [4] META SPC 4

5.1. **Pokyny na používanie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má aplikovať pred dojením pomocou ponorného/napeňovacieho pohárika. Pred použitím sa musí výrobok zohriať na izbovú teplotu.

Očistite struk suchou utierkou, naplňte napeňovací pohárik výrobkom a stláčajte ho, až kým sa nevytvorí pena. Ponorte struk do pohárika. Aplikujte penu na struk po dobu 60 sekúnd. Utrite výrobok čistou utierkou. Po použití neoplachujte.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Vyvarujte sa postriekaniu a rozliatiu.

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

[4] Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 4.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-25 °C

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 4

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	OxyFoamPlus	Oblasť trhu: EU			
	MEPA Foampro D	Oblasť trhu: EU			
	Predip PLUS	Oblasť trhu: EU			
Číslo autorizácie	EU-0024303-0004 1-4				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4
Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88
Kyselina L-glutámová, N-kokoacylderiváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	2,0
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12

META SPC 5

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 5

1.1. **Identifikátor meta SPC 5**

Identifikátor	META SPC 5

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-5

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. ZLOŽENIE META SPC 5

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 5**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 5**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 5

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 5

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 12

Použiť # 1 – Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch A - D v oblasti life sciences a v podporných prostrediach (napr. vo farmaceutickom priemysle). Dezinfekcia pri prenose alebo dezinfekcia malých plôch. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry.

Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná polyetyléntereftalátová (PET) fľaša s rozprašovačom, 0,25 – 1 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 13

Použiť # 2 – Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences mopovaním pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje

	Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Dezinfekcia podláh v čistých priestoroch v oblasti life sciences a v podporných prostrediach (napr. vo farmaceutickom priemysle). Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naneste na povrch mopom.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 14

Použiť # 3 – Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby; — 15 min pre mykobaktérie.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť

Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 – 1 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 5 l

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na povrch, povrch utrite čistou suchou utierkou a nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 15

Použiť # 4 – Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje

	Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 – 1 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 5 l

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 16

Použiť # 5 – Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach utieraním pomocou čistej jednorazovej utierky a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby; — 15 min pre mykobaktérie.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 5 l

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Výrobok nalejte do čistej nádoby a rozotrite na povrch pomocou jednorazovej handry/utierky a nechajte vyschnúť na vzduchu. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.6. **Opis použitia**

Tabuľka 17

Použiť # 6 – Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach utieraním pomocou čistej jednorazovej utierky a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy.

	Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 5 l

4.6.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Výrobok nalejte do čistej nádoby a rozotrite na povrch pomocou jednorazovej handry/utierky a nechajte vyschnúť na vzduchu. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.6.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.6.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.6.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.6.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.7. **Opis použitia**

Tabuľka 18

Použiť # 7 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Nerutinná dezinfekcia väčších povrchov v nemocničnej miestnosti. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť

Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 5 l

4.7.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie a naneste ho na podlahu pomocou mopu a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

4.7.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.7.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.7.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.7.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.8. **Opis použitia**

Tabuľka 19

Použiť # 8 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje

	Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Nerutinná dezinfekcia väčších plôch v ordináciách lekárov. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 5 l

4.8.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie a naneste ho na podlahu pomocou mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

4.8.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.8.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.8.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.8.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.9. **Opis použitia**

Tabuľka 20

Použiť # 9 – Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách sprejovaním povrchu a následným utretím čistou handrou/utierkou, alebo nasprejovaním tekutiny na utierku a následným utretím povrchu, alebo s dezinfekčným prostriedkom vo vedre a utieraním čistou jednorazovou handrou/utierkou a nerutinná dezinfekcia väčších povrchov pomocou mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktéie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie pomocou rozprašovača a suchej utierky a mopovanie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Nerutinná dezinfekcia menších a väčších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie, mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie, mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry. Spôsob: Utieranie handrou/utierkou a vedrom a čistenie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Nerutinná dezinfekcia menších a väčších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov. Doby kontaktu pre utieranie a mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre utieranie a mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m^2; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombináciu sprejovania s rozprašovačom a mopovania: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť

	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pre utieranie: 10 ml/m^2; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombinované utieranie a mopovanie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 – 1 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 5 l

4.9.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Sprejovanie pomocou rozprašovača a utieranie pomocou suchej utierky: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Mopovanie pomocou mopu a vedra: Naplňte vedro výrobkom pripraveným na použitie a naneste ho na podlahu pomocou mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

Utieranie pomocou handry/utierky a vedra: Výrobok nalejte do čistej nádoby a rozotrite po povrchu jednorazovou handrou/utierkou, utrite povrch čistou handrou/utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.9.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pre sprejovanie: Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.9.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.9.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.9.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.10. **Opis použitia**

Tabuľka 21

Použiť # 10 – Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy.

	Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 – 1 l

4.10.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.10.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.10.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.10.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.10.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.11. **Opis použitia**

Tabuľka 22

Použiť # 11 – Dezinfekcia malých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky; — 5 min pre huby a mykobaktérie; — 60 min pre bakteriálne spóry; — 30 min pre vírusy. Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 30 min pre vírusy a bakteriálne spóry.

Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť.
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 1 – 5 l Svetlo nepriepustná PET fľaša s rozprašovačom, 0,25 – 1 l

4.11.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a vybavenie, alebo nasprejujte výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.11.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.11.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5 (meta SPC 5).

4.11.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

4.11.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 5.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE [5] META SPC 5

5.1. **Pokyny na používanie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

—

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

[5] Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 5.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-35 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 5

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	Incidin OxyFoam		Oblasť trhu: EU		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0005 1-5				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	Incidin OxyFoam S	Oblasť trhu: EU
	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Oblasť trhu: EU
	KitchenPro Oxy Foam S	Oblasť trhu: EU

Číslo autorizácie	EU-0024303-0006 1-5				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5

META SPC 6

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 6

1.1. **Identifikátor meta SPC 6**

Identifikátor	META SPC 6

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-6

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. ZLOŽENIE META SPC 6

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 6**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 6**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 6

Výstražné upozornenia	Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia	Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie. Používajte elektrické zariadenie do výbušného prostredia. Používajte ventilačné zariadenie do výbušného prostredia. Používajte osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. Používajte neiskriace prístroje. Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny. Noste ochranné okuliare. Noste ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte lekára. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. V prípade požiaru: Na hasenie použite vodu Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 6

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 23

Použiť # 1 – Dezinfekcia malých povrchov v priemysle (napr. priestorov jedální, WC) sprejovaním pomocou rozprašovača

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v priemysle (napr. priestorov jedální, WC). Doba kontaktu pre sprejovanie pri 10 °C a 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky.

	Doba kontaktu pre sprejovanie pri 10 °C v čistých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 3-krát za deň
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 – 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 – 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l Svetlo neprepúšťajúca HDPE fľaša s rozprašovačom, do 1 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecné pokyny pre používanie meta-SPC 6 (meta SPC 6).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 24

Použiť # 2 – Dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle sprejovaním pomocou rozprašovača

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v závodoch na spracovanie potravín. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 10 °C a 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 10 °C v čistých podmienkach: — 1 min pre baktérie a kvasinky.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 4-krát za deň
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE nádoba, 1 – 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 – 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša s rozprašovačom, do 1 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6 (meta SPC 6).

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 6.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ([6]) META SPC 6

5.1. **Pokyny na používanie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Výrobok nasprejujte na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou alebo nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách. Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte pred oxidačnými činidlami.

Skladovacia teplota: 0-30 °C

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

([6]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 6.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 6

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	OxyDes Rapid	Oblasť trhu: EU
Číslo autorizácie	EU-0024303-0007 1-6	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5

META SPC 7

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 7

1.1. **Identifikátor meta SPC 7**

Identifikátor	META SPC 7

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-7

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. ZLOŽENIE META SPC 7

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 7**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	4,95	5,45
Kyselina capryleth-9 karboxylová (zmes kyseliny alkyléter-karboxylovej)	Poly(oxy-1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(oktyloxy) - (4-11 EO)	Iná ako účinná látka	53563-70-5		2,15	2,15
Kyselina hexeth-4 karboxylová (zmes kyseliny alkyléter-karboxylovej)	Poly(oxy-1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Iná ako účinná látka	105391-15-9		0,62	0,62

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 7**

Úprava/úpravy	SL - Rozpustný koncentrát

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 7

Výstražné upozornenia	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	Nevdychujte aerosóly. Nevdychujte pary. Po manipulácii starostlivo umyte ruky Noste ochranné okuliare. Noste ochranu tváre. Noste ochranné rukavice. Noste ochranný odev. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Okamžite volajte lekára. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Odborné ošetrenie (pozri pokyny prvej pomoci na etikete). Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 7

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 25

Použiť # 1 – Dezinfekcia povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách mopovaním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia podláh v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často dotýkajú a ktorých sa ľudia často nedotýkajú. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 7,5 – 10 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1 – 100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 26

Použiť # 2 – Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky a/alebo mopovaním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (10 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (15 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie). Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie). Spôsob: Sprejovanie pomocou rozprašovača a suchej utierky a mopovanie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC).

	Doby kontaktu pre sprejovanie a mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (10 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (15 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 7,5 – 15 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre sprejovanie s postrekovačmi s dýzami: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 7,5 – 10 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre mopovanie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m^2; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 7,5 – 15 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombináciu sprejovania s rozprašovačom a mopovania: raz za deň na jednu miestnosť.
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1 – 100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Po použití neoplachujte.

Sprejovanie: Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Nasprejujte rozriedený výrobok na povrch, povrch utrite čistou suchou utierkou a nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Mopovanie: Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Pre sprejovanie: Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 27

Použiť # 3 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách mopovaním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých plôch vo veľkých priestoroch bez kontaktu s potravinami. Doba kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 7,5 – 10 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne

Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1 – 100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 28

Použiť # 4 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do kontaktu s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou zariadenia zaveseného na stene

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie zariadením zaveseným na stene Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých plôch vo veľkých nepotravinárskych a potravinárskych priestoroch.

	Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (10 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (15 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 180 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 7,5-15 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: raz za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1 – 100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Naneste výrobok pomocou zariadenia zaveseného na stene. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Po aplikácii opláchnite.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Zaistite technické vetranie s najmenej 15 výmenami vzduchu za hodinu.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 29

Použiť # 5 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov vo veľkých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doba kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (10 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (10 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (15 % riedenie); — 15 min pre baktérie (7,5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 7,5 – 15 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustný HDPE kanister, 1 – 100 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 10 cm až 20 cm. Nasprejujte rozriedený výrobok na povrch, povrch utrite čistou suchou utierkou a nechajte vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Po použití neoplachujte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7 (meta SPC 7).

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 7.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ([7]) META SPC 7

5.1. **Pokyny na používanie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

Pokyn pre riedenie (7,5 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 75 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (10 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 100 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (15 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 150 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody minimálne 15 minút. Ak je to možné, použite jemné mydlo. Pred ďalším použitím odev vyperte. Pred ďalším použitím obuv dôkladne očistite. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

([7]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 7.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-25 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 7

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	Incidin OxyConcentrate	Oblasť trhu: EU			
	UltraSan Floor	Oblasť trhu: EU			
Číslo autorizácie	EU-0024303-0008 1-7				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	4,95
Kyselina capryleth-9 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy-1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(oktyloxy) - (4-11 EO)	Iná ako účinná látka	53563-70-5		2,15
Kyselina hexeth-4 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy-1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Iná ako účinná látka	105391-15-9		0,62

7.2. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	Oblasť trhu: EU
	Incidin OxyConcentrate FF	Oblasť trhu: EU
	CidalSan Large Area	Oblasť trhu: EU
Číslo autorizácie	EU-0024303-0009 1-7	

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	4,95
Kyselina capryleth-9 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy-1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(oktyloxy) - (4-11 EO)	Iná ako účinná látka	53563-70-5		2,15
Kyselina hexeth-4 karboxylová (zmes kyseliny alkyléterkarboxylovej)	Poly(oxy-1,2-etándiyl), .alfa.-(karboxymetyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Iná ako účinná látka	105391-15-9		0,62

META SPC 8

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 8

1.1. **Identifikátor meta SPC 8**

Identifikátor	META SPC 8

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-8

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. ZLOŽENIE META SPC 8

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 8**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 8**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 8

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 8

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 30

Použiť # 1 – Dezinfekcia povrchov v priemysle (napr. v jedálňach, WC) utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia povrchov v priemysle (napr. v jedálňach, WC). Doba kontaktu pre utieranie pri 10 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 2 min pre baktérie; — 5 min pre kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (zodpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustné PP puzdro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm alebo 200 × 200 mm).

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

—

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 31

Použiť # 2 – Dezinfekcia malých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v závodoch na spracovanie potravín. Doba kontaktu pre utieranie pri 10 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 2 min pre baktérie; — 5 min pre kvasinky; — 15 min pre huby; — 60 min pre mykobaktérie.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (zodpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm alebo 200 × 200 mm).

	Svetlo nepriepustné PP puzdro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm alebo 200 × 200 mm).

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 32

Použiť # 3 – Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Rutinná dezinfekcia menších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často nedotýkajú.

	Doba kontaktu pre utieranie pri 10 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 15 min pre baktérie, kvasinky a huby; — 60 min pre mykobaktérie.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustné PP puzdro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel alebo s netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm alebo 200 × 200 mm).

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

—

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8 (meta SPC 8).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 8.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ([8]) META SPC 8

5.1. **Pokyny na používanie**

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití výrobkov nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Keď je nádoba prázdna, zlikvidujte ju. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

([8]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 8.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

—

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-35 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 6 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 8

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	DrySan Oxy Wipes		Oblasť trhu: EU		
	IncidinOxyWipe		Oblasť trhu: EU		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0010 1-8				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,0

META SPC 9

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 9

1.1. **Identifikátor meta SPC 9**

Identifikátor	META SPC 9

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-9

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. ZLOŽENIE META SPC 9

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 9**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7,0	7,7
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	1,5	1,5
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	3,71	3,71
Alkohol EO fosfátester	Poly(oxy-1,2-etándiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkyléter, fosfáty	Iná ako účinná látka	68130-47-2		14,625	14,625
Alkylpolyglykozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymetyl) oxán-3,4,5-triol	Iná ako účinná látka	68515-73-1	500-220-1	6,35	6,35
Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované	Iná ako účinná látka	69227-22-1		3,0	3,0

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 9**

Úprava/úpravy	SL - Rozpustný koncentrát

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 9

Výstražné upozornenia	Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Po manipulácii starostlivo umyte ruky Nevdychujte pary. Nevdychujte aerosóly. Noste ochranu tváre. Noste ochranné rukavice. Noste ochranné okuliare. Noste ochranný odev. PO POŽITÍ: Vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou. Okamžite volajte lekára. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Odborné ošetrenie (pozri pokyny prvej pomoci na etikete). Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii nádobe s odolnou vnútornou vrstvou. Uchovávajte uzamknuté. Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 9

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 33

Použiť # 1 – Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách utieraním pomocou čistej jednorazovej handry/utierky a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia menších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často dotýkajú a ktorých sa ľudia často nedotýkajú. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3-5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Nalejte rozriedený výrobok do čistého vedra a rozotrite ho po povrchu jednorazovou handrou/utierkou, utrite povrch čistou handrou/utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 34

Použiť # 2 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách utieraním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná a nerutinná dezinfekcia väčších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často dotýkajú a ktorých sa často nedotýkajú. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie); — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3 – 5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

Nerutinná dezinfekcia: Dezinfekcia v špecifických rizikových situáciách (pokiaľ vnútroštátne orgány verejného zdravotníctva nestanovujú inak).

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 35

Použiť # 3 – Dezinfekcia malých a/alebo veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky alebo utieraním pomocou jednorazovej handry a vedra a/alebo podlahy utieraním pomocou plochého mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie). Spôsob: Utieranie pomocou jednorazovej handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie). Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie). Spôsob: Sprejovanie pomocou rozprašovača a suchej utierky a mopovanie pomocou mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie, mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).

	Spôsob: Utieranie handrou/utierkou a vedrom a čistenie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých a veľkých povrchov v malých priestoroch bez prítomnosti potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre utieranie a mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3 – 5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre sprejovanie s postrekovačmi s dýzami: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pre utieranie: 10 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3 – 5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre utieranie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3 – 5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre mopovanie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pri sprejovaní: 10 ml/m^2; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3 – 5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombináciu sprejovania s rozprašovačom a mopovania: raz za deň na jednu miestnosť. Aplikačná dávka: Aplikačná dávka pre utieranie: 10 ml/m^2; Aplikačná dávka pri mopovaní: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3 – 5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie pre kombinované utieranie a mopovanie: raz za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 –5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Po použití neoplachujte.

Sprejovanie: Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte rozriedený výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a zariadenia, alebo nasprejujte rozriedený výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou alebo nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Utieranie: Nalejte rozriedený výrobok do čistého vedra a rozotrite ho po povrchu jednorazovou handrou/utierkou, utrite povrch čistou handrou/utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

Mopovanie: Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Pre sprejovanie: Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 36

Použiť # 4 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách utieraním pri použití plochého mopu a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje

Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou plochého mopu a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých plôch vo veľkých priestoroch bez kontaktu s potravinami. Doby kontaktu pre mopovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 20 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3 – 5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Naplňte vedro zriedeným výrobkom a naneste ho na podlahu pomocou plochého mopu, utrite povrch čistým suchým mopom a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Zaistite technické vetranie s najmenej 15 výmenami vzduchu za hodinu.

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 37

Použiť # 5 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré neprichádzajú do kontaktu s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou zariadenia zaveseného na stene

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie zariadením zaveseným na stene Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých plôch vo veľkých nepotravinárskych a potravinárskych priestoroch. Doba kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky (3 % riedenie). Doby kontaktu pre sprejovanie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre baktérie (1,5 % riedenie); — 15 min pre kvasinky (2 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 180 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 1,5 – 3 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: raz za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Naneste výrobok pomocou zariadenia zaveseného na stene. Po aplikácii opláchnite.

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Zaistite technické vetranie s najmenej 15 výmenami vzduchu za hodinu.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.6. **Opis použitia**

Tabuľka 38

Použiť # 6 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách sprejovaním pomocou rozprašovača a suchej utierky

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Viruses Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Sprejovanie použitím rozprašovača a suchej utierky Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov vo veľkých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doby kontaktu pre sprejovanie a utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3 – 5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l

4.6.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov držte fľašu vo zvislej polohe a rozprašujte zo vzdialenosti 30 cm. Nasprejujte rozriedený výrobok na suchú utierku a utrite malé povrchy, ako sú pracovné dosky a zariadenia, alebo nasprejujte rozriedený výrobok na povrch, utrite povrch čistou suchou utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití trysku vždy zatvorte. Po použití neoplachujte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.6.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Nevdychujte pary/aerosóly.

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

Plocha povrchov, ktoré sa majú dezinfikovať (v m^2), nesmie byť väčšia ako 1/10 objemu miestnosti (v m^3), napr. pri objeme miestnosti 120 m^3 je maximálna plocha, ktorá môže byť dezinfikovaná, 12 m^2.

4.6.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.6.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.6.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.7. **Opis použitia**

Tabuľka 39

Použiť # 7 – Dezinfekcia veľkých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami v inštitucionálnych/komerčných budovách utieraním pomocou jednorazovej handry a vedra

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné

Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou jednorazovej handry/utierky a vedra Detailný opis: Rutinná dezinfekcia veľkých povrchov vo veľkých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie (5 % riedenie). — 5 min pre kvasinky (3 % riedenie); — 5 min pre huby (4 % riedenie); — 50 min pre vírusy (5 % riedenie).
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 10 ml/m^2 Riedenie (%): Riedenie (%): 3 – 5 Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 0,5 – 5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,01 – 1 l

4.7.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Nalejte rozriedený výrobok do čistého vedra a rozotrite ho po povrchu jednorazovou handrou/utierkou, utrite povrch čistou handrou/utierkou a nechajte ho vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

4.7.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.7.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9 (meta SPC 9).

4.7.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

4.7.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 9.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ([9]) META SPC 9

5.1. **Pokyny na používanie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz.

([9]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 9.

Pokyn pre riedenie (1,5 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 15 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (2 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 20 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (3 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 30 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (4 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 40 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

Pokyn pre riedenie (5 %): na výrobu 1 l rozriedeného dezinfekčného prostriedku na povrchy pridajte 50 ml koncentrovaného výrobku do približne 500 ml destilovanej vody alebo vody rovnakej kvality (napr. demineralizovanej vody), premiešajte a doplňte do 1 l destilovanou vodou alebo vodou rovnakej kvality.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Počas manipulácie s výrobkom noste ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku).

Používanie ochrany zraku počas manipulácie s výrobkom je povinné.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite oplachujte veľkým množstvom vody minimálne 15 minút. Ak je to možné, použite jemné mydlo. Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte. Pred ďalším použitím obuv dôkladne očistite. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po požití: Vypláchnite ústa vodou. Nevyvolávajte zvracanie. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte ústami. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-25 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 9

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Oblasť trhu: EU			
	Incidin OxyPro	Oblasť trhu: EU			
Číslo autorizácie	EU-0024303-0011 1-9				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7,0
Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	1,5
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alkohol EO fosfátester	Poly(oxy-1,2-etándiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylétery, fosfáty	Iná ako účinná látka	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglykozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymetyl) oxán-3,4,5-triol	Iná ako účinná látka	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované	Iná ako účinná látka	69227-22-1		3,0

7.2. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	Oasis Pro Oxy Des	Oblasť trhu: EU			
	Maxx Oxy Des 2	Oblasť trhu: EU			
Číslo autorizácie	EU-0024303-0012 1-9				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7,0

Kyselina fosforečná	Kyselina fosforečná	Iná ako účinná látka	7664-38-2	231-633-2	1,5
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Iná ako účinná látka	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alkohol EO fosfátester	Poly(oxy-1,2-etándiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylétery, fosfáty	Iná ako účinná látka	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglykozid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymetyl) oxán-3,4,5-triol	Iná ako účinná látka	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 etoxylované propoxylované	Iná ako účinná látka	69227-22-1		3,0

META SPC 10

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 10

1.1. **Identifikátor meta SPC 10**

Identifikátor	META SPC 10

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-10

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 01 - Osobná hygiena človeka

2. ZLOŽENIE META SPC 10

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 10**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
Kyselina L-glutámová, N-kokoacyl-deriváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 10**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 10

Výstražné upozornenia	Môže byť korozívna pre kovy. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Po manipulácii starostlivo umyte ruky Noste ochranné okuliare. Noste ochranu tváre. Absorbujte uniknutý produkt, aby sa zabránilo materiálnym škodám. Uchovávajte v nádobe odolnej proti korózii nádobe s odolnou vnútornou vrstvou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte starostlivosť. Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 10

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 40

Použiť # 1 – Hygienické umývanie rúk

Typ výrobku	Výrobky typu 01 - Osobná hygiena človeka
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Priama aplikácia na pokožku Detailný opis: Antimikrobiálne mydlo na ruky, určené len na hygienické umývanie rúk pre potravinársky priemysel a priemysel nápojov. Doba kontaktu pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 60 sekúnd pre baktérie a kvasinky.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 3 ml výrobku na aplikáciu Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: 1 až 10-krát za deň
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustná HDPE baňatá fľaša, 1 – 100 l Svetlo nepriepustná HDPE bandaska, 1 – 100 l Svetlo nepriepustný HDPE IBC kontajner, 600 – 1 000 l Svetlo nepriepustný HDPE sud, 60 – 220 l Svetlo nepriepustná HDPE fľaša, 0,1 – 5 l Svetlo nepriepustné HDPE puzdro, 0,5 – 100 l

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10 (meta SPC 10).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 10.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ([10]) META SPC 10

5.1. **Pokyny na používanie**

Naneste asi 3 ml výrobku na mokré ruky a roztierajte počas 60 sekúnd. Oplachujte dôkladne pod tečúcou vodou z vodovodu počas asi 30 sekúnd.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Vyvarujte sa postriekaniu a rozliatiu.

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite vodou.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite vodou.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-25 °C

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 10

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	Manosan Oxy		Oblasť trhu: EU		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0013 1-10				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4

([10]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 10.

Monohydrát kyseliny citrónovej	Kyselina 2-hydroxypropán-1,2,3-trikarboxylová	Iná ako účinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9
Fenoxyetanol	2-fenoxyetanol	Iná ako účinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9
Laurylsulfát sodný	Dodecylsulfát sodný	Iná ako účinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88
Kyselina L-glutámová, N-kokoacylderiváty, monosodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Iná ako účinná látka	68187-32-6	269-087-2	2,0
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amónne soli	Iná ako účinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12

META SPC 11

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 11

1.1. **Identifikátor meta SPC 11**

Identifikátor	META SPC 11

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-11

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. ZLOŽENIE META SPC 11

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 11**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 11**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 11

Výstražné upozornenia	
Bezpečnostné upozornenia	

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 11

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 41

Použiť # 1 – Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov, materiálov a zariadení v čistých priestoroch v oblasti life sciences a v podporných prostrediach (napr. vo farmaceutickom priemysle) a dezinfekcia pri prenose. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky, huby a mykobaktérie;

	— 30 min pre vírusy; — 60 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PET vedro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkam zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm).

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

—

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 42

Použiť # 2 – Dezinfekcia čistých priestorov v oblasti life sciences mopovaním pomocou RTU utierok k mopu

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje

	Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Mopovanie pomocou impregnovaných RTU mopových utierok Detailný opis: Dezinfekcia podláh v čistých priestoroch v oblasti life sciences a v podporných prostrediach (napr. vo farmaceutickom priemysle). Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie, kvasinky, huby a mykobaktérie; — 30 min pre vírusy; — 60 min pre bakteriálne spóry. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 5 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PET vedro s 10 až 5 000 impregnovanými utierkam zo zmesi 45 % polyester / 55 % celulóza (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm).

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

—

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.3. **Opis použitia**

Tabuľka 43

Použiť # 3 – Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v zdravotníckych aplikáciách utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: Žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Rutinná dezinfekcia menších povrchov v nemocničných miestnostiach a ambulanciách lekárov, ktorých sa ľudia často nedotýkajú.

	Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 15 min pre *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry, mykobaktérie a vírusy. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 15 min pre baktérie a kvasinky; — 30 min pre huby, mykobaktérie a vírusy.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 2-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné vrecko s potlačou s 10 – 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustný PET kanister s 10 – 1 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vedro s 10 – 1 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vrecko s 10 – 1 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm).

4.3.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Rutinná dezinfekcia: Dezinfekcia povrchov, ktoré môžu byť pravidelne kontaminované patogénmi počas lekárskych alebo ošetrovateľských procesov, aby sa znížilo riziko prenosu takýchto organizmov cez povrchy.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

—

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.4. **Opis použitia**

Tabuľka 44

Použiť # 4 – Dezinfekcia malých povrchov, ktoré neprichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: Žiadne údaje Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch bez potravín (napr. na WC). Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 15 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry, mykobaktérie a vírusy. Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 2 min pre baktérie; — 15 min pre kvasinky; — 30 min pre huby, mykobaktérie a vírusy.

Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné vrecko s potlačou s 10 – 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustný PET kanister s 10 – 1 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vedro s 10 – 1 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vrecko s 10 – 1 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm).

4.4.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.4.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

—

4.4.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.4.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.4.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.5. **Opis použitia**

Tabuľka 45

Použiť # 5 – Dezinfekcia malých povrchov, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, v inštitucionálnych/komerčných budovách utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: Žiadne údaje

	Vedecký názov: Huby Bežný názov: Huby Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Mykobaktérie Bežný názov: Mykobaktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Bakteriálne spóry Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Clostridium difficile Bežný názov: Bakteriálne spóry Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Vírusy Bežný názov: Vírusy Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Rutinná dezinfekcia malých povrchov v malých priestoroch s potravinami (napr. v kuchyniach). Doby kontaktu pre utieranie pri 20 °C v čistých podmienkach: — 15 min pre spóry *Clostridium difficile*; — 30 min pre bakteriálne spóry, mykobaktérie a vírusy. Doba kontaktu pre utieranie pri 20 °C v špinavých podmienkach: — 2 min pre baktérie; — 15 min pre kvasinky; — 30 min pre huby, mykobaktérie a vírusy.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 10-krát za deň na jednu miestnosť
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné vrecko s potlačou s 10 – 100 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustný PET kanister s 10 – 1 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vedro s 10 – 1 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm). Svetlo nepriepustné PET vrecko s 10 – 1 000 impregnovanými utierkami zo zmesi 60 % polyester / 40 % lyocel (veľkosť utierok: 420 × 250 mm alebo 200 × 200 mm).

4.5.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11 (meta SPC 11).

4.5.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.5.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.5.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

4.5.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 11.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ([11]) META SPC 11

5.1. **Pokyny na používanie**

Výrobok je určený na čistenie a dezinfekciu v jednom kroku. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Pri použití v čistých podmienkach: pred aplikáciou výrobku očistite povrch. Výrobok aplikujte na suchý povrch. Povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Keď je nádoba prázdna, zlikvidujte ju. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

—

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob.

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

([11]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 11.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách.

Skladovacia teplota: 0-35 °C. Chráňte pred mrazom.

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 11

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide		Oblasť trhu: EU		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0014 1-11				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	Incidin OxyWipe S		Oblasť trhu: EU		
	KitchenPro Oxy Wipes S		Oblasť trhu: EU		
Číslo autorizácie	EU-0024303-0015 1-11				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5

META SPC 12

1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE TÝKAJÚCE SA META SPC 12

1.1. **Identifikátor meta SPC 12**

Identifikátor	META SPC 12

1.2. **Prípona čísla autorizácie**

Číslo	1-12

1.3. **Typ(y) výrobku**

Typ(y) výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív

2. ZLOŽENIE META SPC 12

2.1. **Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení meta SPC 12**

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)	
					Min.	Max.
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Druh (druhy) prípravku v rámci meta SPC 12**

Úprava/úpravy	AL - Iné tekutiny

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA META SPC 12

Výstražné upozornenia	Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Bezpečnostné upozornenia	Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Uzemnite a upevnite nádobu a plniace zariadenie. Používajte elektrické zariadenie do výbušného prostredia. Používajte ventilačné zariadenie do výbušného prostredia. Používajte osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. Používajte neiskriace prístroje. Vykonajte opatrenia na zabránenie výbojom statickej elektriny. Noste ochranné okuliare. Noste ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM. Okamžite volajte lekára. V prípade požiaru: Na hasenie použite vodu Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. Zneškodnite obsah v súlade s vnútroštátnymi predpismi. Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE (POUŽITIA) META SPC 12

4.1. **Opis použitia**

Tabuľka 46

Použiť # 1 – Dezinfekcia povrchov v priemysle (napr. v jedálňach, WC) utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 02 - Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia povrchov v priemysle (napr. v jedálňach, WC). Doba kontaktu pre utieranie pri 10 °C a 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 3-krát za deň
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5 000 impregnovanými netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm). Svetlo nepriepustné PE vrecko s 10 až 5 000 impregnovanými netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm).

4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12.

4.2. **Opis použitia**

Tabuľka 47

Použiť # 2 – Dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami v potravinárskom a nápojovom priemysle utieraním pomocou impregnovaných RTU utierok

Typ výrobku	Výrobky typu 04 - Oblasť potravín a krmív
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	—
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: žiadne údaje Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: žiadne údaje
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: Utieranie pomocou impregnovaných RTU utierok Detailný opis: Dezinfekcia malých povrchov v závodoch na spracovanie potravín. Doba kontaktu pre utieranie pri 10 °C a 20 °C v špinavých podmienkach: — 5 min pre baktérie a kvasinky.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Aplikačná dávka: 1 utierka na 1 m^2 (odpovedá 10 ml/m^2) Riedenie (%): RTU výrobok Počet a časový rozvrh aplikácie: Frekvencia aplikácie: max. 4-krát za deň
Kategória(ie) používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Svetlo nepriepustné PP vedro s 10 až 5 000 impregnovanými netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm). Svetlo nepriepustné PE vrecko s 10 až 5 000 impregnovanými netkanými 100 % polypropylénovými utierkami (veľkosť utierok: 200 × 250 mm).

4.2.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12 (meta SPC 12).

4.2.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Potraviny, krmivá alebo nápoje uchovávajte mimo ošetreného povrchu až do jeho vyschnutia. Nepoužívať priamo na potraviny, krmivá alebo nápoje alebo v ich blízkosti.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite si všeobecný návod na používanie v meta zhrnutí charakteristík výrobku 12.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY NA POUŽÍVANIE ([12]) META SPC 12

5.1. **Pokyny na používanie**

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a riaďte sa všetkými pokynmi. Výrobok sa má nanášať na suchý povrch. Povrch dokonale navlhčite pomocou výrobku. Po použití výrobkov nechajte povrch vyschnúť na vzduchu. Po použití neoplachujte. Ak sa nádoba nepoužíva, zatvorte ju. Nepoužívajte utierky, ktoré sú už suché. Keď je nádoba prázdna, zlikvidujte ju. Nepoužívajte na povrchy citlivé na oxidačné činidlá, napr. na mramor, meď alebo mosadz. Použité utierky sa musia vložiť do uzavretej nádoby na likvidáciu.

5.2. **Opatrenia na zmiernenie rizika**

Zabráňte prenosu z rúk do očí.

5.3. **Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

OPATRENIA PRVEJ POMOCI

Po kontakte s očami: Ihneď vyplachujte veľkým množstvom vody, aj pod viečkami, po dobu najmenej 15 minút. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Po kontakte s pokožkou: Opláchnite veľkým množstvom vody.

Po požití: Vypláchnite ústa. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Po vdýchnutí: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ošetrujte podľa príznakov. Ak sa objavia príznaky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

ENVIRONMENTÁLNE NÚDZOVÉ OPATRENIA

Zabráňte kontaktu s pôdou a s povrchovými alebo podzemnými vodami.

Zvážte zabezpečenie zachytenia okolo skladovacích nádob

5.4. **Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Výrobok: Ak je to možné, uprednostňuje sa recyklácia pred likvidáciou alebo spálením. Ak sa recyklácia nedá prakticky realizovať, zlikvidujte v súlade s národnými predpismi. Odpady zlikvidujte v schválenom zariadení na likvidáciu odpadu.

Kontaminovaný obal: Zneškodnite nádobu v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

5.5. **Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Uchovávajte mimo dosahu detí. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Skladujte vo vhodných označených nádobách. Uchovávajte mimo dosahu tepla a zdrojov zapálenia. Skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste. Chráňte pred oxidačnými činidlami.

Skladovacia teplota: 0-30 °C.

Doba použiteľnosti: 12 mesiacov

([12]) Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizík a ďalšie pokyny na používanie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia v rámci meta SPC 12.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Výrobok obsahuje peroxid vodíka (č. CAS: 7722-84-1), pre ktorý bola dohodnutá európska referenčná hodnota 1,25 mg/m^3 pre profesionálneho používateľa, ktorá sa použila na posúdenie rizika tohto výrobku.

7. TRETIA INFORMAČNÁ ÚROVEŇ: JEDNOTLIVÉ VÝROBKY V META SPC 12

7.1. **Obchodný názov, číslo autorizácie a špecifické zloženie každého výrobku**

Obchodný názov	OxyDes Maxi Wipes	Oblasť trhu: EU			
Číslo autorizácie	EU-0024303-0016 1-12				
Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
peroxid vodíka		Účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanol	Propán-1-ol	Iná ako účinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5