31999R1411

L 164/56 *EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS* 30.6.1999.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1411/1999

(1999. gada 29. jūnijs)

par jaunu dzīvnieku barībā izmantojamu piedevu un šo piedevu izmantojumu apstiprināšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1245/1999 [2], un jo īpaši tās 3. un 9.j pantu,

(1) tā kā Direktīvā 70/524/EEK ir paredzēts, ka jaunas piedevas vai jaunus piedevu izmantojumus var apstiprināt, ņemot vērā jaunākās zinātnes un tehnikas atziņas;

(2) tā kā Padomes 1993. gada 14. decembra Direktīvā 93/113/EK par fermentu, mikroorganismu un to preparātu realizēšanu un izmantošanu dzīvnieku uzturā [3], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 97/40/EK [4], atkāpjoties no Direktīvas 70/524/EEK, paredzēts, ka dalībvalstis provizoriski var pieļaut fermentu, mikroorganismu un to preparātus izmantošanu un realizēšanu;

(3) tā kā, pārbaudot dokumentāciju, ko dalībvalstis iesniegušas saskaņā ar Direktīvas 93/113/EK 3. pantu, konstatēts, ka provizoriski var apstiprināt dažus preparātus, kas pieder fermentu un mikroorganismu grupai;

(4) tā kā Dzīvnieku ēdināšanas zinātniskā komiteja ir sniegusi labvēlīgu atzinumu attiecībā uz šo preparātu nekaitīgumu;

(5) tā kā šajā direktīvā paredzētie pasākumi saskan ar Barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Preparātus, kas pieder "fermentu grupai" un ir uzskaitīti šīs regulas I pielikumā, saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK var apstiprināt par dzīvnieku uztura piedevām, kas dzīvnieku uzturā izmantojamas atbilstīgi minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Preparātus, kas pieder "mikroorganismu grupai" un ir uzskaitīti šīs regulas II pielikumā, saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK var apstiprināt par dzīvnieku uztura piedevām, kas dzīvnieku uzturā izmantojami atbilstīgi minētajā pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

To piemēro no 1999. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Franz FISCHLER

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.
[2] OV L 150, 17.6.1999., 15. lpp.
[3] OV L 334, 31.12.1993., 17. lpp.
[4] OV L 180, 9.7.1997., 21. lpp.

I PIELIKUMS

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kg kompleksās barības			
6	Endo-1,4-betaksilanāze EK 3.2.1.8 Endo-1,4-betaglikanāze EK 3.2.1.4	Endo-1,4-betaksilanāzes un endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts, kas iegūts ar *Humicola insolens* (DSM 10442), ar šādu minimālo aktivitāti: — ar pārklājumu: 800 FXU (1)/g 75 FBG (2)/g — mikroganulās: 800 FXU/g 75 FBG/g — šķīdumā: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Cūkas nobarošanai	–	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg barības: — 400 FXU — 37 FBG 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne cietes polisaharīdiem (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glikāniem), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 30 % miežu un/vai auzu, kviešu	30.9.1999.
32	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EK 3.2.1.6	Endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts, kas iegūts ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), ar šādu maksimālo aktivitāti: — 200 U (3)/ml	Cāļi nobarošanai	–	100 U	–	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 100 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne cietes polisaharīdiem (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 30 % miežu	30.9.1999.
		1 200 U/ml	Sivēni	Četri mēneši	400 U	–	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 400 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne cietes polisaharīdiem (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 55 % miežu	30.9.1999.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kg kompleksās barības			
			Cūkas nobarošanai	–	500 U	–	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne cietes polisaharīdiem (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 70 % miežu	30.9.1999.
33	Endo-1,4-betaksilanāze EK 3.2.1.8	Endo-1,4-betaksilanāzes preparāts, kas iegūts ar *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), ar šādu minimālo aktivitāti: — pulverī: 2 000 U/ml (4) — šķīdumā: 5 000 U/ml	Cāļi nobarošanai	–	500 U	–	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 500 līdz 2 500 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne cietes polisaharīdiem (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 55 % kviešu vai 60 % rudzu	30.9.1999.
			Dējējvistas	–	2 500 U	–	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 2 000 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne cietes polisaharīdiem (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 35 % kviešu	30.9.1999.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					Aktivitātes vienības uz kg kompleksās barības			
		— pulverī: 4 000 U/g — -šķīdumā: 10 000 U/ml	Sivēni	Četri mēneši	5 000 U	–	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 5 000 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne cietes polisaharīdiem (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 45 % kviešu	30.9.1999.
		— pulverim: 4 000 U/g — šķīdumā: 8 000 U/ml	Cūkas nobarošanai	–	4 000 U	–	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 4 000 U. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne cietes polisaharīdiem (galvenokārt arabinoksilāniem), piemēram, maisījumā, kas satur vairāk nekā 35 % kviešu	30.9.1999.

(1) 1 FXU ir fermenta daudzums, kas atbrīvo 3,1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus) no azokviešu arabinokksilāna minūtē pie pH 6,0 un 50 °C.
(2) 1 FBG ir fermenta daudzums, kas atbrīvo vienu mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus) no miežu beta-glikāna minūtē pie pH 6,0 un 50 °C.
(3) 1 U ir fermenta daudzums, kas atbrīvo vienu mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus) no miežu beta glikāna minūtē pie pH 5,0 un 30 °C.
(4) 1 U ir fermenta daudzums, kas atbrīvo vienu mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentus) no auzu speltas ksilāna minūtē pie pH 5,3 un 50 °C.

II PIELIKUMS

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					CFU/kg kompleksās barības			
1	Bacillus cereus var. royoi NCIMB 40112	*Bacillus cereus* var. *royoi* preparāts, kas satur ne vairāk kā 1×10^{10} CFU/g piedevas	Cāļi nobarošanai	–	$0,2 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: monenzīnnātriju, lazalocīdnātriju, salinomicīna nātriju, amprolijetopabātu, metiklorpindolmetilbenzokvātu, dekokvinātu, robenidīnu, dinitolmīdu, narasīnu, halofuginonu	30.9.1999.
			Dējējvistas	–	$0,2 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu	30.9.1999.
			Teļi	seši mēneši	$0,5 \times 10^{9}$	1×10^{9}	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu	30.9.1999.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					CFU/kg kompleksās barības			
			Liellopi nobarošanai	–	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu *Bacillus cereus*var. *toyoi*daudzums dienas devā nevar pārsniegt $1,0 \times 10^9$ CFU uz 100 kg dzīvsvara. Pievienot $0,2 \times 10^9$ CFU attiecībā uz papildu 100 kg dzīvsvara	30.9.1999.
			Vaislas trušu mātītes	–	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: robenidīnu	30.9.1999.
			Truši nobarošanai	–	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu Var izmantot barības maisījumā, kas satur atļautos kokcidiostatus: metiklorpindolu, robenidīnu, salinomicīnnātriju	30.9.1999.

Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					CFU/kg kompleksās barības			
12	Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R	*Lactobacillus farciminis* preparāts, kas satur ne mazāk par 1×10^9 CFU/g piedevas	Sivēni	četri mēneši	1×10^9	1×10^9	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu	30.9.1999.
13	Enteroccocus faecium DSM 10 663	*Enteroccocus faecium*preparāts, kas satur ne mazāk kā: — pulverī un granulās: $3,5 \times 10^{10}$ CFU/g piedevas — ar pārklājumu: $0,2 \times 10^{10}$ CFU/g piedevas — šķīdumā: 1×10^{10} CFU/ml piedevas	Sivēni	četri mēneši	1×10^9	1×10^9	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu	30.9.1999.
14	Saccharomyces cerevisae MUCL 39 885	*Saccharomyces cerevisae* preparāts, kas satur ne mazāk kā:	Sivēni	četri mēneši	3×10^9	3×10^9	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu	30.9.1999.
		— pulverī, sfēriskās un ovālās granulās:	Liellopi nobarošanai		9×10^9	9×10^9	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos nosaka glabāšanas ilgumu un granulēšanas noturīgumu *Saccharomyces cerevisae*daudzums dienas devā nedrīkst pārsniegt $1,6 \times 10^{10}$ CFU uz 100 kg dzīvsvara. Pievienot $3,2 \times 10^9$ CFU attiecībā uz papildu 100 kg dzīvsvara	30.9.1999.