31999R1411

L 164/56 *URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI* 30.6.1999

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1411/1999
z dne 29. junija 1999
o dovolitvi novih dodatkov in nove vrste uporabe dodatkov v krmi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi ([1]), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1245/1999 ([2]), in zlasti členov 9j in 3 Direktive,

(1) ker Direktiva 70/524/EGS predvideva, da je mogoče dovoliti nove dodatke in nove vrste uporabe dodatkov, ob upoštevanju znanstvenega in tehničnega znanja;

(2) ker je Direktiva Sveta 93/113/ES z dne 14. decembra 1993 o uporabi in prometu encimov, mikroorganizmov in njihovih pripravkov v prehrani živali ([3]), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 97/40/ES ([4]), z odstopanjem od Direktive 70/524/EGS, pooblastila države članice, da začasno dovolijo uporabo in promet encimov, mikroorganizmov in njihovih pripravkov;

(3) ker iz preverjanja dokumentacij, ki so jih predložile države članice v skladu s členom 3 Direktive 93/113/ES, izhaja, da se lahko začasno dovoli nekatere pripravke, ki spadajo v skupino encimov in mikroorganizmov;

(4) ker je Znanstveni odbor za prehrano živali dal ugodno mnenje v zvezi z neškodljivostjo teh pripravkov;

(5) ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za krmo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravki, ki sodijo v skupino „encimi“ in so našteti v Prilogi I k tej uredbi, se lahko dovolijo v skladu z Direktivo 70/524/EGS kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 2

Pripravki, ki spadajo v skupino „mikroorganizmi“ in so našteti v Prilogi II k tej uredbi, se lahko dovolijo v skladu z Direktivo 70/524/EGS kot dodatki v prehrani živali pod pogoji, določenimi v navedeni prilogi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v *Uradnem listu Evropskih skupnosti*.

Uporablja se od 1. julija 1999.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 1999

Za Komisijo
Franz FISCHLER
Član Komisije

([1]) UL L 270, 14.12.1970, str. 1.
([2]) UL L 150, 17.6.1999, str. 15.
([3]) UL L 334, 31.12.1993, str. 17.
([4]) UL L 180, 9.7.1997, str. 21.

PRILOGA I

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
6	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8. Endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4.	Pripravek endo-1,4-betaksilanaze in endo-1,4-beta-glukanase, ki ju proizvaja *Humicula insulens*(DSM 10442), ki ima najnižje delovanje za: — Prelito: 800 FXU ([1])/g 75 FBG ([2])/g — Mikroganulat: 800 FXU/g 75 FBG/g — Tekočino: 550 FXU/ml 50 FBG/ml	Prašiči za pitanje	—	200 FXU 19 FBG	800 FXU 75 FBG	1. Med pogoji za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg krme: — 400 FGU — 37 FBG 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharadi (v glavnem arabinoksilani in betaglukani), npr. vsebujočih več kakor 30 % ječmena in/ali ovsa, žita	30.9.1999
32	Endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6.	Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum*(ATCC 2106), ki ima najnižje delovanje: — 200 U ([3])/ml	Piščanci za pitanje	—	100 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 100 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharadi (v glavnem beta-glukani), npr. vsebujočih več kakor 30 % ječmena	30.9.1999
		1 200 U/ml	Pujski	Štirje meseci	400 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo shranjevanja, čas shranjevanja in obstojnost na peletiranje 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 400 U 3. Za uporabo v krmnih meanicah, bogatih z nekrobnimi polisaharadi (v glavnem beta-glukani), npr. vsebujočih več kakor 55 % ječmena	30.9.1999

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
			Prašiči za pitanje	—	500 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharadi (v glavnem beta-glukani), npr. vsebujočih več kakor 70 % ječmena	30.9.1999
33	Endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8.	Pripravek endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), ki ima najnižje delovanje: — V obliki prahu: 2 000 U/ml [4] — V tekoči obliki: 5 000 U/ml	Piščanci za pitanje	—	500 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 500 do 2 500 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharadi (v glavnem arabinoksilani), npr. vsebujočih več kakor 55 % pšenice ali 60 % rži	30.9.1999
			Kokoši nesnice	—	2000 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 2 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharadi (v glavnem arabinoksilani), npr. vsebujočih več kakor 35 % pšenice	30.9.1999

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice			
		— V obliki prahu: 4 000 U/g — V tekoči obliki: 10 000 U/ml	Pujski	Štirje meseci	5000 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 5 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharadi (v glavnem arabinoksilani), npr. vsebujočih več kakor 45 % pšenice	30.9.1999
		— V obliki prahu: 4 000 U/g — V tekoči obliki: 8 000 U/ml	Prašiči za pitanje	—	4000 U	—	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju 2. Priporočeni odmerek na kg popolne krmne mešanice: 4 000 U 3. Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharadi (v glavnem arabinoksilani), npr. vsebujočih več kakor 35 % pšenice	30.9.1999

([1]) 1 FXU je količina encima, ki sprosti 3,1 mikromola redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz azo–pšeničnega arabinoksilana na minuto pri pH 6,0 in 50°C.
([2]) 1 FBG je količina encima, ki sprosti en mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 6,0 in 50°C.
([3]) 1 U je količina encima, ki sprosti en mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz ječmenovega beta-glukana na minuto pri pH 5,0 in 30°C.
([4]) 1 U je količina encima, ki sprosti en mikromol redukcijskih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana ovsene pire na minuto pri pH 5,3 in 50°C.

PRILOGA II

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
1	*Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112	Pripravek *Bacillus cereus* var. *toyoi*, ki vsebuje najmanj 1 x 10^{10} CFU/g dodatka	Piščanci za pitanje	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: monensin natrij, lasolacid natrij, salinomicin natrij, amprolij-etopabat-metilklorpindol-metil benzokvat, dekokinat, robenidin,dinitolmid, narasin, halofuginon	30.9.1999
			Kokoši nesnice	—	$0,2 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.9.1999
			Teleta	šest mesecev	$0,5 \times 10^9$	1×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.9.1999

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
			Govedo za pitanje	—	$0,2 \times 10^9$	$0,2 \times 10^9$	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju. Količina za *Bacillus cereus* var. *toyoi* v dnevnem odmerku ne sme presegati $1,0 \times 10^9$ CFU na 100 kg telesne teže. Dodajte $0,2 \times 10^9$ CFU za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže.	30.9.1999
			Plemenski kunci	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: robenidin	30.9.1999
			Kunci za pitanje	—	$0,1 \times 10^9$	5×10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Sme se uporabljati v krmnih mešanicah, ki vsebujejo dovoljene kokcidiostatike: metilklorpindol, robenidin, salinomicin natrij	30.9.1999

Št.	Dodatek	Kemijska formula, opis	Vrsta ali kategorija živali	Zgornja meja starosti živali	Največja	Najmanjša vsebnost	Druge določbe	Datum poteka veljavnosti dovoljenja za promet
					CFU/kg popolne krmne mešanice			
12	*Lactbacillus farciminis* CNCM MA 67/4R	Pripravek z *Lactbacillus farciminis*,ki vsebuje najmanj 1x 10^9 CFU/g dodatka	Pujski	štirje meseci	1 x 10^9	1 x 10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.9.1999
13	*Enteroccocus faecium* DSM 10 663	Pripravek z *Enteroccocus faecium*,ki vsebuje v: — Obliki prahu in granulatni obliki najmanj: 3,5 x 10^{10} CFU/g dodatka — Prelivni obliki: 2,0 x 10^{10} CFU/g dodatka — Tekoči obliki: 1 x 10^{10} CFU/ml dodatka	Pujski	štirje meseci	1 × 10^9	1 × 10^{10}	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.9.1999
14	*Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39 885	Pripravek s *Saccharomyces cerevisiae*, ki vsebuje v: — Prahu, granulatu okrogle in ovalne oblike najmanj: 1 x 10^{10} CFU/g dodatka	Pujski	štirje meseci	3 x 10^9	3 x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju	30.9.1999
			Govedo za pitanje		9 x 10^9	9 x 10^9	V navodilih za uporabo dodatka in premiksa navedite temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju Količina za *Saccharomyces cerevisiae* v dnevnem odmerku ne sme presegati 1,6 x 10^{10} CFU na 100 kg telesne teže. Dodajte 3,2 x 10^9 CFU za vsakih nadaljnjih 100 kg telesne teže.	30.9.1999