KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/1247,

19. juuli 2022,

milles käsitletakse luba kasutada võlupunast AC väikeimetajatest mittetoiduloomade ja dekoratiivlindude söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, ([1]) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöödas kasutatavate söödalisandite taotlemise nõuded ning sellise loa andmise alused ja kord.

(2) Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikega 1 on esitatud taotlus võlupunase AC kasutamise lubamiseks. Taotlusele olid lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3) Taotluses käsitletakse võlupunase AC kasutamise lubamist väikeimetajatest mittetoiduloomade ja dekoratiivlindude söödalisandina ning selle klassifitseerimist kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „värvained“.

(4) Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet“) jõudis oma 11. novembri 2021. aasta arvamuses ([2]) järeldusele, et kavandatud tingimuste juures ei avalda võlupunane AC kahjulikku mõju loomade tervisele, tarbijate ohutusele ega keskkonnale. Kuna väikeimetajatest mittetoiduloomade ja dekoratiivlindude täiendsöödas kasutatakse väga mitmekesised söötasid ning pole selge, millises koguses annaks võlupunane AC nähtava mõju, ei saanud toiduohutusamet teha järeldust võlupunase AC tõhususe kohta väikeimetajatest mittetoiduloomade ja dekoratiivlindude söödas. Siiski märkis toiduohutusamet, et kõnealuse toidus kasutada lubatud lisaaine puhul, ning kui selle funktsioon söödas on sama kui toidus, võib edasisest tõhususe tõendamisest loobuda. Lisaks kinnitas toiduohutusamet määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud referentlabori aruande söödas sisalduva kõnealuse söödalisandi analüüsimise meetodite kohta.

(5) Peale selle on võlupunast AC komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/197 ([3]) juba lubatud kasutada kasside ja koerte söödas ning toiduohutusamet jõudis oma 24. aprilli 2012. aasta arvamuses ([4]) järeldusele, et võlupunane AC annab koerte tavapärasele söödale tõhusalt värvuse vähemalt koguses 50 mg/kg, mis on sarnane toiduohutusameti poolt välja pakutud miinimummääradega, mida kasutatakse väikeimetajatest mittetoiduloomade ja dekoratiivlindude puhul.

(6) Eespool esitatut arvesse võttes leiab komisjon, et kõnealuse aine tõhususe kohta on piisavalt tõendeid.

(7) Võlupunase AC hindamisest nähtub, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud tingimused loa andmiseks on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse aine kasutamiseks vastavalt käesoleva määruse lisas esitatud tingimustele.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

([1]) ELT L 268, 18.10.2003, lk 29.
([2]) EFSA Journal 2021; 19 (12): 6987.
([3]) Komisjoni 13. veebruari 2020. aasta rakendusmäärus (EL) 2020/197, milles käsitletakse võlupunase AC lubamist kasside ja koerte söödalisandina (ELT L 42, 14.2.2020, lk 4)
([4]) EFSA Journal 2012; 10 (5): 2675.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud ained, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „organoleptilised lisandid“ ja funktsionaalrühma „värvained“, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöödas vastavalt lisas esitatud tingimustele.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 19. juuli 2022

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Toimeaine sisaldus milligrammides 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta			
Kategooria: organoleptilised lisandid. Funktsionaalrühm: värvained. i) ained, mis annavad söödale värvuse või taastavad selle								
2a129	Võlupunane AC	*Söödalisandi koostis* Võlupunase AC peamine koostisaine on naatriumsool. Tahkel kujul (pulber või graanulid)	Merisiga Tšintšilja Deegu Hamster Liivahiir Vöötorav	–	–	500	1. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitustingimused ja püsivus kuumtöötlemisel. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse söödalisandi kasutamisest tulenevaid võimalikke ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas naha-, silma- ja hingamiskaitsevahendeid.	9. august 2032
		Toimeaine kirjeldus Võlupunane AC koosneb peamiselt dinaatrium-2-hüdroksü-1-(2-metoksü-5-metüül-4-sulfonatofenüülaso)-naftaleen-6-sulfonaadist ja lisavärvainetest, peamisteks värvituteks koostisaineteks on naatriumkloriid ja/või naatriumsulfaat. Lubatud on ka kaltsium- ja kaaliumsoolad. Toodetud keemilise sünteesi teel Puhtuse kriteeriumid: sisaldab kokku vähemalt 85 % värvaineid, arvutatud naatriumsoolana (katse) Vees lahustumatud ained: ≤ 0,2 % lisavärvained: ≤ 3 % orgaanilised ühendid, v.a järgmised värvained: — 6-hüdroksü-2-naftaleen-sulfoonhappe naatriumisool: ≤ 0,3 %	Valgetuhkrud	–	–	99		
			Muud väikeimetajatest mittetoiduloomad, v.a koerad ja kassid	–	–	99		
			Kanaarilinnud Viirpapagoid Mainad Tuukanid	–	–	45		
			Lembelinnud	–	–	51		
			Nümfkakaduud	–	–	79		
			Kakaduud	–	–	115		
			Papagoilased	–	–	145		
			Papagoid	–	–	147		
			Araraunad	–	–	150		

		— 4-amino-5-metoksü-2-metüülbenseen-sulfoonhape: ≤ 0,2 % — 6,6-oksübis(2-naftaleen-sulfoonhappe) dinaatriumisool: ≤ 1 % Sulfoonimata primaarsed aromaatsed amiinid: < 0,01 % (arvutatud aniliinina) Eetriga ekstraheeritavad ained: < 0,2 % lahusest, mille pH on 7 Keemiline valem: $C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$ CASi number: 25956-17-6 EINECSi number: 247-368-0	Boliivia araraunad	–	–	173		
			Hüatsint-siniaarad	–	–	214		
			Muud dekoratiivlinnud	–	–	45		
		Analüüsimeetod ([1]) Võlupunase AC koguse kindlakstegemine söödalisandis: — spektrofotomeetria lainepikkusel 504 nm (komisjoni määrus (EL) nr 231/2012, milles viidatakse kogumikule FAO JECFA monograafiad nr 1, kd 4). Võlupunase AC sisalduse määramiseks söötades: — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia koos tandemmassispektromeetriaga (LC-MS/MS).						

([1]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad referentlabori veebisaidil järgmisel aadressil: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en