RÈGLEMENT (CEE) N° 2062/92 DU CONSEIL

du 30 juin 1992

fixant, pour la récolte 1992, les prix d'objectif, les prix d'intervention et les primes accordées aux acheteurs de tabac en feuilles, les prix d'intervention dérivés du tabac emballé, les qualités de référence ainsi que les zones de production

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 727/70 du Conseil, du 21 avril 1970, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur du tabac brut (1), et notamment son article 2 paragraphe 5, son article 4 paragraphes 4 et 5 et son article 6 paragraphe 8,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que la Commission a proposé une réforme de l'organisation commune du marché du tabac qui s'appliquera à partir de la récolte 1993; qu'il y a donc lieu de maintenir, pour la récolte 1992, les dispositions applicables à la récolte précédente, sous réserve de modifications indispensables pour assurer la transition vers le nouveau régime; que, en vue de celui-ci, la fixation de la quantité maximale garantie par variétés ou groupes de variétés prévue à l'article 4 paragraphe 5 premier alinéa du règlement (CEE) n° 727/70 n'est pas requise pour la récolte 1993;

considérant que, lors de la fixation des prix dans le secteur du tabac brut, il y a lieu de tenir compte des objectifs de la politique agricole commune; que la politique agricole commune a notamment pour objectifs d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité de l'approvisionnement et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;

considérant que les prix d'objectif et les prix d'intervention du tabac en feuilles doivent être fixés selon les critères visés à l'article 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 727/70 en vue d'encourager l'orientation de la production, notamment dans le sens de la conversion des cultures vers les variétés les plus demandées, les plus compétitives ainsi que les moins nocives pour la santé;

considérant qu'il est indiqué de fixer, pour la récolte 1992 également, des prix d'intervention dérivés pour les variétés qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur de l'organisation commune des marchés ou, pour les variétés cultivées en Grèce, en Espagne et au Portugal, avant l'adhésion de ces pays, d'une garantie de prix au stade du tabac emballé, ainsi que pour les variétés principalement cultivées en Allemagne, afin de tenir compte des usages de commercialisation existant dans ce pays;

considérant que, lors de l'application des dispositions relatives au régime de prix, de primes et de contrôle quantitatif de production, il convient de prendre en considération les différences de qualité selon les caractéristiques du sol et du climat; que ces conditions se trouvent remplies pour les variétés Badischer Burley et Paraguay; que, par conséquent, il y a lieu de fixer des prix, primes et quantités maximales garanties pour des zones spécifiques de production pour ces variétés;

considérant que la prime accordée aux acheteurs du tabac communautaire est destinée à leur permettre de payer aux producteurs de tabac en feuilles un prix qui se situe au niveau du prix d'objectif en tenant compte de l'évolution des prix sur le marché mondial, ainsi que du niveau des prix résultant du jeu de l'offre et de la demande sur le marché communautaire;

considérant que la prime est identique pour tous les tabacs de la variété en cause, indépendamment de la qualité du tabac livré; qu'il en résulte cependant l'incitation de produire des tabacs de basse qualité; qu'il importe dès lors de réduire le montant de la prime pour les quantités de tabac de basse qualité achetées par un transformateur au-delà d'un pourcentage correspondant à la quantité normale de tabac de basse qualité par rapport à la totalité d'une récolte;

considérant que les prix susvisés ainsi que le montant de la prime doivent être fixés pour chaque variété produite dans des zones de production reconnues et pour une qualité de référence définie de manière à permettre une appréciation aussi objective que possible de la qualité du tabac;

considérant que, pour la récolte 1992, il convient d'indiquer les zones de production reconnues de chaque variété de tabac et de reprendre les définitions des qualités de référence qui ont été fixées par le règlement (CEE) n° 1738/91 (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la récolte 1992, les qualités de référence et les zones de production reconnues pour chacune des variétés de tabac en

(1) JO n° L 94 du 28. 4. 1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 860/92 (JO n° L 91 du 7. 4. 1992, p. 1).
(2) JO n° C 119 du 11. 5. 1992, p. 71.
(3) JO n° C 150 du 15. 6. 1992.
(4) JO n° C 169 du 6. 7. 1992.
(5) JO n° L 163 du 26. 6. 1991, p. 13.

feuilles de la production communautaire, visées à l'article 2 paragraphe 3 points b) et c) du règlement (CEE) n° 727/70, sont fixées respectivement aux annexes I et III du présent règlement.

Article 2

Pour la récolte 1992, les qualités de référence et les zones de production reconnues visées à l'article 6 paragraphe 3 points b) et c) du règlement (CEE) n° 727/70, pour chacune des variétés de tabac emballé de la production communautaire pour lesquelles est fixé un prix d'intervention dérivé, sont fixées respectivement aux annexes II et III du présent règlement.

Article 3

1. Pour la récolte 1992, les prix d'objectif et d'intervention et les montants de la prime accordée aux acheteurs de tabac en feuilles, visés aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 727/70, ainsi que les prix d'intervention dérivés du tabac emballé visés à l'article 6 dudit règlement, sont fixés à l'annexe IV du présent règlement.

2. Sans préjudice de l'article 7 *bis* du règlement (CEE) n° 727/70, les prix et primes ne s'appliquent que pour autant que chacune de ces variétés ait été cultivée dans les zones de production correspondantes indiquées à l'annexe III du présent règlement.

3. Lorsque la quantité de tabac de classes, catégories ou qualités inférieures achetée par un transformateur dépasse, par rapport à ses achats totaux de la variété en cause, le pourcentage indiqué à l'annexe IV, la prime est diminuée de 30 % pour la quantité dépassant le pourcentage en cause.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au *Journal officiel des Communautés européennes*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

ANNEXE I

Tabac en feuilles: variétés et leurs qualités de référence pour la récolte 1992

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (Leaves) de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, de couleur marron foncé à bigarré, de longueur uniforme Présentation: tabac trié, en manoques, en balles provisoires ou dans un autre emballage, avec ou sans un lien étranger Humidité: 26 %
2	Badischer Burley E et ses hybrides	Hauptgut (Leaves) de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, nourries, de couleur marron rougeâtre à marron clair, de longueur uniforme Présentation: tabac trié, en manoques, en balles provisoires ou dans un autre emballage, avec ou sans un lien étranger Humidité: 25 %
3	Virgin D et ses hybrides	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, de couleur jaune à rouge jaune; des écarts tels que des colorations brunâtres à jaune verdâtre sont admis jusqu'à concurrence du tiers de la surface de la feuille Présentation: tabac trié, en manoques, en balles provisoires ou dans un autre emballage, avec ou sans un lien étranger Humidité: 19 %
4	a) Paraguay et ses hybrides b) Dragon vert et ses hybrides, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Feuilles médianes (Leaves) de classe 2 Classe 2: feuilles saines présentant de légers défauts de coloration, de nature de tissu, de maturité, mais de combustibilité satisfaisante Présentation: tabac trié et manoqué ou capsé Humidité: 27 %
5	Nijkerk	Feuilles de tête (Tips) de classe 2 Classe 2: — soit feuilles de deuxième longueur (inférieure ou égale à 45 cm), au tissu très gommeux, nourri, intègre, résistant et élastique, à nervures noyées, de bonne maturité, se traduisant par une coloration marron à marron foncé, de tonalité chaude — soit feuilles de première longueur (supérieure à 45 cm), au tissu encore gommeux, nourri, encore intègre, résistant, à nervures plus ou moins accusées, de toutes colorations, à l'exclusion du vert poireau Présentation: tabac trié et manoqué ou capsé Humidité: 27 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
6	a) Misionero et ses hybrides b) Rio Grande et ses hybrides	Feuilles de deuxième qualité Deuxième qualité: feuilles développées, de plus de 45 cm, au tissu non grossier, de coloration claire un peu jaunâtre, de tonalité chaude ou assez chaude, ayant suffisamment de tenue et assez intègre, de combustibilité passable Présentation: tabac trié et manoqué ou capsé Humidité: 27 %
7	Bright	Feuilles de catégorie A Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, sans défaut de séchage, de texture ouverte, aux côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur jaune dans les différentes gradations Présentation: en balles provisoires de 30 à 40 kg Humidité: 16 %
8	Burley I	Feuilles de catégorie A Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, sans défaut de séchage, de texture ouverte, même consistante, avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur noisette plus ou moins chaude Présentation: en balles provisoires de 30 à 40 kg ou en manoques avec lien étranger *(fascicoli)* de 25 à 30 feuilles Humidité: 19 %
9	Maryland	Feuilles de catégorie A Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, présentant de légers défauts de séchage avec très peu de teintes bronzées, au tissu de texture moyenne avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de coloration marron rougeâtre, plutôt chaude Présentation: en balles provisoires de 30 à 40 kg ou en manoques avec lien étranger *(fascicoli)* de 25 à 30 feuilles Humidité: 19 %
10	a) Kentucky et ses hybrides b) Moro di Cori c) Salento	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles mûres à point, d'un tissu consistant, sans défaut de séchage et de conservation, de couleur marron, présentant quelques défauts d'intégrité, de bonne combustibilité Présentation: en manoques avec un lien étranger *(fascicoli)* de 25 à 30 feuilles Humidité: 23 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybrides de Badischer Geudertheimer	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles d'un tissu consistant ou léger, saines, sans défaut de séchage, de couleur marron à verdâtre, présentant des défauts d'intégrité; feuilles mûres, saines, de couleur marron foncé à bigarré (hybrides de Badischer Geudertheimer) Présentation: tabac trié, en manoques ou en balles provisoires, avec un lien étranger Humidité: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio et variétés similaires	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles de maturité suffisante, d'un tissu consistant ou même grossier ou maigre, présentant des défauts non accentués de séchage, de fermentation et d'intégrité Présentation: en manoques avec un lien étranger *(fascicoli)* de 25 à 30 feuilles Humidité: 24 %
13	Xanti-Yakà	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale elliptique, avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 20 cm Présentation: en balles provisoires de 15 à 20 kg ou en caisses de guirlandes de feuilles de 30 à 40 kg Humidité: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles (Perustitza) ou pétiolées (Samsun), de forme elliptique lancéolée à pointe effilée (Perustitza) ou elliptique arrondie (Samsun), avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle tendant vers l'aigu, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron (Perustitza) ou tendant au roussâtre (Samsun), avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 25 cm Présentation: en balles provisoires de 15 à 20 kg ou en caisses de guirlandes de feuilles de 30 à 40 kg Humidité: 17 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
15	Erzegovina et variétés similaires	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale ou elliptique, avec des côtes moyennement accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 35 cm Présentation: en balles provisoires de 15 à 20 kg ou en caisses de guirlandes de feuilles de 30 à 40 kg Humidité: 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles médianes inférieures, triées par longueur suivant les proportions suivantes: première longueur (égale ou supérieure à 38 cm) 60 % deuxième longueur (de 32 à moins de 38 cm) 35 % troisième longueur (de 25 à moins de 32 cm) 5 % Feuilles de dimension convenable, mûres à point et de couleur uniforme, saines, sans défaut d'intégrité, d'un tissu fin, élastique et résistant, avec des côtes et nervures noyées, fermentées à point et bien conservées, de bonne combustibilité, de goût et d'arôme typiques, utilisables pour capage de cigares, comprenant environ 25 % de feuilles non intègres Présentation: en manoques avec un lien étranger *(fascicoli)* Humidité: 22 %
17	Basmas	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 15 cm de longueur, de couleur jaune or, orangée à rouge jaune, d'une bonne élasticité et brillantes, assez nourries; de structure lâche et de bonne texture; d'arôme typique et prononcé, de bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 45 % de la qualité I/III Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair, vert-jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et de bonne texture, d'une élasticité moyenne, modérément brillantes, modérément nourries, d'arôme typique et prononcé, de très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation: en balles-planteurs de 15 à 25 kg, présentées selon le mode traditionnel en deux rangées de pastèles (à feuilles capsées). (Il convient de noter que dans les districts d'Astakos et de Chrysoupolis la présentation est faite en «armathodema») Humidité: 17 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
18	Katerini et variétés similaires	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair ou orangée à rougeâtre, de structure lâche, d'une bonne élasticité, brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 45 % de la qualité I/III Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune, orangée, vert-jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure lâche, modérément nourries, d'élasticité moyenne, brillantes, de bonne texture et d'une très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation: les guirlandes sont généralement rassemblées selon le mode de présentation «Baski» avant l'emballage. Présentation en balles de 25 à 35 kg selon le mode traditionnel appelé «Kaloup» Humidité: 16 %
19	a) Kaba Koulak classique b) Elassona	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 25 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et jusqu'à 20 cm de longueur pour Elassona, Karatzova et Kontoula, de couleur jaune moyen à foncé, d'une bonne élasticité, brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et 25 cm de longueur pour Elassona, Karatzova et Kontoula, de couleur jaune, vert-jaune, rougeâtre, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, d'une élasticité moyenne, modérément brillantes et d'une excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III Présentation: en balles-planteurs de 15 à 30 kg, présentées selon le mode traditionnel en deux rangées d'«armathodema» Humidité: 17 %
20	a) Kaba Koulak non classique b) Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi I	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et Trapezous, jusqu'à 20 cm pour Phi I et jusqu'à 15 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune clair à rougeâtre, d'une bonne élasticité, brillantes, de structure assez lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 35 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et Trapezous, jusqu'à 25 cm pour Phi I et jusqu'à 20 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune, vert-

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
20 *(suite)*	a) Kaba Koulak non classique b) Myrodata Smyrne, Trapezous et Phi I	jaune ou marron clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, de très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III Présentation: en balles-planteurs de 25 à 35 kg, présentées selon le mode traditionnel en «armathodema», ou de 35 à 50 kg sous la forme de «Kaloup» Humidité: 17 %
21	Myrodata Agrinion	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune à orange foncé, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur jaune, vert-jaune ou rougeâtre clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III Présentation: en balles-planteurs de 15 à 30 kg présentées selon le mode traditionnel en deux rangées d'«armathodema» Humidité: 15 %
22	Zichnomyrodata	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair à orange clair, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune, vert-jaune ou rougeâtre clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et assez brillantes, d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III Présentation: en balles-planteurs de 15 à 30 kg présentées selon le mode traditionnel en deux rangées d'«armathodema» Humidité: 17 %
23	Tsebelia	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier, ayant jusqu'à 35 cm de longueur, de couleur rouge-jaune orange à rougeâtre, de structure lâche, de bonne élasticité et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 45 % de la qualité I/III

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
23 *(suite)*	Tsebelia	Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaune clair, vert-jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche, assez élastiques et d'un brillant moyen, assez nourries, d'assez bonne texture et de très bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes et/ou présentant de légers défauts d'intégrité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation: en balles-planteurs de 30 à 40 kg, présentées en deux rangées d'«armathodema» Humidité: 14 %
24	Mavra	Feuilles de la qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 30 cm de longueur, d'une couleur allant du jaune rougeâtre à l'orange et au rougeâtre, de structure lâche, de bonne texture, de bonne élasticité et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 45 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaunâtre, vert-jaune (citron), rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes et/ou présentant de légers défauts d'intégrité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation: en balles-planteurs de 30 à 50 kg présentées en deux rangées d'«armathodema» Humidité: 14 %
25	Burley EL	Feuilles de la qualité A Qualité A: feuilles complètement mûres, complètement développées, intègres, saines, sans défaut de séchage, provenant de l'étage médian, de couleur uniforme marron noisette moyen à rouge noisette, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Présentation: en balles-planteurs de 50 à 70 kg présentées en deux rangées d'«armathodema», sans ficelle (feuilles en vrac) Humidité: 22 %
26	Virginia EL	Feuilles de la qualité A Qualité A: feuilles complètement mûres, complètement développées, saines, intègres, sans défaut de séchage, de couleur uniforme jaune citron à orange moyen, nourries, de bonne texture et de bonne combustibilité, provenant essentiellement de l'étage médian Présentation: en balles-planteurs de 30 à 40 kg, présentées en deux rangées d'«armathodema», sans ficelle (feuilles en vrac) Humidité: 19 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
27	Santa Fé	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, sans défaut de séchage, avec la côte complètement réduite, de couleur marron, présentant quelques défauts d'intégrité Présentation: tabac trié en balles provisoires homogènes Humidité: 18 %
28	Burley fermenté	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, sans défaut de séchage, avec la côte complètement réduite, de bonne combustibilité, de couleur noisette à cannelle, présentant quelques défauts d'intégrité Présentation: tabac trié en balles provisoires homogènes Humidité: 18 %
29	Havanna E	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, de tissu fin, avec la côte et les nervures peu accentuées, sans défaut de séchage, avec la côte complètement réduite de couleur marron, marron clair ou verdâtre, présentant quelques défauts d'intégrité Présentation: tabac trié en balles provisoires Humidité: 18 %
30	Round Scafati	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles de dimension suffisante, de bonne maturité, de couleur uniforme, saines, sans défaut d'intégrité, de tissu fin, élastiques et résistantes, avec côte et nervures fines, bien conservées, de bonne combustibilité, de goût et d'arôme typiques, utilisables pour les capes de cigares. On peut tolérer un pourcentage d'environ 25 % de feuilles non intègres Présentation: en balles provisoires homogènes contenant des manoques, avec un lien étranger Humidité: 18 %
31	Virginia E	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles de maturité suffisante, sans défaut de séchage, de texture ouverte, avec la côte et les nervures peu accentuées, saines, de couleur jaune citron ou orange Présentation: en balles provisoires homogènes de 33 à 45 kg de tabac non manoqué et séparé par étage foliaire Humidité: 16 %
32	Burley E	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles de maturité suffisante, sans défaut de séchage, de texture ouverte, avec la côte et les nervures peu accentuées, saines, de couleur cannelle, dans les différentes gradations Présentation: en balles provisoires homogènes de 33 à 45 kg de tabac non manoqué et séparé par étage foliaire Humidité: 18 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
33	Virginia P	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, de texture ouverte et élastique, huileuses, de couleur jaune citron à orange, brillant, d'une longueur supérieure à 40 cm, les premier et dernier étages foliaires non inclus Présentation: en balles provisoires de 45 kg avec les feuilles ordonnées Humidité: 17 %
34	Burley P	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, de texture ouverte et élastique, de couleur brillante, d'une longueur supérieure à 40 cm, les premier et dernier étages foliaires non inclus Présentation: en balles provisoires de 35 kg avec les feuilles ordonnées Humidité: 22 %

ANNEXE II

Tabac emballé: variétés et leurs qualités de référence pour la récolte 1992

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (Leaves) de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, de couleur légèrement bigarrée à marron foncé, de longueur uniforme, normalement fermentées Présentation: en balles, en caisses ou en cartons de 75 à 220 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ Humidité: 16 %
2	Badischer Burley E et ses hybrides	Hauptgut (Leaves) de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, nourries, de couleur marron clair, marron rougeâtre à marron foncé, de longueur uniforme, normalement fermentées Présentation: en balles ou en caisses ou en cartons de 75 à 220 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ Humidité: 15 %
3	Virgin D et ses hybrides	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, intactes, nourries, de couleur jaune, rouge-jaune à jaune brunâtre, normalement fermentées Présentation: en balles ou en caisses ou en cartons de 75 à 220 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ Humidité: 13 %
7	Bright	Feuilles de catégorie A Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, bien soignées, de texture ouverte, aux côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur jaune dans les différentes gradations Présentation: en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en cartons de 150 à 210 kg environ Humidité: 13 %
8	Burley I	Feuilles de catégorie A Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, bien soignées, de texture ouverte, même consistante, avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur noisette plus ou moins chaude Présentation: en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en cartons de 150 à 210 kg environ Humidité: 13 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
9	Maryland	Feuilles de catégorie A Catégorie A: feuilles de maturité suffisante, présentant de légers défauts de séchage, même avec très peu de teintes bronzées, au tissu de texture moyenne avec des côtes et nervures pas trop accentuées, saines, de couleur marron rougeâtre plus ou moins chaude Présentation: en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en cartons de 150 à 210 kg environ Humidité: 13 %
10	a) Kentucky et ses hybrides b) Moro di Cori c) Salento	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles mûres à point, d'un tissu consistant, sans défaut de séchage et de conservation, de couleur marron, présentant quelques défauts d'intégrité, de bonne combustibilité Présentation: en boucauts de 280 à 450 kg environ ou en balles de 170 à 200 kg environ ou en cartons de 150 à 200 kg Humidité: 16 %
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybrides de Badischer Geudertheimer	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles d'un tissu consistant ou léger, saines, sans défaut de séchage, de couleur marron à verdâtre, présentant des défauts d'intégrité; feuilles mûres, saines, de couleur légèrement bigarré à marron foncé, normalement fermentées (Hybrides de Badischer Geudertheimer) Présentation: en balles, en caisses ou en cartons de 75 à 200 kg environ ou en boucauts de 225 à 450 kg environ Humidité: 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio et variétés similaires	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles de maturité suffisante, d'un tissu consistant ou même grossier ou maigre, présentant des défauts de soin, de fermentation et d'intégrité pas trop accentués Présentation: en balles de 120 kg environ ou en boucauts de 330 kg environ Humidité: 16 %
13	Xanti-Yakà	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale elliptique, avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 20 cm Présentation: petites balles de 18 à 50 kg environ Humidité: 13 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
14	a) Perustitza b) Samsun	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles (Perustitza), ou pétiolées (Samsun), de forme elliptique lancéolée à pointe effilée (Perustitza) ou elliptique arrondie (Samsun), avec des côtes peu accentuées et des nervures secondaires à angle tendant vers l'aigu, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 25 cm Présentation: petites balles de 18 à 50 kg environ Humidité: 13 %
15	Erzegovina et variétés similaires	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles suffisamment saines et mûres, sessiles, de forme ovale ou elliptique, avec des côtes moyennement accentuées et des nervures secondaires à angle plutôt ouvert, pouvant présenter quelques défauts de séchage, d'un tissu le plus souvent léger, de couleur allant du jaune au marron, avec des défauts marqués d'intégrité, mais bien conservées, provenant de tous les étages foliaires, de goût discret, d'arôme suffisant et de bonne combustibilité La longueur des feuilles médianes ne dépasse pas 35 cm Présentation: petites balles de 18 à 50 kg environ Humidité: 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Feuilles de catégorie B Catégorie B: feuilles médianes inférieures triées par longueur selon les proportions suivantes: première longueur (égale ou supérieure à 38 cm) 60 % deuxième longueur (de 32 à moins de 38 cm) 35 % troisième longueur (de 25 à moins de 32 cm) 5 % Feuilles de dimension convenable, mûres à point et de couleur uniforme, saines, sans défauts d'intégrité, d'un tissu fin, élastique et résistant, avec des côtes et nervures noyées, fermentées à point et bien conservées, de bonne combustibilité, de goût et d'arôme typiques, utilisables pour capage de cigares, comprenant environ 25 % de feuilles non intègres Présentation: en balles de 70 à 90 kg environ ou en cartons de 180 à 210 kg environ Humidité: 16 %
17	Basmas	Feuilles de qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien séchées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 15 cm de longueur, de couleur jaune or, orangée à rouge-jaune, d'une bonne élasticité et brillantes, assez nourries, de structure lâche et de bonne texture, d'arôme typique et prononcé, de bonne combustibilité

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
17 *(suite)*	Basmas	Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 45 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant quelques légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair, rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et de bonne texture, d'une élasticité et d'un brillant moyens, modérément nourries, d'arôme typique et prononcé, de très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus (III) constituent 55 % de la qualité I/III Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg Humidité: 13 %
18	Katerini et variétés similaires	Feuilles de qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien séchées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair ou orangée à rougeâtre, de structure lâche, d'une bonne élasticité et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 45 % de la qualité I/III Feuilles mûres présentant quelques légers défauts d'intégrité et de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune, orangée, vert-jaune, rougeâtre ou marron clair, de structure lâche, d'une élasticité moyenne et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg chacune Humidité: 13 %
19	a) Kaba Koulak classique b) Elassona	Feuilles de qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 25 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et jusqu'à 20 cm de longueur pour Elassona, Karatzova et Kontoula, de couleur jaune moyen à foncé, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III Feuilles mûres, présentant quelques légers défauts d'intégrité et/ou de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Macedonia Kaba Koulak et 25 cm de longueur pour Elassona, Karatzova et Kontoula, de couleur jaune à rougeâtre, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, d'une élasticité moyenne, brillantes, d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 53 % de la qualité I/III Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg chacune Humidité: 13 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
20	a) Kaba Koulak non classique b) Myrodata Smyrne Trapezous et Phi I	Feuilles de qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien séchées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception des feuilles de tête, ayant jusqu'à 30 cm de longueur pour Kaba Koulak Macedonia et Trapezous, jusqu'à 20 cm pour Phi I et jusqu'à 15 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune clair à rougeâtre, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure assez lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 47 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 35 cm de longueur pour Kaba Koulak Macedonia et Trapezous, jusqu'à 25 cm pour Phi I et jusqu'à 20 cm pour Myrodata Smyrne, de couleur jaune à marron clair, de structure assez lâche, d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, de très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus (III) constituent 53 % de la qualité I/III Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg chacune Humidité: 13 %
21	Myrodata Agrinion	Feuilles de qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune à orange foncé, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 47 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur jaune à rougeâtre clair, de structure assez lâche et de texture assez bonne, assez élastiques et brillantes, d'une excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus (III) constituent 53 % de la qualité I/III Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg Humidité: 14 %
22	Zichnomyrodata	Feuilles de qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires, excepté les feuilles de tête, ayant jusqu'à 20 cm de longueur, de couleur jaune clair à orange clair, d'une bonne élasticité et brillantes, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 47 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, quelques traces de maladie, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 25 cm de longueur, de couleur jaune à rougeâtre clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et assez brillantes, d'excellente combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus (III) constituent 53 % de la qualité I/III Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg Humidité: 13 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
23	Tsebelia	Feuilles de qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, bien soignées, provenant de tous les étages foliaires à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur rouge-jaune, orange à rougeâtre, de structure lâche, élastiques et brillantes, assez nourries, de bonne texture et de très bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus (I/II) constituent 45 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaune clair à rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche, assez élastiques et assez brillantes, assez nourries, d'assez bonne texture et de très bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes par des maladies et/ou présentant de légers défauts d'intégrité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg Humidité: 13 %
24	Mavra	Feuilles de qualité I/III Qualité I/III: feuilles mûres, intègres, saines, séchées avec soin, provenant de tous les étages foliaires, à l'exception du premier (protomana), ayant jusqu'à 30 cm de longueur, de couleur allant du rouge-jaune ou orange au rougeâtre, de structure lâche, de bonne texture, élastiques et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 45 % de la qualité I/III Feuilles mûres et suffisamment intègres, présentant de légers défauts de séchage, provenant de tous les étages foliaires, ayant jusqu'à 40 cm de longueur, de couleur jaunâtre à rougeâtre ou marron clair, de structure assez lâche et d'assez bonne texture, assez élastiques et brillantes, assez nourries et de bonne combustibilité. Cette catégorie inclut également les feuilles légèrement atteintes par les maladies et/ou présentant de légers défauts d'intégrité Les feuilles décrites ci-dessus constituent 55 % de la qualité I/III Présentation: en balles dites «Tongas» d'environ 30 kg Humidité: 13 %
25	Burley EL	Feuilles de qualité A Qualité A: feuilles complètement mûres, complètement développées, intègres, saines, bien séchées, provenant de l'étage médian, de couleur uniforme allant d'un marron noisette moyen à un rouge noisette moyen, de structure lâche, de bonne texture et d'excellente combustibilité Présentation: en balles d'environ 100 kg ou en caisses d'environ 200 kg ou en tonneaux d'environ 240 à 280 kg Humidité: 13 %
26	Virginia EL	Feuilles de qualité A Qualité A: feuilles complètement mûres, complètement développées, provenant de l'étage médian, saines, intègres, bien soignées, d'un jaune uniforme allant du jaune citron à l'orange moyen, de bonne texture et de bonne combustibilité Présentation: en balles d'environ 100 kg Humidité: 13 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
27	Santa Fé	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, bien fermentées, de couleur marron ou marron foncé, présentant quelques défauts d'intégrité Présentation: en balles de 80 à 100 kg ou en cartons de 150 à 210 kg Humidité: 14 %
28	Burley fermenté	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, bien fermentées, de couleur marron, présentant quelques défauts d'intégrité Présentation: en balles de 80 à 100 kg ou en cartons de 150 à 210 kg Humidité: 14 %
29	Havanna E	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, saines, de tissu fin, avec la côte et les nervures peu accentuées, bien fermentées, de couleur marron, marron clair ou à tons verdâtres, présentant quelques défauts d'intégrité Présentation: en balles de 80 à 100 kg ou en cartons de 150 à 210 kg Humidité: 14 %
30	Round Scafati	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles de dimension suffisante, de bonne maturité, de couleur uniforme, saines, sans défauts importants d'intégrité, de tissu fin, élastiques et résistantes, avec côte et nervures fines, bien conservées, de bonne combustibilité, de goût et d'arôme typiques, bien fermentées, utilisables pour les capes de cigares. On peut tolérer un pourcentage d'environ 25 % de feuilles non intègres Présentation: en balles de 70 à 100 kg ou en cartons de 180 à 210 kg Humidité: 14 %
31	Virginia E	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles de maturité suffisante, de texture ouverte, avec la côte et les nervures peu accentuées, saines, de couleur jaune avec différentes gradations de citron à orange Présentation: en cartons de 170 à 210 kg Humidité: 14 %
32	Burley E	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles de maturité suffisante, de texture ouverte, avec la côte et les nervures peu accentuées, saines, dans les différentes gradations, de couleur cannelle Présentation: en cartons de 150 à 210 kg Humidité: 14 %

Numéro d'ordre	Variété	Qualité de référence
33	Virginia P	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, bien soignées, de texture ouverte et élastique, huileuses, de couleur jaune citron à orange, brillantes, d'une longueur supérieure à 40 cm, les premier et dernier étages foliaires non inclus Présentation: en cartons de tabac non manoqué de 200 kg Humidité: 12,5 %
34	Burley P	Feuilles de classe 1 Classe 1: feuilles mûres, bien soignées, de texture ouverte et élastique, de couleur brillante, d'une longueur supérieure à 40 cm, les premier et dernier étages foliaires non inclus Présentation: en cartons de tabac non manoqué de 180 kg Humidité: 13 %

ANNEXE III

Zones de production reconnues pour chacune des variétés de tabac de la production communautaire

Variétés	Pays	Zones de production
1. Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Allemagne	Plaine rhénane et vallées adjacentes, Franconie centrale, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale
	France	Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, Val-de-Loire, Poitou-Bretagne et Centre
2. Badischer Burley E et ses hybrides	Allemagne	A(*) Plaine rhénane et vallées adjacentes, Franconie centrale, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe
	France	A(*) Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Bourgogne, Charente et Languedoc-Roussillon
	Italie	B(*) Piémont, Lombardie, Vénétie, Émilie-Romagne
3. Virgin D et ses hybrides	Allemagne	Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Franconie, plaine rhénane et vallées adjacentes, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie occidentale, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe
	France	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Champagne-Ardenne, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Charente, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-France
4. a) Paraguay et ses hybrides	France	A(*) Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Bretagne, Charente, Val-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Normandie et Bourgogne
	Italie	B(*) Molise et Campanie
	Belgique	C(*) Flandres
b) Dragon vert et ses hybrides, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	France	A(*) Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Val-de-Loire et Alsace-Lorraine
	Belgique	C(*) Flandres, Hainaut, Namur, Luxembourg
5. Nijkerk	France	Départements du Lot et de l'Aveyron
6. Misionero	France	Île de la Réunion
7. Bright	Italie	Frioul, Vénétie, Lombardie, Piémont, Toscane, Marches, Ombrie, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles et Calabre
8. Burley I	Italie	Vénétie, Lombardie, Piémont, Ombrie, Émilie-Romagne, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Pouilles et Sicile
9. Maryland	Italie	Frioul, Lombardie, Toscane, Marches, Ombrie, Latium, Molise et Campanie
10. Kentucky	Italie	Vénétie, Toscane, Ombrie, Latium, Campanie
	Espagne	Estrémadure, Andalousie
11. a) Forcheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Italie	Frioul, Trente, Vénétie, Toscane, Latium, Molise et Campanie
e) Hybrides de Badischer Geudertheimer	Italie	Vénétie, Toscane, Molise, Campanie, Latium et Pouilles
12. Beneventano, Brasile Selvaggio	Italie	Campanie et Sicile
13. Xanti-Yakà	Italie	Abruzzes, Campanie, Basilicate et Pouilles

Variétés	Pays	Zones de production
14. a) Perustitza b) Samsun	Italie	Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Pouilles et Sicile
15. Erzegovina	Italie	Latium, Abruzzes et Pouilles
16. Round Tip	Grèce Italie	Macédoine centrale Campanie
17. Basmas	Grèce	Thrace, Macédoine, Sterea Hellas et Thessalie
18. a) Katerini b) Variétés similaires	Grèce	Macédoine Macédoine, Sterea Hellas, Épire et Thessalie
19. a) Kaba Koulak classique b) Elassona	Grèce Grèce	Macédoine Thessalie
20. Kaba Koulak non classique	Grèce	Macédoine, Thessalie, Sterea Hellas, Thrace, Épire, Péloponèse et les îles
21. Myrodata Agrinion	Grèce	Sterea Hellas
22. Zichnomyrodata	Grèce	Thessalie
23. Tsebelia	Grèce	Épire et Sterea Hellas
24. Mavra	Grèce	Thessalie, Péloponèse et Sterea Hellas
25. Burley EL	Grèce	Macédoine, Thessalie
26. Virginia EL	Grèce	Sterea Hellas, Thessalie, Macédoine, Thrace, Péloponèse, Épire
27. Santa Fé	Espagne	Andalousie
28. Burley fermenté	Espagne	Estrémadure, Andalousie, Castille-Léon, Castille-Manche, communauté valencienne, Navarre, Rioja, Catalogne, Madrid
29. Havanna E	Espagne	Castille-Léon, Navarre, Galice, Asturies, Cantabrie, zone de Campezo au Pays basque
30. Round Scafati	Espagne	Galice, Asturies, Navarre, Castille-Léon, Cantabrie
31. Virginia E	Espagne	Estrémadure, Andalousie, Castille-Léon, Castille-Manche
32. Burley E	Espagne	Estrémadure, Andalousie, Castille-Léon, Castille-Manche
33. Virginia P	Portugal	Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo, région autonome des Açores
34. Burley P	Portugal	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, région autonome des Açores

(*) Zone spécifique de production telle que définie à l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 727/70.

ANNEXE IV

Prix d'objectif, prix d'intervention et primes pour les tabacs en feuilles de la récolte 1992
Prix d'intervention dérivés pour les tabacs emballés de la récolte 1992

(en écus/kg)

Numéro d'ordre	Variétés	Prix d'objectif	Prix d'intervention	Montant de la prime	Prix d'intervention dérivés	Pourcentage maximal (article 3 paragraphe 3)
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	3,637	3,091	2,530	4,636	30 (2)
2	Badischer Burley E et ses hybrides	4,504	3,829	2,956	5,417	45 (3)
3	Virgin D et ses hybrides	4,618	3,925	2,922	5,171	30 (3)
4	a) Paraguay et ses hybrides (zones spécifiques A et C) b) Dragon vert et ses hybrides, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,394	2,885	2,348	—	20 (4)
	c) Paraguay et ses hybrides (zone spécifique B)	2,953	2,510	2,043	—	30 (4)
5	Nijkerk	3,351	2,849	2,128	—	20 (4)
6	a) Misionero et ses hybrides b) Rio Grande et ses hybrides	3,123	2,654	2,155	—	30 (5)
7	Bright	4,063	3,454	2,457	4,756	30 (6)
8	Burley I	2,474	2,102	1,748	3,202	30 (6)
9	Maryland	3,307	2,811	1,872	4,007	30 (6)
10	a) Kentucky et ses hybrides b) Moro di Cori c) Salento	2,791	2,373	1,902	3,341	30 (6)
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybrides de Badischer Geudertheimer	2,351	1,763 (1)	1,658	2,957 (1)	30 (6)
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio et variétés similaires	1,270	1,079	0,935	1,825	30 (6)
13	Xanti-Yakà	3,056	2,598	2,251	4,324	45 (6)
14	a) Perustitza b) Samsun	2,893	2,459	2,142 2,085	3,737 3,761	45 (6)
15	Erzegovina et variétés similaires	2,599	2,209	1,930	3,371	45 (6)
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	13,816	11,744	8,345	18,731	30 (6)
17	Basmas	6,080	5,168	3,067	6,902	20 (7)
18	Katerini et variétés similaires	5,064	4,305	2,729	6,185	20 (7)
19	a) Kaba Koulak classique b) Elassona	3,774	3,208	1,950	4,687	20 (7)
20	a) Kaba Koulak non classique b) Myrodata Smyrna, Trapezous et Phi I	2,843	2,417	1,335	3,799	20 (7)
21	Myrodata Agrinion	3,752	3,189	1,970	4,608	20 (7)
22	Zichnomyrodata	3,898	3,313	2,078	4,805	20 (7)
23	Tsebelia	2,359	1,769 (1)	1,914	3,072 (1)	20 (7)

Numéro d'ordre	Variétés	Prix d'objectif	Prix d'intervention	Montant de la prime	Prix d'intervention dérivés	Pourcentage maximal (article 3 paragraphe 3)
24	Mavra	2,303	1,727 (1)	1,565	3,025 (1)	20 (7)
25	Burley EL	2,247	1,910	1,496	3,031	20 (6)
26	Virginia EL	3,572	3,036	2,951	4,240	30 (6)
27	Santa Fé	1,381	1,174	0,300	2,031	30 (4)
28	Burley fermenté	2,236	1,901	0,929	2,918	30 (4)
29	Havanna E	2,873	2,442	1,949	3,627	30 (4)
30	Round Scafati	7,529	6,400	5,134	11,408	30 (8)
31	Virginia E	4,252	3,614	2,209	5,031	30 (4)
32	Burley E	2,960	2,516	1,717	3,782	30 (4)
33	Virginia P	4,256	3,617	2,350	4,944	30 (4)
34	Burley P	3,067	2,607	1,717	3,890	30 (4)

(1) Compte tenu de l'application de l'article 13 du règlement (CEE) n° 727/70.
(2) Classe III, Obergut.
(3) Classe III.
(4) Classe 3.
(5) Troisième et quatrième qualités.
(6) Catégorie C.
(7) Grade IV.
(8) Classes 3 et 4.