VERORDENING (EEG) Nr. 2062/92 VAN DE RAAD

van 30 juni 1992

tot vaststelling van de voor de oogst van 1992 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren, afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak, referentiekwaliteiten en produktiegebieden

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (1), inzonderheid op artikel 2, lid 5, artikel 4, leden 4 en 5, en artikel 6, lid 8,

Gezien het het voorstel van de Commissie (2),

Gezien het advies van het Europese Parlement (3),

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (4),

Overwegende dat de Commissie een hervorming van de gemeenschappelijke marktordening voor tabak met ingang van de oogst 1993 voorgesteld heeft; dat voor de oogst 1992 derhalve dezelfde voorschriften als voor de vorige oogst moeten gelden, behoudens een aantal wijzigingen die voor de overgang naar de nieuwe regeling volstrekt noodzakelijk zijn; dat met het oog daarop, in afwijking van artikel 4, lid 5, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 727/70, voor de oogst 1993 de gegarandeerde maximumhoeveelheid voor iedere in de Gemeenschap geteelde tabakssoort of groep tabakssoorten niet behoeft te worden vastgesteld;

Overwegende dat bij de vaststelling van de prijzen in de sector ruwe tabak rekening moet worden gehouden met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid; dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid met name ten doel heeft de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, de voorziening veilig te stellen en redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te waarborgen;

Overwegende dat de streefprijzen en de interventieprijzen voor tabaksbladeren moeten worden vastgesteld volgens de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde criteria, ten einde de produktie een bepaalde oriëntatie te geven en met name de omschakeling te bevorderen op soorten die het meest worden gevraagd, het best kunnen concurreren en het minst schadelijk voor de gezondheid zijn;

Overwegende dat het dienstig is ook voor de oogst 1992 afgeleide interventieprijzen vast te stellen voor de soorten waarvoor vóór de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke marktordening, of wat de in Griekenland, Spanje en Portugal geteelde soorten betreft, vóór de toetreding van deze landen, een prijsgarantie voor verpakte tabak bestond, alsmede voor de voornamelijk in Duitsland geteelde soorten, ten einde rekening te houden met de handelsgebruiken in dat land;

Overwegende dat bij de toepassing van de voorschriften inzake prijzen, premies en regulering van de geproduceerde hoeveelheden rekening dient te worden gehouden met de kwaliteitsverschillen die het gevolg zijn van uiteenlopende bodem- en klimaateigenschappen; dat dit met name het geval is voor de soorten Badischer Burley en Paraguay; dat derhalve voor deze soorten prijzen, premies en gegarandeerde maximumhoeveelheden voor specifieke produktiegebieden dienen te worden vastgesteld;

Overwegende dat de premie die wordt toegekend aan de kopers van in de Gemeenschap geproduceerde tabak, ten doel heeft de kopers in staat te stellen de producenten van tabaksbladeren een prijs te betalen die op het niveau ligt van de streefprijs, met inachtneming van de prijsontwikkeling op de wereldmarkt en van het uit vraag en aanbod op de markt van de Gemeenschap voortvloeiende prijspeil;

Overwegende dat de premie gelijk is voor alle tabak van de betrokken soort, ongeacht de kwaliteit van de geleverde tabak; dat daardoor echter wordt aangezet tot produktie van tabak van matige kwaliteit; dat derhalve het premiebedrag moet worden verminderd voor de hoeveelheid tabak van mindere kwaliteit die door een bewerker wordt aangekocht boven een bepaald percentage dat overeenkomt met het normale aandeel van tabak van mindere kwaliteit in de totale oogst;

Overwegende dat bovengenoemde prijzen en het premiebedrag moeten worden vastgesteld voor elke soort die wordt geproduceerd in erkende produktiegebieden, en wel voor een referentiekwaliteit die op zodanige wijze wordt bepaald dat de tabakskwaliteit zo objectief mogelijk kan worden beoordeeld;

Overwegende dat voor de oogst 1992 de erkende produktiegebieden van elke tabakssoort moeten worden aangegeven en de definities van de referentiekwaliteiten behoren te worden aangehouden die zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 1738/91 (5),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de oogst 1992 worden de in artikel 2, lid 3, onder b) en c), van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde referentie-

(1) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 860/92 (PB nr. L 91 van 7. 4. 1992, blz. 1).
(2) PB nr. C 119 van 11. 5. 1992, blz. 71.
(3) PB nr. C 150 van 15. 6. 1992.
(4) PB nr. C 169 van 6. 7. 1992.
(5) PB nr. L 163 van 26. 6. 1991, blz. 13.

kwaliteiten en erkende produktiegebieden voor elk van de in de Gemeenschap geproduceerde soorten tabaksbladeren vastgesteld in respectievelijk bijlage I en bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Voor de oogst 1992 worden de in artikel 6, lid 3, onder b) en c), van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde referentiekwaliteiten en erkende produktiegebieden voor elke soort verpakte tabak van de produktie van de Gemeenschap waarvoor een afgeleide interventieprijs wordt vastgesteld, vastgesteld in respectievelijk bijlage II en bijlage III bij deze verordening.

Artikel 3

1. Voor de oogst 1992 worden de in de artikelen 2 en 3 van Verordening (EEG) nr. 727/70 bedoelde streefprijzen, interventieprijzen en premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren alsmede de in artikel 6 van die verordening bedoelde afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak vastgesteld in bijlage IV bij deze verordening.

2. Onverminderd artikel 7 bis van Verordening (EEG) nr. 727/70 zijn de prijzen en premies slechts van toepassing voor zover de betrokken soorten zijn geteeld in de desbetreffende produktiegebieden zoals vermeld in bijlage III bij deze verordening.

3. Wanneer het aandeel van de door een bewerker aangekochte hoeveelheid tabak van een lagere klasse, categorie of kwaliteit in de totaal aangekochte hoeveelheid van de betrokken soort groter is dan het in bijlage IV aangegeven percentage, wordt de premie met 30 % verlaagd voor de boven het betreffende percentage aangekochte hoeveelheid.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992.

Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUES CUNHA

BIJLAGE I

Tabaksbladeren: soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1992

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (Leaves) van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerbruine tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte Presentatie: gesorteerde tabak in bundels, in voorlopige balen of anders verpakt, met tabak of met een ander middel bijeengebonden Vochtigheid: 26 %
2	Badischer Burley E en de hybriden daarvan	Hauptgut (Leaves) van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde en stevige, goed snijdbare bladeren van roodbruine tot lichtbruine kleur, gelijke bladgrootte Presentatie: gesorteerde tabak in bundels, in voorlopige balen of anders verpakt, met tabak of met een ander middel bijeengebonden Vochtigheid: 25 %
3	Virgin D en de hybriden daarvan	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele tot geelrode kleur; afwijkingen zoals bruinachtig of groenachtig gele verkleuring zijn tot een derde van de bladoppervlakte toegestaan Presentatie: gesorteerde tabak in bundels, in voorlopige balen of anders verpakt, met tabak of met een ander middel bijeengebonden Vochtigheid: 19 %
4	a) Paraguay en de hybriden daarvan b) Dragon vert en de hybriden daarvan, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Middenblad (Leaves) van klasse 2 Klasse 2: gezonde bladeren met lichte gebreken wat betreft kleur, aard van het weefsel of rijpheid, maar van bevredigende brandbaarheid Presentatie: gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren Vochtigheid: 27 %
5	Nijkerk	Topblad (Tips) van klasse 2 Klasse 2: — hetzij bladeren van de 2e lengte (kleiner dan of gelijk aan 45 cm), sterk gomhoudend, vol, gaaf, sterk en elastisch, met verzonken nerven, van goede rijpheid welke zich weerspiegelt in een kastanjebruine kleur, warm van tint — hetzij bladeren van de 1e lengte (groter dan 45 cm), nog gomhoudend, vol, nog gaaf, sterk, met min of meer gepronon-ceerde nerven, van elke kleur behalve flesgroen Presentatie: gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren Vochtigheid: 27 %

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
6	a) Misionero en de hybriden daarvan b) Rio Grande en de hybriden daarvan	Bladeren van 2e kwaliteit 2e kwaliteit: ontwikkelde bladeren van meer dan 45 cm, met niet-grof weefsel, met een lichte, iets geelachtige kleur, van warme of vrij warme toon, voldoende stevig en vrij gaaf, redelijk brandbaar Presentatie: gesorteerde en samengebundelde of gerangschikte bladeren Vochtigheid: 27 %
7	Bright	Bladeren van categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen Presentatie: in voorlopige balen van 30 tot 40 kg Vochtigheid: 16 %
8	Burley I	Bladeren van categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur Presentatie: in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid: 19 %
9	Maryland	Bladeren van categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken en zeer weinig bronskleurige tinten, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een eerder warme roodbruine kleur Presentatie: in voorlopige balen van 30 tot 40 kg of met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid: 19 %
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	Bladeren van categorie B Categorie B: goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, zonder drogings- en bewaringsgebreken, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid, goed brandbaar Presentatie: met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid: 23 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybriden van Badischer Geudertheimer	Bladeren van categorie B Categorie B: gezonde bladeren met stevig of licht weefsel, zonder drogingsgebreken, kastanjebruin tot groenachtig van kleur, met gaafheidsgebreken; rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerkleurige tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte (hybriden van Badischer Geudertheimer) Presentatie: gesorteerde tabak in bundels of voorlopige balen, met een ander middel dan tabak bijeengebonden Vochtigheid: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	Bladeren van categorie B Categorie B: voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft droging, gedeeltelijke fermentatie en gaafheid Presentatie: met een ander middel dan tabak bijeengebonden in bundels van 25 tot 30 bladeren (fascicoli) Vochtigheid: 24 %
13	Xanti-Yakà	Bladeren van categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, weinig geprononceerde hoofdnerf, waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm Presentatie: in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen Vochtigheid: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Bladeren van categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld (Perustitza) of gesteeld (Samsun), ellips-lancetvormig met spitse punt (Perustitza) of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende (Perustitza) of naar het roodachtige zwemende (Samsun) kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm Presentatie: in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen Vochtigheid: 17 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	Bladeren van categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm Presentatie: in voorlopige balen van 15 tot 20 kg, of in kisten van 30 tot 40 kg waarin de bladeren in slingervorm zijn opgehangen Vochtigheid: 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Bladeren van categorie B Categorie B: laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen: 1e lengte (gelijk aan of groter dan 38 cm) 60 % 2e lengte (van 32 tot minder dan 38 cm) 35 % 3e lengte (van 25 tot minder dan 32 cm) 5 % goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet-gave bladeren Presentatie: met een ander middel dan tabak samengebundeld (fascicoli) Vochtigheid: 22 %
17	Basmas	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 15 cm lang, goudgele of oranjegele tot roodgele kleur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, open textuur en fijne weefselstructuur, typisch en sterk aroma, goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 20 cm lang, lichtgele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur, open textuur en goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, gemiddelde substantie, typisch en sterk aroma, zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in planterbalen van 15 tot 25 kg die bestaan uit op de traditionele wijze in twee rijen gelegde „pastali" (in gestrekt losblad) (Opgemerkt dient te worden dat in de streek van Astakos en Chrysoupolis de tabak op „armathodema"-wijze wordt verpakt) Vochtigheid: 17 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
18	Katerini en vergelijkbare soorten	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 20 cm lang, lichtgele of oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe bladeren met enkele gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele, oranjegele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur, open textuur, gemiddelde substantie, middelmatige soepelheid en glans, goede weefselstructuur en zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: de guirlandes worden gewoonlijk op de „Baski"-wijze opgestapeld voordat ze worden verpakt. Op de traditionele „Kaloupi"-wijze verpakt in balen van 25 tot 35 kg Vochtigheid: 16 %
19	a) Kaba Koulak (klassieke) b) Elassona	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 20 cm voor Elassona, Karatzova en Kontoula, middelmatig gele tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, gele, geelgroene, roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in planterbalen van 15 tot 30 kg bestaande uit op de traditionele „armathodema"-wijze in twee rijen gelegde bladeren Vochtigheid: 17 %
20	a) Kaba Koulak (andere dan klassieke) b) Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi 1	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere pluk uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Phi 1, en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, voldoende open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne,

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
20 *(vervolg)*	a) Kaba Koulak (andere dan klassieke) b) Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi 1	gele, geelgroene tot lichtbruine kleur, voldoende open textuur, vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in planterbalen van 25 tot 35 kg die op de traditionele „armathodema"-wijze zijn gemaakt of van 35 tot 50 kg in de vorm van „kaloupi" Vochtigheid: 17 %
21	Myrodata Agrinion	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 25 cm lang, gele tot donkeroranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang, gele, geelgroene of lichtroodachtige kleur, voldoende open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in planterbalen van 15 tot 30 kg, waarvan de bladeren op de traditionele „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd Vochtigheid: 15 %
22	Zichnomyrodata	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 20 cm lang, lichtgele tot lichtoranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele, geelgroene of lichtroodachtige kleur, voldoende open textuur en vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in planterbalen van 15 tot 30 kg, waarvan de bladeren op de traditionele „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd Vochtigheid: 17 %
23	Tsebelia	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste, tot 35 cm lang, geelrode, oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
23 *(vervolg)*	Tsebelia	rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, lichtgele, groengele, roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur, voldoende soepelheid en glans, gemiddelde substantie, vrij goede weefselstructuur en zeer goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren die lichte gebreken vertonen ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in planterbalen van 30 tot 40 kg, waarvan de bladeren op de „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd Vochtigheid: 14 %
24	Mavra	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde bladeren zonder drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 30 cm lang, van geelroodachtig tot oranjegeel en roodachtig variërende kleur, open textuur, goede weefselstructuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie en goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, geelachtige, geelgroene (citroengele), roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, gemiddelde substantie en goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in planterbalen van 30 tot 50 kg, waarvan de bladeren op de „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd Vochtigheid: 14 %
25	Burley EL	Bladeren van kwaliteit A Kwaliteit A: volledig rijpe bladeren, volledig ontwikkeld, gaaf, gezond, zonder drogingsgebreken, afkomstig van het middenblad, uniforme kleur variërend van middelmatig hazelnootbruin tot hazelnootbruinrood, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Presentatie: in planterbalen van 50 tot 70 kg, waarvan de bladeren op de „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd, zonder koord (losblad) Vochtigheid: 22 %
26	Virginia EL	Bladeren van kwaliteit A Kwaliteit A: volledig rijpe bladeren, volledig ontwikkeld, gezond, gaaf, zonder drogingsgebreken, uniforme kleur variërend van citroengeel tot middelmatig oranjegeel, goede substantie, goede weefselstructuur en goede brand, hoofdzakelijk afkomstig van het middenblad Presentatie: in planterbalen van 30 tot 40 kg, waarvan de bladeren op „armathodema"-wijze in twee rijen zijn gelegd, zonder koord (losblad) Vochtigheid: 19 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
27	Santa Fé	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, geheel ingedroogde hoofdnerf, kastanjebruin van kleur, enkele gaafheidsgebreken Presentatie: gesorteerde tabak in homogene voorlopige balen Vochtgehalte: 18 %
28	Gefermenteerde Burley	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, zonder drogingsgebreken, geheel ingedroogde hoofdnerf, goede brand, van een hazelnoot- tot kaneelbruine kleur, enkele gaafheidsgebreken Presentatie: gesorteerde tabak in homogene voorlopige balen Vochtgehalte: 18 %
29	Havanna E	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, fijne weefselstructuur, weinig gepronconceerde nervatuur, zonder drogingsgebreken, geheel ingedroogde hoofdnerf, van een kastanjebruine, lichtbruine of groenachtige kleur, enkele gaafheidsgebreken Presentatie: gesorteerde tabak in uniforme voorlopige balen Vochtgehalte: 18 %
30	Round Scafati	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: bladeren van voldoende grootte, goed rijp, van een uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsgebreken, fijne weefselstructuur, soepel en sterk, fijne nervatuur, goed bewaard, goede brand, typische smaak en typisch aroma, bruikbaar als dekblad voor sigaren. Ongeveer 25 % niet-gave bladeren kunnen worden toegestaan Presentatie: met een ander middel dan tabak bijeengehouden bundels in homogene voorlopige balen Vochtgehalte: 18 %
31	Virginia E	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: bladeren van voldoende rijpheid, zonder drogingsgebreken, open textuur, weinig geprononceerde nervatuur, gezond, van een citroengele of oranje kleur Presentatie: ongebundelde tabak van een zelfde plukronde in homogene voorlopige balen van 33 tot 45 kg Vochtgehalte: 16 %
32	Burley E	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: bladeren van voldoende rijpheid, zonder drogingsgebreken, open textuur, weinig geprononceerde nervatuur, gezond, van een kaneelbruine kleur in de verschillende schakeringen Presentatie: ongebundelde tabak van een zelfde plukronde in homogene voorlopige balen van 33 tot 45 kg Vochtgehalte: 18 %

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
33	Virginia P	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe bladeren, open textuur, soepel, oliehoudend, van een citroengele tot oranje kleur, glanzend, langer dan 40 cm, exclusief de eerste en de laatste plukronde Presentatie: gerangschikte bladeren in voorlopige balen van 45 kg Vochtgehalte: 17 %
34	Burley P	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe bladeren, open textuur, soepel, glanzende kleur, langer dan 40 cm, exclusief de eerste en de laatste plukronde Presentatie: gerangschikte bladeren in voorlopige balen van 35 kg Vochtgehalte: 22 %

BIJLAGE II

Verpakte tabak: soorten en hun referentiekwaliteit voor de oogst 1992

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (Leaves) van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur, van gelijke grootte, normale fermentatie Presentatie: in balen, kisten of kartonnen dozen van ongeveer 75 tot 220 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid: 16 %
2	Badischer Burley E en de hybriden daarvan	Hauptgut (Leaves) van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van lichtbruine of roodbruine tot donkerbruine kleur, gelijke bladgrootte, normale fermentatie Presentatie: in balen of kisten van ongeveer 75 tot 220 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid: 15 %
3	Virgin D en de hybriden daarvan	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele of geelrode tot geelbruine kleur, normale fermentatie Presentatie: in balen of kisten van ongeveer 75 tot 220 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid: 13 %
7	Bright	Bladeren van categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg Vochtigheid: 13 %
8	Burley I	Bladeren van categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg Vochtigheid: 13 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
9	Maryland	Bladeren van categorie A Categorie A: bladeren van voldoende rijpheid, met lichte drogingsgebreken, ook met zeer weinig bronskleurige tinten, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een min of meer warme roodbruine kleur Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 150 tot 210 kg Vochtigheid: 13 %
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	Bladeren van categorie B Categorie B: goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, zonder drogings- en bewaringsgebreken, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid, goed brandbaar Presentatie: in vaten van ongeveer 280 tot 450 kg of in balen van ongeveer 170 tot 200 kg of in kartonnen dozen van 150 tot 200 kg Vochtigheid: 16 %
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybriden van Badischer Geudertheimer	Bladeren van categorie B Categorie B: gezonde bladeren met stevig of licht weefsel, zonder drogingsgebreken, kastanjebruin tot groenachtig van kleur, met gaafheidsgebreken; rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerkleurig tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte (hybriden van Badischer Geudertheimer) Presentatie: in balen, kisten of kartonnen dozen van ongeveer 75 tot 200 kg of in vaten van ongeveer 225 tot 450 kg Vochtigheid: 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	Bladeren van categorie B Categorie B: voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft verzorging, fermentatie en gaafheid Presentatie: in balen van ongeveer 120 kg of in vaten van ongeveer 330 kg Vochtigheid: 16 %
13	Xanti-Yakà	Bladeren van categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal-ellipsvormig, weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 20 cm Presentatie: in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg Vochtigheid: 13 %

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
14	a) Perustitza b) Samsun	Bladeren van categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld (Perustitza) of gesteeld (Samsun), ellips-lancetvormig met spitse punt (Perustitza) of ellipsvormig en stomp (Samsun), weinig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een vrij scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende (Perustitza) of naar het roodachtige zwemende (Samsun) kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 25 cm Presentatie: in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg Vochtigheid: 13 %
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	Bladeren van categorie B Categorie B: voldoende rijpe en gezonde bladeren, ongesteeld, ovaal of ellipsvormig, middelmatig geprononceerde hoofdnerf waarmee de zijnerven een minder scherpe hoek vormen, eventueel enkele drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een van geel tot kastanjebruin variërende kleur, ernstige gaafheidsgebreken maar goed bewaard, afkomstig van alle bladstanden, zachte smaak en voldoende aroma, goed brandbaar De middenbladeren zijn niet langer dan 35 cm Presentatie: in kleine balen van ongeveer 18 tot 50 kg Vochtigheid: 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Bladeren van categorie B Categorie B: laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen: 1e lengte (gelijk aan of groter dan 38 cm) 60 % 2e lengte (van 32 tot minder dan 38 cm) 35 % 3e lengte (van 25 tot minder dan 32 cm) 5 % goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet-gave bladeren Presentatie: in balen van ongeveer 70 tot 90 kg of in kartonnen dozen van ongeveer 180 tot 210 kg Vochtigheid: 16 %
17	Basmas	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 15 cm lang, goudgele of oranjegele tot roodgele kleur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, open textuur en goede weefselstructuur, typisch en sterk aroma, goede brand

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
17 *(vervolg)*	Basmas	Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren (I/II) rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, tot 20 cm lang, lichtgele, roodachtige of lichtbruine kleur, voldoende open textuur en goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, gemiddelde substantie, typisch en sterk aroma, zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren (III) Presentatie: in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
18	Katerini en vergelijkbare soorten	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 20 cm lang, lichtgele of oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren (I/II) rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele, oranjegele, geelgroene, roodachtige of lichtbruine kleur, open textuur, gemiddelde substantie, middelmatige soepelheid en glans, goede weefselstructuur en zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
19	a) Kaba Koulak (klassieke) b) Elassona	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, goed behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 25 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 20 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, middelmatig tot donkergele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 47 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe bladeren met enkele lichte gaafheids- en/of drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en tot 25 cm lang voor Elassona, Karatzova en Kontoula, gele tot roodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, middelmatige soepelheid en glans, uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 53 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
20	a) Kaba Koulak (andere dan klassieke) b) Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi 1	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 30 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous, tot 20 cm lang voor Phi 1 en tot 15 cm lang voor Myrodata Smyrne, lichtgele tot roodachtige kleur, goede soepelheid en glans, vrij open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven bladeren (I/II) rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 35 cm lang voor Kaba Koulak Makedonia en Trapezous, tot 25 cm lang voor Phi 1 en tot 20 cm lang voor Myrodata Smyrne, gele tot lichtbruine kleur, vrij open textuur, vrij goede weefselstructuur, voldoende soepelheid en glans, zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven bladeren (III) Presentatie: in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
21	Myrodata Agrinion	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 25 cm lang, gele tot donkeroranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven bladeren (I/II) rijpe en voldoende gave bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 30 cm lang, gele tot lichtroodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede soepelheid en glans, uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven bladeren (III) Presentatie: in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 14 %
22	Zichnomyrodata	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren van iedere plukronde uitgezonderd de laatste (topblad), tot 20 cm lang, lichtgele tot lichtoranjegele kleur, goede soepelheid en glans, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 47% uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, weinig aangetast door ziekten, afkomstig van iedere plukronde, tot 25 cm lang, gele tot lichtroodachtige kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede elasticiteit en glans, uitstekende brand Kwaliteit I/III bestaat voor 53% uit de hierboven omschreven bladeren (III) Presentatie: in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
23	Tsebelia	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig behandelde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 30 cm lang, geelrode, oranjegele tot roodachtige kleur, open textuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie, goede weefselstructuur en zeer goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 45% uit de hierboven omschreven bladeren (I/II) rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, lichtgele tot roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur, voldoende soepelheid en glans, gemiddelde bladsubstantie, vrij goede weefselstructuur en zeer goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen Kwaliteit I/III bestaat voor 55% uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
24	Mavra	Bladeren van kwaliteit I/III Kwaliteit I/III: rijpe, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren, afkomstig van iedere plukronde uitgezonderd de eerste („protomana"), tot 30 cm lang, van geelrood of oranjegeel tot roodachtig variërende kleur, open textuur, goede weefselstructuur, goede soepelheid en glans, gemiddelde substantie en goede brand Kwaliteit I/III bestaat voor 45 % uit de hierboven omschreven bladeren rijpe en voldoende gave bladeren met lichte drogingsgebreken, afkomstig van iedere plukronde, tot 40 cm lang, geelachtige tot roodachtige of lichtbruine kleur, vrij open textuur en vrij goede weefselstructuur, vrij goede elasticiteit en glans, gemiddelde substantie en goede brand. Tot deze kwaliteit behoren ook bladeren met lichte gebreken ten gevolge van ziekten en/of mechanische beschadigingen Kwaliteit I/III bestaat voor 55 % uit de hierboven omschreven bladeren Presentatie: in zogenaamde „Tonga"-balen van ongeveer 30 kg Vochtigheid: 13 %
25	Burley EL	Bladeren van kwaliteit A Kwaliteit A: volledig rijpe, volledig ontwikkelde, gave, gezonde, zorgvuldig gedroogde bladeren afkomstig van het middenblad, uniforme kleur variërend van middelmatig hazelnootbruin tot hazelnootbruinrood, open textuur, goede weefselstructuur en uitstekende brand Presentatie: in balen van ongeveer 100 kg of in kisten van ongeveer 200 kg of in vaten van ongeveer 240 tot 280 kg Vochtigheid: 13 %
26	Virginia EL	Bladeren van kwaliteit A Kwaliteit A: volledig rijpe, volledig ontwikkelde bladeren afkomstig van het middenblad, gezond, gaaf, zorgvuldig behandeld, uniforme kleur variërend van citroengeel tot middelmatig oranjegeel, goede weefselstructuur en goede brand Presentatie: in balen van ongeveer 100 kg Vochtigheid: 13 %

Volgnummer	Soort	Referentiekwaliteit
27	Santa Fé	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, goed gefermenteerd, van een kastanjebruine of donkerbruine kleur, enkele gaafheidsgebreken Presentatie: in balen van 80 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 150 tot 210 kg Vochtigheid: 14 %
28	Gefermenteerde Burley	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, goed gefermenteerd, van een kastanjebruine kleur, enkele gaafheidsgebreken Presentatie: in balen van 80 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 150 tot 210 kg Vochtigheid: 14 %
29	Havanna E	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, gezonde bladeren, fijne weefselstructuur, weinig geprononceerde nervatuur, goed gefermenteerd, van een kastanjebruine of lichtbruine kleur of met groenachtige tinten, enkele gaafheidsgebreken Presentatie: in balen van 80 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 150 tot 210 kg Vochtigheid: 14 %
30	Round Scafati	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: bladeren van voldoende grootte, goed rijp, van een uniforme kleur, gezond, zonder ernstige gaafheidsgebreken, fijne weefselstructuur, soepel en sterk, fijne nervatuur, goed bewaard, goede brand, typische smaak en typisch aroma, goed gefermenteerd, bruikbaar als dekblad voor sigaren. Ongeveer 25% niet-gave bladeren kunnen worden toegestaan Presentatie: in balen van 70 tot 100 kg of in kartonnen dozen van 180 tot 210 kg Vochtigheid: 14 %
31	Virginia E	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: bladeren van voldoende rijpheid, open textuur, weinig geprononceerde nervatuur, gezond, van een gele kleur met verschillende schakeringen van citroengeel tot oranje Presentatie: in kartonnen dozen van 170 tot 210 kg Vochtigheid: 14 %
32	Burley E	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: bladeren van voldoende rijpheid, open textuur, weinig geprononceerde nervatuur, gezond, van een kaneelbruine kleur in de verschillende schakeringen Presentatie: in kartonnen dozen van 150 tot 210 kg Vochtigheid: 14 %

Volg-nummer	Soort	Referentiekwaliteit
33	Virginia P	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, goed verzorgde bladeren, open textuur, soepel, oliehoudend, van een citroengele tot oranje kleur, glanzend, langer dan 40 cm, exclusief de eerste en de laatste plukronde Presentatie: ongebundelde tabak in kartonnen dozen van 200 kg Vochtigheid: 12,5 %
34	Burley P	Bladeren van klasse 1 Klasse 1: rijpe, goed verzorgde bladeren, open textuur, soepel, glanzende kleur, langer dan 40 cm, exclusief de eerste en de laatste plukronde Presentatie: ongebundelde tabak in kartonnen dozen van 180 kg Vochtigheid: 13 %

BIJLAGE III

Erkende produktiegebieden voor elk van de in de Gemeenschap geproduceerde soorten tabak

Soort	Land	Produktiegebieden
1. Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Duitsland	Rijnvlakte en aangrenzende dalen, Mittelfranken, Brandenburg, Mecklenburg-Voorpommeren
	Frankrijk	Nord-Pas-de-Calais, Picardië, Champagne-Ardennes, Elzas-Lotharingen, Val-de-Loire, Poitou-Bretagne en Centre
2. Badischer Burley E en de hybriden daarvan	Duitsland	A (*) Rijnvlakte en aangrenzende dalen en Mittelfranken, Brandenburg, Mecklenburg-Voorpommeren, Saksen, Saksen-Anhalt, Thuringen
	Frankrijk	A (*) Aquitanië, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Elzas-Lotharingen, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Bourgogne, Charente en Languedoc-Roussillon
	Italië	B (*) Piemonte, Lombardije, Veneto en Emilia-Romagna
3. Virgin D en de hybriden daarvan	Duitsland	Sleeswijk-Holstein, Neder-Saksen, Frankenland, Rijnvlakte en aangrenzende dalen, Brandenburg, Mecklenburg-Voorpommeren, Saksen, Saksen-Anhalt, Thuringen
	Frankrijk	Aquitanië, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Champagne-Ardennes, Elzas-Lotharingen, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Charente, Languedoc-Roussillon, Normandië, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardië en Île-de-France
4. a) Paraguay en de hybriden daarvan	Frankrijk	A (*) Aquitanië, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Bretagne, Charente, Val-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence, Franche-Comté, Elzas-Lotharingen, Champagne-Ardennes, Picardië, Nord-Pas-de-Calais, Normandië en Bourgogne
	Italië	B (*) Molise en Campanië
	België	C (*) Vlaanderen
b) Dragon vert en de hybriden daarvan, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Frankrijk	A (*) Nord-Pas-de-Calais, Picardië, Champagne-Ardennes, Val-de-Loire en Elzas-Lotharingen
	België	C (*) Vlaanderen, Henegouwen, Namen en Luxemburg
5. Nijkerk	Frankrijk	Departementen Lot en Aveyron
6. Misionero	Frankrijk	Eiland Réunion
7. Bright	Italië	Friuli, Veneto, Lombardije, Piemonte, Toscane, Marche, Umbrië, Latium, Abruzzen, Molise, Campanië, Basilicata, Apulië en Calabrië
8. Burley I	Italië	Veneto, Lombardije, Piemonte, Umbrië, Emilia-Romagna, Latium, Abruzzen, Molise, Campanië, Basilicata, Apulië en Sicilië
9. Maryland	Italië	Friuli, Lombardije, Toscane, Marche, Umbrië, Latium, Molise en Campanië
10. Kentucky	Italië	Veneto, Toscane, Umbrië, Latium, Campanië
	Spanje	Extremadura, Andalusië
11. a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Italië	Friuli, Trentino, Veneto, Toscane, Latium, Molise en Campanië
e) Hybriden van Badischer Geudertheimer	Italië	Veneto, Toscane, Molise, Campanië, Latium en Apulië
12. Beneventano, Brasile Selvaggio	Italië	Campanië en Sicilië
13. Xanti-Yakà	Italië	Abruzzen, Campanië, Basilicata en Apulië

Soort	Land	Produktiegebieden
14. a) Perustitza b) Samsun	Italië	Latium, Abruzzen, Molise, Campanië, Apulië en Sicilië
15. Erzegovina	Italië	Latium, Abruzzen en Apulië
16. Round Tip	Griekenland Italië	Centraal-Macedonië Campanië
17. Basmas	Griekenland	Thracië, Macedonië, Sterea Hellas en Thessalië
18. a) Katerini b) Vergelijkbare soorten	Griekenland	Macedonië Macedonië, Sterea Hellas, Epirus en Thessalië
19. a) Kaba Koulak (klassieke) b) Elassona	Griekenland	Macedonië Thessalië
20. Kaba Koulak (andere dan klassieke)	Griekenland	Macedonië, Thessalië, Sterea Hellas, Thracië, Epirus, Peloponnesus en de eilanden
21. Myrodata Agrinion	Griekenland	Sterea Hellas
22. Zichnomyrodata	Griekenland	Thessalië
23. Tsebelia	Griekenland	Epirus en Sterea Hellas
24. Mavra	Griekenland	Thessalië, Peloponnesus en Sterea Hellas
25. Burley EL	Griekenland	Macedonië en Thessalië
26. Virginia EL	Griekenland	Sterea Hellas, Thessalië, Macedonië, Thracië, Peloponnesus en Epirus
27. Santa Fé	Spanje	Andalusië
28. Gefermenteerde Burley	Spanje	Extremadura, Andalusië, Castilië-Leon, Castilië-Mancha, Gemeenschap Valencia, Navarra, Rioja, Catalonië en Madrid
29. Havana E	Spanje	Castilië-Leon, Navarra, Galicië, Asturië en Cantabrië, gebied van Campero in het Baskenland
30. Round Scafati	Spanje	Galicië, Asturië, Navarra, Castilië-Leon en Cantabrië
31. Virginia E	Spanje	Extremadura, Andalusië, Castilië-Leon en Castilië-Mancha
32. Burley E	Spanje	Extremadura, Andalusië, Castilië-Leon en Castilië-Mancha
33. Virginia P	Portugal	Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo en Região Autónoma dos Açores
34. Burley P	Portugal	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes en Região Autónoma dos Açores

(*) Specifiek produktiegebied als bedoeld in artikel 4, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 727/70.

BIJLAGE IV

Streefprijzen, interventieprijzen en premies voor tabaksbladeren van de oogst 1992
Afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak van de oogst 1992

(in ecu/kg)

Volgnummer	Soort	Streefprijs	Interventieprijs	Premie	Afgeleide interventieprijs	Maximum percentage (artikel 3, lid 3)
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	3,637	3,091	2,530	4,636	30 (2)
2	Badischer Burley E en de hybriden daarvan	4,504	3,829	2,956	5,417	45 (3)
3	Virgin D en de hybriden daarvan	4,618	3,925	2,922	5,171	30 (3)
4	a) Paraguay en de hybriden daarvan (specifieke zones A en C) b) Dragon vert en de hybriden daarvan, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,394	2,885	2,348	—	20 (4)
	c) Paraguay en de hybriden daarvan (specifieke zone B)	2,953	2,510	2,043	—	30 (4)
5	Nijkerk	3,351	2,849	2,128	—	20 (4)
6	a) Misionero en de hybriden daarvan b) Rio Grande en de hybriden daarvan	3,123	2,654	2,155	—	30 (5)
7	Bright	4,063	3,454	2,457	4,756	30 (6)
8	Burley I	2,474	2,102	1,748	3,202	30 (6)
9	Maryland	3,307	2,811	1,872	4,007	30 (6)
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	2,791	2,373	1,902	3,341	30 (6)
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Hybriden van Badischer Geudertheimer	2,351	1,763 (1)	1,658	2,957 (1)	30 (6)
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	1,270	1,079	0,935	1,825	30 (6)
13	Xanti-Yakà	3,056	2,598	2,251	4,324	45 (6)
14	a) Perustitza b) Samsun	2,893	2,459	2,142 2,085	3,737 3,761	45 (6)
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	2,599	2,209	1,930	3,371	45 (6)
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	13,816	11,744	8,345	18,731	30 (6)
17	Basmas	6,080	5,168	3,067	6,902	20 (7)
18	Katerini en vergelijkbare soorten	5,064	4,305	2,729	6,185	20 (7)
19	a) Kaba Koulak (klassieke) b) Elassona	3,774	3,208	1,950	4,687	20 (7)
20	a) Kaba Koulak (andere dan klassieke) b) Myrodata Smyrne, Trapezous en Phi I	2,843	2,417	1,335	3,799	20 (7)
21	Myrodata Agrinion	3,752	3,189	1,970	4,608	20 (7)
22	Zichnomyrodata	3,898	3,313	2,078	4,805	20 (7)
23	Tsebelia	2,359	1,769 (1)	1,914	3,072 (1)	20 (7)

Volg-nummer	Soort	Streefprijs	Interventie-prijs	Premie	Afgeleide interventie-prijs	Maximum percentage (artikel 3, lid 3)
24	Mavra	2,303	1,727 (1)	1,565	3,025 (1)	20 (7)
25	Burley EL	2,247	1,910 (1)	1,496	3,031 (1)	20 (6)
26	Virginia EL	3,572	3,036	2,951	4,240	30 (6)
27	Santa Fé	1,381	1,174	0,300	2,031	30 (4)
28	Gefermenteerde Burley	2,236	1,901	0,929	2,918	30 (4)
29	Havanna E	2,873	2,442	1,949	3,627	30 (4)
30	Round Scafati	7,529	6,400	5,134	11,408	30 (8)
31	Virginia E	4,252	3,614	2,209	5,031	30 (4)
32	Burley E	2,960	2,516	1,717	3,782	30 (4)
33	Virginia P	4,256	3,617	2,350	4,944	30 (4)
34	Burley P	3,067	2,607	1,717	3,890	30 (4)

(1) Op grond van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 727/70.
(2) Klasse III, Obergut.
(3) Klasse III.
(4) Klasse 3.
(5) Derde en vierde kwaliteit.
(6) Categorie C.
(7) Graad IV.
(8) Klassen 3 en 4.