REGLAMENTO (CEE) N° 2062/92 DEL CONSEJO

de 30 de junio de 1992

por el que se fijan, para la cosecha de 1992, los precios de objetivo, los precios de intervención y las primas concedidas a los compradores de tabaco en hoja, los precios de intervención derivados del tabaco embalado, las calidades de referencia, así como las zonas de producción

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 727/70 del Consejo, de 21 de abril de 1970, por el que se establece la organización común de mercados en el sector del tabaco crudo (1) y, en particular, el apartado 5 de su artículo 2, los apartados 4 y 5 de su artículo 4 y el apartado 8 de su artículo 6,

Vista la propuesta de la Comisión (2),

Visto el dictamen del Parlamento Europeo (3),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social (4),

Considerando que la Comisión ha propuesto una reforma de la organización común de mercados del tabaco que será aplicable a partir de la cosecha de 1993; que procede mantener para la cosecha de 1992 las disposiciones aplicables a la cosecha anterior, sin perjuicio de las modificaciones indispensables para la transición al nuevo régimen; que, en vista de este último, no es preciso fijar para la cosecha de 1993 la cantidad máxima garantizada por variedades o grupos de variedades prevista en el párrafo primero del apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 727/70;

Considerando que, al fijar los precios en el sector del tabaco bruto procede tener en cuenta los objetivos de la política agrícola común; que la política agrícola común tiene como principales objetivos garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables;

Considerando que los precios de objetivo y los precios de intervención del tabaco en hoja deben fijarse en función de los criterios contemplados en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 727/70 para estimular la orientación de la producción, en particular en el sentido de una conversión de los cultivos hacia las variedades más solicitadas, mas competitivas, así como hacia los menos nocivos para la salud;

Considerando que es oportuno fijar asimismo, para la cosecha 1992, precios de intervención derivados para las variedades que, antes de la entrada en vigor de la organización común de mercados o, respecto de las variedades cultivadas en Grecia, en España y en Portugal, antes de la adhesión, se beneficiaban de una garantía de precios en la fase de tabaco embalado, así como para las variedades principalmente cultivadas en Alemania, a fin de tener en cuenta las vías de comercialización existentes en dicho país;

Considerando que, al aplicar las disposiciones relativas al régimen de precios, de primas y de control cuantitativo de la producción, es conveniente tener en cuenta las diferencias de calidad según las características del suelo y del clima; que estas condiciones se cumplen en el caso de las variedades Badischer Burley y Paraguay; que, por consiguiente y en relación con estas variedades, es conveniente que los precios, las primas y las cantidades máximas garantizadas se fijen con arreglo a zonas específicas de producción;

Considerando que la prima concedida a los compradores de tabaco comunitario está destinada a que puedan pagar a los productoes de tabaco en hoja un precio que se sitúe al nivel del precio de objetivo teniendo en cuenta la evolución de los precios del mercado mundial, así como el nivel de los precios resultante del juego de la oferta y la demanda en el mercado comunitario;

Considerando que la prima es idéntica para todos los tabacos de la variedad de que se trate, independientemente de la calidad del tabaco entregado; que ello incita, sin embargo, a producir tabaco de calidad inferior; que es importante, por consiguiente, reducir el importe de la prima para las cantidades de tabaco de calidad inferior, compradas por los transformadores que rebasen el porcentaje correspondiente a la cantidad normal de tabaco de calidad inferior respecto a la totalidad de la cosecha;

Considerando que los precios contemplados, así como el importe de la prima, deben fijarse para cada variedad producida en zonas de producción reconocidas y con relación a una calidad de referencia definida de forma que permitan una evaluación lo más objetiva posible de la calidad del tabaco;

Considerando que, para la cosecha de 1992, es conveniente indicar las zonas de producción reconocidas de cada variedad de tabaco y mantener las definiciones de las calidades de referencia establecidas por el Reglamento (CEE) n° 1738/91 (5),

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Para la cosecha de 1992, las calidades de referencia y las zonas de producción reconocidas para cada una de las

(1) DO n° L 94 de 28. 4. 1970, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CEE) n° 860/92 (DO n° L 91 de 7. 4. 1992, p. 1).
(2) DO n° C 119 de 11. 5. 1992, p. 71.
(3) DO n° C 150 de 15. 6. 1992.
(4) DO n° C 169 de 6. 7. 1992.
(5) DO n° L 163 de 26. 6. 1991, p. 13.

variedades de tabaco en hoja de la producción comunitaria, contempladas en las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento (CEE) n° 727/70, se fijan en los Anexos I y III, respectivamente, del presente Reglamento.

Artículo 2

para la cosecha de 1992, las calidades de referencia y las zonas de producción reconocidas contempladas en las letras b) y c) del apartado 3 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n° 727/70, para cada una de las variedades de tabaco embalado de la producción comunitaria para las que se establezca un precio de intervención derivado, se fijan en los Anexos II y III, respectivamente, del presente Reglamento.

Artículo 3

1. Para la cosecha de 1992, los precios de objetivo y de intervención y los importes de la prima concedida a los compradores de tabaco en hoja, contempladas en los artículos 2 y 3 del Reglamento (CEE) n° 727/70, así como los precios de intervención derivados del tabaco embalado contemplados en el artículo 6 del mencionado Reglamento, se fijan en el Anexo IV del presente Reglamento.

2. Sin perjuicio del artículo 7 *bis* del Reglamento (CEE) n° 727/70, los precios y primas únicamente se aplicarán en el caso de que cada una de dichas variedades haya sido cultivada en las zonas de producción correspondientes indicadas en el Anexo III del presente Reglamento.

3. Cuando la cantidad de tabaco de clase, categoría o calidad inferior comprada por un transformador rebase el porcentaje indicado en el Anexo IV respecto a la cantidad total adquirida de la variedad de que se trate, se reducirá un 30 % la prima para la cantidad que sobrepase el porcentaje en cuestión.

Artículo 4

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 30 de junio de 1992.

Por el Consejo

El Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

ANEXO I

Tabaco en hoja: variedades y calidades de referencia del mismo para la cosecha de 1992

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (Leaves) de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color marrón oscuro a moteado, de longitud uniforme Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales o en otro envase, con o sin ligaduras que no son tabaco Humedad: 26 %
2	Badischer Burley E y sus híbridos	Hauptgut (Leaves) de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, carnosas, de color marrón rojizo a marrón claro, de longitud uniforme Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales o en otro envase, con o sin ligaduras que no son tabaco Humedad: 25 %
3	Virginia D y sus híbridos	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color amarillo a rojo amarillo; se admiten, hasta un límite del tercio de la superficie de la hoja, diferencias tales como coloraciones parduzcas a amarillo verdoso Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales o en otro envase, con o sin ligaduras que no son tabaco Humedad: 19 %
4	a) Paraguay y sus híbridos b) Dragon vert y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Hojas medianas (Leaves) de clase 2 Clase 2: hojas sanas que presenten ligeros defectos de coloración, del tipo de tejido, de madurez, pero de combustibilidad satisfactoria Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas Humedad: 27 %
5	Nijkerk	Hojas de corona (Tips) de clase 2 Clase 2: — ya sea hojas de segunda longitud (inferior o igual a 45 cm), de tejido muy gomoso, carnoso, íntegro, resistente y elástico, con nervios poco pronunciados, de buena madurez, que se traduzca en una coloración marrón a marrón oscuro, de color vivo — ya sea hojas de primera longitud (superior a 45 cm) de tejido todavía más gomoso, carnoso, más íntegro, resistente, con nervios más o menos pronunciados, de todas las coloraciones, con exclusión del verde botella Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas Humedad: 27 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
6	a) Misionero y sus híbridos b) Río Grande y sus híbridos	Hojas de segunda calidad 2ª calidad: hojas desarrolladas, de más de 45 cm, de tejido no grueso, de coloración clara un poco amarillenta, de color vivo o bastante vivo, que tenga suficiente firmeza y sea bastante íntegro, de combustibilidad pasable Presentación: tabaco seleccionado y en manillas o en hojas sueltas Humedad: 27 %
7	Bright	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, con nervios centrales y nervios no demasiado acentuados, sanas, de color amarillo en sus diferentes gradaciones Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg Humedad: 16 %
8	Burley I	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, incluso consistentes, con los nervios centrales y nervios no demasiado acentuados, sanas, de color avellana más o menos vivo Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg o en manillas con ligaduras que no son tabaco *(fascicoli)* de 25 a 30 hojas Humedad: 19 %
9	Maryland	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente que presenten ligeros defectos de secado, con muy pocas tonalidades color avellana, de tejido de textura mediana con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de coloración marrón rojizo, más bien vivo Presentación: en fardos provisionales de 30 a 40 kg o en manillas con ligaduras que no son tabaco *(fascicoli)* de 25 a 30 hojas Humedad: 19 %
10	a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de buena madurez, de tejido consistente, sin defectos de curado y de conservación, de color marrón, que presenten algunos defectos de integridad, de buena combustibilidad Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco *(fascicoli)* de 25 a 30 hojas Humedad: 23 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Híbridos de Badischer Geudertheimer	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de tejido consistente o ligero, sanas, sin defectos de curado, de color marrón verdoso, que presenten defectos de integridad; hojas maduras, sanas, de color marrón oscuro a moteado. (Híbridos de Badischer Geudertheimer) Presentación: tabaco seleccionado, en manillas o en fardos provisionales con ligaduras que no son tabaco Humedad: 26 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de madurez suficiente de tejido consistente o incluso grueso o fino, que presenten defectos no acentuados de curado, de fermentación y de integridad Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco *(fascicoli)* de 25 a 30 hojas Humedad: 24 %
13	Xanti-Yaká	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval elíptica, con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo más bien abierto, que pueden presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 20 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 %
14	a) Perustitza b) Samsun	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles (Perustitza) o pecioladas (Samsun) de forma elíptica lanceolada con la punta afilada (Perustitza) o elíptica redondeada (Samsun), con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo tendente al agudo, que pueden presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón (Perustitza) o tendente al parduzco (Samsun), con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 25 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
15	Erzegovina y variedades similares	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval o elíptica con los nervios centrales medianamente acentuados y con los nervios secundarios en ángulo más bien abierto, que puede presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 35 cm Presentación: en fardos provisionales de 15 a 20 kg o en cajas que contengan guirnaldas de hojas de 30 a 40 kg Humedad: 17 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Hojas de categoría B Categoría B: hojas medianas inferiores seleccionadas por longitud de acuerdo con las proporciones siguientes: 1ª longitud (igual o superior a 38 cm) 60 % 2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm) 35 % 3ª longitud (de 25 a menos de 32 cm) 5 % Hojas de dimensión conveniente, de buena madurez y de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de textura fina, elástica y resistente, con los nervios centrales y los nervios poco pronunciados, de buena fermentación y bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, utilizables para el encapado de cigarros, que incluyan aproximadamente un 25 % de hojas no íntegras Presentación: en manillas con ligaduras que no son tabaco *(fascicoli)* Humedad: 22 %
17	Basmas	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 15 cm de longitud, de color amarillo oro, anaranjado a rojo amarillo, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas; estructura floja y buena textura; de aroma típico y acusado, de buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro, verde claro, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de buena textura, de elasticidad media, moderadamente brillantes, moderadamente carnosas, de aroma típico y acusado, de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 15 a 25 kg, presentados de la forma tradicional en dos filas de «pastali» (en hojas alineadas). (Es conveniente señalar que en los distritos de Astakós y Jrisúpoli la presentación se hace en armatodema) Humedad: 17 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
18	Katerini y variedades similares	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro o anaranjado a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad, brillantes, bastantes carnosas, de buena textura y muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, anaranjado, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura floja, moderadamente carnosas, de elasticidad media y brillantes, de buena textura y de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: generalmente las guirnaldas se juntan de acuerdo con la forma de presentación «Baski» antes del embalaje. Presentación en fardos de 25 a 35 kg de acuerdo con la forma tradicional llamada «Kaloup» Humedad: 16 %
19	a) Kaba Koulac clásico b) Elassona	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 25 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y hasta 20 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo medio a oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y 25 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo, verde amarillo, rojizo, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, de elasticidad media y moderadamente brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 15 a 30 kg, presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema Humedad: 17 %
20	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi I	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 20 cm para Phi I y hasta 15 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo claro a rojizo, de buena elasticidad y brillantes de estructura bastante floja, de buena textura y excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten algunos defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 35 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 25 cm para Phi I y hasta 20 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo, verde

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
20 *(cont.)*	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi I	amarillo o marrón claro, de textura bastante floja, de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 25 a 35 kg, presentadas de la forma tradicional en armatodema, o de 35 a 50 kg en la forma de Kaloup Humedad: 17 %
21	Myrodata Agrinion	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo o anaranjado oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de textura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de secado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud, de color amarillo, verde amarillo o rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 15 a 30 kg presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema Humedad: 15 %
22	Zichnomyrodata	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro a anaranjado claro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado y algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, verde amarillo o rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y bastante brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 15 a 30 kg presentadas de la forma tradicional en dos filas de armatodema Humedad: 17 %
23	Tsebelia	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero, que tengan hasta 35 cm de longitud, de color rojo amarillo, naranja a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad Las hojas anteriomente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
23 *(cont.)*	Tsebelia	Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillo claro, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja, bastante elásticas y de brillo medio, bastante carnosas, de bastante buena textura y de muy buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas y/o que presenten ligeros defectos de integridad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 30 a 40 kg, presentadas en dos filas de armatodema Humedad: 14 %
24	Mavra	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de un color que va de rojizo amarillo al naranja y al rojizo, de estructura floja, de buena textura, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillento, verde amarillo (limón), rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas y/o que presenten ligeros defectos de integridad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos de 30 a 50 kg presentados en dos filas de armatodema Humedad: 14 %
25	Burley EL	Hojas de la calidad A Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes del piso medio, de color uniforme marrón avellana medio a rojo avellana, de estructura floja, de buena textura y excelente combustibilidad Presentación: en fardos de 50 a 70 kg presentados en dos filas de armatodema sin bramante (hojas sueltas) Humedad: 22 %
26	Virginia EL	Hojas de la calidad A Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, sanas, íntegras, sin defectos de curado, de color uniforme amarillo limón a naranja medio, carnosas, de buena textura y de buena combustibilidad, procedentes esencialmente del piso medio Presentación: en fardos de 30 a 40 kg, presentadas en dos filas de armatodema, sin bramante (hojas sueltas) Humedad: 19 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
27	Santa Fe	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, con la vena central totalmente rendida, color marrón, con algunos defectos de integridad Presentación: tabaco seleccionado, en fardos provisionales homogéneos Humedad: 18 %
28	Burley fermentado	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, sin defectos de curado, con la vena central totalmente rendida, con buena combustibilidad, de color avellana a canela, con algunos defectos de integridad Presentación: tabaco seleccionado, en fardos provisionales homogéneos Humedad: 18 %
29	Havana E	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, tejido fino, con la vena central y las nervaduras poco acentuadas, sin defectos de curado, con la vena totalmente rendida, color marrón, marrón claro o verdoso, con algún defecto de integridad Presentación: tabaco seleccionado, en fardos provisionales uniformes Humedad: 18 %
30	Round Scafati	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas de dimensión suficiente, de buena madurez, de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de tejido fino, elásticas y resistentes, con la vena central y las nervaduras finas, bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, aptas para cajas de cigarros. Se puede tolerar un porcentaje de hojas no íntegras del 25 % aproximadamente Presentación: en fardos homogéneos provisionales, conteniendo manojos atados con ligaduras que no son de tabaco Humedad: 18 %
31	Virginia E	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas de madurez suficiente, sin defectos de curado, de textura abierta, con la vena poco central y las nervaduras poco acentuadas, sanas, de color amarillo limón o naranja Presentación: en fardos homogéneos provisionales de 33 a 45 kg de hojas sueltas y separadas por pisos foliares Humedad: 16 %
32	Burley E	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas de suficiente madurez, sin defectos de curado, de textura abierta, con vena central y secundarias poco acentuadas, sanas, de color canela en sus diferentes tonos Presentación: en fardos homogéneos de 33 a 45 kg de hojas sueltas y separadas por pisos foliares Humedad: 18 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
33	Virginia P	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, de textura abierta y elástica, de color brillante, de longitud superior a 40 cm, el primer y el último pisos foliares no incluidos Presentación: en fardos provisionales de 45 kg con las hojas ordenadas Humedad: 17 %
34	Burley P	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, textura abierta y elástica, color brillante, longitud superior a 40 cm, el primer y último pisos foliares no incluidos Presentación: en fardos provisionales de 35 kg con las hojas ordenadas Humedad: 22 %

ANEXO II

Tabaco embalado: variedades y calidades de referencia del mismo para la cosecha de 1992

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (Leaves) de la clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color ligeramente moteado a marrón oscuro, de longitud uniforme, normalmente fermentadas Presentación: en fardos, en cajas o en cartones de 75 a 220 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente Humedad: 16 %
2	Badischer Burley E y sus híbridos	Hauptgut (Leaves) de la clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, carnosas, de color marrón claro, marrón rojizo a marrón oscuro, de longitud uniforme, normalmente fermentadas Presentación: en fardos, en cajas o en cartones de 75 a 220 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente Humedad: 15 %
3	Virginia D y sus híbridos	Hojas de la clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, intactas, de color amarillo, rojo amarillo a amarillo parduzco, normalmente fermentadas Presentación: en fardos, en cajas o en cartones de 75 a 220 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente Humedad: 13 %
7	Bright	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de manipulación, de textura abierta, con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de color amarillo en sus diferentes gradaciones Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente Humedad: 13 %
8	Burley I	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, sin defectos de manipulación, de textura abierta, incluso consistentes, con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, de color avellana más o menos vivo Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente Humedad: 13 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
9	Maryland	Hojas de categoría A Categoría A: hojas de madurez suficiente, que presenten ligeros defectos de curado, incluso con muy poca tonalidad color avellana, de tejido de textura media con los nervios centrales y los nervios no demasiado acentuados, sanas, de coloración marrón rojiza más o menos viva Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 210 kg aproximadamente Humedad: 13 %
10	a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de buena madurez, de tejido consistente, sin defectos de curado y de conservación, de color marrón, que presenten algunos defectos de integridad, de buena combustibilidad Presentación: en barricas de 280 a 450 kg aproximadamente o en fardos de 170 a 200 kg aproximadamente o en cartones de 150 a 200 kg aproximadamente Humedad: 16 %
11	a) Forchheimer Havana II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Híbridos de Badischer Geudertheimer	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de tejido consistente o ligero, sanas, sin defectos de curado, de color marrón a verdoso, que presenten defectos de integridad; hojas maduras, sanas, de color ligeramente moteado a marrón oscuro, de longitud uniforme normalmente fermentadas. (Híbridos de Badischer Geudertheimer) Presentación: en fardos, cajas o cartones de 75 a 200 kg aproximadamente o en barricas de 225 a 450 kg aproximadamente Humedad: 16 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares	Hojas de categoría B Categoría B: hojas de madurez suficiente, de tejido consistente o incluso grueso o fino, que presenten defectos de manipulación, de fermentación y de integridad no demasiado acentuados Presentación: en fardos de 120 kg aproximadamente o en barricas de 330 kg aproximadamente Humedad: 16 %
13	Xanti-Yakà	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval elíptica, con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios de ángulo más bien abierto, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido ligero la mayoría de las veces, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 20 cm Presentación: en fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente Humedad: 13 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
14	a) Perustitza b) Samsun	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles (Perustitza) o pecioladas (Samsun), de forma elíptica lanceolada con la punta afilada (Perustitza) o elíptica redondeada (Samsun), con los nervios centrales poco acentuados y los nervios secundarios con un ángulo tendente al agudo, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón (Perustitza) o tendente al rojizo (Samsun), con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 25 cm Presentación: en fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente Humedad: 13 %
15	Erzegovina y variedades similares	Hojas de categoría B Categoría B: hojas suficientemente sanas y maduras, sésiles, de forma oval o elíptica, con los nervios centrales medianamente acentuados y los nervios secundarios en ángulo más bien abierto, que puedan presentar algunos defectos de curado, de tejido la mayoría de las veces ligero, de color que va del amarillo al marrón, con marcados defectos de integridad, pero bien conservadas, procedentes de todos los pisos foliares, de gusto discreto, de aroma suficiente y de buena combustibilidad La longitud de las hojas medianas no supera los 35 cm Presentación: en fardos pequeños de 18 a 50 kg aproximadamente Humedad: 13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	Hojas de categoría B Categoría B: hojas medianas inferiores seleccionadas por longitud de acuerdo con las proporciones siguientes: 1ª longitud (igual o superior a 38 cm) 60 % 2ª longitud (de 32 a menos de 38 cm) 35 % 3ª longitud (de 25 a 32 cm) 5 % Hojas de dimensión conveniente, de buena madurez y de color uniforme, sanas, sin defectos de integridad, de textura fina, elástica y resistente, con los nervios centrales y los nervios poco pronunciados, de buena fermentación y bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, utilizables para el encapado de cigarros, que incluyan aproximadamente un 25 % de hojas no íntegras Presentación: en fardos de 70 a 90 kg aproximadamente o en cartones de 180 a 210 kg aproximadamente Humedad: 16 %
17	Basmas	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 15 cm de longitud, de color amarillo oro, anaranjado a rojo amarillo, de buena elasticidad y brillantes, bastante carnosas, estructura floja y buena textura, de aroma típico y acusado, de buena combustibilidad

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
17 *(cont.)*	Basmas	Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten unos ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro, rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de buena textura, de elasticidad y brillo medios, moderadamente carnosas, de aroma típico y acusado, de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 13 %
18	Katerini y variedades similares	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro o anaranjado a rojizo, de estructura floja, de buena elasticidad, brillantes, bastante carnosas, de buena textura y muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten unos ligeros defectos de integridad y de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo, anaranjado, verde amarillo, rojizo o marrón claro, de estructura floja, de elasticidad media y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente Humedad: 13 %
19	a) Kaba Koulak clásico b) Elassona	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 25 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y hasta 20 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo medio a oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras, que presenten unos ligeros defectos de integridad y/o curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y 25 cm de longitud para Elassona, Karatzova y Kontoula, de color amarillo a rojizo, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, de elasticidad media y brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente Humedad: 13 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
20	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi I	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 30 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 20 cm para Phi I y hasta 15 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo claro a rojizo, de buena elasticidad y brillantes, de estructura bastante floja, de buena textura y excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 35 cm de longitud para Macedonia Kaba Koulak y Trapezous, hasta 25 cm para Phi I y hasta 20 cm para Myrodata Smyrne, de color amarillo a marrón claro, de estructura bastante floja, de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg cada uno aproximadamente Humedad: 13 %
21	Myrodata Agrinion	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a anaranjado oscuro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de secado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 30 cm de longitud, de color amarillo a rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 14 %
22	Zichnomyrodata	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción de las hojas de corona, que tengan hasta 20 cm de longitud, de color amarillo claro a naranja claro, de buena elasticidad y brillantes, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 47 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, algunas señales de enfermedad, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 25 cm de longitud, de color amarillo a rojizo claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, de excelente combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 53 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 13 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
23	Tsebelia	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con la excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de color rojo amarillo, naranja a rojizo, de estructura floja, elásticas y brillantes, bastante carnosas, de buena textura y de muy buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas (I/II) constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillo claro a rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja, bastante elásticas y bastante brillantes, bastante carnosas, de bastante buena textura y de muy buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas por enfermedades y/o que presenten ligeros defectos de integridad Las hojas anteriormente descritas (III) constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 13 %
24	Mavra	Hojas de la calidad I/III Calidad I/III: hojas maduras, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares con excepción del primero (protomana), que tengan hasta 30 cm de longitud, de un color que va del rojo amarillo o naranja al rojizo, de estructura floja, de buena textura, elásticas y brillantes, bastante carnosas, de buena combustibilidad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 45 % de la calidad I/III Hojas maduras y suficientemente íntegras, que presenten ligeros defectos de curado, procedentes de todos los pisos foliares, que tengan hasta 40 cm de longitud, de color amarillento a rojizo o marrón claro, de estructura bastante floja y de bastante buena textura, bastante elásticas y brillantes, bastante carnosas y de buena combustibilidad. Esta categoría también comprende las hojas ligeramente desecadas por las enfermedades y/o que presenten ligeros defectos de integridad Las hojas anteriormente descritas constituirán el 55 % de la calidad I/III Presentación: en fardos llamados «Tongas» de 30 kg aproximadamente Humedad: 13 %
25	Burley EL	Hojas de la calidad A Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, íntegras, sanas, sin defectos de curado, procedentes del piso medio, de color uniforme que va del marrón avellana medio al rojo avellana medio, de estructura floja, de buena textura y de excelente combustibilidad Presentación: en fardos de 100 kg aproximadamente o en cajas de 200 kg aproximadamente o en barricas de 240 a 280 kg aproximadamente Humedad: 13 %
26	Virginia EL	Hojas de la calidad A Calidad A: hojas completamente maduras, completamente desarrolladas, procedentes del piso medio, sanas, íntegras, sin defectos de curado, de color amarillo uniforme que va del amarillo limón al naranja medio, de buena textura y de buena combustibilidad Presentación: en fardos de 100 kg aproximadamente Humedad: 13 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
27	Santa Fe	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, bien fermentadas, color marrón o marrón oscuro, con algunos defectos de integridad Presentación: en fardos de 80 a 100 kg o en cajas de cartón de 150 a 210 kg Humedad: 14 %
28	Burley fermentado	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, bien fermentadas y de color marrón, con algunos defectos de integridad Presentación: en fardos de 80 a 100 kg o en cajas de cartón de 150 a 210 kg Humedad: 14 %
29	Havana E	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sanas, de textura fina, con la vena central y las nervaduras no muy acentuadas, bien fermentadas, de color marrón, marrón claro o de tonos verdosos, con algún defecto de integridad Presentación: en fardos de 80 a 100 kg o en cartones de 150 a 210 kg Humedad: 14 %
30	Round Scafati	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas de dimensión suficiente, de buena madurez, de color uniforme, sanas, sin defectos importantes de integridad, de textura fina, elásticas y resistentes, con la vena central y las nervaduras finas, bien conservadas, de buena combustibilidad, de gusto y aroma típicos, bien fermentadas, utilizables para capas de cigarros. Se puede tolerar un porcentaje de hojas no íntegras del 25 % aproximadamente Presentación: en fardos de 70 a 100 kg o en cartones de 180 a 210 kg Humedad: 14 %
31	Virginia E	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas de madurez suficiente, de textura abierta, con la vena central y las nervaduras poco acentuadas, sanas, de color amarillo con diferentes tonos, desde el amarillo limón al naranja Presentación: en cartones de 170 a 210 kg Humedad: 14 %
32	Burley E	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas de madurez suficiente, de textura abierta, con la vena central y las nervaduras poco acentuadas, sanas, de color canela en sus diferentes tonos Presentación: en cartones de 150 a 210 kg Humedad: 14 %

Número de orden	Variedad	Calidad de referencia
33	Virginia P	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sin defectos de manipulación, de textura abierta y elástica, aceitosas, de color amarillo limón o naranja, brillante, longitud superior a 40 cm, el primer y el último pisos foliculares no incluidos Presentación: en cartones de hojas sueltas de 200 kg Humedad: 12,5 %
34	Burley P	Hojas de clase 1 Clase 1: hojas maduras, sin defectos de manipulación, de textura abierta y elástica, color brillante, longitud superior a 40 cm, el primer y el último pisos foliculares no incluidos Presentación: en cartones de hojas sueltas de 180 kg Humedad: 13 %

ANEXO III

Zonas de producción reconocidas para cada una de las variedades de tabaco de la producción comunitaria

Variedades	País	Zonas de producción
1. Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Alemania	Planicie Renana y valles adyacentes, Franconia central, Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental
	Francia	Norte Pas-de-Calais, Picardía, Champagne-Ardenas, Alsacia-Lorena, Valle del Loira, Poitou-Bretaña y Centro
2. Badischer Burley E y sus híbridos	Alemania	A(*) Planicie renana y valles adyacentes, Franconia Central, Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia
	Francia	A(*) Aquitania, Mediodía-Pirineos, Auvernia-Lemosín, Alsacia-Lorena, Ródano-Alpes, Franco-Condado, Valle del Loira, Centro, Poitou-Bretaña, Borgoña, Charente y Languedoc-Rosellón
	Italia	B(*) Piamonte, Lombardía, Véneto, Emilia-Romaña
3. Virgin D y sus híbridos	Alemania	Schleswig-Holstein, Baja Sajonia, Franconia y Planicie Renana y valles adyacentes, Brandeburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, Sajonia, Sajonia-Anhalt, Turingia
	Francia	Aquitania, Mediodía-Pirineos, Auvernia-Lemosín, Champagne-Ardenas, Alsacia-Lorena, Ródano-Alpes, Franco-Condado, Provenza, Valle del Loira, Centro, Poitou-Bretaña, Charente, Languedoc-Rosellón, Normandía, Borgoña, Norte Pas-de-Calais, Picardía e Isla de Francia
4. a) Paraguay y sus híbridos	Francia	A(*) Aquitania, Mediodía-Pirineos, Languedoc-Rosellón, Auvernia-Lemosín, Poitou-Bretaña, Charente, Valle del Loira, Centro, Ródano-Alpes, Provenza, Franco-Condado, Alsacia-Lorena, Champagne-Ardenas, Picardía, Norte Pas-de-Calais, Normandía y Borgoña
	Italia	B(*) Molise y Campania
	Bélgica	C(*) Flandes
b) Dragon vert y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Francia	A(*) Norte Pas-de-Calais, Picardía, Champagne-Ardenas, Valle del Loira y Alsacia-Lorena
	Bélgica	C(*) Flandes, Hainaut, Namur, Luxemburgo
5. Nijkerk	Francia	Departamentos de Lot y Aveyron
6. Misionero	Francia	Isla de la Reunión
7. Bright	Italia	Friul, Véneto, Lombardía, Piamonte, Toscana, Marcas, Umbría, Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Basilicata, Apulia y Calabria
8. Burley I	Italia	Véneto, Lombardía, Piamonte, Umbría, Emilia-Romaña, Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Basilicata, Apulia y Sicilia
9. Maryland	Italia	Friul, Lombardía, Toscana, Marcas, Umbría, Lacio, Molise y Campania
10. Kentucky	Italia	Véneto, Toscana, Umbría, Lacio, Campania
	España	Extremadura, Andalucía
11. a) F. Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano	Italia	Friul, Trento, Véneto, Toscana, Lacio, Molise y Campania
e) Híbridos de Badischer Geudertheimer	Italia	Véneto, Toscana, Molise, Campania, Lacio y Apulia
12. Beneventano Brasile Selvaggio	Italia	Campania Sicilia
13. Xanti-Yakà	Italia	Abruzos, Campania, Basilicata y Apulia

Variedades	País	Zonas de producción
14. a) Perustitza b) Samsun	Italia	Lacio, Abruzos, Molise, Campania, Apulia y Sicilia
15. Erzegovina	Italia	Lacio, Abruzos y Apulia
16. Round Tip	Grecia Italia	Macedonia central Campania
17. Basmas	Grecia	Tracia, Macedonia, Sterea Hellas y Tesalia
18. a) Katerini b) Variedades similares	Grecia	Macedonia Macedonia, Sterea Hellas, Epiro y Tesalia
19. a) Kaba Koulak clásico b) Elassona	Grecia Grecia	Macedonia Tesalia
20. Kaba Koulak no clásico	Grecia	Macedonia, Tesalia, Sterea Hellas, Tracia, Epiro, Peloponeso y las islas
21. Myrodata Agrinion	Grecia	Sterea Hellas
22. Zichnomyrodata	Grecia	Tesalia
23. Tsebelia	Grecia	Epiro y Sterea Hellas
24. Mavra	Grecia	Tesalia, Peloponeso y Sterea Hellas
25. Burley EL	Grecia	Macedonia, Tesalia
26. Virginia EL	Grecia	Sterea Hellas, Tesalia, Macedonia, Tracia, Peloponeso, Epiro
27. Santa Fé	España	Andalucía
28. Burley fermentado	España	Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, Rioja, Cataluña, Madrid
29. Havana E	España	Castilla y León, Navarra, Galicia, Asturias, Cantabria, zona de Campezo en el País Vasco
30. Round Scafati	España	Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León, Cantabria
31. Virginia E	España	Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha
32. Burley E	España	Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha
33. Virginia P	Portugal	Beira Interior, Ribatejo Oeste, Alentejo, Región Autónoma de las Azores
34. Burley P	Portugal	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro y Miño, Tras-os-Montes, Región Autónoma de las Azores

(*) Zona específica de producción, como prevé el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 727/70.

ANEXO IV

Precios de objetivo, precios de intervención y primas para los tabacos en hoja de la cosecha de 1992
Precios de intervención derivados para los tabacos embalados de la cosecha de 1992

(en ecus por kg)

Número de orden	Variedades	Precios de objetivo	Precios de intervención	Importe de la prima	Precios de intervención derivados	Porcentaje máximo (apartado 3 del artículo 3)
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	3,637	3,091	2,530	4,636	30 (2)
2	Badischer Burley E y sus híbridos	4,504	3,829	2,956	5,417	45 (3)
3	Virgin D y sus híbridos	4,618	3,925	2,922	5,171	30 (3)
4	a) Paraguay y sus híbridos (zona específica A y C) b) Dragon vert y sus híbridos, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,394	2,885	2,348	—	20 (4)
	c) Paraguay y sus híbridos (zona específica B)	2,953	2,510	2,043	—	30 (4)
5	Nijkerk	3,351	2,849	2,128	—	20 (4)
6	a) Misionero y sus híbridos b) Río Grande y sus híbridos	3,123	2,654	2,155	—	30 (5)
7	Bright	4,063	3,454	2,457	4,756	30 (6)
8	Burley I	2,474	2,102	1,748	3,202	30 (6)
9	Maryland	3,307	2,811	1,872	4,007	30 (6)
10	a) Kentucky y sus híbridos b) Moro di Cori c) Salento	2,791	2,373	1,902	3,341	30 (6)
11	a) Forchheimer Havanna II c b) Nostrano del Brenta c) Resistente 142 d) Gojano e) Híbridos de Badischer Geudertheimer	2,351	1,763 (1)	1,658	2,957 (1)	30 (6)
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio y variedades similares	1,270	1,079	0,935	1,825	30 (6)
13	Xanti-Yakà	3,056	2,598	2,251	4,324	45 (6)
14	a) Perustitza b) Samsun	2,893	2,459	2,142 2,085	3,737 3,761	45 (6)
15	Erzegovina y variedades similares	2,599	2,209	1,930	3,371	45 (6)
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	13,816	11,744	8,345	18,731	30 (6)
17	Basmas	6,080	5,168	3,067	6,902	20 (7)
18	Katerini y variedades similares	5,064	4,305	2,729	6,185	20 (7)
19	a) Kaba Koulak clásico b) Elassona	3,774	3,208	1,950	4,687	20 (7)
20	a) Kaba Koulak no clásico b) Myrodata Smyrne, Trapezous y Phi 1	2,843	2,417	1,335	3,799	20 (7)
21	Myrodata Agrinion	3,752	3,189	1,970	4,608	20 (7)
22	Zichnomyrodata	3,898	3,313	2,078	4,805	20 (7)
23	Tsebelia	2,359	1,769 (1)	1,914	3,072 (1)	20 (7)

Número de orden	Variedades	Precios de objetivo	Precios de intervención	Importe de la prima	Precios de intervención derivados	Porcentaje máximo (apartado 3 del artículo 3)
24	Mavra	2,303	1,727 (1)	1,565	3,025 (1)	20 (7)
25	Burley EL	2,247	1,910 (1)	1,496	3,031 (1)	20 (6)
26	Virginia EL	3,572	3,036	2,951	4,240	30 (6)
27	Santa Fé	1,381	1,174	0,300	2,031	30 (4)
28	Burley fermentado	2,236	1,901	0,929	2,918	30 (4)
29	Havana E	2,873	2,442	1,949	3,627	30 (4)
30	Round Scafati	7,529	6,400	5,134	11,408	30 (8)
31	Virginia E	4,252	3,614	2,209	5,031	30 (4)
32	Burley E	2,960	2,516	1,717	3,782	30 (4)
33	Virginia P	4,256	3,617	2,350	4,944	30 (4)
34	Burley P	3,067	2,607	1,717	3,890	30 (4)

(1) Habida cuenta de la aplicación del artículo 13 del Reglamento (CEE) n° 727/70.
(2) Clase III, Obergut.
(3) Clase III.
(4) Clase 3.
(5) Tercera y cuarta calidad.
(6) Categoría C.
(7) Grado IV.
(8) Clases 3 y 4.