Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2036/2005 AL COMISIEI

din 14 decembrie 2005

privind autorizarea permanentă a unor aditivi în hrana animalelor și autorizarea provizorie a unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 328, 15.12.2005, p. 13)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1018/2012 al Comisiei din 5 noiembrie 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1206/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012	L 347	12	15.12.2012
►M3	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/961 al Comisiei din 7 iunie 2017	L 145	7	8.6.2017
►M4	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1145 al Comisiei of 8 iunie 2017	L 166	1	29.6.2017
►M5	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2299 al Comisiei din 12 decembrie 2017	L 329	33	13.12.2017

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2036/2005 AL COMISIEI

din 14 decembrie 2005

privind autorizarea permanentă a unor aditivi în hrana animalelor și autorizarea provizorie a unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Preparatele care aparțin grupei „microorganisme” menționate în anexa I sunt autorizate fără limită de timp, ca aditiv în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

▼M4

———————

▼B

Articolul 3

Preparatele care aparțin grupei „enzime” menționate în anexa III sunt autorizate pentru o perioadă de patru ani, ca aditivi în hrana animalelor, în condițiile prevăzute în anexa respectivă.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

Nr. CE	Aditiv	Formulă chimică, descriere	Specia animală sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de furaj complet			
Microorganisme								
E 1703	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM 1-1079	Preparat de *Saccharomyces cerevisiae* conținând cel puțin 2×10^{10} UFC/g de aditiv	Scroafe	–	1×10^{9}	►M1 —— ◄	În modul de întrebuințare a aditivului și a preamestecului, se indică temperatura de depozitare, durata conservării și stabilitatea la granulare.	Nedeterminată
▼M5 ——								
▼M3 ——								

▼M4

———

▼B

ANEXA III

Nr. CE	Aditiv	Formulă chimică, descriere	Specia animală sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
▼M2 _____								
▼B 37	Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 Subtilizină EC 3.4.21.62	Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) și de subtilizină produsă de *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) având o activitate minimă: endo-1,4-beta-xilanază: 5 000 U ([2])/g Subtilizină: 1 600 U ([3])/g	Rațe	–	endo-1,4-beta-xilanază: 2 500 U subtilizină: 800 U	– –	1. În modul de întrebuințare a aditivului și a premestecului, se indică temperatura de depozitare, durata conservării și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,4-beta-xilanază: 2 500 U; subtilizină: 800 U 3. Utilizarea în furajele combinate, de exemplu, care conțin mai mult de 65 % grâu.	4.1.2010
59	Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 Subtilizină EC 3.4.21.62 Alfa-amilază EC 3.2.1.1 Poligalacturonază EC 3.2.1.15	Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), de endo-1,3(4)-beta-glucanază și de alfa-amilază produse de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), de subtilizină produsă de *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), de poligalacturonază produsă de *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) având o activitate minimă de: endo-1,4-beta-xilanază: 300 U ([2])/g endo-1,3(4)-beta-glucanază: 150 U ([4])/g subtilizină: 4 000 U ([3])/g alfa-amilază: 400 U ([5])/g poligalacturonază: 25 U ([6])/g	Rațe	–	endo-1,4-beta-xilanază: 300 U endo-1,3(4)-beta-glucanază: 150 U subtilizină: 4 000 U alfa-amilază: 400 U poligalacturonază: 25 U	– – – – –	1. În modul de întrebuințare a aditivului și a premestecului, se indică temperatura de depozitare, durata conservării și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,4-beta-xilanază: 300 U; endo-1,3(4)-beta-glucanază: 150 U; subtilizină: 4 000 U; alfa-amilază: 400 U; poligalacturonază: 25 U. 3. Se utilizează în furajele combinate, bogate în polizaharide amilacee și neamilacee (în special, arabinoxilani și beta-glucani), de exemplu, care conțin mai mult de 40 % porumb.	4.1.2010

▼B

Nr. CE	Aditiv	Formulă chimică, descriere	Specia animală sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
			Găini ouătoare	–	endo-1,4-beta-xilanază: 225 U	–	1. În modul de întrebuințare a aditivului și a premestecului, se indică temperatura de depozitare, durata conservării și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,4-beta-xilanază: 225 U endo-1,3(4)-beta-glucanază: 112 U subtilizină: 3 000 U alfa-amilază: 300 U poligalacturonază: 18 U 3. Se utilizează în furajele combinate, bogate în polizaharide amilacee și neamilacee (în special arabinoxilani și beta-glucani), de exemplu, care conțin mai mult de 40 % porumb.	4.1.2010
					endo-1,3(4)-beta-glucanază: 112 U	–		
					subtilizină: 3 000 U	–		
					alfa-amilază: 300 U	–		
					poligalacturonază: 18 U	–		

►M2 ——— ◄
([2]) 1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți xiloză) pe minut din xilan de pleavă de ovăz, cu un pH de 5,3 și la 50 °C.
([3]) 1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 1 microgram de compus fenolic (măsurat în echivalenți tirozină) pe minut dintr-un substrat de cazeină, cu un pH de 7,5 și la 40 °C.
([4]) 1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zaharuri reducătoare (măsurate în echivalenți glucoză) pe minut din beta-glucan de orz, cu un pH de 5,0 și la 30 °C.
([5]) 1 U reprezintă cantitatea de enzimă care hidrolizează 1 micromol de legături glucozidice pe minut din substrat de polimer amilaceu legat transversal și insolubil în apă, cu un pH de 6,5 și la 37 °C.
([6]) 1 U reprezintă cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de materiale reducătoare (măsurate în echivalenți acid galacturonic) pe minut dintr-un substrat poli D-galacturonic, cu un pH de 5,0 și la 40 °C.