Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 2036/2005/EK RENDELETE

(2005. december 14.)

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

(HL L 328., 2005.12.15., 13. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság 1018/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. november 5.)	L 307	56	2012.11.7.
►M2	A Bizottság 1206/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. december 14.)	L 347	12	2012.12.15.
►M3	A Bizottság (EU) 2017/961 végrehajtási rendelete (2017. június 7.)	L 145	7	2017.6.8.
►M4	A Bizottság (EU) 2017/1145 végrehajtási rendelete (2017. június 8.)	L 166	1	2017.6.29.
►M5	A Bizottság (EU) 2017/2299 végrehajtási rendelete (2017. december 12.)	L 329	33	2017.12.13.

▼B

A BIZOTTSÁG 2036/2005/EK RENDELETE

(2005. december 14.)

a takarmányokban lévő egyes adalékanyagok végleges engedélyezéséről és egyes már engedélyezett takarmány-adalékanyagok új alkalmazásának ideiglenes engedélyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

1. cikk

A „mikroorganizmusok” csoportjába tartozó, az I. mellékletben felsorolt, készítmények takarmány-adalékanyagként való felhasználása az említett mellékletben megállapított feltételek szerint határozatlan időre engedélyezett.

▼M4

—————

▼B

3. cikk

Az „enzimek” csoportjába tartozó, III. mellékletben felsorolt készítmények takarmány-adalékanyagként való felhasználása az említett mellékletben megállapított feltételek szerint négy évre engedélyezett.

4. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

I. MELLÉKLET

EK-sorszám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Legnagyobb életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
					CFU/kg a teljes értékű takarmányban			
Mikroorganizmusok								
E 1703	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	*Saccharomyces cerevisiae-os* készítmény, amelynek legkisebb tartalma: 2×10^{10} CFU/g adalékanyag	Kocák	—	1×10^{9}	►M1 — ◄	Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás.	Határozatlan időre
▼M5 —								
▼M3 —								

▼M4

▼B

III. MELLÉKLET

EK-sorszám vagy szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Legnagyobb életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
Enzimek								
▼M2 ———								
▼B								
37	Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8 Szubtilizin EC 3.4.21.62	A *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz és a *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) által termelt szubtilizin készítmény legkisebb aktivitása: Endo-1,4-béta-xilanáz: 5 000 U ([2])/g Szubtilizin: 1 600 U ([3])/g	Kacsák	—	Endo-1,4-béta-xilanáz: 2 500 U Szubtilizin: 800 U	— —	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában: Endo-1,4-béta-xilanáz: 2 500 U Szubtilizin: 800 U. 3. Összetett takarmányokban való felhasználásra, pl. 65 % feletti búzatartalom esetén.	2010.1.4.
59	Endo-1,4-béta-xilanáz EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-béta-glükanáz EC 3.2.1.6 Szubtilizin EC 3.4.21.62 Alfa-amiláz EC 3.2.1.1 Poligalakturonáz EC 3.2.1.15	A *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) által termelt endo-1,4-béta-xilanáz, a *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) által termelt endo-1,3(4)-béta-glükanáz és alfa-amiláz, a *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) által termelt szubtilizin és az *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94) által termelt poligalakturonáz készítmény, amelynek legkisebb aktivitása: Endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U ([2])/g Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 150 U ([4])/g Szubtilizin: 4 000 U ([3])/g Alfa-amiláz: 400 U ([5])/g Poligalakturonáz: 25 U ([6])/g	Kacsák	—	Endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 150 U Szubtilizin: 4 000 U Alfa-amiláz: 400 U Poligalakturonáz: 25 U	— — — — —	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában: Endo-1,4-béta-xilanáz: 300 U Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 150 U Szubtilizin: 4 000 U Alfa-amiláz: 400 U Poligalakturonáz: 25 U. 3. Keményítő- és nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. több mint 40 % kukoricát tartalmazó összetett takarmányokban való felhasználásra.	2010.1.4.

▼B

EK-sorszám vagy szám	Adalékanyag	Kémiai képlet, leírás	Állatfaj vagy -kategória	Legnagyobb életkor	Legkisebb megengedhető tartalom	Legnagyobb megengedhető tartalom	Egyéb rendelkezések	Az engedélyezési időszak vége
					Aktivitási egység/kg a teljes értékű takarmányban			
			Tojótyúkok	—	Endo-1,4-béta-xilanáz: 225 U Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 112 U Szubtilizin: 3 000 U Alfa-amiláz: 300 U Poligalakturonáz: 18 U	— — — — —	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet, az eltarthatósági időtartam és a pelletálási stabilitás. 2. Ajánlott adag a teljes értékű takarmány egy kilogrammjában: Endo-1,4-béta-xilanáz: 225 U Endo-1,3(4)-béta-glükanáz: 112 U Szubtilizin: 3 000 U Alfa-amiláz: 300 U Poligalakturonáz: 18 U. 3. Keményítő- és nem keményítőalapú poliszacharidokban (főként arabinoxilánokban és béta-glükánokban) gazdag, pl. több mint 40 % kukoricát tartalmazó összetett takarmányokban való felhasználásra.	2010.1.4.

►M2 ——————— ◄

(2) 1 U az az enzimmennyiség, amely 5,3 pH-érték mellett 50 °C-on tönkölyzab-xilánból percenként 1 mikromol (xilóz-ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
(3) 1 U az az enzimmennyiség, amely 7,5 pH-érték mellett 40 °C-on kazein szubsztrátból percenként 1 mikromol (tirozin-ekvivalens) fenolvegyületet szabadít fel.
(4) 1 U az az enzimmennyiség, amely 5,0 pH-érték mellett 30 °C-on árpa béta-glükánból percenként 1 mikromol (glükóz-ekvivalens) redukálócukrot szabadít fel.
(5) 1 U az az enzimmennyiség, ami 6,5 pH-érték mellett 37 °C-on vízben nem oldható keresztkötésű keményítő polimer szubsztrátból percenként 1 mikromol glikozidkötést szabadít fel.
(6) 1 U az az enzimmennyiség, ami 5,0 pH-érték mellett 40 °C-on poli-D-galakturon szubsztrátból percenként 1 mikromol (galakturonsav-ekvivalens) redukálóanyagot szabadít fel.