Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2036/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl nuolatinių leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamus tam tikrus pašarų priedus nauja paskirtimi

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 328, 2005 12 15, p. 13)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1018/2012	L 307	56	2012 11 7
►M2	2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1206/2012	L 347	12	2012 12 15
►M3	2017 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/961	L 145	7	2017 6 8
►M4	2017 m. birželio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1145	L 166	1	2017 6 29
►M5	2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2299	L 329	33	2017 12 13

▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2036/2005

2005 m. gruodžio 14 d.

dėl nuolatinių leidimų naudoti tam tikrus pašarų priedus ir dėl laikino leidimo naudoti jau leidžiamus tam tikrus pašarų priedus nauja paskirtimi

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

I priede nurodomus preparatus, priklausančius mikroorganizmų grupei, leidžiama neribotą laiką naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

▼M4

———————

▼B

3 straipsnis

III priede nurodomus preparatus, priklausančius fermentų grupei, leidžiama ketverius metus naudoti kaip priedus gyvūnų mityboje tame priede numatytomis sąlygomis.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼B

I PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Kolonijas sudarančio vieneto (KSV)/kg visaverčio parašo			
Mikroorganizmai								
E 1703	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	*Saccharomyces cerevisiae* preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip: 2×10^{10} KSV/g priedo	Paršavedės	—	1×10^{9}	►M1 — ◄	Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.	Neribotam laikui
▼M5 —								
▼M3 —								

▼M4

———

▼B

III PRIEDAS

EB Nr. ar Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro			
Fermentai								
▼M2 ———								
▼B 37	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8 Subtilizinas EC 3.4.21.62	Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), ir subtilizino, gauto iš *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,4-beta-ksilanazė: 5 000 U ([2])/g Subtilizinas: 1 600 U ([3])/g	Antys	—	Endo-1,4-beta-ksilanazė: 2 500 U Subtilizinas: 800 U	— —	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: Endo-1,4-beta-ksilanazė: 2 500 U Subtilizinas: 800 U. 3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 65 % kviečių.	2010 1 4
59	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė EC 3.2.1.6 Subtilizinas EC 3.4.21.62 Alfa-amilazė EC 3.2.1.1 Poligalakturonazė EC 3.2.1.15	Endo-1,4-beta-ksilanazės, gautos iš *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-gliukanazės ir alfa-amilazės, gautos iš *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), subtilizino, gauto iš *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), poligalakturonazės, gautos iš *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), preparatas, kurio mažiausias aktyvumas: Endo-1,4-beta-ksilanazė: 300 U ([2])/g Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 150 U ([4])/g Subtilizinas: 4 000 U ([3])/g Alfa-amilazė: 400 U ([5])/g Poligalakturonazė: 25 U ([6])/g	Antys	—	Endo-1,4-beta-ksilanazė: 300 U Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 150 U Subtilizinas: 4 000 U Alfa-amilazė: 400 U Poligalakturonazė: 25 U	— — — — —	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: Endo-1,4-beta-ksilanazė: 300 U Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 150 U Subtilizinas: 4 000 U Alfa-amilazė: 400 U Poligalakturonazė: 25 U. 3. Naudoti kombinuotuose pašaruose, turinčiuose daug krakmolo ir nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kukurūzų.	2010 1 4

▼B

EB Nr. ar Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašymas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
					Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro			
			Vištos dedeklės	—	Endo-1,4-beta-ksilanazė: 225 U	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.	2010 1 4
					Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 112 U	—	2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:	
					Subtilizinas: 3 000 U	—	Endo-1,4-beta-ksilanazė: 225 U	
					Alfa-amilazė: 300 U	—	Endo-1,3(4)-beta-gliukanazė: 112 U	
					Poligalakturonazė: 18 U	—	Subtilizinas: 3 000 U	
							Alfa-amilazė: 300 U	
							Poligalakturonazė: 18 U.	
							3. Naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, turinčiuose daug krakmolo ir nekrakmolingų polisacharidų (ypač beta-gliukanų ir arabinoksilanų), pvz., tuose, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 40 % kukurūzų.	

►M2 ——————— ◄

([2]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę iš avižų speltos ksilano, esant 5,3 pH ir 50 °C temperatūrai.

([3]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikrogramą fenolio junginio (tirozino ekvivalentai) per minutę iš kazeino substrato, esant 7,5 pH ir 40 °C temperatūrai.

([4]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš miežių beta-gliukano, esant 5,0 pH ir 30 °C temperatūrai.

([5]) 1 U – tai fermento kiekis, hidrolizuojantis 1 mikromolį gliukozidų junginių iš vandenyje netirpaus tinklinės struktūros krakmolo polimero substrato per minutę, esant 6,5 pH ir 37 °C temperatūrai.

([6]) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį redukuojančių medžiagų (galakturono rūgšties ekvivalentai) per minutę iš poli D-galakturono substrato, esant 5,0 pH ir 40 °C temperatūrai.