Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2036/2005

av den 14 december 2005

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för några redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 328, 15.12.2005, s. 13)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1018/2012 av den 5 november 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1206/2012 av den 14 december 2012	L 347	12	15.12.2012
►M3	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/961 av den 7 juni 2017	L 145	7	8.6.2017
►M4	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1145 av den 8 juni 2017	L 166	1	29.6.2017
►M5	Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2299 av den 12 december 2017	L 329	33	13.12.2017

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2036/2005

av den 14 december 2005

om permanent godkännande av vissa fodertillsatser och om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för några redan godkända fodertillsatser

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Preparaten av typen mikroorganismer enligt specifikationen i bilaga I skall godkännas utan tidsbegränsning för användning som fodertillsatser på de villkor som anges i den bilagan.

▼M4

———————

▼B

Artikel 3

Preparaten av typen enzymer enligt specifikationen i bilaga III skall godkännas för fyra år för användning som fodertillsatser på de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA I

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
Mikroorganismer								
E 1703	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	Preparat av *Saccharomyces cerevisiae* som innehåller minst 2×10^{10} CFU/g tillsats	Suggor	—	1×10^{9}	►M1 — ◄	Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering.	Utan tidsbegränsning
▼M5 —								
▼M3 —								

▼M4

▼B

BILAGA III

EG-nr eller nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					Aktivitet/kg helfoder			
Enzymer								
▼M2 ———								
▼B 37	Endo-1,4-betaxylanas EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) och subtilisin framställt av *Bacillus subtilis* (ATCC 2107). Minsta aktivitet: Endo-1,4-beta-xylanas: 5 000 U ([2])/g Subtilisin: 1 600 U ([3])/g	Ankor	—	Endo-1,4-beta-xylanas: 2 500 U Subtilisin: 800 U	— —	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. 2. Rekommenderad dos per kg helfoder: Endo-1,4-beta-xylanas: 2 500 U Subtilisin: 800 U. 3. För användning i foderblandningar som innehåller mer än 65 % vete.	4.1.2010
59	Endo-1,4-beta-xylanas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glukanas EC 3.2.1.6 Subtilisin EC 3.4.21.62 Alfa-amylas EC 3.2.1.1 Polygalakturonas EC 3.2.1.15	Preparat av endo-1,4-beta-xylanas framställt av *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glukanas och alfa-amylas framställt av *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), subtilisin framställt av *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), polygalakturonas framställt av *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94). Minsta aktivitet: Endo-1,4-beta-xylanas: 300 U ([2])/g Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 150 U ([4])/g Subtilisin: 4 000 U ([3])/g Alfa-amylas: 400 U ([5])/g Polygalakturonas: 25 U ([6])/g	Ankor	—	Endo-1,4-beta-xylanas: 300 U Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 150 U Subtilisin: 4 000 U Alfa-amylas: 400 U Polygalakturonas: 25 U	— — — — —	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. 2. Rekommenderad dos per kg helfoder: Endo-1,4-beta-xylanas: 300 U Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 150 U Subtilisin: 4 000 U Alfa-amylas: 400 U Polygalakturonas: 25 U. 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner och beta-glukaner), t.ex. blandningar som innehåller mer än 40 % majs.	4.1.2010

▼B

EG-nr eller nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					Aktivitet/kg helfoder			
			Värphöns	—	Endo-1,4-beta-xylanas: 225 U Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 112 U Subtilisin: 3 000 U Alfa-amylas: 300 U Polygalakturonas: 18 U	— — — — —	1. Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering. 2. Rekommenderad dos per kg helfoder: Endo-1,4-beta-xylanas: 225 U Endo-1,3(4)-beta-glukanas: 112 U Subtilisin: 3 000 U Alfa-amylas: 300 U Polygalakturonas: 18 U. 3. För användning i foderblandningar med höga halter av icke-stärkelse-polysackarider (huvudsakligen arabinoxylaner och beta-glukaner), t.ex. blandningar som innehåller mer än 40 % majs.	4.1.2010

►M2 ——————— ◄

([2]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (xylosekvivalenter) per minut från havrespeltxylan vid pH 5,3 och 50 °C.
([3]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikrogram fenolförening (tyrosinekvivalenter) per minut från kaseinsubstrat vid pH 7,5 och 40 °C.
([4]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande sockerarter (glukosekvivalenter) per minut från korn-beta-glukan vid pH 5,0 och 30 °C.
([5]) 1 U motsvarar den mängd enzym som hydrolyserar 1 mikromol glukosidbindningar per minut från icke-vattenlösliga tvärbundna stärkelse-polymersubstrat vid pH 6,5 och 37 °C.
([6]) 1 U motsvarar den mängd enzym som frigör 1 mikromol reducerande material (galakturonsyraekvivalenter) per minut från ett poly-D-galakturonsubstrat vid pH 5,0 och 40 °C.