**Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ**

►B

# РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2036/2005 НА КОМИСИЯТА

**от 14 декември 2005 година**

**относно безсрочно разрешаване употребата на някои добавки в храните за животни и временното разрешаване на нов вид употреба на някои добавки, чиято употреба в храните за животни вече е разрешена**

**(текст от значение за ЕИП)**

(ОВ L 328, 15.12.2005 г., стр. 13)

Изменен със:

| | | Официален вестник | | |
|---|---|---|---|---|
| | | № | страница | дата |
| ►M1 | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1018/2012 на Комисията от 5 ноември 2012 година | L 307 | 56 | 7.11.2012 г. |
| ►M2 | Регламент за изпълнение (ЕС) № 1206/2012 на Комисията от 14 декември 2012 година | L 347 | 12 | 15.12.2012 г. |
| ►M3 | Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/961 на Комисията от 7 юни 2017 година | L 145 | 7 | 8.6.2017 г. |
| ►M4 | Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1145 на Комисията от 8 юни 2017 година | L 166 | 1 | 29.6.2017 г. |
| ►M5 | Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2299 на Комисията от 12 декември 2017 година | L 329 | 33 | 13.12.2017 г. |

▼B

# РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2036/2005 НА КОМИСИЯТА

**от 14 декември 2005 година**

**относно безсрочно разрешаване употребата на някои добавки в храните за животни и временното разрешаване на нов вид употреба на някои добавки, чиято употреба в храните за животни вече е разрешена**

**(текст от значение за ЕИП)**

*Член 1*

Разрешава се употребата като добавка при храненето на животни на препаратите от групата „Микроорганизми“, така както те са специфицирани в приложение I, без ограничение във времето и при условията, определени в това приложение.

▼M4

———————

▼B

*Член 3*

Разрешава се употребата като добавка при храненето на животни на препаратите от групата „Ензими“, така както те са специфицирани в приложение III, за срок от четири години и при условията, определени в това приложение.

*Член 4*

Настоящият регламент влиза в сила на 20-тия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼B

*ПРИЛОЖЕНИЕ I*

| № на ЕО | Добавка | Химическа формула, описание | Вид или категория животни | Максимална възраст | Минимално съдържание | Максимално съдържание | Други условия | Край на срока на разрешителното |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | CFU/kg готова храна за животни | | | |
| **Микроорганизми** | | | | | | | | |
| E 1702 | *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 | Препарат от *Saccharomyces cerevisiae* със съдържание на минимум:<br>2 x $10^{10}$ CFU/g добавка | Свине майки | — | $1 \times 10^9$ | ►M1 — ◄ | В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране. | Без ограничение във времето |
| ▼M5 — | | | | | | | | |
| ▼M3 — | | | | | | | | |

▼M4

———

▼B

*ПРИЛОЖЕНИЕ III*

| № на ЕО или № | Добавка | Химическа формула, описание | Вид или категория животни | Максимална възраст | Минимално съдържание | Максимално съдържание | Други условия | Край на срока на разрешителното |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Единици активност/kg готова храна за животни | | | |
| **Ензими** | | | | | | | | |
| ▼M2 ——— | | | | | | | | |
| ▼B 37 | Ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8<br>Субтилизин EC 3.4.21.62 | Препарат от ендо-1,4-бета- ксиланаза, получаван от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), и субтилизин, получаван от *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) с минимално действие от:<br>Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 5 000 U/g (2)<br>Субтилизин: 1 600 U/g (3) | Патици | — | Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 2 500 U<br>г. Субтилизин: 800 U | —<br>— | 1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.<br>2. Препоръчвана дозировка на kg готова храна за животни:<br>ендо-1,4-бета-ксиланаза: 2 500 U<br>Субтилизин: 800 U.<br>3. За употреба в хранителни смески напр. със съдържание на над 65 % пшеница. | 4.1.2010 |
| 59 | Ендо-1,4-бета-ксиланаза EC 3.2.1.8<br>Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза EC 3.2.1.6<br>Субтилизин EC 3.4.21.62<br>Алфа-амилаза EC 3.2.1.1<br>Полигалактуроназа EC 3.2.1.15 | Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза получен от *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), ендо-1,3(4)-бета-глюканаза и алфа-амилаза, получен от *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), субтилизин получен от *Bacillus Subtilis* (ATCC 2107) и полигалактуроназа, получен от *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), чиято минимална активност е:<br>ендо-1,4-бета-ксиланаза: 300 U/g (2)<br>ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 150 U/g (4)<br>Субтилизин: 4 000 U/g (3)<br>Алфа-амилаза: 400 U/g (5)<br>Полигалактуроназа: 25 U/g (6) | Патици | — | Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 300 U<br>Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 150 U<br>Субтилизин: 4 000 U<br>Алфа-амилаза: 400 U<br>Полигалактуроназа: 25 U | —<br>—<br>—<br>—<br>— | 1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.<br>2. Препоръчителна доза за kg готова храна:<br>Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 300 U<br>Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 150 U<br>Субтилизин: 4 000 U<br>Алфа-амилаза: 400 U<br>Полигалактуроназа: 25 U<br>3. За употреба в хранителни смески, богати на съдържащи и несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно арабиноксилани и бета глюкани), напр. съдържащи над 40 % царевица. | 4.1.2010 г. |

▼B

| № на ЕО или № | Добавка | Химическа формула, описание | Вид или категория животни | Максимална възраст | Минимално съдържание | Максимално съдържание | Други условия | Край на срока на разрешителното |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Единици активност/kg готова храна за животни | | | |
| | | | Кокошки носачки | — | Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 225U<br>Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 112U<br>Субтилизин: 3 000 U<br>Алфа-амилаза: 300 U<br>Полигалактуроназа: 18 U | —<br>—<br>—<br>—<br>— | 1. В указанията за употреба на добавката и предварителната смес да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при пелетизиране.<br>2. Препоръчителна доза за kg готова храна:<br>Ендо-1,4-бета-ксиланаза: 225 U<br>Ендо-1,3(4)-бета-глюканаза: 112 U<br>Субтилизин: 3 000 U<br>Алфа-амилаза: 300 U<br>Полигалактуроназа: 18 U.<br>3. За употреба в хранителни смески, богати на съдържащи и несъдържащи скорбяла полизахариди (предимно арабиноксилани и бета глюкани), напр. съдържащи над 40 % царевица. | 4.1.2010 г. |

►M2 ——————— ◄

([2]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуцирани захари (ксилозни еквиваленти) от ксилан от овесена шпелта на минута, при pH 5,3 и при 50 °C.
([3]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микрограм фенолно съединение (тирозинови еквиваленти) от казеинова подложка на минута при pH 7,5 и при 40 °C.
([4]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1микромол редуциращи захари (глюкозни еквиваленти) от ечемичен бета-глюкан на минута при pH 5,0 и при 30 °C.
([5]) 1 U е количеството ензим, което хидролизира 1 микромол глюкозидни връзки от неразтворима във вода подложка от полимер на скорбяла с напречни връзки, на минута при pH 6,5 и при 37 °C.
([6]) 1 U е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуциращ материал (еквиваленти на галактуронова киселина) от поли-D-галактуронова подложка на минута при pH 5,0 и при 40 °C.