Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►**B**

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2036/2005,

14. detsember 2005,

teatavatele söödalisanditele alalise kasutusloa andmise ja lubatud söödalisandite uue kasutusviisi ajutise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 328, 15.12.2005, lk 13)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►**M1**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1018/2012, 5. november 2012	L 307	56	7.11.2012
►**M2**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1206/2012, 14. detsember 2012	L 347	12	15.12.2012
►**M3**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/961, 7. juuni 2017	L 145	7	8.6.2017
►**M4**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/1145, 8. juuni 2017	L 166	1	29.6.2017
►**M5**	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/2299, 12. detsember 2017	L 329	33	13.12.2017

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2036/2005,

14. detsember 2005,

teatavatele söödalisanditele alalise kasutusloa andmise ja lubatud söödalisandite uue kasutusviisi ajutise lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Mikroorganismide rühma kuuluvaid I lisas nimetatud preparaate on lubatud tähtajatult kasutada söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

▼M4

———————

▼B

Artikkel 3

Ensüümide rühma kuuluvaid III lisas nimetatud preparaate on lubatud ajutiselt nelja-aastase tähtajaga kasutada söödalisandina kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

I LISA

EÜ nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Minimaalne sisaldus	Maksimaalne sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid (CFU) täissööda kilogrammi kohta			
Mikroorganismid								
E 1703	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	*Saccharomyces cerevisiae* preparaat, mis sisaldab vähemalt 2×10^{10} CFU/söödalisandi g	Emised	—	1×10^{9}	►M1 — ◄	Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja püsivus granuleerimisel.	Tähtajatu
▼M5 —								
▼M3 —								

▼M4

———

EÜ nr või nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Minimaalne sisaldus	Maksimaalne sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kg kohta			
Ensüümid								
▼M2 ———								
▼B 37	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Subtilisiin EC 3.4.21.62	*Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 2105) abil toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi- ja *Bacillus subtilis*'e (ATCC 2107) abil toodetud subtilisiinipreparaat minimaalse aktiivsusega: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 5 000 U ([2])/g subtilisiin: 1 600 U ([3])/g	Pardid	—	endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 500 U subtilisiin: 800 U	— —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja püsivus granuleerimisel. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 2 500 U subtilisiin: 800 U. 3. Kasutamiseks segajõusöödas, mis sisaldab näiteks üle 65 % nisu.	4.1.2010
59	Endo-1,4-beeta-ksülanaas EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beeta-glükanaas EC 3.2.1.6 Subtilisiin EC 3.4.21.62 Alfa-amülaas EC 3.2.1.1 Polügalakturonaas EC 3.2.1.15	*Trichoderma longibrachiatum*'i (ATCC 2105) abil toodetud endo-1,4-beeta-ksülanaasi, *Bacillus amyloliquefaciens*'i (DSM 9553) abil toodetud endo-1,3(4)-beeta-glükanaasi ja alfa-amülaasi, *Bacillus subtilis*'e (ATCC 2107) abil toodetud subtilisiini, *Aspergillus aculeatus*'e (CBS 589.94) abil toodetud polügalakturonaasi preparaat minimaalse aktiivsusega: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U ([2])/g endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U ([4])/g subtilisiin: 4 000 U ([3])/g alfa-amülaas: 400 U ([5])/g polügalakturonaas: 25 U ([6])/g	Pardid	—	endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U subtilisiin: 4 000 U alfa-amülaas: 400 U polügalakturonaas: 25 U	— — — — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja püsivus granuleerimisel. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 300 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 150 U subtilisiin: 4 000 U alfa-amülaas: 400 U polügalakturonaas: 25 U. 3. Kasutamiseks segajõusöödas, milles on rohkesti tärklis- ja muid polüsahhariide (peamiselt arabinoksülaane ja beeta-glükaane), nt jõusööt, mis sisaldab üle 40 % maisi.	4.1.2010

▼B

EÜ nr või nr	Söödalisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Minimaalne sisaldus	Maksimaalne sisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
					Aktiivsuse ühikuid täissööda kg kohta			
			Munakanad	—	endo-1,4-beeta-ksülanaas: 225 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 112 U subtilisiin: 3 000 U alfa-amülaas: 300 U polügalakturonaas: 18 U	— — — — —	1. Söödalisandi ja eelsegu kasutamisjuhistes tuleb märkida säilitustemperatuur, kõlblikkusaeg ja püsivus granuleerimisel. 2. Soovituslik doos ühe kilogrammi täissööda kohta: endo-1,4-beeta-ksülanaas: 225 U endo-1,3(4)-beeta-glükanaas: 112 U subtilisiin: 3 000 U alfa-amülaas: 300 U polügalakturonaas: 18 U. 3. Kasutamiseks segajõusöödas, milles on rohkesti tärklis- ja muid polüsahhariide (peamiselt arabinoksülaane ja beeta-glükaane), nt jõusööt, mis sisaldab üle 40 % maisi.	4.1.2010

►M2 ——————— ◄

([2]) 1 U on ensüümikogus, mis pH väärtusel 5,3 ja temperatuuril 50 °C vabastab kaera/speltanisu ksülaanist 1 mikromooli taandavaid suhkruid (ksüloosiekvivalente) minutis.
([3]) 1 U on ensüümikogus, mis pH väärtusel 7,5 ja temperatuuril 40 °C vabastab kaseiinsubstraadist 1 mikrogrammi fenooliühendit (türosiiniekvivalenti) minutis.
([4]) 1 U on ensüümikogus, mis pH väärtusel 5,0 ja temperatuuril 30 °C vabastab odra beeta-glükaanist 1 mikromooli redutseerivaid suhkruid (glükoosiekvivalente) minutis.
([5]) 1 U on ensüümikogus, mis pH väärtusel 6,5 ja temperatuuril 37 °C hüdrolüüsib vees lahustumatust võrkstruktuuriga tärklispolümeersubstraadist 1 mikromooli glükosiidsidemeid minutis.
([6]) 1 U on ensüümikogus, mis pH väärtusel 5,0 ja temperatuuril 40 °C vabastab polü-D-galakturoonsubstraadist 1 mikromooli taandavat ainet (galakturoonhappeekvivalenti) minutis.