Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 2036/2005 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2005

tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding en een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van al toegelaten toevoegingsmiddelen in de diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 328 van 15.12.2005, blz. 13)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►M1	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1018/2012 van de Commissie van 5 november 2012	L 307	56	7.11.2012
►M2	Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1206/2012 van de Commissie van 14 december 2012	L 347	12	15.12.2012
►M3	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/961 van de Commissie van 7 juni 2017	L 145	7	8.6.2017
►M4	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1145 van de Commissie van 8 juni 2017	L 166	1	29.6.2017
►M5	Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2299 van de Commissie van 12 december 2017	L 329	33	13.12.2017

▼B

VERORDENING (EG) Nr. 2036/2005 VAN DE COMMISSIE

van 14 december 2005

tot verlening van een permanente vergunning voor bepaalde toevoegingsmiddelen in de diervoeding en een voorlopige vergunning voor een nieuwe toepassing van al toegelaten toevoegingsmiddelen in de diervoeding

(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1

Voor de tot de groep „Micro-organismen” behorende preparaten die in bijlage I worden vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning zonder tijdsbeperking voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

▼M4

———————

▼B

Artikel 3

Voor de tot de groep „Enzymen” behorende preparaten die in bijlage III worden vermeld, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor vier jaar voor gebruik als toevoegingsmiddel in de diervoeding verleend.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE I

EG-nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of -categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					CFU/kg volledig diervoeder			
Micro-organismen								
E 1703	*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079	Bereiding van *Saccharomyces cerevisiae* met ten minste 2×10^{10} CFU/g toevoegingsmiddel	Zeugen	—	1×10^{9}	►**M1** —— ◄	In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de houdbaarheid en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden.	Zonder tijdsbeperking
▼**M5** ——								
▼**M3** ——								

▼**M4**

———

▼B

BIJLAGE III

EG-nr. of nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					Aantal activiteitseenheden/kg volledig diervoeder			
Enzymen								
▼M2 ———								
▼B								
37	Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 Subtilisine EC 3.4.21.62	Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), en subtilisine, geproduceerd door *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), met een minimale activiteit van: endo-1,4-bèta-xylanase: 5 000 U/g ([2]) subtilisine: 1 600 U/g ([3])	Eenden	—	endo-1,4-bèta-xylanase: 2 500 U subtilisine: 800 U	— —	1. In de gebruiksaanwijzing van het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de maximale opslagduur en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,4-bèta-xylanase: 2 500 U subtilisine: 800 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders die bv. meer dan 65 % tarwe bevatten.	4.1.2010
59	Endo-1,4-bèta-xylanase EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-bèta-glucanase EC 3.2.1.6 Subtilisine EC 3.4.21.62 Alfa-amylase EC 3.2.1.1 Polygalacturonase EC 3.2.1.15	Bereiding van endo-1,4-bèta-xylanase, geproduceerd door *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), endo-1,3(4)-bèta-glucanase en alfa-amylase, geproduceerd door *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), subtilisine, geproduceerd door *Bacillus subtilis* (ATCC 2107), en polygalacturonase, geproduceerd door *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), met een minimale activiteit van: endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U/g ([2]) endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 150 U/g ([4]) subtilisine: 4 000 U/g ([3]) alfa-amylase: 400 U/g ([5]) polygalacturonase: 25 U/g ([6])	Eenden	—	endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 150 U subtilisine: 4 000 U alfa-amylase: 400 U polygalacturonase: 25 U	— — — — —	1. In de gebruiksaanwijzing van het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de maximale opslagduur en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,4-bèta-xylanase: 300 U endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 150 U subtilisine: 4 000 U alfa-amylase: 400 U polygalacturonase: 25 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan zetmeel en niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen en bèta-glucanen), bv. voeders die meer dan 40 % maïs bevatten.	4.1.2010

▼B

EG-nr. of nr.	Toevoegingsmiddel	Chemische formule, beschrijving	Diersoort of categorie	Maximum-leeftijd	Minimum	Maximum	Overige bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
					Aantal activiteitseenheden/kg volledig diervoeder			
			Legkippen	—	endo-1,4-bèta-xylanase: 225 U endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 112 U subtilisine: 3 000 U alfa-amylase: 300 U polygalacturonase: 18 U	—	1. In de gebruiksaanwijzing van het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur, de maximale opslagduur en de stabiliteit bij verwerking tot pellets vermelden. 2. Aanbevolen dosis per kg volledig diervoeder: endo-1,4-bèta-xylanase: 225 U endo-1,3(4)-bèta-glucanase: 112 U subtilisine: 3 000 U alfa-amylase: 300 U polygalacturonase: 18 U. 3. Voor gebruik in mengvoeders die rijk zijn aan zetmeel en niet-zetmeelpolysachariden (vooral arabinoxylanen en bèta-glucanen), bv. voeders die meer dan 40 % maïs bevatten.	4.1.2010

►M2 ——————— ◄

([2]) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,3 en een temperatuur van 50 °C 1 micromol reducerende suikers (xylose-equivalent) per minuut vrijmaakt uit xylaan van haverkaf.
([3]) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 7,5 en een temperatuur van 40 °C 1 microgram fenolverbinding (tyrosine-equivalent) per minuut vrijmaakt uit caseïnesubstraat.
([4]) U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 30 °C 1 micromol reducerende suikers (glucose-equivalent) uit bèta-glucaan van gerst.
([5]) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 6,5 en een temperatuur van 37 °C 1 micromol glucosidebindingen per minuut hydrolyseert uit in water onoplosbaar vernet zetmeelpolymeersubstraat.
([6]) 1 U is de hoeveelheid enzym die bij een pH van 5,0 en een temperatuur van 40 °C 1 micromol reducerend materiaal (galacturonzuur-equivalent) per minuut vrijmaakt uit poly-D-galacturonsubstraat.