# KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1206/2005

## (2005. gada 27. jūlijs)

## par pastāvīgu atļauju izmantot noteiktas piedevas dzīvnieku barībā

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1] un jo īpaši tās 3. pantu un 9.d panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām [2], jo īpaši tās 25. pantu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 paredzētas atļaujas piedevu izmantošanai dzīvnieku ēdināšanā.

(2) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 25. pantā noteikti pārejas posma pasākumi lopbarības piedevu atļauju pieteikumiem, kas iesniegti saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas.

(3) Atļaujas pieteikumi piedevām, kas uzskaitītas šās Regulas pielikumos, tika iesniegti pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 stāšanās spēkā.

(4) Sākotnējās piezīmes par šiem pieteikumiem saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. panta 4. punktu Komisijai tika iesniegtas pirms Regulas (EK) Nr. 1831/2003 piemērošanas dienas. Tādējādi minētie pieteikumi jāizskata saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 4. pantu.

(5) Ar Komisijas (EK) Regulu Nr. 937/2001 [3] pirmo reizi provizoriski atļāva izmantot no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252) iegūto fermentu preparātu endo-1,4-beta-glikanāze, endo-1,3(4)-beta-glikanāze un endo-1,4-beta-ksilanāze gaļas tītaru barošanā. Pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētajam fermentu preparātam, iesniedza jaunus datus. To novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Minētos fermentu preparātus, kas noteikti pielikumā, attiecīgi ir jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(6) Ar Komisijas (EK) Regulu Nr. 418/2001 [4] pirmo reizi provizoriski atļāva izmantot no *Penicillium funiculosum* (IMI SD101) iegūto fermentu preparātu endo-1,3(4)-beta-glikanāze un endo-1,4-beta-ksilanāze nobarojamas cūkas barošanā. Pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētajam fermentu preparātam, iesniedza jaunus datus. To novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Minētos fermentu preparātus, kas noteikti pielikumā, attiecīgi ir jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(7) Ar Komisijas (EK) Regulu Nr. 937/2001 pirmo reizi provizoriski atļāva izmantot no *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) iegūto fermentu preparātu endo-1,4-beta-ksilanāze sivēnu barošanā. Pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minētajam fermentu preparātam, iesniedza jaunus datus. To novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Minētos fermentu preparātus, kas noteikti pielikumā, attiecīgi ir jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

(8) Noteiktu fermentu preparātu – no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes, no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) iegūta subtilizīna – izmantošanas pagaidu atļauju attiecībā uz gaļas cāļiem pirmoreiz piešķīra ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1636/1999 [5]. Pamatojot pieteikumu par beztermiņa atļaujas piešķiršanu minēto fermentu preparātu izmantojumam, iesniedza jaunus datus. To novērtējums liecina, ka Direktīvas 70/524/EEK 3.a pantā paredzētie šādas atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir ievēroti. Minētos fermentu preparātus, kas noteikti pielikumā, attiecīgi ir jāatļauj izmantot bez termiņa ierobežojuma.

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1800/2004 (OV L 317, 16.10.2004., 37. lpp.).
[2] OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).
[3] OV L 130, 12.5.2001., 25. lpp.
[4] OV L 62, 2.3.2001., 3. lpp.
[5] OV L 194, 27.7.1999., 17. lpp.

(9) Minēto pieteikumu novērtējums liecina par to, ka ir vajadzīgas konkrētas procedūras, lai pasargātu darbiniekus no pielikumos norādīto piedevu iedarbības. Šāda aizsardzība jānodrošina, piemērojot Padomes 1989. gada 12. jūnija Direktīvu 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā [1].

(10) Regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Pielikumā minētos preparātus, kas pieder grupai "Fermenti", atļauts izmantot bez termiņa ierobežojuma kā piedevu dzīvnieku barībā atbilstīgi šajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 27. jūlijā

*Komisijas vārdā —*
*Komisijas locekle*
Neelie KROES

[1] OV L 183, 29.6.1989., 1. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

*PIELIKUMS*

| EK Nr. | Piedeva | Ķīmiskā formula, apraksts | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktīvās vienības uz 1 kg kompleksās barības | | | |
| **Fermenti** | | | | | | | | |
| E 1602 | Endo-1,4-beta-glikanāze<br>EC 3.2.1.4<br>Endo-1,3(4)-beta-glikanāze<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-beta-ksilanāze<br>EC 3.2.1.8 | Preparāts no endo-1,4-beta-glikanāzes, endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes, kas iegūtas no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 74 252), ar šādu minimālo aktivitāti:<br>Šķidrā un granulu veidā:<br>endo-1,4-beta-glikanāze:<br>8 000 U (1)/ml vai g<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze:<br>18 000 U (2)/ml vai g<br>endo-1,4-beta-ksilanāze:<br>26 000 U (3)/ml vai g | Gaļas tītari | — | endo-1,4-beta-glikanāze: 400 U<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900 U<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300 U | —<br>—<br>— | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas<br>2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības<br>endo-1,4-beta-glikanāze: 400–800 U<br>Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 900–1 800 U<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 300–2 600 U<br>3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne-cietes polisaharīdiem (galvenokārt arabinoksilāniem un beta-glukāniem), piemēram, kas satur vairāk nekā 25 % kviešu vai 20 % miežu un 5 % rudzu | Beztermiņa |
| E 1604 | Endo-1,3(4)-beta-glikanāze<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-beta-ksilanāze<br>EC 3.2.1.8 | Preparāts endo-1,3(4)-beta-glikanāze un endo-1,4-beta-ksilanāze, kas iegūtas no *Penicillium funiculosum* (IMI SD101), ar šādu minimālo aktivitāti:<br>pulverveidā:<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze:<br>2 000 U (4)/g<br>endo-1,4-beta-ksilanāze:<br>1 400 U (5)/g<br>Šķidrā veidā:<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze:<br>500 U/ml<br>endo-1,4-beta-ksilanāze:<br>350 U/ml | Nobarojamas cūkas | — | endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U | —<br>— | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas<br>2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības:<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U<br>3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar ne-cietes polisaharīdiem (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 40 % miežu vai 20 % kviešu | Beztermiņa |

| EK Nr. | Piedeva | Ķīmiskā formula, apraksts | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Aktīvās vienības uz 1 kg kompleksās barības | | | |
| E 1606 | Endo-1,4-beta-ksilanāze<br>EC 3.2.1.8 | Preparāts endo-1,4-beta-ksilanāze, kas iegūts no *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) ar minimālo aktivitāti:<br>Cietā un šķidrā veidā:<br>100 IU (6)/g vai ml | Sivēni (atšķirtie) | — | 10 IU | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas<br>2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības:<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 10 IU<br>3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar arabinoksilāniem un kas satur, piemēram, minimums 40 % kviešu vai miežu<br>4. Izmantošanai barībā, kas paredzēta atšķirtiem sivēniem līdz apmēram 35 kg | Beztermiņa |
| E 1633 | Endo-1,3(4)-beta-glikanāze<br>EC 3.2.1.6<br>Endo-1,4-beta-ksilanāze<br>EC 3.2.1.8<br>Subtilizīns<br>EC 3.4.21.62 | Preparāts endo-1,3(4)-beta-glikanāze, kas iegūts no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-ksilanāze, kas iegūts no *Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105) un subtilizīns, kas iegūts no *Bacillus subtilis* (ATCC 2107) ar šādu minimālo aktivitāti:<br>Cietā veidā:<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U (7)/g<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 300 U (8)/g<br>subtilizīns: 800 U (9)/g | Gaļas cāļi | — | endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 30 U<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 90 U<br>subtilizīns: 240 U | —<br>—<br>— | 1. Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas<br>2. Ieteicamā deva uz 1 kg kompleksās barības:<br>endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 30–100 U<br>endo-1,4-beta-ksilanāze: 90–300 U<br>subtilizīns: 240–800 U<br>3. Izmantošanai barības maisījumā, piemēram, kas satur vairāk par 60 % miežu. | Beztermiņa |

(1) 1 U ir fermenta daudzums, kas pH 5,0 vidē un 40 °C temperatūrā vienā minūtē no karboksimetilcelulozes atbrīvo 0,1 mikromolu glikozes.
(2) 1 U ir fermenta daudzums, kas pH 5,0 vidē un 40 °C temperatūrā vienā minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 0,1 mikromolu glikozes.
(3) 1 U ir fermenta daudzums, kas pH 5,0 vidē un 40 °C temperatūrā vienā minūtē no auzu pelavu ksilāna atbrīvo 0,1 mikromolu glikozes.
(4) 1 U ir fermenta daudzums, kas pH 5,0 vidē un 50 °C temperatūrā vienā minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 5,55 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalentus).
(5) 1 U ir fermenta daudzums, kas pH 5,5 vidē un 50 °C temperatūrā vienā minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 4,00 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalentus).
(6) 1 IU ir fermenta daudzums, kas pH 4,5 vidē un 30 °C temperatūrā vienā minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentus).
(7) 1 U ir fermenta daudzums, kas pH 5,0 vidē un 30 °C temperatūrā vienā minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalenti).
(8) 1 U ir fermenta daudzums, kas pH 5,3 vidē un 50 °C temperatūrā vienā minūtē no auzu pelavu ksilāna atbrīvo 1 mikromolu reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalenti).
(9) 1 U ir fermenta daudzums, kas pH 7,5 vidē un 40 °C temperatūrā vienā minūtē no kazeīna substrāta atbrīvo 1 mikrogramu fenola savienojumu (tirozīna ekvivalenti).