a) *Prezzi indicativi :*

	unità di conto per 1.000 kg
Grano tenero	106,25
Segala	97,50
Orzo	94,44
Granturco	94,94
Grano duro	125,00

b) *Prezzi d'intervento di base :*

	unità di conto per 1.000 kg
Grano tenero	98,75
Segala	91,00
Orzo	87,98
Grano duro	117,50

c) *Prezzo minimo garantito del grano duro :* 145 unità di conto per 1.000 kg.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 14 novembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

REGOLAMENTO N. 865/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1967

che fissa le qualità tipo del grano tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del grano duro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1) e in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (2),

Considerando che i prezzi comuni del grano tenero, della segala, dell'orzo, del granturco e del grano duro devono essere fissati per qualità tipo determinate ; che è opportuno che queste ultime corrispondano il piú possibile alle qualità medie dei cereali raccolti nella Comunità ;

Considerando che a tal fine si possono prendere in considerazione, per i prezzi indicativi e i prezzi d'intervento, le qualità tipo fissate dal regolamento n. 129/67/CEE (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo e i prezzi d'intervento del grano tenero è definita come segue :

a) Grano tenero sano, leale e mercantile, privo di odore, di colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media del grano tenero raccolto nella Comunità in condizioni normali ;

b) Tenore di umidità : 16 % ;

c) Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui

— percentuale delle impurità relative ai chicchi : 1,5 % (per impurità relative ai chicchi s'intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi che presentano colorazioni del germe o chicchi volpati) ;

— percentuale delle altre impurità (Schwarzbesatz) : 0,5 % (per altre impurità s'intendono i semi estranei, la segala cornuta, i chicchi avariati, i chicchi cariati e carbonati, le pule, le impurità propriamente dette, i frammenti di insetti e i coleotteri) ;

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.
(2) GU n. 192 dell'11. 8. 1967, pag. 7.
(3) GU n. 120 del 21. 6. 1967, pag. 2352/67.

— percentuale di chicchi germinati : 1 %;

— percentuale di chicchi spezzati : 2 %;

d) Peso specifico : 75 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 2

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo e i prezzi d'intervento della segala è definita come segue :

a) Segala sana, leale e mercantile, priva di odore, di colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media della segala raccolta nella Comunità in condizioni normali ;

b) Tenore di umidità : 16 % ;

c) Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 5 %, di cui

— percentuale delle impurità relative ai chicchi : 1,5 % (per impurità relative ai chicchi si intendono i chicchi striminziti, i chicchi di altri cereali e i chicchi attaccati da parassiti),

— percentuale delle altre impurità (Schwarzbesatz) : 0,5 % (per altre impurità s'intendono i semi estranei, la segala cornuta, i chicchi avariati, i chicchi cariati e carbonati, le pule, le impurità propriamente dette, i frammenti di insetti e i coleotteri),

— percentuale di chicchi germinati : 1 %,

— percentuale di chicchi spezzati : 2 % ;

d) Peso specifico : 71 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 3

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo e i prezzi d'intervento dell'orzo è definita come segue :

a) Orzo sano, leale e mercantile, privo di odore, di colore proprio del cereale e di qualità corrispondente alla qualità media dell'orzo raccolto nella Comunità in condizioni normali ;

b) Tenore di umidità : 16 % ;

c) Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 3 %, di cui :

— percentuale di altri cereali : 2 %,

— percentuale di corpi estranei : 1 % ;

d) Peso specifico : 67 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 4

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo e il prezzo d'intervento del granturco è definita come segue :

a) Granturco sano, leale e mercantile, privo di odore :

b) Tenore di umidità : 15 % ;

c) Percentuale totale degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta : 8 %, di cui

— percentuale di chicchi spezzati : 2 % (ai sensi del presente regolamento, per chicchi spezzati si intendono le parti di chicchi di granturco o i chicchi interi che passano attraverso un vaglio a fori circolari del diametro di 4,5 millimetri),

— percentuale di chicchi attaccati da parassiti e avariati, compresi i chicchi riscaldati o danneggiati dal gelo : 5 %,

— percentuale di corpi estranei : 1 %.

Articolo 5

La qualità tipo per la quale sono fissati il prezzo indicativo, i prezzi d'intervento e il prezzo minimo garantito del grano duro è definita come segue :

a) Grano duro, sano, leale e mercantile, privo di odore, secco, di colore tra il giallo ambrato e il bruno, che presenta alla frattura un aspetto vitreo, translucido e corneo, e di qualità corrispondente alla qualità media del grano duro raccolto nella Comunità in condizioni normali ;

b) Percentuale totale degli elementi che non sono chicchi di grano duro di qualità perfetta : 24 %, di cui

— percentuale di chicchi di grano duro bianconati, anche parzialmente, e di chicchi di grano tenero : 20 %, di cui al massimo il 4 % di chicchi di grano tenero,

— percentuale delle impurità relative ai chicchi : 3,5 % (per le impurità relative ai chicchi s'intendono i chicchi spezzati e striminziti, i chicchi di cereali diversi dal grano duro e dal grano tenero, i chicchi attaccati da parassiti e i chicchi che presentano colorazioni del germe o chicchi volpati),

— percentuale delle altre impurità (Schwarzbesatz) : 0,5 % (per altre impurità s'intendono i semi estranei, i chicchi cariati e carbonati, le pule, le impurità propriamente dette, i frammenti di insetti e i coleotteri) ;

c) Peso specifico : 78 chilogrammi per ettolitro.

Articolo 6

Per l'applicazione del presente regolamento :

a) la determinazione del tenore di umidità si effettua secondo il metodo indicato nell'allegato I ;

b) gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti in conformità dell'allegato II, salvo diversa definizione contenuta nel presente regolamento ;

c) il metodo di determinazione dei chicchi di grano duro bianconati è stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento n. 120/67/CEE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 novembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

ALLEGATO I

Metodo pratico di riferimento per la dosatura dell'acqua

Principio

Il prodotto è essiccato a 130 ° C sotto pressione atmosferica normale, per una durata stabilita empiricamente, in funzione della dimensione delle particelle, di modo che la perdita di massa riferita a 100 grammi concordi con la percentuale d'acqua trovata con il metodo di riferimento fondamentale.

Campo d'applicazione

Tale metodo d'essiccamento a 130 ° C si applica ai chicchi ridotti in particelle di dimensioni inferiori o uguali a 1.700 µ, di cui meno del 10 % dovrà essere superiore a 1.000 µ, e più del 50 % inferiore a 500 µ, nonché alle farine.

Apparecchi

Bilancia, precisione 0,1 milligrammi.

Apparecchio per la frantumazione che non provoca fermentazione, facile da pulire, conforme ai requisiti indicati nel « campo d'applicazione » (ad esempio : mulino a coni smontabili).

Vaso metallico munito di coperchio : superficie utile che permetta di ottenere una ripartizione del campione di 0,2 grammi per cm^2.

Stufa isotermica a riscaldamento elettrico, regolata tra 130 ° C e 133 ° C (1) che possieda una sufficiente ventilazione (2).

Essiccatore ad anidride fosforica e a piastra metallica.

Reagenti

Anidride fosforica (P_2O_5) pura per analisi.

---

(1) Temperatura dell'aria all'interno della stufa.

(2) La stufa deve avere una capienza calorifica tale che, dopo essere stata regolata ad una temperatura di 131° C, essa possa raggiungere nuovamente questa temperatura in meno di un'ora dopo il collocamento del numero massimo di campioni da essiccare simultaneamente. Essa dovrebbe avere una ventilazione tale che, essiccando contemporaneamente per due ore tutti i campioni di grano tenero che essa può contenere, i risultati presentino una differenza inferiore allo 0,1 % rispetto ai risultati ottenuti dopo quattro ore di essiccamento.

Modo d'operare

Campione :

Introdurre almeno 5 grammi di sostanza nel vaso metallico, tarato dopo permanenza nello spazio essiccante, e raffreddamento con essiccatore. Pesare con una precisione di 0,2 milligrammi. Operare rapidamente in caso di prodotti umidi.

Condizionamento (pre-essiccamento o umidificazione) e macinazione per i chicchi

Non condizionare i chicchi che cortengono il 10—13 % d'acqua. Il tenore d'acqua dei chicchi più secchi o più umidi dovrà essere portato quantitavamente entro tali limiti. Il caso più frequente è il pre-essiccamento : collocare ogni vaso che contiene il campione nella stufa per 7—10 minuti. Ritirare il vaso, coprirlo, collocarlo nell'essiccatore.

Pesare non appena il vaso è raffreddato alla temperatura del laboratorio. Frantumare subito il campione. Versare la polvere nel vaso. Pesare nuovamente. Devono passare meno di due minuti tra le due pesature.

Disidratazione

Rimettere nella stufa per due ore. Ritirare i campioni operando come è stato detto precedentemente. Pesare subito dopo il raffreddamento con l'essiccatore.

ALLEGATO II

Definizione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta

1. I corpi estranei sono : i semi estranei non tossici, i chicchi avariati, le pule, i frammenti di insetti e i coleotteri.

2. I vari elementi che costituiscono il « Besatz » :

   a) *Chicchi spezzati o fratture :*

   Tutti i chicchi il cui endosperma è parzialmente scoperto sono chicchi spezzati. I chicchi danneggiati per urto e i chicchi il cui germe à stato tolto per urto appartengono parimenti a questo gruppo.

   b) *Chicchi striminziti :*

   Tutti i chicchi di frumento che, dopo la pulitura del campione da tutti gli altri elementi che costituiscono il « Besatz », passano attraverso un vaglio con fori di 2 millimetri sono chicchi di grano striminziti.

   Per grani striminziti di segala s'intendono tutti i chicchi di segala che sono raggrinziti in modo distintamente visibile, non soltanto nel solco ma anche ai lati e sul dorso.

   c) *Altri cereali :*

   Per « altri cereali » s'intendono tutti i chicchi che non appartengono al genere di chicchi rappresentato dal campione.

   Quando si tratta di un campione di grano duro, tutti i chicchi di grano tenero sono compresi tra gli « altri cereali » e viceversa.

   d) *Chicchi germinati :*

   I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente ad occhio nudo la radichetta o la piumetta. Bisogna però tenere conto dell'aspetto generale del campione quando si giudica il suo tenore di grani germinati. Vi sono dei tipi di cereali a germe pro-

minente, ad esempio il grano duro, nei quali l'involucro che copre il germe scoppia quando si agita la partita di cereali. Questi chicchi assomigliano ai chicchi germinati ; non bisogna però includerli in questo gruppo.

Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili, per le quali è facile distinguere il chicco germinato da quello normale.

e) *Chicchi attaccati da parassiti :*

Cicchi attaccati da parassiti sono tutti quelli che presentano tarlature all'esterno o all'interno è tracce dell'attacco di insetti e acari. I chicchi attaccati dalla cimice appartengono a questo gruppo.

f) *Chicchi che presentano colorazione del germe o chicchi volpati :*

I chicchi che presentano colorazione del germe sono quelli che presentano colorazioni situate fra il bruno e il nero brunastro e il cui germe è normale e non è in fase di germinazione.

g) *Chicchi avariati :*

Sono chicchi non più atti all'alimentazione umana perché putrefatti o intaccati da muffe o batteri o in seguito ad altri influssi.

I chicchi avariati per una fermentazione spontanea appartengono parimenti a questo gruppo ; tali chicchi « scaldati » o « fermentati » sono chicchi completamente sviluppati il cui involucro presenta una colorazione tra il bruno grigiastro e il nero, mentre la sezione presenta una colorazione tra il grigio paglierino e il nero brunastro.

I chicchi colpiti dalle cecidomie del grano sono inclusi nel gruppo dei chicchi avariati solo nel caso in cui, in seguito all'attacco crittogamico secondario, oltre la metà della superficie del chicco presenta una colorazione tra il grigio e il nero. Se la colorazione copre meno della metà della superficie del chicco, questo deve essere incluso nei chicchi striminziti.

Occorre inoltre comprendere tra i chicchi avariati i chicchi deteriorati dal freddo e, per l'orzo, i chicchi carbonati.

h) *Impurità propriamente dette :*

Tutti gli elementi contenuti nel campione di cereali trattenuti da una lamiera perforata con fessure di 3,5 millimetri e che non passano attraverso una lamiera perforata con fessure di 1 millimetro sono compresi tra le impurità.