2024/2863

13.11.2024.

# PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2024/2863

## od 12. studenoga 2024.

## o izdavanju odobrenja Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan" u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

**(Tekst značajan za EGP)**

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda ([1]), a posebno njezin članak 44. stavak 5. prvi podstavak,

budući da:

(1) Društvo ITW Novadan ApS podnijelo je 30. travnja 2019. Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija") zahtjev u skladu s člankom 43. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 za odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda pod nazivom „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan", koja pripada vrsti proizvoda 3 kako je opisana u Prilogu V. toj uredbi, uz pisanu potvrdu da je nadležno tijelo Danske pristalo ocijeniti taj zahtjev. Zahtjev je evidentiran u registru biocidnih proizvoda pod brojem predmeta BC-DB051458-55.

(2) „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan" kao aktivnu tvar sadržava L-(+)-mliječnu kiselinu, koja je uvrštena na popis odobrenih aktivnih tvari Unije iz članka 9. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 za vrstu proizvoda 3.

(3) Nadležno ocjenjivačko tijelo Agenciji je 30. lipnja 2023., u skladu s člankom 44. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012, podnijelo izvješće o ocjenjivanju i zaključke ocjenjivanja.

(4) Agencija je 20. ožujka 2024. Komisiji dostavila mišljenje ([2]), nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda za „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan" i konačno izvješće o ocjenjivanju skupine biocidnih proizvoda, u skladu s člankom 44. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(5) U mišljenju se zaključuje da je „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan" skupina biocidnih proizvoda u smislu članka 3. stavka 1. točke (s) Uredbe (EU) br. 528/2012, da ispunjava uvjete za odobrenje Unije u skladu s člankom 42. stavkom 1. te uredbe te da, podložno sukladnosti s nacrtom sažetka svojstava biocidnog proizvoda, ispunjava uvjete utvrđene u članku 19. stavku 6. te uredbe.

(6) Agencija je 2. travnja 2024. Komisiji dostavila nacrt sažetka svojstava biocidnog proizvoda na svim službenim jezicima Unije u skladu s člankom 44. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(7) Komisija je suglasna s mišljenjem Agencije i stoga smatra da je primjereno izdati odobrenje Unije za skupinu biocidnih proizvoda „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan".

(8) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

([1]) SL L 167, 27.6.2012., str. 1., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Mišljenje ECHA-e od 27. veljače 2024. o odobrenju Unije za „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid based biocidal product family of Novadan" (ECHA/BPC/413/2024) (https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation).

DONIJELA JE OVU UREDBU:

*Članak 1.*

Društvu ITW Novadan ApS izdaje se odobrenje Unije s brojem odobrenja EU-0032465-0000 za stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabu skupine biocidnih proizvoda „Teat disinfectants L-(+)-lactic acid-based biocidal product family of Novadan" u skladu sa sažetkom svojstava biocidnog proizvoda iz Priloga.

Odobrenje Unije valjano je od 3. prosinca 2024. do 30. studenoga 2034.

*Članak 2.*

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 12. studenoga 2024.

*Za Komisiju*
*Predsjednica*
Ursula VON DER LEYEN

*PRILOG*

**SAŽETAK SVOJSTAVA PROIZVODA ZA SKUPINU BIOCIDNIH PROIZVODA**

Teat disinfectants L-(+)-lactic acid-based biocidal product family of Novadan

**Vrsta(e) proizvoda**

PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni

**Broj autorizacije** EU-0032465-0000

**Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)** EU-0032465-0000

Dio I.

**PRVA RAZINA INFORMACIJA**

1. **ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Naziv skupine**

| | |
|---|---|
| Ime/naziv | Teat disinfectants L-(+)-lactic acid-based biocidal product family of Novadan |

1.2. **Vrsta(e) proizvoda**

| | |
|---|---|
| Vrsta(e) proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |

1.3. **Nositelj autorizacije**

| | | |
|---|---|---|
| Naziv i adresa nositelja autorizacije | Ime/naziv | ITW Novadan ApS |
| | Adresa | Platinvej 21 6000 Kolding DK |
| Broj autorizacije | | EU-0032465-0000 |
| *Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)* | | EU-0032465-0000 |
| Datum autorizacije | | 3. prosinca 2024. |
| Datum isteka autorizacije | | 30. studenoga 2034. |

1.4. **Proizvođač(i) proizvoda**

| | |
|---|---|
| Naziv proizvođača | Novadan ApS |
| Adresa proizvođača | Platinvej 21, 6000 Kolding, Danska |
| Lokacija proizvodnih pogona | Novadan ApS site 1<br>Platinvej 21, 6000 Kolding, Danska |

1.5. **Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari**

| | |
|---|---|
| Aktivna tvar | L-(+)-mliječna kiselina |
| Naziv proizvođača | Purac Bioquimica SA |
| Adresa proizvođača | Gran Viral, 19 – 25, 08160 Montmelo, Španjolska |

| | |
|---|---|
| Lokacija proizvodnih pogona | Purac Bioquimica SA site 1<br>Gran Viral, 19 – 25, 08160 Montmelo, Španjolska |

| | |
|---|---|
| Aktivna tvar | L-(+)-mliječna kiselina |
| Naziv proizvođača | Jungbunzlauer S.A. |
| Adresa proizvođača | Z.I. Portuaire 67390 Marckolsheim Francuska |
| Lokacija proizvodnih pogona | Jungbunzlauer S.A. site 1<br>Z.I. Portuaire 67390 Marckolsheim Francuska |

2. **SASTAV I FORMULACIJA SKUPINE BIOCIDNIH PROIZVODA**

2.1. **Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu skupine**

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-mliječna kiselina | | Aktivna tvar | 79-33-4 | 201-196-2 | 4,1 - 4,1 % (w/w) |

2.2. **Vrsta(e) formulacija**

| | |
|---|---|
| Vrsta(e) formulacije | AL Svaka druga tekućina |

Dio II.

**DRUGA RAZINA INFORMACIJA – METASAŽETCI SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 1 identifikacijska oznaka**

| | |
|---|---|
| Identifikacijska oznaka | Meta SPC: meta-SPC 1 |

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

| | |
|---|---|
| Broj | 1-1 |

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

| | |
|---|---|
| Vrsta(e) proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |

2. **SASTAV U META SPC-U 1**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-mliječna kiselina | | Aktivna tvar | 79-33-4 | 201-196-2 | 4,1 - 4,1 % (w/w) |

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 1**

| | |
|---|---|
| Vrsta(e) formulacije | AL Svaka druga tekućina |

3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

| | |
|---|---|
| Oznake upozorenja | H318: Uzrokuje teške ozljede oka. |
| Oznake obavijesti | P280: Nositi zaštitu za oči.<br>P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.<br>P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. |

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

*Tablica 1.*

**Upotreba #1.1: ručno uranjanje nakon mužnje (RTU - proizvod spreman za uporabu)**

| | |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bakterije<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Kvasci<br>Uobičajeno ime: Kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome<br><br>Proizvod za dezinfekciju sisa muznih životinja (krave, bivolice, ovce, koze) za upotrebu nakon mužnje. |
| Način(i) primjene | Metoda: Ručno uranjanje<br><br>Detaljan opis:<br>Ručno uranjanje nakon mužnje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene:<br>Krave i bivolice: 4 ml/životinja po tretiranju; ovce: 2 ml/životinja po tretiranju; koze: 2-4 ml/životinja po tretiranju.<br><br>Razrjeđenje (%):<br>Proizvodi spremni za upotrebu (RTU) formulirani na pH = 3 ±0,1.<br>Ne za razrjeđivanje.<br><br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Primjenjuje se nakon mužnje 1-3 puta na dan (primijeniti nakon svake mužnje).<br>Vrijeme kontakta: 5 minuta. |

| | |
|---|---|
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Kanister, polietilen visoke gustoće (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L<br>Plastična bačva, HDPE: 200 L<br>Srednji kontejner za rasuti teret (IBC), HDPE: 1 000 L<br>Neprozirni spremnici. |

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Napunite spremnik proizvodom spremnim za upotrebu (RTU) i pričvrstite čašicu za uranjanje na vrh.

Pažljivo očistite sise tako da ih obrišete papirnatim ručnikom/krpom za jednokratnu upotrebu neposredno prije mužnje.

Nakon mužnje pritisnite spremnik i postavite čašu za uranjanje preko svake sise odozdo, pritom pazeći da je sisa cijelom duljinom uronjena u dezinficijens.

Dopunite svježim dezinficijensom pritiskanjem spremnika po potrebi. Nakon dezinfekcije ispraznite spremnik te ga očistite zajedno s čašom za uranjanje tako da isperete vodom.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.2. **Opis uporabe**

*Tablica 2.*

**Upotreba #1.4: automatizirano uranjanje nakon mužnje (RTU - proizvod spreman za uporabu)**

| | |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bakterije<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br>Znanstveno ime: Kvasci<br>Uobičajeno ime: Kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome<br>Proizvod za dezinfekciju sisa muznih životinja (krave, bivolice, ovce, koze) za upotrebu nakon mužnje. |

| | |
|---|---|
| Način(i) primjene | Metoda: Automatizirano uranjanje<br>Detaljan opis:<br>Automatizirano uranjanje nakon mužnje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene:<br>Krave i bivolice: 4 ml/životinja po tretiranju; ovce: 2 ml/životinja po tretiranju; koze: 2-4 ml/životinja po tretiranju.<br>Razrjeđenje (%):<br>Proizvodi spremni za upotrebu (RTU) formulirani na pH = 3 ± 0,1.<br>Ne za razrjeđivanje.<br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Primjenjuje se nakon mužnje 1-3 puta na dan (primijeniti nakon svake mužnje).<br>Vrijeme kontakta: 5 minuta. |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Kanister, polietilen visoke gustoće (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L<br>Plastična bačva, HDPE: 200 L<br>Srednji kontejner za rasuti teret (IBC), HDPE: 1 000 L<br>Neprozirni spremnici. |

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Otvorite kantu s proizvod spreman za upotrebu (RTU) proizvodom te umetnite usisnu cijev automatiziranog sustava za uranjanje.

Prije mužnje pažljivo očistite sise automatskim postupkom ili ručno.

Nakon mužnje, vakuum se isključuje, a dezinficijens se ubrizgava u razvodnik na prijanjaljki. Kada se sisna čaša ukloni sustavom automatskog uklanjanja klastera (Automatic Cluster Removal, ACR), sise ostaju prekrivene s približno 2-4 ml sredstva.

Čitav postupak je automatiziran.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

5.1. **Upute za uporabu**

Za umetanje proizvoda u opremu za nanošenje preporučuje se upotreba pumpe za doziranje.

Prije upotrebe, proizvode je potrebno zagrijati na temperaturu iznad 20 °C.

Kako bi se osiguralo dostatno vrijeme kontakta, potrebno je paziti da se proizvod ne ukloni nakon primjene.

Ostavite proizvod na vimenu do sljedeće mužnje. Ostavite životinje da stoje dok se proizvod ne osuši (najmanje 5 minuta).

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Sljedeća osobna zaštitna oprema (PPE) propisana je ne dovodeći u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu od strane poslodavaca.

Upotreba zaštite za oči u skladu s europskom normom EN ISO 16321 ili ekvivalentnom normom obavezna je tijekom miješanja i punjenja, ručnog prskanja, uranjanja i čišćenja.

Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na zakonodavstvo i EN standarde.

Izbjegavajte prijenos s ruke na oko.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

U slučaju nezgode: Kontaktirajte liječnika ili službu za zbrinjavanje unesrećenih, a sa sobom ponesite etiketu s proizvoda ili ovaj sigurnosno-tehnički list.

Kontaktirajte liječnika ako niste sigurni kakvo je stanje izložene osobe ili ako ne dođe do povlačenja simptoma.

Osobi koja nije pri svijesti nikada nemojte davati da pije vodu ili nešto slično.

AKO SE UDIŠE: Pomjerite osobu na svjež zrak, držite je u stanju mirovanja, u položaju ugodnom za disanje.

Ukoliko postoje simptomi: pozovite 112/hitnu pomoć radi medicinske pomoći.

Ukoliko ne postoje simptomi: pozovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Kožu isperite vode. Ukoliko postoje simptomi CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Odmah isperite vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ukoliko postoje i ukoliko ih je lako ukloniti. Nastavite sa ispiranjem najmanje 15 minuta. Pozovite 112/hitnu pomoć radi medicinske pomoći.

AKO SE PROGUTA: Odmah isperite usta. Ukoliko je izložena osoba u stanju da guta dajte joj nešto da pije. NEMOJTE izazivati povraćanje. Pozovite 112/hitnu pomoć radi medicinske pomoći.

*Hitne mjere zaštite okoliša*

Izbjegavajte izlijevanje tvari u jezera, riječne tokove, kanalizacijske odvode i slično.

Zadržite i sakupite prolivenu tekućinu nezapaljivim, upijajućim materijalom npr. pijeskom, zemljom, vermikulitom ili dijatomejskom zemljom i stavite u spremnik za odlaganje u skladu s lokalnim propisima.

Koliko god je to moguće, čišćenje treba obavljati pomoću uobičajenih sredstava za čišćenje. Treba izbjegavati uporabu otapala.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

*Način zbrinjavanja:*

Zbrinuti neiskorišten proizvod i ambalažu sukladno lokalnim zahtjevima.

Iskorišten proizvod može se ispustiti u komunalni kanalizacijski sustav ili odložiti na stajski gnoj, ovisno o lokalnim zahtjevima.

Ne ispuštati u zasebni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Prazne spremnike operite s mnogo vode i odložite u običan ili komercijalan otpad.

Papirnate ručnike korištene za čišćenje sisa odložite kao miješani komunalni otpad (EWC code 20 03 01).

Ovaj proizvod nije reguliran propisima o opasnom otpadu.

*Ostale informacije:*

Pri rukovanju otpadom treba provoditi mjere opreza koje se odnose na rukovanje proizvodom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

Zaštititi od mraza.

Zaštititi od sunčevog svjetla.

Držati u originalnom spremniku.

Čuvati izvan dohvata djece.

Rok trajanja: 24 mjeseca.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

Potpune reference na zakonodavstvo i EN standarde navedene u odjeljku 5.2 „Mjere za smanjenje rizika”:

Direktiva Vijeća 98/24/ EZ od 7. travnja 1998. godine o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četrnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16 stavka 1 Direktive 89/391/EEZ ) (OJ L 131, 5.5.1998., str. 11.).

EN ISO 16321 - Zaštita za oči i lice za profesionalne korisnike

S obzirom na napomenu „Kategorija(e) korisnika”: „Profesionalci (uključujući industrijske korisnike) znači obučeni stručnjaci ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.”

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 1**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trgovački naziv(i) | | Viri Barriere Dip | područje prodaje: EU | | |
| | | Agro White Dip | područje prodaje: EU | | |
| | | Lacto B Dip | područje prodaje: EU | | |
| Broj autorizacije | | EU-0032465-0001 1-1 | | | |
| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
| L-(+)-mliječna kiselina | | Aktivna tvar | 79-33-4 | 201-196-2 | 4,1 % (w/w) |

7.2. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trgovački naziv(i) | | | Viri TE Dip | područje prodaje: EU | |
| | | | Agro Lac Dip | područje prodaje: EU | |
| | | | Lacto Extra Dip | područje prodaje: EU | |
| Broj autorizacije | | | EU-0032465-0002 1-1 | | |
| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
| L-(+)-mliječna kiselina | | Aktivna tvar | 79-33-4 | 201-196-2 | 4,1 % (w/w) |

7.3. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trgovački naziv(i) | | | Nova FD | područje prodaje: EU | |
| | | | Agro FD | područje prodaje: EU | |
| | | | Lacto FD | područje prodaje: EU | |
| | | | DF CUA | područje prodaje: EU | |
| | | | Lacto Protect Film | područje prodaje: EU | |
| Broj autorizacije | | | EU-0032465-0003 1-1 | | |
| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
| L-(+)-mliječna kiselina | | Aktivna tvar | 79-33-4 | 201-196-2 | 4,1 % (w/w) |

1. **METASAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2 ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE**

1.1. **Metasažetak svojstava biocidnog proizvoda 2 identifikacijska oznaka**

| | |
|---|---|
| Identifikacijska oznaka | Meta SPC: meta-SPC 2 |

1.2. **Dodatak broju autorizacije**

| | |
|---|---|
| Broj | 1-2 |

1.3. **Vrsta(e) proizvoda**

| | |
|---|---|
| Vrsta(e) proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |

2. **SASTAV U META SPC-U 2**

2.1. **Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-mliječna kiselina | | Aktivna tvar | 79-33-4 | 201-196-2 | 4,1 - 4,1 % (w/w) |

2.2. **Vrsta(e) formulacije(a) u metasažetku svojstava biocidnog proizvoda 2**

| | |
|---|---|
| Vrsta(e) formulacije | AL Svaka druga tekućina |

3. **OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

| | |
|---|---|
| Oznake upozorenja | H318: Uzrokuje teške ozljede oka. |
| Oznake obavijesti | P280: Nositi zaštitu za oči.<br>P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.<br>P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. |

4. **AUTORIZIRANE UPORABE IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA**

4.1. **Opis uporabe**

*Tablica 1.*

**Upotreba #1.1: ručno uranjanje nakon mužnje (RTU - proizvod spreman za uporabu)**

| | |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bakterije<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Kvasci<br>Uobičajeno ime: Kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka |

| | |
|---|---|
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome<br>Proizvod za dezinfekciju sisa muznih životinja (krave, bivolice, ovce, koze) za upotrebu nakon mužnje. |
| Način(i) primjene | Metoda: Ručno uranjanje<br>Detaljan opis:<br>Ručno uranjanje nakon mužnje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene:<br>Krave i bivolice: 4 ml/životinja po tretiranju; ovce: 2 ml/životinja po tretiranju; koze: 2-4 ml/životinja po tretiranju.<br>Razrjeđenje (%):<br>Proizvodi spremni za upotrebu (RTU) formulirani na pH = 3 ± 0,1.<br>Ne za razrjeđivanje.<br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Primjenjuje se nakon mužnje 1-3 puta na dan (primijeniti nakon svake mužnje).<br>Vrijeme kontakta: 5 minuta. |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Kanister, polietilen visoke gustoće (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L<br>Plastična bačva, HDPE: 200 L<br>Srednji kontejner za rasuti teret (IBC), HDPE: 1 000 L<br>Neprozirni spremnici. |

4.1.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Napunite spremnik proizvodom spremnim za upotrebu (RTU) i pričvrstite čašicu za uranjanje na vrh.

Pažljivo očistite sise tako da ih obrišete papirnatim ručnikom/krpom za jednokratnu upotrebu neposredno prije mužnje.

Nakon mužnje pritisnite spremnik i postavite čašu za uranjanje preko svake sise odozdo, pritom pazeći da je sisa cijelom duljinom uronjena u dezinficijens.

Dopunite svježim dezinficijensom pritiskanjem spremnika po potrebi. Nakon dezinfekcije ispraznite spremnik te ga očistite zajedno s čašom za uranjanje tako da isperete vodom.

4.1.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.1.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.1.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.1.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.2. **Opis uporabe**

*Tablica 2.*

**Upotreba #1.2: ručno raspršivanje ručnim raspršivačem nakon mužnje (RTU proizvod spreman za uporabu)**

| | |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno. |

| | |
|---|---|
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bakterije<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Kvasci<br>Uobičajeno ime: Kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome<br><br>Proizvod za dezinfekciju sisa muznih životinja (krave, bivolice, ovce, koze) za upotrebu nakon mužnje. |
| Način(i) primjene | Metoda: Ručno raspršivanje, ručni raspršivač<br><br>Detaljan opis:<br>Nakon mužnje pomoću raspršivača na okidač. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene:<br>Krave i bivolice: 4 ml/životinja po tretiranju; ovce: 2 ml/životinja po tretiranju; koze: 2-4 ml/životinja po tretiranju.<br><br>Razrjeđenje (%):<br>Proizvodi spremni za upotrebu (RTU) formulirani na pH = 3 ±0,1.<br>Ne za razrjeđivanje.<br><br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Primjenjuje se nakon mužnje 1-3 puta na dan (primijeniti nakon svake mužnje).<br>Vrijeme kontakta: 5 minuta. |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Kanister, polietilen visoke gustoće (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L<br>Plastična bačva, HDPE: 200 L<br>Srednji kontejner za rasuti teret (IBC), HDPE: 1 000 L<br><br>Neprozirni spremnici. |

4.2.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Napunite spremnik proizvodom spremnim za upotrebu (RTU) i pričvrstite gornji dio ručne prskalice na spremnik.

Pažljivo očistite sise tako da ih obrišete papirnatim ručnikom/krpom za jednokratnu upotrebu neposredno prije mužnje.

Nakon mužnje raspršite dezinficijens na sise raspršivačem, pritom pazeći da je svaka sisa prekrivena dezinficijensom.

Spremnik dopunite svježim dezinficijensom prema potrebi.

Nakon dezinfekcije ispraznite spremnik te ga očistite zajedno s raspršivačem tako da isperete vodom.

4.2.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

Profesionalni promatrač mora nositi istu osobnu zaštitnu opremu (PPE) kao i profesionalni korisnik.

4.2.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.2.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.2.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.3. **Opis uporabe**

*Tablica 3.*

**Upotreba #1.3: ručno raspršivanje elektroničkim raspršivačem nakon mužnje (RTU - proizvod spreman za uporabu)**

| | |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bakterije<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Kvasci<br>Uobičajeno ime: Kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome<br><br>Proizvod za dezinfekciju sisa muznih životinja (krave, bivolice, ovce, koze) za upotrebu nakon mužnje. |
| Način(i) primjene | Metoda: Ručno prskanje elektroničkim raspršivačem<br><br>Detaljan opis:<br>Nakon mužnje ručno s elektroničkim raspršivačem. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene:<br>Krave i bivolice: 4 ml/životinja po tretiranju; ovce: 2 ml/životinja po tretiranju; koze: 2-4 ml/životinja po tretiranju.<br><br>Razrjeđenje (%):<br>Proizvodi spremni za upotrebu (RTU) formulirani na pH = 3 ±0,1.<br>Ne za razrjeđivanje.<br><br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Primjenjuje se nakon mužnje 1-3 puta na dan (primijeniti nakon svake mužnje).<br>Vrijeme kontakta: 5 minuta. |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Kanister, polietilen visoke gustoće (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L<br>Plastična bačva, HDPE: 200 L<br>Srednji kontejner za rasuti teret (IBC), HDPE: 1 000 L<br><br>Neprozirni spremnici. |

4.3.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Otvorite kantu s proizvod spreman za uporabu (RTU) proizvodom i umetnite usisnu cijev elektroničkog raspršivača.

Pažljivo očistite sise tako da ih obrišete papirnatim ručnikom/krpom za jednokratnu upotrebu neposredno prije mužnje.

Nakon mužnje raspršite dezinficijens na sise elektroničkim raspršivačem, pritom pazeći da je svaka sisa prekrivena dezinficijensom. Prema potrebi zamijenite praznu kantu novom.

Nakon dezinfekcije, sustav s usisnom cijevi postavite u kantu s vodom te pumpanjem vode isperite raspršivač.

4.3.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

Profesionalni promatrač mora nositi istu osobnu zaštitnu opremu (PPE) kao i profesionalni korisnik.

4.3.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.3.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.3.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.4. **Opis uporabe**

*Tablica 4.*

**Upotreba #1.4: automatizirano uranjanje nakon mužnje (RTU - proizvod spreman za uporabu)**

| | |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bakterije<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Kvasci<br>Uobičajeno ime: Kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome<br><br>Proizvod za dezinfekciju sisa muznih životinja (krave, bivolice, ovce, koze) za upotrebu nakon mužnje. |
| Način(i) primjene | Metoda: Automatizirano uranjanje<br><br>Detaljan opis:<br>Automatizirano uranjanje nakon mužnje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene:<br>Krave i bivolice: 4 ml/životinja po tretiranju; ovce: 2 ml/životinja po tretiranju; koze: 2-4 ml/životinja po tretiranju.<br><br>Razrjeđenje (%):<br>Proizvodi spremni za upotrebu (RTU) formulirani na pH = 3 ±0,1.<br>Ne za razrjeđivanje.<br><br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Primjenjuje se nakon mužnje 1-3 puta na dan (primijeniti nakon svake mužnje).<br>Vrijeme kontakta: 5 minuta. |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Kanister, polietilen visoke gustoće (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L<br>Plastična bačva, HDPE: 200 L<br>Srednji kontejner za rasuti teret (IBC), HDPE: 1 000 L<br><br>Neprozirni spremnici. |

4.4.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Otvorite kantu s proizvod spreman za upotrebu (RTU) proizvodom te umetnite usisnu cijev automatiziranog sustava za uranjanje.

Prije mužnje pažljivo očistite sise automatskim postupkom ili ručno.

Nakon mužnje, vakuum se isključuje, a dezinficijens se ubrizgava u razvodnik na prijanjaljki. Kada se sisna čaša ukloni sustavom automatskog uklanjanja klastera (Automatic Cluster Removal, ACR), sise ostaju prekrivene s približno 2-4 ml sredstva.

Čitav postupak je automatiziran.

4.4.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.4.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.4.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.4.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.5. **Opis uporabe**

*Tablica 5.*

**Upotreba #1.5: automatizirano robotsko raspršivanje nakon mužnje (RTU - proizvod spreman za uporabu)**

| | |
|---|---|
| Vrsta proizvoda | PT03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni |
| Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe | Nije relevantno. |
| Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bakterije<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Kvasci<br>Uobičajeno ime: Kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka |
| Područje(a) uporabe | uporaba u zatvorenome<br><br>Proizvod za dezinfekciju sisa muznih životinja (krave, bivolice, ovce, koze) za upotrebu nakon mužnje. |
| Način(i) primjene | Metoda: Automatizirano robotsko raspršivanje<br><br>Detaljan opis:<br>Automatizirano robotsko raspršivanje nakon mužnje. |
| Količina(e) kod primjene i učestalost | Stopa primjene:<br>Krave i bivolice: 4 ml/životinja po tretiranju; ovce: 2 ml/životinja po tretiranju; koze: 2-4 ml/životinja po tretiranju.<br><br>Razrjeđenje (%):<br>Proizvodi spremni za upotrebu (RTU) formulirani na pH = 3 ±0,1.<br>Ne za razrjeđivanje.<br><br>Broj i vremenski raspored primjene:<br>Primjenjuje se nakon mužnje 1-3 puta na dan (primijeniti nakon svake mužnje).<br>Vrijeme kontakta: 5 minuta. |
| Kategorija(e) korisnika | profesionalac |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal | Kanister, polietilen visoke gustoće (HDPE): 0,5 L, 5 L, 10 L, 20 L, 60 L<br>Plastična bačva, HDPE: 200 L<br>Srednji kontejner za rasuti teret (IBC), HDPE: 1 000 L<br><br>Neprozirni spremnici. |

4.5.1. *Upute za uporabu specifične za uporabu*

Otvorite kantu s proizvod spreman za uporabu (RTU) proizvodom te umetnite usisnu cijev robotskog uređaja za mužnju.

Sise se čiste automatski, četkama robotskog sustava. Nakon mužnje robotskim sustavom, 2-4 ml dezinficijensa automatski se raspršuje preko sisa pomoću ruke klastera.

Ispiranje raspršivača odvija se automatski.

4.5.2. *Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.5.3. *Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.5.4. *Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

4.5.5. *Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja*

Vidjeti opće upute za upotrebu.

5. **OPĆE UPUTE ZA UPORABU IZ METASAŽETKA SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

5.1. **Upute za uporabu**

Za umetanje proizvoda u opremu za nanošenje preporučuje se upotreba pumpe za doziranje.

Prije upotrebe, proizvode je potrebno zagrijati na temperaturu iznad 20 °C.

Kako bi se osiguralo dostatno vrijeme kontakta, potrebno je paziti da se proizvod ne ukloni nakon primjene.

Ostavite proizvod na vimenu do sljedeće mužnje. Ostavite životinje da stoje dok se proizvod ne osuši (najmanje 5 minuta).

5.2. **Mjere za smanjenje rizika**

Sljedeća osobna zaštitna oprema (PPE) propisana je ne dovodeći u pitanje primjenu Direktive Vijeća 98/24/EZ i drugog zakonodavstva Unije u području zdravlja i sigurnosti na radu od strane poslodavaca.

Upotreba zaštite za oči u skladu s europskom normom EN ISO 16321 ili ekvivalentnom normom obavezna je tijekom miješanja i punjenja, ručnog prskanja, uranjanja i čišćenja.

Pogledajte odjeljak 6 za potpune reference na zakonodavstvo i EN standarde.

Izbjegavajte prijenos s ruke na oko.

5.3. **Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

U slučaju nezgode: Kontaktirajte liječnika ili službu za zbrinjavanje unesrećenih, a sa sobom ponesite etiketu s proizvoda ili ovaj sigurnosno-tehnički list.

Kontaktirajte liječnika ako niste sigurni kakvo je stanje izložene osobe ili ako ne dođe do povlačenja simptoma.

Osobi koja nije pri svijesti nikada nemojte davati da pije vodu ili nešto slično.

AKO SE UDIŠE: Pomjerite osobu na svjež zrak, držite je u stanju mirovanja, u položaju ugodnom za disanje.

Ukoliko postoje simptomi: pozovite 112/hitnu pomoć radi medicinske pomoći.

Ukoliko ne postoje simptomi: pozovite CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Kožu isperite vode. Ukoliko postoje simptomi CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Odmah isperite vodom nekoliko minuta. Uklonite kontaktne leće ukoliko postoje i ukoliko ih je lako ukloniti. Nastavite sa ispiranjem najmanje 15 minuta. Pozovite 112/hitnu pomoć radi medicinske pomoći.

AKO SE PROGUTA: Odmah isperite usta. Ukoliko je izložena osoba u stanju da guta dajte joj nešto da pije. NEMOJTE izazivati povraćanje. Pozovite 112/hitnu pomoć radi medicinske pomoći.

*Hitne mjere zaštite okoliša*

Izbjegavajte izlijevanje tvari u jezera, riječne tokove, kanalizacijske odvode i slično.

Zadržite i sakupite prolivenu tekućinu nezapaljivim, upijajućim materijalom npr. pijeskom, zemljom, vermikulitom ili dijatomejskom zemljom i stavite u spremnik za odlaganje u skladu s lokalnim propisima.

Koliko god je to moguće, čišćenje treba obavljati pomoću uobičajenih sredstava za čišćenje. Treba izbjegavati uporabu otapala.

5.4. **Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

*Način zbrinjavanja:*

Zbrinuti neiskorišten proizvod i ambalažu sukladno lokalnim zahtjevima.

Iskorišten proizvod može se ispustiti u komunalni kanalizacijski sustav ili odložiti na stajski gnoj, ovisno o lokalnim zahtjevima.

Ne ispuštati u zasebni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda.

Prazne spremnike operite s mnogo vode i odložite u običan ili komercijalan otpad.

Papirnate ručnike korištene za čišćenje sisa odložite kao miješani komunalni otpad (EWC code 20 03 01).

Ovaj proizvod nije reguliran propisima o opasnom otpadu.

*Ostale informacije:*

Pri rukovanju otpadom treba provoditi mjere opreza koje se odnose na rukovanje proizvodom.

5.5. **Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja**

Čuvati na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu.

Zaštititi od mraza.

Zaštititi od sunčevog svjetla.

Držati u originalnom spremniku.

Čuvati izvan dohvata djece.

Rok trajanja: 24 mjeseca.

6. **OSTALE INFORMACIJE**

Potpune reference na zakonodavstvo i EN standarde navedene u odjeljku 5.2 „Mjere za smanjenje rizika”:

Direktiva Vijeća 98/24/ EZ od 7. travnja 1998. godine o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika povezanih s kemijskim agensima na radu (četrnaesta pojedinačna Direktiva u smislu članka 16 stavka 1 Direktive 89/391/EEZ ) (OJ L 131, 5.5.1998., str. 11.).

EN ISO 16321 - Zaštita za oči i lice za profesionalne korisnike

S obzirom na napomenu „Kategorija(e) korisnika”: „Profesionalci (uključujući industrijske korisnike) znači obučeni stručnjaci ako to zahtijeva nacionalno zakonodavstvo.”

7. **TREĆA RAZINA INFORMACIJA: POJEDINAČNI PROIZVODI U METASAŽETKU SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA 2**

7.1. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

| | | |
|---|---|---|
| Trgovački naziv(i) | Viri TE Spray | područje prodaje: EU |
| | Agro Lac Spray | područje prodaje: EU |
| | Lacto Extra Spray | područje prodaje: EU |
| | LactoPlus | područje prodaje: EU |
| | Teho Lacta Spray | područje prodaje: EU |
| Broj autorizacije | EU-0032465-0004 1-2 | |

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-mliječna kiselina | | Aktivna tvar | 79-33-4 | 201-196-2 | 4,1 % (w/w) |

7.2. **Trgovački naziv(i), broj autorizacije i specifičan sastav svakog pojedinog proizvoda**

| | | |
|---|---|---|
| Trgovački naziv(i) | Nova LA Spray | područje prodaje: EU |
| | Agro LA Spray | područje prodaje: EU |
| | Lacto LA Spray | područje prodaje: EU |
| | Lacto Max | područje prodaje: EU |
| | Lacto Protect Sprüh | područje prodaje: EU |
| Broj autorizacije | EU-0032465-0005 1-2 | |

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija | CAS broj | EZ broj | Sadržaj (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| L-(+)-mliječna kiselina | | Aktivna tvar | 79-33-4 | 201-196-2 | 4,1 % (w/w) |