Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►**B**

REGULAMENTUL (CE) NR. 2148/2004 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2004

privind autorizarea permanentă sau provizorie a unor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unui aditiv deja autorizat

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 370, 17.12.2004, p. 24)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►**M1**	Regulamentul (CE) nr. 1980/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005	L 318	3	6.12.2005
►**M2**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1018/2012 al Comisiei din 5 noiembrie 2012	L 307	56	7.11.2012
►**M3**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1043 al Comisiei din 30 iunie 2015	L 167	63	1.7.2015
►**M4**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2305 al Comisiei din 10 decembrie 2015	L 326	43	11.12.2015
►**M5**	Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/447 al Comisiei din 14 martie 2017	L 69	18	15.3.2017

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 2148/2004 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2004

privind autorizarea permanentă sau provizorie a unor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unui aditiv deja autorizat

(Text cu relevanță pentru SEE)

Articolul 1

Se autorizează, fără limită de timp, preparatul aparținând grupei „Lianți, agenți antiaglomeranți și coagulanți” care face obiectul anexei I, ca aditiv pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Se autorizează, fără limită de timp, preparatele aparținând grupei „Microorganisme” care fac obiectul anexei II, ca aditivi în hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 3

Se autorizează, provizoriu, pe o perioadă de patru ani, preparatul aparținând grupei „Microorganisme” care face obiectul anexei III, ca aditiv în hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 4

Se autorizează, fără limită de timp, preparatele aparținând grupei „Enzime” care fac obiectul anexei IV, ca aditivi în hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 5

Se autorizează provizoriu, pe o perioadă de patru ani, preparatul aparținând grupei „Enzime” care face obiectul anexei V, ca aditiv în hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 6

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXA I

Nr. CE	Aditiv	Compoziție, denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg de substanță activă/kg de furaj			
Lianți, agenți agreganți și coagulanți								
E567	Clinoptilolit de origine vulcanică	Aluminosilicat de calciu hidratat de origine vulcanică, conținând cel puțin 85 % clinoptilolit și maximum 15 % feldspat, mică și argile, fără fibre și cuarț. ►M1 ——————— ◄	Porci	—	—	20 000	Toate furajele	Fără limită de timp
			Iepuri	—	—	20 000	Toate furajele	Fără limită de timp
			Păsări	—	—	20 000	Toate furajele	Fără limită de timp

▼B

ANEXA II

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de furaj complet			
Microorganisme								
▼M5 —								
▼B E 1702	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	Preparat de *Saccharomyces cerevisiae* conținând cel puțin: 5×10^9 UFC/g de aditiv	Purcei (înțărcați)	—	5×10^9	►M2 —— ◄	În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. Se utilizează la purcei înțărcați de până la cca 35 kg.	Fără limită de timp
E 1706	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Amestec de *Enterococcus faecium* conținând cel puțin: 7×10^9 UFC/g și de *Lactobacillus rhamnosus* conținând cel puțin: 3×10^9 UFC/g	Purcei (înțărcați)	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. Se utilizează la purcei înțărcați de până la cca 35 kg.	Fără limită de timp

▼B

ANEXA III

Nr. (sau numărul CE)	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de furaj complet			
Microorganisme								
24	*Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* BCCM/MUCL 39434	Preparat de *Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* având o activitate minimă de $1,0 \times 10^8$ UFC/g	Vaci de lapte	—	$0,25 \times 10^6$	$1,0 \times 10^6$	În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare și durata de conservare. Nu se utilizează în preamestecuri și furaje granulate. Se utilizează la vaci de lapte, în special la atingerea nivelului maxim al producției zilnice, pentru o perioadă minimă de 14 zile. Doza zilnică ce se va administra fiecărei vaci este de $1,0 \times 10^7$ UFC.	20 decembrie 2008

▼B

ANEXA IV

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
E1615	Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10W) având o activitate minimă de: Forma solidă: 70 000 BGN ([1])/g Forma lichidă: 14 000 BGN/ml	Pui pentru îngrășare	—	1 050 BGN	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: 2 800 BGN. 3. Se utilizează în furajele combinate, bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani), de exemplu conținând mai mult de 35 % orz.	Fără limită de timp
▼M4 —								
▼M3 —								

▼B

([1]) 1 BGN este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți glucoză) pe minut din beta-glucanul de orz, la pH 4,8 și 50 °C.

ANEXA V

Nr. (sau nr. CE)	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
30 (sau E 1604	Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6 Endo-1,4 -beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază și de endo-1,4 -beta-xilanază produse de *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) având o activitate minimă de: pulbere: Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 2 000 U ([1])/g Endo-1,4 -beta-xilanază: 1 400 U ([2])/g formă lichidă: Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 500 U/ml Endo-1,4 -beta-xilanază: 350 U/ml	Purcei (înțărcați)	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U Endo-1,4 -beta-xilanază: 70 U	— —	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U Endo-1,4 -beta-xilanază: 70 U 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu conținând mai mult de 30 % orz sau 20 % grâu. 4. Pentru purceii înțărcați de până la cca 35 kg.	20 decembrie 2008

▼B

Nr. (sau nr. CE)	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
			Rațe pentru îngrășare	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U Endo-1,4 -beta-xilanază: 70 U	— —	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 100 U Endo-1,4 -beta-xilanază: 70 U 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu conținând mai mult de 50 % orz sau 60 % grâu.	20 decembrie 2008

([1]) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 5,55 micromoli de zahăr reducător (măsurat în echivalenți maltoză) pe minut din beta-glucanul de orz, la pH 5 și 50 °C.
([2]) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 4 micromoli de zahăr reducător (măsurat în echivalenți maltoză) pe minut din xilanul de lemn de mesteacăn, la pH 5,5 și 50 °C.