Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2148/2004

(2004. gada 16. decembris)

par pastāvīgu un pagaidu atļauju izmantot dzīvnieku barībā konkrētas piedevas un atļauju izmantot jau atļautu jaunu piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 370, 17.12.2004., 24. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Regula (EK) Nr. 1980/2005 (2005. gada 5. decembris)	L 318	3	6.12.2005.
►M2	Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1018/2012 (2012. gada 5. novembris)	L 307	56	7.11.2012.
►M3	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1043 (2015. gada 30. jūnijs)	L 167	63	1.7.2015.
►M4	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2305 (2015. gada 10. decembris)	L 326	43	11.12.2015.
►M5	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/447 (2017. gada 14. marts)	L 69	18	15.3.2017.

▼B

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2148/2004

(2004. gada 16. decembris)

par pastāvīgu un pagaidu atļauju izmantot dzīvnieku barībā konkrētas piedevas un atļauju izmantot jau atļautu jaunu piedevu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Saistvielu, pretsalipes vielu un koagulantu grupas preparātu atļauts izmantot bez termiņa ierobežojuma kā piedevu dzīvnieku barībā atbilstīgi I pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Mikroorganismu grupas preparātus atļauts izmantot bez termiņa ierobežojuma kā piedevu dzīvnieku barībā atbilstīgi II pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

3. pants

Mikroorganismu grupas preparātu atļauts izmantot četrus gadus kā piedevu dzīvnieku barībā atbilstīgi III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

4. pants

Fermentu grupas preparātus atļauts izmantot bez termiņa ierobežojuma kā piedevu dzīvnieku barībā atbilstīgi IV pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

5. pants

Fermentu grupas preparātu atļauts izmantot četrus gadus kā piedevu dzīvnieku barībā atbilstīgi V pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

6. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

I PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					mg uz 1 kg kompleksās barības			
Saistvielas, pretsalipes vielas un koagulanti								
E 567	Vulkāniskas izcelsmes klinoptilolīts	Vulkāniskas izcelsmes kalcija alumosilikāta hidrāts, kas satur vismaz 85 % klinoptilolīta un ne vairāk kā 15 % laukšpata, vizlas un mālu un nesatur šķiedras un kvarcu ►M1 ——— ◄	Cūkas	—	—	20 000	Visa barība	Uz neierobežotu laiku
			Truši	—	—	20 000	Visa barība	Uz neierobežotu laiku
			Mājputni	—	—	20 000	Visa barība	Uz neierobežotu laiku

▼B

II PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					KVV uz 1 kg kompleksās barības			
Mikroorganismi								
▼M5 —								
▼B								
E 1702	*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47	*Saccharomyces cerevisiae* preparāts, kas satur vismaz: 5×10^9 KVV/g piedevas	Sivēni (atšķirtie)	—	5×10^9	►M2 — ◄	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. Izmantošanai atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz aptuveni 35 kg.	Uz neierobežotu laiku
E 1706	*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133	Maisījums, kura sastāvā ir: *Enterococcus faecium*, kas satur vismaz: 7×10^9 KVV/g un *Lactobacillus rhamnosus*, kas satur vismaz: 3×10^9 KVV/g	Sivēni (atšķirtie)	—	$2{,}5 \times 10^9$	5×10^9	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. Izmantošanai atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz aptuveni 35 kg.	Uz neierobežotu laiku

▼B

III PIELIKUMS

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņa beigas
					KVV uz 1 kg kompleksās barības			
Mikroorganismi								
24	*Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* BCCM/MUCL 39434	*Kluyveromyces marxianus* var. *lactisK1* preparāts ar minimālo aktivitāti: $1,0 \times 10^8$ KVV/g	Piena govis	—	$0,25 \times 10^6$	$1,0 \times 10^6$	Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. Nelietot granulētos premiksos un barībā. Izmantot piena govīm, jo īpaši, kad tās sasniedz maksimālo dienas izslaukumu, vismaz 14 dienas. Katrai govij noteiktā dienas deva ir $1,0 \times 10^7$ KVV.	2008. gada 20. decembris

▼B

IV PIELIKUMS

EK Nr.	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	End of period of authorisation
					Aktīvās vienības/kg kompleksās barības			
Fermenti								
E 1615	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6	No *Trichoderma longibrachiatum* (CNCM MA 6-10 W) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Cietā veidā: 70 000 BGN (1)/g Šķidrā veidā: 14 000 BGN/ml	Gaļas cāļi	—	1 050 BGN	—	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: 2 800 BGN. 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem), piemēram, kas satur vairāk par 35 % miežu.	Uz neierobežotu laiku
▼M4 —								
▼M3 —								

▼B

(1) 1 BGN ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 4,8 un temperatūra 50 °C, minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo vienu mikromolu reducējošā cukura (glikozes ekvivalents).

▼B

V PIELIKUMS

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atlanjas termina beigas
					Aktīvās vienības/kg kompleksās barības			
Fermenti								
30 (vai E 1604)	Endo-1,3(4)-beta-glikanāze EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8	No *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) iegūtas endo-1,3(4)-beta-glikanāzes un endo-1,4-beta-ksilanāzes preparāts ar minimālo aktivitāti: Pulvera veidā: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 2 000 U ([1])/g Endo-1,4-beta-ksilanāze: 1 400 U ([2])/g Šķidrā veidā: Endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 500 U/ml Endo-1,4-beta-ksilanāze: 350 U/ml	Sivēni (atšķirtie)		endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-glikanāze: 70 U	— —	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 30 % miežu vai 20 % kviešu. 4. Izmantošanai atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz aptuveni 35 kg.	2008. gada 20. decembris

▼B

Nr. (vai EK Nr.)	Piedeva	Ķīmiskā formula, apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atlanjas termina beigas
					Aktīvās vienības/kg kompleksās barības			
			Gaļas pīles	—	endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U	— —	1. Piedevas un premiksa izmantošanas norādījumos norāda glabāšanas temperatūru, glabāšanas laiku un stabilitāti pēc granulēšanas. 2. Ieteicamā deva uz kg kompleksās barības: endo-1,3(4)-beta-glikanāze: 100 U endo-1,4-beta-ksilanāze: 70 U 3. Izmantošanai barības maisījumā, kas bagāts ar polisaharīdiem, kuri nav cietes polisaharīdi (galvenokārt beta-glikāniem un arabinoksilāniem), piemēram, kas satur vairāk par 50 % miežu vai 60 % kviešu.	2008. gada 20. decembris

([1]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,0 un temperatūra 50 °C minūtē no miežu beta-glikāna atbrīvo 5,55 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalenti).
([2]) 1 U ir fermenta daudzums, kas tad, ja pH ir 5,5 un temperatūra 50 °C, minūtē no bērza koksnes ksilāna atbrīvo 4,00 mikromolus reducējošo cukuru (maltozes ekvivalenti).